



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

TAGAU

DE

Chirurg

Institu

017

745

R. 199.2890 AN.
TAGAVLTII


AMBIANI VIMACI,
PARISIENSIS
MEDICI,
DE CHIRURGICA
INSTITVTIONE
LIBRI QVINQVE.

His accessit sextus liber de Materia chirurgica, authore
Iacobo Hollerio Stempno, medi-
co Parisiensi.

REM MAXIMAM SIBI



PROMITTIT PRVDENTIA.



T 14/2

LVGDVNI,
APVD GVLIELMV M ROVIL-
LIVM, SVB SCVTO VENETO.
M. D. XLVII.

del colegio de la comp^a de J. de
Alcala Dono J. del coronel
aplicase a la libreria de Luis Carril

Catalogus librorum.

Primus liber tradit tumores præter naturam.	pag. 1
Secundus liber, generatim de plagis seu cruentis vulneribus tractat.	pag. 133
Tertius liber, est de ulceribus curandis.	pag. 167
Quartus liber, fracturas tradit, & curat.	pag. 333
Quintus liber, luxata ossa distinguit, & reponit.	pag. 360
Sextus liber, materiam chirurgicam docet.	pag. 376

PETRI CRVSELII MEDICI IN OPERIS HVIVS COMMENDATIONEM HENDECASYLLABVM.

In chirurgia diu malis magistris
 Lanfranco, Albucasi, Guidone, Bruno,
 Rollando, Rogero, Vigonioq;
 Indignam malè passa seruitutem
 Cæcis deliruit gemens tenebris,
 Olim iam medicas duas sorores
 Emeruisse videns: gradu citato
 Ad claros studijs viros, & vsu
 Illustres medico Lucretianos
 Tendit suppetias petens, opemq;
 Cunctantur reliqui: Tagaultus vnus
 Afflicta lachrymas dolens, vicemq;
 Et sordes, habitumq; non herilem,
 Ornatu decorat nouo, reducens
 Densus è tenebris, vt emulari
 Germanas merito queat sorores.
 Sic putres Arabum lacus repurgat.
 Nam quod Cous habet senex, quod ipse
 Huc spectans tot habet libris Galenus:
 Hæc totum poteris videre Lector
 Descriptum methodo breui. Proinde,
 Summo iudice me, est honore dignus
 Vindex pæoniæ Tagaultus artis.
 Quo chirurgia tam bono magistro,
 Et doctore tibi expolita prodit.

Christianissimo Gallia

RVM REGI FRANCI-
SCO, EIVS NOMINIS

PRIMO,

IOAN. TAGAVLTIVS

MEDICVS S. D.



INTER eximias præclarasq; ani-
mi dotes, ac virtutes propè diui-
nas, quibus cæteris principibus
tantum antecellis, quantum di-
gnitate, opibus, potentiaque &
imperij magnitudine illis om-
nibus præstas: ea mihi potissima semper visa est,
Christianiss. simul & inuictiss. rex, quòd nullum
vnquàm tēporis momētum præterlabi sinis, quo
nō aliquid cogites aut agas, bono ac salutarī prin-
cipe dignum. Siquidem quicquid ocij ac tēporis
à necessaria cura corporis tibi superest, tu id om-
ne vel Reipub. tuę sapienter moderandæ, vel ho-
nestis atq; optimis disciplinis (quæ secundas res
ornant, aduersas solantur) tribuis: vt ne in vena-
tione quidē ipsa, qua colligendis & animi & cor-
poris viribus interdum vteris, tibi temperes, quin
vel de principatus tui administratione, vel de fe-
rarū quas persequeris, aut stirpiū quæ tūc se ocu-
lis obiciūt, aliarūve rerum natura, ferè semper
disputes. Quo fit vt Mineruam non minus quàm
Dianam errare in mōtibus & syluis subinde ex-
periaris. Sed & in mensa illa tua regia, frequenti

A 2

prin



EPISTOLA

principum, illustriumque virorum Cardinaliū & Episcoporum conspectu ac confesso, semper aliquid ardui, doctiq; & honesti, contra morem & exēplum aliorum principū, non eorū modo qui nunc sunt, sed qui multis antehac sæculis fuerūt, ē media philosophia atque antiquitate depromitur: vt rectē æstimanti ea sapientiæ verius officina, quā epulū regiū possit videri. Aut enim humanæ, eadēmq; graues & te principe dignæ, aut diuinæ, quæ animū ad religionem informant, in ea recitantur historiarū, aut de omni genere artium, atque disciplinarum disputatur. Hinc factum est, vt Gallorum Resp. inde adeo quod illi præfuisse, virtute honesta, religione ac pietate integra, iure & legibus æqua, opibus firma, copijs locuples, & gloria ampla semper fuerit. In hac autē assidua literarum cōcertatione, tu quasi arbiter honorarius, inter doctos homines de rebus controuersis, vt olim in encyclijs & scholis suis (si parua magnis conferre phas est) facere solebant, magistri ac philosophi illi veteres, nō minore eloquentia quā dignitate iudicium interponis, grauiusq; decernis. Quid q; tu omnem omnium artium materiam, rationē, & instrumenta, in numero habes, atq; apposis nominibus exprimis. In quo Themistoclis, Mithridatis, Cyriq; Persarum regis memoriā facile superas, vel obscuras potius. Sed & cum de re medica (vt aliquid de ipsa separatim dicamus) disputatio incidit, incidit autem frequēter, tu res medicas non aliter tractas quā qui omni vita nihil aliud egerit. Nec aliter statuis,

tuis,quàm qui in ea disciplina consenuerit:vt & præceptiones artis,& medicamentorū,præsertim simplicium nomina & vires, ipsamq; corporum anatomen(cuius speculatione incredibiliter delectaris)ad vnguem teneas,cōsilia curādi sapientissimè distinguas,vim remediorū adnotes, quid vnumquodq; profit, quid noceat, aptè & acutè definias.Quāquàm verò hoc bonarū artium studiū,quod nunquàm intermittis, præpoiterè nati quidā, & ab omni ingenij cultu alieni,tanquàm parum regium irridēt atq; damnant. Tu tamen, Princeps longè maximè ac sapientissimè,regiarum virtutū fundamentum,& clarissimum boni ac salutaris principis ornamentū ponis,verè cum Platone nobilissimo totius Græciæ philosopho diiudicans,nō aliter foelices fore respublicas,nisi si aut philosophis cōmitteretur imperiū,aut quibus imperium contigisset,philosophiam sequerentur.Salomon cū pro Dauid patre suo regnare cœpit,tantum sapientiam à Deo postulauit,qua rectè iudicare & populū sibi commissum sapienter gubernare posset:atq; hic nihil aliud inculcabat filio suo quàm amorē ac studium sapientiæ. Nec abs re quidē:nam fato sceptrā cadūt,doctrinæ autē gloria perennis. Quod tu etiam animo reputans,nihil vnquàm charius, nihil antiquius duxisti,sapiētix studio,atq; assidua eiusmodi bonarum artiū tractatione:ex qua tantos iam progressus in omni virtute,atq; omni disciplinarum genere fecisti, vt Imperatores illos,& belli duces clarissimos,Alexandrū magnū,Iulium Cæsarem,

EPISTOLA

Octaviū Augustū, Scipionem Africanū, non minus literarum scientia, quā bellicis artibus prestantes, facile superaueris. Sed & hac doctrine cupiditate, qua semper totus sic flagras, tu nō solum eorū quibus imperas fortunis, & corporibus, verum etiam animis excolendis, multarū rerum vsu ac sciētia edoctus, prudēter ac sapiēter (quod verē est imperare) consulis prospicisq;: dum scilicet infinitos propemodum homines, ac nobiles maximē, certatim ad studia literarū tuo exemplo excitas atq; incendis. Regū enim mores, reliqui ciues ferē sequuntur. Hinc non abs re tanquā ad certissimū rei literarię preſidiū, externi etiam homines, qui arte aliqua præstant, ad te vnum vndiq; confugiunt, teq; musarum patronum, ac fautorem eximiū agnoscunt & prædicant. Quæ res effecit, princeps humanissime, vt depulso metu, aucta spe, hosce de chirurgia commentarios tibi consecrarem, vt scilicet in ista tua felici agricultura, qua semina omnium bonarum artium, in hunc foecundissimum agrū tuum, tum etiam in totum terrarum orbem, dispergis, aliquam operę partem sustinerem: vt quę aliquid ex clarissimo tuo nomine patrocini nanciscantur, auspiciatiusq; in vulgus prodeāt. Sed ad id etiam me vehementer impulit, quod haudita pridē, sermone in mensa illa tua semel atq; iterum de chirurgia habito, quod in reliquis literis, græcis, latinis, hebræis cœperas, idem in hac quoq; arte, quę manu medetur, te facturum spondidisti, teq; vnum aut etiam alterum doctum, & longo iam vsu ex-

ercita-

ercitatum medicum instituturū, qui chirurgiam
Lutetiæ Parisiorum diligēter ac fideliter inter-
pretentur. Atq; hoc quidem tuum tam sanctum
tamq; salubre institutum nobis aliquando retu-
lerunt ἀρχίατῆρ Burgensis, Capellanus pater, &
Gulielmus Milletus, medici tui clarissimi, simul
& fidelissimi. Fecerat idē quoq; paulò ante am-
plissimus Cardinalis Bellaius, vir omni virtutum
ac scientiarum genere cumulatissimus, ac reipu.
Gallicæ longè amantissimus. Qui omnes me ve-
hementer aliquoties hortati sunt, vt chirurgicā
hanc lectionem maturè aggrederer, eam quidem
tibi futuram quā gratissimam affirmātes, teq;
statuisse vnum aut alterum eius artis professore,
Lutetiæ instituere: arbitratus amplissimo huic ac
præpotenti tuo imperio, rem non vtilem modo,
sed & apprimè etiam necessariam futurā. Quip-
pe quòd deinceps chirurgos non parum multos
haberes in regno tuo, vulneribus & fracturis ritè
curandis, luxatisque decenter in suam sedem re-
ponendis, maximè idoneos. Cæterū tametsi hac
medicinæ parte, nulli sæpe non sit opus, nobiliori-
bus tamē & principibus viris, atque ijs etiā om-
nibus qui castra sequuntur & militiæ addicti sunt,
in primis necessaria est. Hi enim dū equis ad ce-
leritatem dispositis huc atque illuc excurrunt, dū
ludis equestribus exercentur, dum in bello cum
hoste conflitantur, & dimicant, fracturis & luxa-
tionibus, vt interim vulnera taceam, nunquā
non expositi sunt: quibus, nisi ritè tractentur, vel
subinde periclitantur, vel membris sic affectis, suo

EPISTOLA

tandem robore destitutis, reliquum vitæ tēpus, miseri & imbecilles trahūt. Sed vt vnde digressa est redeat oratio, q̄ nondum hæ nostrę chirurgicę institutiones erāt absolutę, tantisper distuli clarissimorum, quos supra nominaui, virorum, hortationi parere, quoad hoc, qualecunque est, opus absolueretur. Dum autem cudendo nimis cunctatur typographus, hominem vt aliis medicinæ partibus præstantem, sic chirurgiæ peritia egregiè instructū, Vidum Vidium Florentinum, doctissimū vnde quaq; viri, ac præstantium ingeniorū studiosiss. D. Castellani Tutelensium episcopi, singulari iudicio cōquisitum, maximo rei chirurgicę studiosorum, atque eorum qui deinceps chirurgiæ præsidio indigebunt, cōmodo, in hanc præclarissimam urbem misisti, qui partem hęc medicinæ, propè desertam & iacentem, quoad fracta saltem & luxata pertinebat, susciperet, atq; extolleret. Librosq̄ Hippocratis (qui primus hanc artem excoluit) inextricabilibus penè sententiis, ob fœcundam & obscuram nimis breuitatem, vbique ipsi medicinæ parenti familiarem, ne dicā affectatam, refertos: & ab eo nuper cum doctissimis atque accuratissimis Galeni commentariis, latinos factos, magna sermonis elegantia, & rerum copia, interpretaretur. Quod si hic, aut alius quispiam, pari doctrina & eruditione præditus, in hoc docendi curriculo perstiterit, bonis chirurgis, vt medicis, Galliani tuam breui refertam iri confidimus. Quod non mediocri mortalium bono, & cum sempiterna quoque

NVNCVPATORIA.

quoque nominis tui gloria eueniet. Quandoquidem effectus chirurgiæ (quæ Celso authore pars est medicinæ vetustissima) inter cæteras artis medendi parteis euidentissimus est, & maximè necessarius, nedum vtilis. Siquidem in morbis cū multum (inquit ille) fortuna cōferat, eademque sæpè salutaria, sæpè vana sint, iure dubitari potest secūda valetudo, medicī ne industria, an corporis beneficio contigerit. In his quoque affectibus in quibus medicamentis extrinsecus admotis maximè vtimur, quamuis profectus euidentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra queri, & sine his reddi sæpè manifestum est. Sicut in oculis vel phlegmone, vel lippitudine arida, aut ea humorum defluxione, quam epiphoram appellant, laborantibus quotidieprehendimus, qui à medicis, collyriis, aut alterius generis medicamentis, diu vexati: sine his aliquādo fanescūt. At in ea parte quæ manu curat (χειρουργικὴ Græci nominant) euident est omnem profectum, vt ali quid ab aliis adiuuetur, hinc tamen potissimum manare. Quot enim morbos, eosdemque grauissimos, in rusticis & vrbanis, qui delicatiores sunt & medicinā auersantur, quotidie videmus: sine illa victus ratione tā exacta, nullisque adhibitis medicamentis naturæ dūtaxat beneficio, euinci, & profligari? At si cui vel crus vel brachium fractum sit, vel luxatus humerus, aut quispiam articulus: nunquam sine manus opera, & chirurgi industria ad sanitatem perducetur. Itaque cū tanta sit eius artis dignitas, vsus, necessitas, quis
hoc

EPISTOLA

hoc tuum tam salubre de constituendis chirurgiæ professoribus, institutum non maximopere probauerit: Opus sanè & liberali & magnifico principe dignum, & quo Romanorum olim imperatorum exempla, & laudata consilia reuocabis. Hi enim medicis (quos Reip. salutare & necessarios nouerant) amplissimum stipendiū ducena & quinquagena annua sestertia, centena verò Rhetoribus & poëtis, reliquarumque disciplinarum professoribus pendebant. Intellexerunt nimirum illi semper Augusti imperatores, inter disciplinas excellentibus illustrium hominum ingeniis inuentas, & incredibili grauiū virorum cura & industria perfectas, expolitasque, Medicinam principem ac reginam existimari sine controuersia debere. Hæc enim & honestatis splendore & utilitatis magnitudine, & iucunditatis illecebris, reliquas omnes vincit, rebusque humanis seu altera secundum Deum vitæ parēs & vindex apprimè est necessaria, atque ideo nō solum à Philosophis, aut Medicis, sed & ab ipsis quoque Imperatoribus, Regibus, atque etiam Pontificibus, aliquando non oscitanter exculta. Neque enim puduit illos primi ordinis viros studium atque industriam in eo genere disciplinæ nonnunquam collocare. Et ut aliquot exempla proferamus: Augustus Cæsar, compositione medica à se inuenta lubenter utebatur, quam postea plerique medici in suos libros transtulerunt. Tyberius pastillum (Græci Trochiscū vocant) ad herpetas, Galeno teste, composuit. Ne-

NVNCVPATORIA.

ro imperator illaudatus quidem, sed tamen ap-
 primè doctus, partem studii in hoc genere do-
 ctinæ posuisse fertur. Hadriani & Iustini anti-
 dota nomine ab eis accepto, hodie quoq; apud
 medicos celebrantur. Princeps Arabs Auicen-
 na in remediis medicis à se conscriptis, testimo-
 nium Kabithi regis locis aliquot laudat. In Se-
 rapionis commētarijs Iacibuſſa Medorum rex,
 & Kemud item rex, velut medicinæ testes me-
 morantur. Lyſimachus, Gentius, Eupator, &
 Clymenus reges, medicæ artis non ignari, ſua
 ipſorum nomina plantis indita, æterno æuo me-
 moranda reliquerunt. Taceo Iubam Maurita-
 niæ regem, qui herbam Euphorbiam nomine,
 miris laudibus celebravit. Prætereo & Arche-
 laum, Hieronem, Attalum, & Philometora re-
 ges, qui de plantis Græcè ſcripſerunt. Ex pontifi-
 cibus autem Nicolaum quintum, & Eusebiū ar-
 te & professione medicos fuiſſe, in historiis no-
 ſtris legimus. Ac de re quidemeiuſmodi apud
 multos tam veteres quàm noſtræ ætatis ſcripto-
 res, ſacundia & eruditione per celebres, in com-
 mendationem dignitatis & excellentiæ medi-
 cæ artis, ac medicorum, longè plura literarum
 monumentis tradita ſunt, quæ hoc loco referre
 & longum eſſet & minimè neceſſarium, eo quæ
 magis quòd id iam cumulatè præſtitit Andreas
 Tiraquellus tuus in curia Pariſienſi cōſiliarius,
 vir optimis quibuſq; diſciplinis inſtructiſſimus,
 ac linguæ vtriuſque Græcæ & Latinæ, Iuriſque
 prudentiæ, quam ſumma cum humanitate &
 morum

EPISTOLA NVNCVPAT.

morum integritate coniunxit, peritissimus: in opere quod de nobilitate & iure primigeniorum mox in lucem est æditurus. At verò nō est, Rex illustrissime ac sapientissime, quòd peregrina iam exempla commemorem, cum tu nulla in re veteribus cedas, adeò vt qui in posterum medicinam, ac bonas omnes disciplinas (quæ te principe & authore suo splēdori restitutæ sunt) autoritate principum commendare volent, nō habebunt necesse veteres illos clarissimos Cæsares, Alexandros, Tyberios, Hadrianos, Iustinos, vel reges alios, aut Pontifices amplius requirere, sed te vnum nominabunt, qui disciplinarum omnium intelligentia, & amplitudine stabilis ac præpotentis imperii, veterum nemine sis inferior. Foelicissimam igitur Gallorum rempublicam iudico, quæ te regem tam prudentem, tamque salutare, omnibusque virtutibus & disciplinis ornatissimum, diuino numine consequuta, rebus omnibus ad beatè degendā vitam cōfērētibus, ita abūdat, vt hodie vniuersi terrarū orbis tractus omnes, & omnē antiquitatē superet. Sed multo adhuc foeliciore eam fore cōfidimus, si te diutius incolumē, & quotidianis Reip. vuneribus medentem, eiusque partes omnes illustrātem habuerit. Quamobrem Deū optimū maximum precor, vt populū ab eo tibi cōmissum annos adhuc quāplurimos, hoc salutari imperio regere possis. Quo enim ij plures erūt, plus ad cumulum foelicitatis huius amplius. simul & Christianis. regni haud dubiè semper accesserit. Vale.

AD LECTOREM

PRÆFATIO.



CHIRURGICEN Guidonis Cauliaci, abhinc centum & septuaginta annos, tanto apud medicos iuxta ac chirurgos in precio habitam, septennium ferè eius artis candidatis prælegi. Quam cum tot passim errorũ ac mendarũ portentis scatentem, tamque inculta, squalenti atque impura barbarie cõsperfam, ne dicã conspurcatam, reperissem: tum in animum induxi meũ, opus eiusmodi, ab illis quibus ita refertum erat erroribus repurgare, & à vocabulis illis sordidioribus, atque ex intima ferè plebei sermonis fæce acceptis, si quando per ocium liceret, pro mea virili parte, vindicare Videbam enim plerosque omnes, qui in disciplinis humanioribus & elegantioribus literis probè erant instituti, fœdam eiusmodi, atque impuro nimis sermone traditam chirurgiam auersari, ab eiusque lectione, vel in ipso vestibulo adituque, perterritos, statim se subducere: Nimirum existimantes (nec abs re quidem) disciplinam omnem detractò cultu orationis sordescere. Contrà autem cõsiderabam, chirurgicos hosce commentarios, remedia quàm plurima, ad eos affectus quæ manus operam desiderant, longè optima & efficacissima continere: ac inethodo tum ad rectè docendum, tum ad faciliè discendum aptissima conscriptos esse. Itaque operis huius non poenitendi, nec vsque adeò (vt existimo) aspèrnerandi prouinciam, eo consilio subiui, vt ipsum à mendis, quibus scatebat, fœdioribus vindicatum, velut reformarem, & quanta maxima possem diligentia ac fide recognitum, in lucem proferrem. Plurima igitur ex Galeno & Hippocrate à Guidone ipso desumpta, deprauatè ac perperam ex vetere illo barbaro interprete citata, vel ex doctis & fidelibus Latinis interpretibus in sensum germanum restituiimus, vel ad fidem græci exemplaris in Romanum sermonem fecilicis conuertimus: eaque non rarò, si quando obscuriora adparebant, sermone magis dilucido explicuiimus: quæ verò breuitas suppresserat, aut ambigua effecerat, sic expressimus, vt omnis ambiguitas tolleretur. Corruptas morborum penè omnium, de quibus differebat, & remediorum præsertim simplicium voces propè innumeras, abieciimus, & alias magis ger-
manas,

P R A E F A T I O

manas, leætas, & proprias tum græcas tum latinas in locum illarum suffecimus. Ad hæc, locos, quàm plurimos densissimis obscuritatis tenebris obductos, penitusque retrusos in lucem clarissimam, non mediocri labore, & diligentia reuocauimus. Græcas item dictiones, & latinas sanè multas cum barbaris & Arabicis aliud longè significantibus turpissimo errore confusas distinximus & explicuimus. Romanas quoque etymologias, græcis vocibus ineptissimè attributas, reiecimus: & veram illis interpretationem ex probatis authoribus iuxta linguæ vtriusque proprietatem adiecimus. Quæ falso erant ab eo posita, (erant autem non parum multa) emendauimus, & rationibus firmissimis, adiectis etiàmnum classicorum authorum sententijs ad re vel maximè facièntibus, refutauimus. In reliquis, quæ crassam nimis, supinamque barbariem respiciebant, ea paulò tersius ac nitidius, ne lectori sordescerent, expressimus. Denique Guidonis commentarios de chirurgia conscriptos, ex purissimis Græcorum, videlicet Hippocratis, Galeni, Pauli Aeginetæ & Aëtij Amideni fontibus, ac longè eruditissimis atque elegantissimis Cor. Celsi de re medica libris, ita locupletauimus & illustrauimus, à mendis que illis sordidioribus, ac portentosis erroribus, quibus passim deformari erant, expurgauimus, vt non iam amplius Cauliaci illius opus, sed nostrum meritò ab omnibus dici & æstimari possit. Quod & me etiam tacente faciliè videbunt, ac (nisi iniqui fuerint æstimatores) ingenuè fatebuntur, quicunque nostras has institutiones chirurgicas accuratius perlustrauerint, & eas cum scriptis Guidonis conferre non fuerint grauati. In quibus (fateor) ordinem illum à Guidone constitutum (quòd nobis, vt suprà diximus, longè optimus videretur) vbiq; ferè obseruauimus. De quo nōnihil modo, quādo id præsens locus postulare videtur, obiter dicemus. Itaque à definitione eius ipsius de quo agitur, iuxta Philosophorū præceptū, semper auspiciamur. Mox quod iā definitione explicatū est, in suas differentias diuidimus. Post hæc causas, signa & iudicia cuiusq; subijcimus. Deniq; vniuersalē curādi rationē apponimus. His sic absolutis, differentię illæ primæ ac (vt ita dicā) genericæ, propria etiā definitione circumscribuntur, & deinceps in suas veluti fibras finduntur, quæ notis cuique peculiaribus scitè designantur: præfagia deinceps cuiusq; propria notantur. postremò curādi methodus particularis describitur. Quo sanè ordine vix alius (meo qui dem iudicio) statui aut excogitari melior potuisset. Cæterū nos tantum

AD LECTOREM.

tantum vniuersalem methodum eorum affectuum, qui chirurgiæ subiecti sunt, hic sequuti sumus: quod hæc abundè satis sit, ijs qui in rationali medicina probè sunt instituti, & corporum ægrotantium ac singularum partium affectuum temperaturam, situm, connexum, substantiam, figuram, actionem, usum, & si quæ sunt alia, ex scriptis medicorum, sed Galeni maximè, didicerunt. Itaque superuacaneum iudicavi de ijs rursus affectibus, quatenus in singulis partibus incidere consueuerunt, differere. Anatomem quoque (cuius cognitio in primis chirurgus est necessaria) prætermisimus, quod hæc in longè eruditissimis ac propè diuinis Galeni commentarijs de usu partium corporis humani, & libris eiusdem de anatomicis administrationibus, ac quibusdam etiam alijs, summa tum arte tum eloquentia conscriptos (ut reliquos taceam, qui hac de re nostra memoria scripserunt) amplissimè ac fidelissimè doceatur & exponatur. Verum enimvero cum in eiusmodi libris plurima sint, quæ valde multis subobscura, quædam verò alijs prolixè nimis dicta, & parum ad chirurgum pertinentia videntur, si in posterum cognouerimus nostros hocce commentarios ab huius artis chirurgicæ studiosis hominibus probari, atque ut his accedat anatomæ (quod iam subodorati sumus) desiderari, quæ iam ante annos aliquot, ea qua fieri potuit breuitate & facilitate in hanc rem quantum satis est chirurgus, conscripsimus, alia additione superis benè fauentibus ne quid huic operi desit, in publicum emittemus. Quod autem ad stylum attinet, quo in hoc opere, quod totum ad docendum res, easque non indignas cognitu, est accommodatum, usus sum: non tam religiosus fui, ut illum tam anxium verborum delectum, tamque splendidum orationis cultum & ornatum ubique obseruarem, qualem ab omnibus qui in communem utilitatem aliquid scribunt, exigere solent delicatuli isti lautioris eloquentiæ institutores, qui omnem dictionem, atque orationem ut putidam auersantur ac respuunt, quæ ex Tulliana officina deprompta non sit: cum tamen Tullius ipse non requirar eloquentiam à philosopho: quam etiam neque Seneca usquam desiderat, nisi cum paruo constat, cumque vitro adest, ut res magnas (inquit) magnificè prosequatur. Cæterum etsi res ipsæ etiam quas hic tractamus, orationis cultum & ornamenta dici admitteret, ne vacabat quidem, dum hæc horis succisuis commentabamur, ut singulas tum voces, tum sententias ita superstitione expendere, & adeo curiosè persequeretur. Sed nec licet nobis etiam esse tam disertis, qui seueriores Musas colimus: quique

non

AD LECTOREM PRAEFATIO.

non ad ingenij ostentationem scribimus, aut ut vberem famæ messem nobis comparemus, sed publicam duntaxat studiosorū utilitatem spectamus. Atque huius sanè rei nos subinde admonuit Iacobus Syluius, arctissima consuetudine vel ab ipsa ferè statim ineunte adolescentia mihi semper coniunctissimus: vir cum omni arte ingenua, liberalique doctrina, tum medicinæ scientia præstantissimus, ut copiosæ & eruditæ eius lucubrationes abundè testantur. Itaque, si rectè iudico, effeci ut stylus non ster neque nimis neglectus, neque anxie nimis & ambitiosè elaboratus, sed temperatus & medioeriter cultus videri possit: quàm duobus postremis libris & paulò cultior sit & æquabilior, quippe quòd in eis aliquantum plus laboris & diligentiae quàm in reliquis adhibuerimus, & quos sequeremur auctores optimos habuerimus. Cæterùm alia ædizione, si detur interim nobis ocium, hoc, qualecunque est, opus acius recoquendi, & diligentius castigandi, futurum confidimus, ut in eo styli disparitas nulla, sed eadem vbique, quoad fieri poterit, æquabilitas (quod artis benè dicendi, atque etiàm interpretandi primum caput est) reperiat. Sed iam satis multa de præsentis operis materia, methodo, deque toto labore nostro dictum sit: qui an à nobis frustra vel rectè susceptus sit ac perfectus, aliorum esto iudicium. Restat ut paucis dicamus, cur liber sextus, ad què toties lectorè quinque nostris prioribus remittimus, nostro nomine non fuerit, euulgatus. Id fuit in causa, quòd dum importunis amicorū efflagitationibus vrgerer, ut quæ de re chirurgica scripseram, ea ederem, non putabam sextum librum adiungendum: propterea quòd rudem duntaxat & impolitam quandam sylvam congestam habebam eorum quæ ibi tractanda erant: quam negotijs plurimis & familiaribus & publicis occupatus haudquaquã recognoscere poteram. Itaque id oneris Iacobo Hollerio, lectionissimo medico doctissimoque philosopho, & arte dicendi instructissimo, dedimus, qui sic opus rude & inchoatum à me limavit, expoliuit, locupletavit & consummavit, sicque totum immutavit, ut cum ad me rediret, meum esse nequaquam agnoscerem.

Quocirca sub illius nomine, potius quàm nostro, quicquid id erat sensuimus euulgandum: ne hominem mihi amicissimum debita laude, meritaque gloria fraudaremus. Tu lector utriusque labore fructe,
& Vale.

Index in sex libros se-

QUENTES, CVIVS

NVMERVS PRIOR PAGI-

NAM, POSTERIOR LINEAM

DENOTAT.

A



<i>Abscessus</i> apertio. 42.8	<i>Adglutinatio</i> diuisorum duplex. 165.4
<i>Abscessus</i> aperien- di ratio. 30.25	<i>Adglutinatoria</i> deligatura. 166.19.
<i>Abscessus</i> à quibus fiant humoribus. 15.21	<i>Adipes</i> anodyn. 433.26
<i>Abscessuum</i> iudicia. 22.14	<i>Adipes</i> pepticam vim habentes. 398.27
<i>Abscessus</i> qui dicant Galeno. 17.25	<i>Adolescens</i> ex cerebri vulnere cu- ratus. 139.28
<i>Abscessus</i> quid. 1.10	<i>Adstringentia</i> calida. 380.29
<i>Abscessus</i> quando secandi. 30.12	<i>Adurentia</i> medicamenta. 49.5
<i>Abscessus</i> vnde. 16.14	* <i>Aëris</i> ambientis nomine quid in- telligendum. 215.20
<i>Abscessuum</i> curatio in vniuersum. 28.36	<i>Aeris</i> erugo. 298.10
* <i>Aceti</i> vsus in malacticis. 39.4.8	<i>Aeris</i> squamma. 299.11
<i>Aceti</i> vsus in scirrhis. 118.28. & 394.30	<i>Aerugo</i> quid. 73.38
<i>Acetum</i> . 382.7	<i>Aeruginosa</i> bilis. 58.22
<i>Acetum</i> mulsum incidit & deter- get. 392.8	* <i>Affectus</i> cum luxatione compli- cati. 361.11
<i>Acrida</i> vbi vitanda. 413.9	<i>Affectui</i> contumaci & minus ca- lenti remedia. 390.17
<i>Acrimonia</i> quomodo auferatur à medicamentis. 413.10	<i>Affectuum</i> cum vlcere complica- torum curandi quatuor inten- tiones. 282.8
<i>Acrochordones</i> qua. 8.11. & 72.3	* <i>Agaricus</i> conuenit conuulsis ex crassis & pituitosis humoribus. 193.8
<i>Acus</i> forma & qualitas qua su- tura fit. 169.8	* <i>Albata</i> . 9.26. & 10.13
* <i>Adens</i> . 34.37	<i>Albata</i> Punicorum est leuce Gra- corum & Celsi. 9.27
<i>Adeps</i> & sebum differunt. 392.35	<i>Alidaron</i> trochiscus. 54.13
<i>Adeps</i> recens laxat vetus discutit. 389.17	<i>Albasaphum</i> . 11.7
<i>Adeps</i> vetus quomodo fit recens. 393.26	α <i>Alkali</i>

INDEX.

Alkali quid.	431.21	Apoſtematis absoluta definitio. &	
Almatim Anicenna, Græcorum ter-		definitionis examinatio.	300
minthi.	13.16	Apoſtematis curatio est extractio	
Almifmar.	72.21	materia extraneæ quæ ipsum fa-	
Al. è vulgaris.	423.13	ciebat.	30.8
Alphi duplices.	9.31	ΑΠΟΔΕΥΜΑΤΙΣ.	334.15
Alphit. don facta fractura.	334.12	* Aquæ aluminosa vis ad pituito-	
Althæa officinæ bis malua.	369.30	ſos abſceſſus.	97.40
Alterationes tres in animalis cor-		Aquæ fortes.	432.14
pore ſunt.	274.22	Aqua vite.	209.2
Altercum.	291.6	Aquosi tumores.	16.8
Alumen.	296.28	Aquosi tumoris curatio.	88.35
* ΑΛΥΚΤΗΓ. quæ.	427.23	Aquosum apoſtema.	87.25
* Anadendromalache.	116.15. &	* Arabibus aliqua laus deferenda.	
118.12		376.18	
Analogia in tumoribus præter na-		ΑΙΣΧΗΤΙΚΑ cuius nature ſint.	387.31
turam.	19.36	Ardor alicuius partis quomodo ex-	
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣ cauſæ.	224.24	tinguatur.	385.8
Androni trochiſcus.	50.34	Argentum viuum ſublimatum ſi-	
Aneurisma quando fit.	242.12	ſtilis calloſis vtile.	324.32
ΑΝΩΔΥΝΗ quæ.	433.17	Aſſenici uſus & meſura.	107.2
Antecedentes tumorum cauſæ.	15.	Aſſenicum ſublimatum.	54.15. &
15. et 272.13		243.1	
ΑΝΤΙΔΙΔΥΜΙΣ.	403.10. &	Aſſenici ſublimati viui à corru-	
Antidotarium quid.	377.35	pto optime ſeparat.	309.31. et 128.1
Anthracæ qui.	33.32. &	Arteria incifa aliquando vnitur.	
Antimonium.	298.10	148.13	
Antiſpaſis.	262.7. &	Arteriarum vulnera.	235.38
ΑΝΤΙΣΠΑΣΙΣ.	346.38	Articulis non conuenit uſus ferri	
* ΑΝΤΙΣΠΑΣΤΗΡ vlcus.	410.14	& cauteriorum.	402.12
Apertæ vaſis conueniunt aſtrin-		Articulorum doloribus conueniens	
gentia.	435.38	oleum.	434.39
Aphoriſmi 49. & 50. lib. 6. inter-		* Aſcites vnde.	87.32
pretatio.	365.5	Aſcites à maiore frigidityte fit quæ	
ΑΠΙΚΟΠΗ.	334.15	tympanites.	88.21
ΑΠΙΚΟΠΗ.	378.34	Aſſanar.	180.1
Apoplexia.	196.2	* Aſtrictionis meſura.	379.39
ΑΠΟΚΛΙΜΑΤΗ quæ.	18.3	* Atheroma.	93.6
Apoſtema aliter à Græciſ, aliter à		Atheromata ſub quo genere tu-	
recentiorib' accipiſ. 1.1. et deinde.		morum continentur.	7.6
		Athe-	

INDEX.

<i>Atherumatis curatio.</i>	108.12	<i>Calidicon trochiscus.</i>	34.12
<i>Attrachylis collectica sumè.</i>	423.26	<i>Calli curatio.</i>	429.5
<i>Attrahètia aduèitio calore.</i>	385.13	<i>Calli in osse fracto conueniens portio.</i>	445.4
* <i>Auerfio sanguinis duplex.</i>	238.28	<i>Calli in osse fracto magnitudo decens.</i>	351.3
<i>Auerfio cū vacuatione sanguinis.</i>	238.32	<i>Calli in osse fracto materia.</i>	350.9
<i>Auicennæ locus de incisione medullæ interpretatus.</i>	261.10	<i>Calli ossis generari incepti notæ.</i>	350.14
<i>Auicenna myrmecias confundit cum herpetibus.</i>	68.4	<i>Calli sine τσόγου concreti signa.</i>	445.2
<i>Aureum Mesuæ sarcoticon.</i>	415.4	<i>Calore quæ trahunt.</i>	407.11
<i>Autoris antidotarij institutum & consilium in libro describendo de materia chirurgica.</i>	378.14	<i>Calor facit motum immodicum.</i>	203.22
B		<i>Callos aufert elleborus.</i>	429.1
<i>Barbarum Galeni.</i>	414.24	<i>Callosus labris vlcerum medicamentum conueniens.</i>	435.2
<i>Batitura æris.</i>	259.11	<i>Callosus vlceribus conueniens medicamentum.</i>	301.15
* <i>Belulcum ferramentum.</i>	156.39	<i>Callos quæ minuunt.</i>	355.6
* <i>Bilis atra.</i>	58.2	<i>Callum iustum firmantia in osse fracto.</i>	445.7
<i>Bilis duplex.</i>	58.7	<i>Callus.</i>	8.17. & 429.2
<i>Bilis quid.</i>	58.4	<i>Callus ossis dicitur, cuius interuentu ossis fracti partes adaligantur.</i>	147.33. & 340.10
* <i>Bocium.</i>	94.7	<i>Callos quantū differt à clauo.</i>	72.38
<i>Borago.</i>	179.1	<i>Calvaria fracta solidescit triginta quinque diebus.</i>	358.10
<i>Botbor.</i>	4.12. & 8.25	<i>Calx vna quid.</i>	242.25. & 287.19
<i>Bothores iuncturarum.</i>	13.16	<i>Cambil.</i>	281.15. & 299.34
* <i>Brachij caput quomodo luxetur.</i>	362.24	<i>Cancer à carcinomate differt.</i>	7.36
<i>Bronchocele.</i>	90.29	<i>Cancerosis vlceribus quæ imponuntur.</i>	407.23
* <i>Bubo.</i>	94.25. & 280.15	<i>Cancer quid.</i>	121.1
C		<i>Cancer quando curationem quas do non admittit.</i>	123.2
<i>Acocbymia quid.</i>	26.24	<i>Cancer vlceratus cur lupus vocetur.</i>	330.17
<i>Cacoëthe vlcera.</i>	59.13. & 292.30		
<i>Cacoëthe vlcera iuuantia.</i>	408.15		
* <i>Casim & percussim plagis factis medicamentum enihumum necessarium.</i>	286.39		
* <i>Cadmia.</i>	297.38		
<i>Calamentum officinarum.</i>	290.16		
<i>Calcis modus lauandi.</i>	257.26		

INDEX.

Cancris exulcerati.	59.13	Caries lignorum.	412.39
Cancris signa.	121.28	Carnem detrahunt que vehemen-	
Cancris signa, scirrhus Guido tri-		ter exiccant & natura acris	
buit.	113.11	sunt.	220.16
Cancris medicamenta topica que		Carnem facere est natura opus.	
conueniant.	125.6	212.17 & 410.19	
Cancris quibus adblandiendum ve-		Carnem minuentium supercrescen-	
ra cura omiffa.	328.31	tem quadam valentia quadam	
Cancris vicerati nota.	327.6	imbecilliora, & inter hac que-	
Cancris vnde.	112.27	dam media.	220.38
Cancros aliquando Celsus gangra-		Carne replent siccantia & deter-	
nam & sphacelum appellat.		gentia.	315.26
336.23 & 346.16		Carni generande que obsunt.	
Cancrofa vlcera purgatio 408.11		410.30	
Caninum cerebri offa fracta qua-		Carni regnenda quis sanguis	
tuordecim diebus solidat.	443.9	aptus.	212.12
Canis rabiei nota.	230.17	Carnis excrefcentias reprimens	
Canis rabie sepius capitur.	230.12	med.	409.30
Cantharides quid mali adferant.		Carnis generationi duplex adest	
431.9		excrementum.	212.34
Caphura.	381.16	Carnis mutata a venenato ielo	
Capitellum quomodo fiat.	431.27	nota.	160.3
Capitis luxationes.	362.3	Carnis supercrescentis detractio.	
Capitis vlcera coniungens	423.33	natura opus non est.	220.17
Capnos græcè, fumaria latine dici-		Carnosi vulneris diuifio.	204.21
tur.	115.8	Carnosi vulneris simplicis in car-	
Capparis cortex.	299.28	ne summa accepti, curatio.	205.12
Carbunculi.	33.31	Carnosum vulnus & eius diffe-	
Carbunculi curatio.	47.13	rentia.	204.11
Carbunculi iudicia.	46.35	Caro temperamentum proprium	
Carbunculi note.	46.2 & 32	seruare debet priusquam vlcus	
Carbunculi qui pessimi.	46.36	curari possit.	284.8
Carbunculis conueniens medica-		Κάταγμα.	259.39 & 333.23
men.	395.5	Καταμυκτην.	413.20
Carbunculum maturans et rum-		Καταμυκτην deligatio.	440.19
pens.	48.20	Cataplasma ad phlegmonas ex	
Carbunculus vnde oritur.	45.34	fluxione natus conueniens qua-	
Caricarum decoctum pepticum est.		le.	69.39
399.6		Cataplasma ex orobi farina	448.39
Caries.	268.9	Cataplasmata vnde fiunt.	381.37
		Κατά	

INDEX.

κατὰ πλᾶτ	Q. curatio.	256.17	Caustica dum admoouemus, viden
Cathartica quæ.		218.34	dum ne vicine partes inflam-
Cathartica, & eorum potestas.			matione tententur.
428.8			328.7
Catharticus quomodo vtendum in			Caustica qualiter admoouendâ.
ulceribus.	406.28	287.30	
Catharticonum vlceri impositorû			Causticonum diuersi modi.
probatio.	406.38		429.38
Catheter quomodo trahit.	386.6		Causticum ruptorium.
Cathimia.	297.38		32.13
κατ' ἴσιν.	37.16		Cauteria dum adhibentur quo-
Cautis omnis præter naturam			modo muniendus locus.
impleri postulat.	211.21		430.15
Causi vlceris implendi indicatio à			Cauteria sunt leniora auro &
temperamento, tum corporis to-			argento quâ ferro et ære.
tius ægri, tum laborantis parti-			430.12
cula sumitur.	213.27		Cauteria hæmorrhagijs cōuenien-
Causi vulneris cum amissione cutis			tia.
utriusque & carnis subiecta ge-			438.15
minis curandi finis.	211.10		Cauteria vbi periculose adhiben-
Causi vulneris curatio iuxta vul-			tur.
garem chirurgorû modû.	216.39		401.27
καυλῶδὸς fractura.	340.28		Causum vulnus priusquam imple-
Caules rubri.	98.24		ri possit, oportet particulam siue
Causa cōiuncta nihil differt à mor-			carne subiectam ad naturalem
bo.	17.14		suum habitum reducere.
Causa duæ tantum morb. secun-			214.29
dum quosdam.	16.38		* Κεῖχεν.
Causa externa curationem non			67.4
inducant sed affectum.	137.7		Centaurij facultas.
Causa effectrix in omni morbo			256.38
primû tollenda.	293.37. et 305.20		Centaurij minoris radix.
Causa inflexionis in partem ali-			257.8
quam.	25.32		Κεφαλική.
Causa inuentio est principium cu-			413.20
rationis.	25.11		Cephalicorum materia.
Causa tumorum præter naturam			413.39
generales.	13.33		Cera alba quæ.
Causa tumoris præter naturam			382.15
speciales.	15.6		Cera & resina confusa valent ad
			suppurandum.
			398.38
			Cera qualivtēdū in ceratis.
			382.13
			Ceratum κατὰ μυστηρίον.
			442.17
			Ceratum humidum.
			345.37
			Ceratum myrtinum.
			382.10
			Ceratum è psyllio.
			382.1
			Ceratum refrigerans.
			64.7
			Ceratum rosaceum.
			382.4
			Cerebri vulnera.
			140.2
			Cerebri vulnera cur lethalia.
			141.12
			Cerebrum promptissimè compa-
			titur nervosis partibus inflam-
			matis.
			203.10

I N D E X.

Κηρίδιον.	392.28	Clavicula quomodo luxetur. 362.
Cereta unde sunt.	381.38	12
Chalastica medicamenta que.	29.1	Clavis cōueniens medicamen-395.5
Χαλαστικὰ sunt interdum ἐπι- πυγῇ.	397.23	Clauus. 8.12. & 72.17
Chalcadis.	298.5	Climia. 297.38
Chalcanthum. 242.23 & 298.15		*Κνημία. 261.2
Chalcitis. 298.5		*Congulum. 385.26
Chalcitis cruda crustas inducit.		Cochlearum carnes. 385.36
298.9		Collectio in tumoribus sit bifariâ.
Chironia ulcera. 292.32		17.39
Chironijs viceribus conueniens		Κελλικτιχὴ quæ. 421.1
med. 302.5		Colleticon Dini. 425.17
Chironijs viceribus & malignis		Colleticon è centaurio minore.
quid vtiliter mispergatur. 412.40		425.12
Chironijs viceribus med. conueniens		Colleticorum vtendi modus. 426.5
in mollibus corporibus. 303.26		Colcozar. 298.5
Chironium vlcus Celso quod dici- tur. 292.32		Κόλπες 310.10
Chirurgia non temere adhibenda		Colubri lapis quomodo acquiri- tur. 389.28
in cancri. 126.30		Concoctione iuuans drageta. 85.6
Chirurgorum imperitia in vlceri- bus quibus admota sint medica- menta plus satis acria. 280.28		Concrefcere quæ debent, oportet mollia & humida esse. 339.33
Chirurgicus non purgabit venam		Congestio. 13.36
quæ incidet citra medici consi- lium. 63.2. & 176.27		Conserua quid. 443.15
Chcerades. 7.29. & 92.7		Confracta vniens med. 444.14
Chceradibus conuenientia. 389.19		Consolida maior. 49.39. & 178.38
Cholera naturalis. 57.11		Consumptiua quæ. 218.34
Χολὴ φυσική. ibid. 12		Continētes vlcera causa. 272.22
Chrysocolla 299.6		Continentis causa definitio. 16.36
*Cicatricē inducturo quid facien- dum. 218.19		Conti vulgo probe dicuntur. 311.3
Cicatricem per accidens inducen- tia. 218.31		Conuulsioni ex plenitudine febris superueniens bonum. 194.7
Cicatricis inducenda methodus.		Conuulsio vniuersalis. 188.6
217.18		Conuulsio particularis. 188.10
Cirrhum medica. 318.1		Conuulsis à quacunque causa sem- per cerebrum corroborandum & quomodo. 195.8
*Clauis Amicernæ. 72.17		Conuulsis remedia continuo adhi- benda, interpositis tamen breui- bus intervallis &c. 191.17
		Ca.

INDEX.

Coriandrum.	382.9	Crus fractum ne breuius fiat quid faciendum.	337.15
Coruus verrucarum genus dictū		Crusta à cauterijs facta quādo & quibus detrahende.	430.22
Auicenna.	8.15. & 72.35	*Cubitus fractus diebus 30. occale scit.	338.12
Corpora que medicamēta leniora requirant, que fortiora.	392.3	Cubitus, manus, femur, in omnes partes luxatur.	362.29
Corpora dura vehementiora requirunt remedia, mollia cōtra.	54.25	Cucurbitula vsus in magnis morbis virulētorū anim. liū. 235.8	
Corporis figura multifariam vulnerati.	151.	Cucurbitula quō trahit.	386.4
Corrosiuorum vsus in pituitosis affeētis.	106.27	Cuniculosa vlcera omnia vulgus fistulas nominat.	310.6
Corruptele particularum indicia.	19.39	Curandi ratio optima tripliciter indicatur.	29.13
Coniungendo soluentia vnitatem.	237.31	Curatio morborū commoda nō ex nominum, sed rerum recta opinio ne contingit.	205.3
Contusa caro in gangranam degenerans quomodo tractanda.	223.27	Curationis ordo in vlcere.	32.3
Contusum vulnus quomodo curetur.	221.33	Curationum communis indicatio in tumoribus præter naturam.	117.31
Coste fracture diuerse.	338.28	Curatio propriè est rei præsentis.	137.15
Costa fracta quot dierū spatio ferumen accipiat.	3.8.14	Curatio tumorum in vniuersum.	23.22
Coryledon.	64.3	Curatio tuta tria requirit.	29.15
Coxa diebus quinquaginta coalescit.	338.19	Cutis habenda ratio in glutinatione vulnerum.	421.16
*Craniofracto, que imminere mala portendunt.	338.34	Cutis regigni non potest.	217.21
Crassa & viscida molliri volunt.	391.24	*Cynoglosson.	178.39
Crassa & viscida secans medicamen & discutiens.	390.16	Cystis fellis vulnera.	143.6
Crispes tumorum sequuntur analogiam humorum ex quibus conflantur.	19.33	Cystis membrana dicitur, que integit ex crescentias.	95.10
Crocea bilis.	58.26		
Crocus.	399.11		
Crocus utilis in anodynis.	43.13		
Cruentis vtile quacunque corporis parte.	424.17		

D	
Acrydion.	62.16
Dartre Gallice.	12.9
*Declinatio in tumoribus præter naturam.	20.9
Defudationes cutis vnde.	15.33
Defen-	

INDEX.

Defensiva quæ.	382.35	rheumata.	382.21
Deligandi fracturarum modus recentiorum Hippocrati dammat.	336.28	Διὰ χαλκίτιος vsus in nervo vulnerato.	258.9
Deligatio ad repellentium genus refertur.	382.37	Diachylon ireatum & commune confert œdemati.	102.18
Deligatio ferularum quando solvenda.	349.27	Diachylon Mesues prodest pituitosis tumoribus.	102.21
Deligatio tuta ossis repositi.	343.23	Διὰ χυλῶν tria genera, & eorū diversus vsus.	326.18
Deligatura conveniens mēbro atrophia affecto.	383.2	Διακοπραιγίαι medicamen.	427.
Deligatura conveniens ossi fracto.	263.7	Diaireos.	415.21
Deligatura duabus fasciis facta ratio atque explicatio.	344.32	Διὰ λαδάνου Critonis.	418.10
Deligaturæ indicationes unde sumantur.	168.19	Διὰ λαδάνου emplastrum.	301.12
Deligatura instrumenta.	439.24	Diapalma.	125.32. & 258.9
Deligatura fracturæ coniuncta cū vulnere.	352.7	Diapedesis causæ.	224.27
Deligatura in œdemate.	81.8	Diaphoreticorum vsus, canon.	391.5
Deligatura retinēs quō fiat.	167.32	Diaphragmatis vulnera.	142.4
Deligaturarū tres differentiæ.	166.15	Διὰ πλάσσης.	441.6
Deligatura ulceribus conveniens.	306.31	Diapompholigos vnguentum.	125.34
Delirij ex vulnere curatio.	203.26	34	
Delirij opitulantur res frigida odorata.	203.39	Διαπυῖτις debent esse emplastica.	397.14
Delirium quid.	202.29	Digerentia siue resolutoria domestica.	226.30
Delitescentiæ regressionis tumorū indicia.	21.15	Digerentibus quando utendum, cōmunis canon.	305.25
Derivandum quando in vulneribus.	178.6	Diphryges.	298.21
Derivatio.	238.38	Διὰ πλάσματα.	426.26
Detergentia.	31.26	Directum in osse fracto reponendo quid dicatur.	340.31
Detergentia quatenus vulnera requirunt.	213.2	Discessa quæ dicantur.	148.31
* Διὰ βρωσίου.	237.20	* Dolia.	156.37
Διὰ χαλκίτιος.	424.8	Dolor durans quæ symptomata inuehat.	432.37
Διὰ χαλκίτιος preparatio ad		Dolores acerrimos calor & frigus faciunt.	433.12
		Dolor fluxionem prorit, & phlegmonem excitat.	206.24
			284.37

INDEX.

Ε 284.37		Emplastica medicamenta quae sint.	241.16
Dolor in fracturis quomodo curatur.	351.18	ἐμπλαστράκια epulotica.	416.38
Dolor in vulneribus quomodo sedetur.	182.15	Emplastrum album epuloticum.	419.37
Dolor sedandus, laese particulae dolore faciens.	203.33	Emplastrum album epuloticum Actuar.	420.2
Dolorum cause.	432.35	Emplastrum Avicennae ad tumores vulnerum & phlegmonas.	183.23
Dothienas adiuvans medicamen.	390.35	Emplastrum Avicennae ad sordida ulcera.	309.12
* Dracontion morbus siue draconculus.	8.20	Emplastrum ex cancris.	126.17
Dracontij radix curat maligna ulcera.	408.2	Emplastrum ex malis punicis.	48.12
Dropacum vsus.	426.20 & 31.	Emplastrum ex metallicis.	250.27
* Dubelata.	7.8	Emplastrum de arnoglossa.	48.9
Duritiei in particulis cause.	116.36	Emplastrum Galeni conferens firmis, panis, parotidibus &c.	102.1
Duritiei omni conveniens medicina.	387.6	Emplastrum Guidonis de limacibus ad adematata resoluenda.	103.8
Δυσχλὺς vlcus.	422.5	Emplastrum Gulielmi de Saliceto.	55.22
E		Emplastrum nigrum.	209.10
Ecchymoma quod.	224.1	Emplastrum nigrum Aristi.	399.40
Ecchymomatis propria curatio.	225.38	Emplastrum Rasis ad adematata.	80.23
Ecchymomatis species.	224.34	Emplastrum viride Andromachi.	400.14
Echecolla per seherent.	397.30	Emunctoria.	34.38
Εκπιπτικῶν.	397.14	* ἐνέχυμα quae.	421.2
Ecchymata.	11.30 & 68.28	Enthema qualia.	316.14
Εκπιπτικῶν quae.	429.4	* Epidermis.	57.20
* E directo secare venam quid	37.18	ἐπιδιδμοι.	345.29
ἐκλῶνιος figura.	347.5	ἐπιδιδμοις καὶ ταγματικῇ.	441.9
* ἐλκῶς ὁδυνηρόν.	277.36	ἐπιδιδμοις.	405.9
ἐλκτικῶν quae.	383.12	ἐπιπικρόν vulnus.	422.2
Elleborus albus.	187.16	Epilepsia quid & quantum distet a convulsionibus alijs.	188.15
Elongatio ligamentorum.	360.31	ἐπιλυσίς quid.	388.31
Elychnon tarsicum.	80.38	Επινυκτίδες.	10.34
* Emphysema quid.	5.34	Επινυκτίς	
Emplastrata diversa ad haemorrhagias.	437.7		

INDEX.

Epinyctis unde dicta.	10.40	deinde indicia & signa.	
ἐπινύκτις epulotica.	416.37	Erysip. latum genus qui tumores	
ἐπιποσινξ quæ.	383.12	referunt.	6.34
Epulotica quam facultatem ha-		Erythrodanum.	178.33
beant.	218.24	*Eshara quid.	242.14
Epulotica recentiorum.	419.27	Esharotica & quibus conveniât.	
Epuloticis quando & quomodo	428.15		
vimur.	420.16	Esharotica recentiorum.	436.19
Epuloticorum natura & eorum		Essentia tumoris præter naturam	
triplex genus.	416.2	tria in se continet.	24.5
Epuloticorum remedium distim-		Essere.	11.3
ctio, & ex ea vitendi modus.		Esthomenica corruptio.	25.16
416.20		Esthomenos herpes.	67.16
Epuloticum album è cerusa & li-		*Euphorbium.	387.40
thargyro.	418.34	*Exanthemata.	11.3 & 68.29
Epusicum album Galeni.	419.11	Exarthremata.	360.22 & 361.5
Epuloticum emplastrum nondum		Exesis vasis cõueniunt sarcoti.	435.37
tamen sanans cacoëthæ viscera.		Exesis visile quacunque corporis	
300.38		parte.	427.18
Epuloticum medicamentum quod.		Exiccantia affatim.	299.32
218.2		Exiccatio valida duos habet sco-	
*Eretrias terra.	291.15 & 299.34	pos.	294.28
Erosio si non cedat mitioribus me-		Exitura.	80.4
dicamentis, visio adhibenda erit.		Exitura Arabib ⁹ sunt abscessus La-	
307.27		tinis, Græcis ἀκισήματα.	4.16
Erosio venis ubi accidat.	237.55	Exitura Auicennæ quæ.	1.14
Error interpretis Auicennæ in di-		Exitura unde.	16.14
ctiombus, myrmecia ex formica.		Expulseria deligatura.	167.11
6.36.		Extenuatorium membrorum in-	
Erysipelas non legitimum & eius		stauratio.	446.6
species.	57.24	ἐρύσιπλος vlcus.	422.5
Erysipelas quid.	57.3		
Erysipelatis curatio.	5.26		
Erysipelatis exulcerati curatio.			
65.15			
Erysipelatis refrigerationis termi-			
nis.	63.22		
Erysipelatis summaria curatio ex-			
plicata aphorismis.	65.35		
Erysipelatis veri causa.	59.18. &		

F
Farina hordeacea. 348.15
Fascia latitudo & longitu-
do pro vulnere & partis ratio-
ne variatur. 168.9
Fasciarum latitudinis modus. 344.7
Fasciarum longitudo. 344.14-345.13
*Febres à quibus fiant humori-
bus. 15.36
Febri

INDEX.

Febri leui vulnere superueniēs est pernicioſa.	184.20	*Flatibus ventris conueniens oleū	434.29
Febriſ quomodo excitatur in conuulſis ex plenitudine.	194.12	Flatuoſi tumores.	16.18
Febriſ vulneratū prehendiens quomodo curanda.	184.13	Fluxio.	13.33
Ferineſ Auicennæ quid.	113.25	Fluxionis auerſio quibus perficiatur.	37.13
Fermentum.	385.22	Fluxionum auerſio quomodo fiat.	26.11. & 35.22
Fermentum quomodo potenter molitur, coquit & digerit.	389.20	*Focilia quæ.	261.1
Femur fractum non neceſſariò breuius fit.	337.10	Forceps ad amplianda vulnera in carne.	164
Ferro quando utimur, quæ partes vitandæ ſunt.	401.18	Forceps ad globos & tela barbaria educenda.	162
Ferrum teli quomodo eximatur, 156.36		Forcipes Albucasiſ ad extrahenda tela.	161
Ferrum infixum quo instrumento commodè extrahatur, & quod vice terebræ inuerſæ Guidonis eſſe poſſit.	163	Formica Auicennæ. 66.32. & 68.4	
Ferula fracturis quando apponuntur.	347.34	Formica genus verrucarum.	73.2
Ferule quales eſſe debeant.	348.15	*Fractura.	259.39. & 333.21
Ferule quomodo applicandæ oſſibus fractis.	263.18	Fractura cum vulnere curatio ex Celſo.	353.10
Ferularum uſus.	348.12	Fractura curatio generalis.	339.22
*Fibula Græcè ἀγκυρῶν.	165.10	Fractura brachii, tibiæ, aut femoris quomodo deliganda.	344.8
Fibula quando imponenda vulneri.	166.28	Fracturarum cauſa.	335.18
Fibule quatenus utiles.	170.7	Fracturarum generalis diuſio.	331.1
Fibula ubi adhibenda.	422.35	Fracturarum prognofica.	336.9
Figura partis rectiſſima quæ.	347.3	Fracturarum veterinariorum alii quot præſagia.	337.27
Fiſtule quomodo noſcuntur.	319.23	Fraudulentium viciuſ.	308.17
Fiſtula quid, & quomodo ex ſinu fiat.	310.7. & 318.40	*Fugilia Auicennæ. 90.34. et 94.33	
Fiſtula quomodo incidantur.	403.25	Fuligines ſarconica.	412.32
Fiſtularum curatio.	321.17	Fumus terre.	115.7
Fiſtularū vera curatio quæ.	325.24	Fuſcuſ color.	113.4
Fiſtula unde ſit dicta.	319.5		

G

Galla ompinacitiſ.	259.22
Gallicuſ morbuſ quando priuim irrepſit.	12.40
Gallicuſ morbuſ veteribuſ ignotuſ.	12.39

Ganglio

INDEX.

Gangliorum per chirurgiam cura- ratio.	101.25	Herpes.	66.18
Ganglium.	72.7. & 91.24	Herpes & erysipelas ulceratum differunt.	68.14
Gangrana.	33.32. & 51.15	Herpes exedens.	59.10. & 66.37
Gangrana & sphaceli curationis capita.	55.33	Herpes miliaris.	67.3
Gangrana signa.	52.29	Herpes pustulosus.	67.16
*Genitalibus inspergitur utiliter colophoniam cum thure.	412.37	Herpetas inueteratas curantia. 70.39	
Gentiana radix quandoque peni- cilli loco imponitur.	173.22	Herpetis curatio.	68.32
Genus in tres partes luxatur. 362. 25		*Hiera picra conuenit conuulsis ex crassis & pituitosis humori- bus.	193.8
*Glandose pustula.	13.12	Hiera Ruffi.	124.19
Glandula.	34.36. & 280.3	Hippo. non fuit ambitiosus in fra- cturis nominandis.	334.24
Glandula unde dicta.	91.11	Hirudines superficie sugunt.	386.4
Glaucium est memitha.	71.13	Hispanica lues.	13.5
Glossocomi formula.	358.1	*Hordeatum vel hordeum mun- datum est prissana bordeacea.	
Glutinandum ratio.	422.14	179.36	
Glutinantia remedia recentiorum. 424.31		Humores proprie qui.	15.36
Glutinantium facultas.	208.27	Humores vniuersi in venis aut ar- terijs continentur.	16.5
& 218.10. & 312.16. & 417.38		*Hydrea.	11.4
Glutinantium finis.	315.35	Hydrophobia.	230.27
*Guidonis error in myrmecys & formicis.	68.7	Hydrophobiae notæ.	231.36
*Gypsum.	381.18	Hydropicorum aquas elicentia. 385.38	
H		Hydropicorum vulnera quare dif- ficulter sanantur.	149.2
Hæmorrhagia cause.	435.33	Hyoscymus anodynum familia. re.	43.19
Hæmorrhagia varia re- media.	436.33	Hyper sarcosis.	220.1
Hæmorrhagia quando cauterijs sistit debeat.	436.39	Hyper sarcosis ablatio.	287.1
Hæmorrhagia trifariam sistitur. 238.21		ὑποδυσμυδης.	344.11. & 336.26
Halitus oris grauis & fetens qua- re oppressis lue venerea.	393.7	& 345.32	
ἄλοι.	72.20	Hypopia.	224.35
Hepatis vulnera.	141.23	ὑπώπις.	433.17
Hernia gutturis.	90.31	ὑπόρρις quid.	403.8
		Hypo sphagmata.	224.36
		Ichthyocolle.	

INDEX.

I		Intemperierũ in vlcere summaria	
Chthyocolla.	299.5	consideratio.	283.27
Ἰχθὺς quid.	212.38 & 273.33	* Ioannis Tagauleij laus.	378.9
* Ieruni intestini vulnera.	143.26	Ionthi.	10.26
* Ignis sancti Antony.	52.2	ἰόνθιον	300.12
* Inbecillitas partiũ ab intemperie provenit.	283.5	* ἰσχίμια veterum.	438.5
Impages quid.	173.26	Ischiadicis vbi ignem adhibemus.	402.13
Impetigo.	9.4	* Iudicij ferendi formula de vulneratis.	145.28
* Incantamenta, insusurrations, & coniurationes ad tela extrahenda non conducunt.	160.19	Inguarium venarum vulnera.	142.40
Incarnatina deligatura.	166.19	E	
Incarnatina sutura sit quinque modis.	168.34	Lacerta caput.	73.34
Incarnantium ordo.	316.22	Lesio melior quã mors.	183.14. & 195.20
Incidens materia quibus conueniat.	388.12	Lana succida vino austero insuccata.	381.12
Incrementum in tumoribus præter naturam.	20.2	Lapis laxuli Græcis Cyaneus dicitur.	115.10
Indicatio communis omnium tumorum præter naturam.	115.16	Larigna pro terebinth. substitui potest.	411.31
Indicationes communes tumorũ præter naturam quibus variatur.	23.29	Laxatio.	360.30
Indicationum primarum differentie due.	213.34	* Λάπις κκλκλκ.	299.12
Indurationis tumorũ indicia.	31.32	Lepra.	9.19
Induratis tumoribus vtile cataplasma.	43.35	Lepra med. conueniens.	424.18
Inflatio est apostema ventosum.	84.25	Lepra Haljab. quid sit.	10.14
Inflationis curationis capita.	87.6	Leuce Græcorum & Celsi est Punicorum albara.	9.27
Inflationum cause.	83.17	Leucophlegmatia vnde.	87.27
Inflationum signa.	83.35	Leucophlegmatia ad adematum species refertur.	7.33
Inflationum curatio.	84.6	* Lichene.	9.4
Inflammatio fracturis adiuncta quomodo curatur.	351.18	Lichinia.	172.19
Intemperierũ vulnerum signa & curationes.	183.39	Lienis scirrhus conueniens med.	392.31
		Lienis vulnera.	143.33
		Ligamenta valentissima tolerant remedia.	247.38
		Limacum carnes.	385.36
		Linamenta.	

INDEX.

Linamenta.	172.19	Malicorium.	299.23
Lithargyrum nutritum.	420.5	Malum terra.	299.27
Luxium ficulneum.	431.30	Malum punicum ulceri inflamma	
*Lolium turana Francis dicit.	53.34	to vtile.	286.2
*Lupia quid.	92.20	Manna.	287.20
Lupia curatio.	100.9	Marciaton frig. doloribus conue-	
Lupia recentiorum, Auicēne glā-		nit.	435.5
dula, Græcorum ganglion idem		Marginem nonnulli subluxatio-	
videntur.	101.3	nem nominant.	350.28
Lupus morbus.	92.28	Materia fiens in tumoribus & fa-	
Lupus cancer ulceratus dicitur.		cta quæ sit.	14.38
330.18		Matricis vulnera.	143.6
Luxata partis dolor vitandus &		Maturantia.	41.14
inflammatio arcenda.	367.6	Maxilla inferior solum luxatur	
Luxatio cum fractura sine vlcere.		in anteriorem partem.	361.29
369.17		Maxilla iugulum, scapula, os ti-	
Luxatio cum fractura & ulcere.		bi, calx, manus, planta fracta in-	
369.20		ter decimum quartum & vige-	
Luxatio pessima.	363.36	sim, unum primū diē coēunt.	338.16
Luxatio quid.	360.18	Maxilla superior immobilis in	
Luxationum causa.	362.39	omni animante excepto croco-	
Luxationum curandarum sum-		dilo.	361.27
ma.	368.33	*Medicamenta acrimoniam lo-	
Luxationum curatio, & eius præ-		tionem deponunt.	257.24
cipua indicatio.	365.23	Medicamenta ῥελαττικὰ vlcera,	
Luxationum generalis diuifio.		detergeāt modicè et siccet.	293.38
359.1		Medicamenta hyperfarcosim tol-	
Luxationum signa.	363.9	lentia.	287.1
M		Medicamenta ignis vires haben-	
Agnes.	385.33	tia.	70.18
Magnum & paruum in		Medicamenta quare varia miscen-	
vulneribus quomodo accipien-		tur.	398.1
dum.	422.1	Medicamentum vnum idemque	
Malactia.	391.7	non est conueniens omnibus cor-	
Malactica quatenus à pepticis dif-		poribus.	296.7
ferunt.	397.31	Medicum prudentem esse conuenit	
Malactici applicandi modus.		in victu instituendo.	181.16
392.22		Medicus præfatiens de longinquo	
Malagmata quomodo confingun-		obuiam it malis.	174.29
tur.	392.25	Medulla & adipis quando acrimo-	
		niam	

INDEX.

niam contrahunt. 384.30
 Medulla panis. 182.33
 Medulla recens laxat, vetus discutit. 386.18
 Medullarum natura & ordines. 393.29
 Medulla taurina ob acredine non emollit. 393.34
 Mēta vulnus. 422.3
 Mel axacardinum. 427.36
 Melancholia sit ex sanguine & pituita supercalefactis in corpore. III.18
 Melancholie differentie. 110.16
 Melancholicus humor in cancro quomodo vacuandus. 124.2
 Meliceria. 273.39
 Meliceridis, atheromat. steatomata exedentia. 108.39
 Melicerides sub quo genere tumorum continentur. 7.13
 Meliceridis curatio. 108.11
 Meliceris. 93.16
 Melligo vix passa. 399.13
 Mentagra. 11.15
 Mesue laus. 200.8
 Metallica elota morsum demittūt, sed minus siccant. 298.31
 Metallica quomodo tenuiora fiūt. 386.18
 Μεταυκρίτις. 427.25
 * Misy. 298.16
 * Modice siccitia metalla. 297.35
 Mollitiū particularis mazeria. 392.14
 Morbulli. 1130. & 68.21
 Morbis extremis extrema competunt remedia. 327.37
 Morborum verus curator quis. 136.19

Morphea. 9.26. & 10.12
 Morsus animalium duplici cōstat differentia. 228.13
 Morsus an sit factus à cane rabido quomodo probatur ex Oribasio. 231.5
 Morsus hominis quando virulentus. 228.28
 Morsus omnis virulenti gemina curandi indicatio. 252.27
 Morsus virulenti signa. 229.23
 Morsus virulentos que animalia inferant. 228.15
 Mortificatio alicuius partis quid. 34.37
 Mortificationis cause. 52.5
 Mortuus sanguis quis. 227.1
 Μόττα. 241.14. & 243.30
 * Myrmecia. 8.10. & 71.33
 Myrmecia educi quomodo debent. 74.20
 Myrmecij's convenientia. 73.16
 Myrrha ossa nudata carne vejūt. 262.34
 Myrrha. 178.35

N

Ναρονίς. 433.17. et 435.14
 Nariū fractura mala. 235.33
 Nata tumor. 7.25. & 94.16
 Νάσθκας. 348.40
 Naturaliter se habentia sui custodiam per similia indicant: contra naturam vero ablationem sui per contraria. 213.37. & 215.18
 * Nervaceæ partes ladūtur frigido. 248.38. & 437.19
 Nervi arterie, vena diuisa aliquādo coalescunt. 148.4
 Nervi casim vulnerati consideratio

I N D E X.

tio & curationis scopi.	253.22	Oedematis signa.	77.9
Nervi contusi cute illaesa curatio.	259.18	Oenostagma siccatur, & putredine prohibet.	406.11
Nervi & tædonis punctura.	144.10	Oesophagi vulnera.	142.33
Nervi puncti curatio.	248.29	*Olea antidyna.	433.19
Nervi vulnerati & nudati curatio.	257.13	Olea composita resoluētia.	389.38
Nervi vulnerati signa.	247.2	Olea ecchilotica.	429.25
Nervo contuso vna cum cute quæ adhibenda.	259.10	Olea rarefacientia.	388.37
Nervosarum partium vulnerum curatio.	248.16	Olea trahentia.	386.19
Nervosarum partium vulne. differeſcentia.	246.21	Oleorum vitia.	381.23
Nervi punctus quando præcidendus.	183.15	Oleum cum sale digerit.	78.21
*Nitri loco quæ ponuntur.	384.20. & 399.29	Oleum è sambuco & ebulo quid faciatur.	389.33
*Nodi Avicennæ.	7.7. & 92.34	Oleum ex vitellis ouorum.	252.1
Nomen vlcus quod dicatur.	276.38	Oleum Sabinum.	251.24
Nomina apud Barbaros non attendenda, sed rerum descriptiones.	11.24	Oleum terebinthinum.	434.22
Nominibus parum fidendum propter diuersum vsu eorū apud autores.	10.15	Oleum vitiosum quomodo eluatur.	381.28
Nota tumorum præter naturam vniuersales.	18.25	*ὠμὴ λύσις.	164.34. & 398.21
O		Omphacium.	380.37
Oculus populi.	381.17	Omphacinum oleum.	381.21
*Oedema Barbari Vndimiam vocant.	6.2	Oppilantia aliàs leniunt dolore, aliàs acrimoniam hebetat.	380.22
Oedema maturantia.	81.23	*Ore distantes vulneris trifariâ in idem adducuntur.	165.8
Oedema non verum.	88.1	Ordo tractandorum in hoc libro.	24.37
Oedema quid.	75.16		
Oedematis causæ tres.	77.4	*Os adiutorij.	261.1
Oedematis curandi scopus duplex.	77.33	Os corruptum quomodo tractandum.	439.31
Oedematis curationis capita generalia.	82.19	Os fractum qualiter collocandum.	441.24
		Offa luxantur quatuor modis.	361.21
		Offa nudata quomodo carne integuntur.	411.8
		Osse fracto quæ intensiones præcipue adsunt.	440.37
		Osse fracto quomodo turunda vulnerei applicanda.	262.24
		Osse	

INDEX.

Osse maiore fracto si medulla exeat periculosum. 260.40	Panis sordidus. 180.5
Osse nudato erysipelas malum. 260.28	Papule. 68.27
Osibus fractis atq; luxatis initio prohibenda fluxio, dolor, inflam- matio. 440.35	Papule duplices Celso. 12.1
Os is caries altè descendens quali- ter tractanda. 291.32	Paralysis quid. 195.34
Os is cavitatis impleri non potest. 262.20	Paralyseos curatio ex medicamen- tis forinsecus admotis et tantu ad chirurgici pertinentibus. 199.37
Os is fracti rectè comissi signa. 339.2	Pararthroma. 360.29
Os is fracti & sua sede moti signa. 342.3	Παρυγοειδὲς quæ. 433.4
Os is fracti reponendi modus per funes. 341.35	Parocheteusis. 238.40
Os is fracti repositi signa. 342.1	Parotidibus conueniens medica- mentum optimum. 387.6
Os is fracti repositio per tensionē. 440.40	Pars languida quando confirman- da. 388.25
Os is fracti sanationē celerem aut tardam faciunt temperamentū, ambiens aer. 338.22	Pastilli Faustiani. 287.18
Os is vitiiati nota. 290.39	* Πελιδὸς a plerisq; fuscus color in corpore dicitur. 113.6
Os is vulnus quod. 260.3	Penicilla. 172.19
Osium abscessus incarnantia. 440.28	Πενίλιν. 397.14
Osium affectus. 439.5	Pepti corum vtendi modus. 400.21
Osium glutinandorum quatuor scopi. 261.35	Περίσπιν. quomodo. in vsum ve- niunt. 389.33
Osium vitij celeriter medica- dum. 439.1	Periodi siue paroxysmi tumorum, humorum ex quibus conflantur sequuntur analogiam. 19.33
* Ostracodermorum piscium te- sta cremata & lota siccant ci- tra rosionem. 299.18	Περίσπιν. 261.2
Ostrea viua quid faciant. 305.40	Pes columbinus. 178.37
* Oxycraton. 38.31	Pes fractus sexaginta diebus si quiescat, conualescit. 338.20
Oxyrhodini facultas. 78.20	* Phagedena. 59.11. & 277.1
P	Phlegma aquosum, tenue, fiatuo- sum quod. 75.6
Analithes ad diuersa mala vtile. 443.33	Phlegmaticarum excrescentiaru curatio. 97.19
	Phlegmonarum genus tumores qui referunt. 6.25
	Phlegmone quid. 25.30
	Phlegmones duplex acceptio. 32.24
	Phlegmones cause tres. 33.36
	Phlegmones note. 34.33
	β Phleg-

INDEX.

Phlegmones curatio.	30.1	Plumbi recrementum.	299.7
Phlegmones curanda quatuor intentiones particulares.	36.20	Plumbi vis in cancris.	126.11
Phlegmones ex humorum influxu factæ summæ curationis, capita.	44.19	Plumbum rstum.	299.6
Phlegmones symptomata.	34.33	* Podagricis quous tempore conueniens remedium.	396.10
Phlegmones symptomatum curatio.	42.20	Pollen est farina volatilis molendini.	170.17
Phlegmones tempora sunt quatuor.	34.22	Polyda sphaeria.	504.0
Phlogosis.	32.29	Polyda pastillus.	514
Phlyctena unde.	87.34	Porra Gallis verruca dicuntur.	
Phonigmi vsus.	426.21	8.7. & 71.27	
Phonismus quando adhibendus, & eius materia.	427.21	Porracea bilis.	58.21
* Picati vsus apud veteres.	442.19	Posca vel pusca quid.	70.26. & 80.12. & 309.3
Pituita que.	426.15	Posca inflammato vlceri utilis.	285.36
Pituita que.	ibid.	Πῶπος.	340.10
Pituita eruptiones.	68.28	Porus farcoides.	147.32. & 260.28
Pituitam ducentia per aluum.	98.10	Pori generatio.	350.4
Pituita quid.	75.35	Puro gignendo victus ratio conueniens.	350.18. & 442.37
Pituitosorum abscessuum causa.	95.19	Πωρωτική que.	442.31
Pituitosorum abscessuum particularis curatio.	99.14	Πωρωτική que.	355.36
Pituitosorum tumorum materia.	95.25	Rarus quomodo augeatur & minuat pro necessitate.	354.36
Pituitosum tumorum genus qui tumores referant.	7.5	* Praegressa causa.	15.11
Pix peptica quomodo fit.	398.31	Προγενετική causa.	17.5
* Plagarum differentia.	129.21	Propolis quid.	384.4
Planta noctis.	116	Propulsorium femina & propulsorium mas.	164
Plantago epulotica est.	419.36	* Pforicum quomodo pareatur ad trahendum.	386.12
Platyisma quid.	302.12	Psyraces.	11.25
Plethora quid.	26.15	Psylla populi Italiae.	49.21
Plethora curatio.	26.19	Psura.	9.21
Plumaceoli qui sint.	171.27	Πτύμαχα.	426.26
Plumbi lamina epulotica est.	419.3	* Pulmonis vulnera.	142.21
		Pulvilli quomodo sunt.	177.26
		Pulvillus quid.	306.20
		Pulus Amic. sistēs sanguine.	245.22
		Bulus	

INDEX.

<i>Pulsus ruber.</i>	424.32	<i>Repellentium natura alia Arabi-</i>	
<i>Pumicis preparatio.</i>	413.5	<i>bus, alia Græcis.</i>	379.15
<i>Purgatio necessaria interdum</i>		<i>Repellere ubi non convenit.</i>	380.17
<i>vulneratis.</i>	174.3	<i>Repositio fracti membri apta.</i>	
<i>Purgatio in vulneratis quādo ad-</i>			346.37
<i>hibenda.</i>	176.33	<i>Reprimētia siue repellētia que</i>	
<i>Pus album, lene, & æquale quo-</i>		<i>sint.</i>	69.26
<i>modo sit.</i>	397.20	<i>Repurgantium vlcera materia.</i>	
<i>Purus generatio vnde.</i>	274.19		407.35
<i>Pus optimū quod.</i>	23.11. & 275.29	<i>Res non naturales.</i>	36.29
<i>Pus momentia.</i>	41.14	<i>Resolutionis tumorū indicia.</i>	21.7
<i>Pustula.</i>	340. & 8.23	<i>Resolventiū canon generalis iuxta</i>	
<i>Pustula vnde.</i>	16.14	<i>diuersa tempora morbi.</i>	28.18
<i>Pustula corrosiue.</i>	59.13. & 66.24	<i>Resoluentium vis qualiter conside-</i>	
<i>Putrefacta particula alicuius sup</i>		<i>randa.</i>	387.40
<i>purantis curatio.</i>	44.10	<i>Reuulsio.</i>	238.39
<i>Putrescentia calido & humido cō-</i>		<i>* Rhegma.</i>	224.9
<i>stant.</i>	286.16	<i>Pēūna.</i>	13.34
<i>Putridis medicamentū cōueniens.</i>		<i>Rheumatismi quando plurimum</i>	
	53.33	<i>mouentur.</i>	378.34
<i>* Pū &.</i>	274.7	<i>* Rosaceum oleum.</i>	381.18
<i>Pyæmonix.</i>	426.12	<i>Rostrium porcinum instrumentum</i>	
<i>Pyulcus quomodo trahit.</i>	386.6	<i>appellatū ad euellenda tela.</i>	161
		<i>* Rubi fructus & flores.</i>	167.32
		<i>Rupta vasa quomodo deliganda.</i>	
			436.15

Que auferri non possunt
transferuntur in locum
aliū.

Quies optimum medicamentum
vulneratis.

Radix vasīs que sit. 167.22
Paxpavidop fractura 340.
28

* Rectorum vulnerum Labra quo
modo adducuntur.

Refrigerantia erysipelas.

Refrigerantia vehementer.

Renum vulnera.

Repellentium distinctio.

Repellentium vsus.

Sagitte & tela quomodo ex-
strahantur.

Se-re.

Sambacino oleo vtimur pro sibi-

no.

Sanies quid.

Sanies mala.

Sandaracha.

Sansa quid.

Sanguinis fluxuri supprimendi

modus.

Sanguinis in vulneratis mistendi

quantitas.

INDEX.

Sanguinis in vulneribus mittendi scopi.	175.II. & 183.5	Σαίφηρος Græcè, Latine durities, Arabicè Sephiros dicitur. 6.4. & 112.10
Sanguinis missio in conuulsis.	192.I8	Scirrhorum differentia ex mixture humorum, ortorum.
Sanguinis profusionis ex vulnere differentia.	237.I4	112.20
Sanguinis profusionis curatio.	238.I9	Scirrhi tumores et qui ad atram bilem spectant. 7.35. & 110.1
Sanguinis sistendi modus per vstionem & escharam.	242.I3	Scirrhusis. 116.35
Sanguinis supprimendi precepta aliquot.	243.24	Scirrhorum tumorum curationis capita. 119.27
Sanguis natura thesaurus.	238.II	Scirrhus hepatis quomodo tractari vult. 392.31
Sanguis quid & quotuplex.	32.40	Scirrhus verus ac legitimus vnde fiat. 112.9
Sarcocolla.	299.4	Sclerotica durities. 34.40
Sarcothlasma.	224.II	Scolodes vlcus. 277.39
Sarcotica qualia sint.	410.29	Scolopomacherion. 74.30
Sarcoticorum facultas.	348.31	Scopuli. 11.32
Sarcoticorum vtendi modus.	415.33	Σκωρία μελύς τις quid. 299.8
Sarmentorum aqua.	73.26	Scorpio virus quod infixit retrahit. 386.1
*Scabies.	9.24	Scrofule. 7.28. & 92.1
Scabiei conueniens med.	435.3	* Sebum coquit, laxat, mollit. 320.14
Scabiosa.	50.4	Sectionum siue apertionum suppurati abscessus septem regula. 31.5
Scammonij succus Dacrydion dicitur.	62.17	Sedantia dolores triplicia genere. 433.5
Σχάται verbo qui voluerit Hippocrates.	361.32	Selaa. 7.7
Schidacidon facta fractura.	334.1	Sephiros Arabum quid. 112.10
Scirrhi desperati signa.	391.37	Septica Arabum. 432.2
Scirrhi legitimi causa.	112.33	Septica & eorum potestas. 428.12
Scirrhi legitimi nota.	113.16	Serosorum tumorum causa. 88.8
Scirrhi legitimi siue scirrhi tumoris curatio.	113.32	Sere. 11.3
Scirrhi illegitimi generatio.	116.28	Serpentinum instrumentū ad euellenda tela. 161.
Scirrhi non exquisiti curatio.	200.15	Sertula campana. 330.10
Scirrhi emolliendi modus et ratio.	394.9	Siccantia quatenus vulnera requirunt. 213.2
		Siccantium

INDEX.

Siccantium medicamentorum in	ne aut inanitione.	185.14
vulneribus curandis gradus.	Spasmus ex vulnere lethalis, quo-	
218.7	modo interpretandum.	144.22
Siccum sano vicinius, humidum non	Spasmus ex siccitate absoluta in-	
sano.	curabilis.	189.36
208.40		
Sigillum lemnium.	Spasmus quid.	184.27
297.36		
Sime ferule.	Sphacelos. 33.31. & 51.24.	435.23
348.34		
Sinapismorum vsus.	Sphacelus à gâgrana differt.	51.37
426.20		
Sinapismorum materia & præpa-	Spaceli ex gangrana creati extir-	
randi modus.	patio.	53.8
427.8		
Sinus Gal. quid dicatur.	Spicula extrahentia.	160.24. &
318.32		
Sinus quid. & eius differentia mul-	384.21. & 385.36	
tiplices.	Spiculorum discrimina.	153.25
310.10		
Sinum curandorum sanationis	Spinacium & spinargium.	180.2
ordo.	Spina dorſi quid & quibus aſſimi-	
312.25	latur.	200.25
Sinus curatio nondum callosi.	304.14	
304.14		
Sinus qualitas unde deprehendi-	Spinam. Auicenna exquisitum ery-	
tur.	sipelas nominavit.	57.18
311.28		
Sirazon quid.	Spinas, ofſicula, vitri fragmenta,	
399.3		
Situs partis vulnerate.	ſurculos extrahentia.	160.24
244.6		
*Solani radix laudatur in ſedâdo	Splenia quæ ſint.	306.16
vulnere dolore.	Splenia unde dicta.	345.28
182.28		
Solanum.	Splenium magnitudo & applican-	
380.38	di modus.	440.24
Solutæ unitatis ſpecies apud Ai-	*Squammas in offe fracto detra-	
cenna.	hentia.	440.15
129.4		
Sordes quid.	*Stratus in tumoribus præter na-	
212.39. & 274.10	turam.	20.5
& 275.10		
Sordida vlcera quos affectus ſequi-	Steatoma.	93.24
tur.		
308.25		
Sordidi vlceris propria curatio.	Στεατόμωχα ſub quo genere tu-	
308.34	morum continentur.	7.13
Sori.	Steatomatis curatio.	108.12
298.16		
*Sparadrapî vsus.	Stercus bubulum.	73.30
368.7. & eius		
descriptio.	Stercus pueri calidum eſt, pepticum.	
445.24		
Spasmi curandi primum ac com-	399.24	
mune præceptum.	Stibi vel ſtibium.	298.19
190.10		
Spasmi ſigna.	Στιμμι.	208.19
188.39		
Spasmus alius vniuerſalis, alius	Stomachus.	195.5
particularis.	Stomoma.	289.9
188.5		
Spasmus omnis aut eſt à repletio-	Struma quid.	7.30. & 92.12
	ß 3	Struma-

INDEX.

Strumarum inter sese differentia. 96.35
*Strumas diuino quodam numine Galliarum reges sanant solo ta-
ctu.* 99.5
*Strumas quoque rex Angliæ sa-
nat sed per hymnos & ceremo-
nias.* 99.11
Strumæ detergentia. 104.29
Strumas incidendi modus. 104.40
Strumas maturantia. 104.15
*Strumosis affectibus quæ medica-
menta conducant.* 97.13
*Stupidum quando crus euadit ex
suppurationis precisione.* 402.
6
** Succorum vitium in vlceratis
quomodo corrigitur.* 282.19
Succorum vsus. 381.34
Suctus qui eliciat. 386.5
Sudamina. 11.5
Suendi vulneris ratio. 159.12
Sugillata quæ. 224.35
Sugillatis remedium conueniens. 390.3
Sulphur. 384.35
Sumach. 70.5
Suppurantium natura. 397.10
Suppurantibus quando utendum. 397.5
Suppurationis tumorum indicia. 21.9
*Sutor malus unico calopodio om-
nes calceat.* 216.37
*Sutura remouenda tempus & mo-
dus.* 171.17
*Sutura in quibus partibus conue-
niat.* 422.31
Suturis quando opus est. 165.20
** Syderatio oculorum.* 51.30
Suæpunctio quæ. 421.2
Symphlytum. 178.37 & 422.40
Symptomata phlegmones. 42.21
*Symptomatum correctio in vulne-
ribus.* 181.34
*Syncope quid, & eius instans no-
ta.* 201.29
Syrion quid. 329.3
T
TAlpa. 7.23 & 94.4
Tarsecum. 72.35
** Telephæa vlcera.* 292.33
*Tela quæ nostris corporibus infi-
guntur quibus differunt.* 153.17
*Telis extrahendis octo instrumen-
ta accommodata.* 154.14
*Telorum extrahendorum modus
duplex.* 154.39
*Telorum extrahendorum obserua-
tiones.* 155.7
*Tempora tumorum præter natu-
ram à tribus potissimum discrimen
assumunt.* 20.12
Tensionem facientia. 237.33
*Tensio quomodo & quanta facien-
da, vt os fractum reducatur.* 341.17
Tenta. 172.17 & 311.2
Tenta cannule. 173.15
*Terebra directæ ad amplianda of-
fesa quibus tela inharcent.* 163
*Ternationes tumorum præter
naturam quæ meliores.* 20.20
Terra sigillata. 297.37
Testudo. 7.22 & 93.32
Tetræpharmacum. 29.5
*Tetræpharmacum thus additum fa-
cit Macedonicum.* 400.1
Tetræpharmacum natura. 475.9
*Tetræpharmacum est suppura-
tium.*

INDEX.

<i>rima.</i>	286.22	Tumorum differentia à quibus sumantur.	4.19
* Theodorici & Henrici error in diata imperanda.	180.32	Tumorum præter naturam quatuor sunt tempora.	19.38
Tberiacadatur contra carbunculos.	50.27	Tumorum præter naturam ex puita octo differentia.	76.23
Tberiacapurgat, incarnat & cicatricem inducit.	414.38	Turunda. 172.19. & earum usus	173.6
Tblasma.	224.II	Tusim.	72.35
Thoracis vitia per quas vias purgantur.	405.10	Túlli.	2.18. & 72.38
Thorax leditur frigido.	437.18	Thymion.	2.13. & 72.2
Thrombos quid.	241.13	V	
* Tophis articularum convenientia.	389.20	Vacuatio à toto fit dupliciter.	192.16
Topica non sint dura neque graui.	381.38	Vacuatio duplex tumorum præter naturam.	63.13
Toto genere præter naturam per chirurgiam amouenda.	29.9	Vacuatio humoris in parte aliqua influxi.	38.7
Tracheæ arteria vulnera.	142.28	Vari.	10.29
τραυματις quæ.	421.2	Varices quæ.	278.8
Trigener.	414.25	Varicibus conuenit deligatura expulforia.	167.30
Triticum ore præmansum pepticum est.	398.7	Varicum curationes.	288.38
Trochisci de arsenico.	431.17	Varicum cum ulcere complicatarum curatio.	288.29
* Tubulus.	156.37	Variolæ.	11.32. & 68.24
Tumor crudus quis Hippocrati intelligatur.	247.28	Vas osculum fundentis sanguinem quomodo obstruatur.	241.II
Tumores à bile creati.	56.33	Vasorum radix quæ.	242.4
Tumores præcipui quatuor qui ex influxione fiunt.	621. & 16.8	* Venæ secunda electio unde indicatur.	372.7
Tumores præter naturam in tria genera diuiduntur.	4.6	Venæ siue arteriæ incise signum.	238.3
Tumores de repente detumescentes malum portendunt.	138.24. & 247.16	Venæ media duplex.	175.37
Tumores præter naturam quatuor modis terminantur.	20.20	Venarum & articularum vulnera an sint iuenda.	240.28
Tumorebus curandis quæ obseruare oportet.	35.2	Venenata vulnera qui astores tractantur præcipue.	228.2
Tumorum accidentia.	5.4	Venenatis morbis remedium.	390.7

INDEX.

<i>Venenum quomodo exugatur ex vulneribus.</i>	160.9	neque barbarismo abiguntur.	378.20
<i>Ventriculi vulnera.</i>	143.5	<i>Vitiligo quid.</i>	10.3
<i>Ventus meridionalis vlceribus nocet.</i>	280.38	<i>Vitiliginis nomine alphon & leu- cam comprehendit Celsus.</i>	10.1
<i>Vermes aurium quæ enecât.</i>	188.33	<i>*Vlcera dyssepulota quæ.</i>	292.26
<i>Vermes vnde nascâtur in vlceribus & quomodo arceantur.</i>	290.13	<i>Vlcera insanabilia sunt quibus os corruptum subest.</i>	273.13
<i>Verruæ 8.6. & earum diuersa genera.</i>	71.30	<i>Vlcera maligna à quibus humoribus excitentur.</i>	304.29
<i>Verrucarû curatio & iudicia</i>	73.1	<i>Vlcera quibus abluenda.</i>	406.1
<i>Verrucarum diuersa curandi rationes.</i>	73.4	<i>Vlceribus sanandis tria summè cõuenientia enumerat.</i>	306.29
<i>Vertebrarû spine luxationes</i>	362.6	<i>Vlceris cum osium corruptione complicati curatio.</i>	291.2
<i>Vesica vulnera.</i>	143.6	<i>Vlcerum causæ gemina.</i>	272.2
<i>*Vibices.</i>	224.38	<i>Vlcerum curatio in vniuersum.</i>	281.9
<i>Victus bona ratio præscribenda statim vulneratis.</i>	174.3	<i>Vlcerum curationis vna præcipua indicatio est mediocris siccatio.</i>	70.13. & 281.21. & 288.9
<i>Victus ratio vulneratorû.</i>	179.24	<i>Vlcerum differentia.</i>	264.19
<i>Vigilia conuulsionem ex siccitate augent.</i>	191.36	<i>Vlcerum differentia à quibus potissimum sumantur.</i>	269.12
<i>Vinculorum materia in vasis diuisis.</i>	106.12	<i>Vlcerum differentia veræ vnde sumantur.</i>	270.24
<i>Vini natura.</i>	381.31	<i>Vlcerum generalis diuisio.</i>	264.1
<i>Vinum.</i>	381.14	<i>Vlcerum signa & indicia.</i>	276.14
<i>Vinum quando & quare conuulsis interdiciendum.</i>	194.22	<i>Vlcus & vulnus differunt.</i>	268.16
<i>Vini nigri austeri vsus & eius facultas in vulneribus.</i>	422.29	<i>Vlcus quid vulgo chirurgus.</i>	267.23
<i>Vires non semper in ægris augende.</i>	181.4	<i>Vlcus quomodo detergendum.</i>	307.6
<i>Virgalis fractura.</i>	333.40	<i>Vlcus simplex quod.</i>	270.26
<i>Viride aris.</i>	298.11	<i>Vim folijs inclusa aqua ad quæ vtilis.</i>	423.22
<i>Virus.</i>	274.11. & 275.6	<i>*Vomica aperienda ferro etiam si nondum satis maturuit.</i>	401.6
<i>Virus sua natura ad cor serpit & eius destructione appetit.</i>	229.10	<i>Vomica aperiende ratio.</i>	402.22
<i>Virus ciaculatum in morsu vacuantia.</i>	232.30	<i>Vomica aperiende locus vulneri quæ</i>	
<i>Vitellina bilis.</i>	58.20		
<i>Vitia corporum neque eloquentia</i>			

INDEX.

quis aptissimus.	403.6	Vnguentum Rogerij spasmo con-	
Vomicarum aperiendarum cau-		ueniens corpore prius repurgat-	
tiones.	404.30	to.	193.19
Vomicas aperiencia medicamen-		*Vrendi & redigendi in cinerem	
ta.	403.34	medicamenta, modus.	412.22
Vomitui in vulneribus vt. l. 17.		Vrendorum metallicorum ratio.	
28		416.14	
Vox perit quibus spina pars que		Vrinam cientia in pituitosis affe-	
in ceruice est afficitur.	197.21	ctibus.	98.20
*Vnico calopodio omnes calcare.		*Vsuea quid.	81.18
216.37		Vitio expeditissimum remedium	
Vnio in quibus partibus possibilis,		ad morsus virulentos.	236.1
& in quibus non.	147.21	Visionem qui non ferunt debent	
Vnitatis soluta cause vniuersales.		vti medicamentis ignis vim ha-	
136.33		bentibus.	307.33
Vnitates solute curandi commu-		Visionis utilitas in osse carioso.	
nis indicatio.	150.13	292.4	
Vnitatis soluta nomina ac differen-		*Vulnera cacoethe.	175.7
tia ex Gale.	128.10. & 134.11	Vulnerantia.	237.29
Vnitatis soluta species variae.		Vulnera praua que.	138.35
134.7		Vulneratorum victus ratio.	179.24
Vniuersalia manifestiora sunt no-		Vulnera triplici ratione magnis	
bis quam particularia.	19.7	estimanda.	137.38. & 175.3
Vnguentum Aegyptiacum.	49.2	Vulnera tutissima & curationem	
& 54.2. & 287.30		facilem habentia.	145.2. et 150.8
Vnguentum album Rasii epuloti-		Vulneribus que nocent omnia fe-	
cum.	419.31	re sanguinis vitio commouentur.	
Vnguentum album communita-		435.20	
tis.	419.1	Vulneris in vena curatio.	245.38
Vnguentum Agrippa conuenit in		Vulneris pars que superior & que	
frigidis doloribus.	435.5	inferior.	167.0
Vnguentum apostolorum & eius		Vulnerum causa.	136.30
virtus.	409.36	Vulnerum cruentorum differentia	
Vnguentum basilicon.	40.18	a tribus potissimum sumuntur.	
Vnguentum diachylon.	40.19	129.20. & 134.39	
Vnguentum ex vermicibus.	254.13	Vulnerum curandorum intentio-	
Vnguentum gloriæ.	425.30	nes.	152.22
Vnguentum optimum maligna		Vulnerum curandorum diuersæ	
vulnera ad cicatricem perducens.		occasiones ex temperamento vul-	
300.9		nerati nascuntur.	174.10
		Vulnerum	

INDEX.

Vulnerum differentia extrinsecus accidentes.	131.24	dum.	421.19
Vulnerum generalis divisio.	128.11	Vulnus quid.	133.19. & 204.13
Vulnerum iudicia ex Celso quae periculosa & quae tutiora.	149.31	Vulnus quot modis fiat cum deper- ditiōe substantiae.	204.29
Vulnerum labia quomodo addu- cenda.	421.24	Vulnus recens qualiter curatur.	316.12
Vulnerum signa & iudicia.	137.30	Vulnus simplex quod.	205.37
Vulnus cruentum quomodo primo tractandum.	422.7	Vulnus simplex quomodo commit- titur.	165.11
Vulnus degenerans in vlcus quo- modo curandum.	184.10	Vulnus vna cum fractura quomo- do curetur.	351.36
Vulnus & vlcus pro eodem.	134.25. & 267.25	Vulnus molles med.	399.2
Vulnus nudum quomodo tractan-		Z	
		Ambana.	423.33
		Zegi.	298.6

FINIS.

Generalis, & compen-

DIARIA CHIRV RGI

INSTITVTIO, FACILI ET

ARTIFICIOSA METHODO

TRADITA.



Nperito ac rationali Chirur- *Duo in chi-*
go, duo potissimū desiderantur. *turgo desi-*
derantur.

1 Exacta cognitio eius partis tertiz,
therapeutices medicinæ: quæ, quia manu
medetur χειρουργία Græcis nominatur.

2 Peritia ac solers prōperitudo, seu prō-
ptia quædam dexteritas, exequēdi ea om-

nia, quæ ad affectus Chirurgiæ subiectos attinent.

1 Vt exactè cognoscatur scientia siue ars, quæ
Chirurgica dicitur, scire oportet,

1 Quid sit Chirurgia.

2 Quæ sit subiecta Chirurgiæ materia, subiectum attributio-
nis nominant.

3 Quis sit finis Chirurgiæ.

4 Quis ordo seruandus sit, in addiscenda Chirurgia: seu quis
sit modus procedendi in discenda chirurgia.

2 Vt peritè, promptè, ac dexterè exequatur Chi-
rurgus, quæ ad artem quam exercet, pertinent:
eum cognoscere oportet.

1 Quod nam sit homini: chirurgici officium, hoc est, quas nam
operationes in vniuersum chirurgicus exercere debeat in
humano corpore.

2 Quomodo manuales suas operationes hic arti sex exequi
debeat.

3 Methodum, ac media, quibus deuenire possit in cognitio-
nes singularum operationum, quas exercere debet in huma-
nis corporibus.

4 Conditiones requisitas vt probe fiant huiusmodi manuum
operationes.

*Quatuor ad
chirurgia co-
gnitionem
necessaria.*

Porro

Generalis & Compendiaria

Quibus co- I Porro cognoscimus quid sit chirurgia, per
gnoscat Rationem nominis, quam etymologiam Græci vocant.
ur Diuisionem, quæ & partitio dicitur, ac distributio, didu-
quid chirur- **giæ.** Definitionem, quæ oratio est, eius ipsius quod definitur na-
turam breuiter & aperte ostendens atque explicans.

Ratio nomi- Chirurgia, quod ad rationem nominis attinet, Idem sonat
nis. quod manuum operatio. Dicta enim est ἀπὸ τῆς χειρὸς καὶ
τῆς ἐργῆς, id est, à manu & opere, vel ἀπὸ τῆς ἐργίας, id est, ab
operatione. Siquidem hæc ars manuum opere exercetur. Hinc
chirurgus & chirurgicus, manualis operator, χειρουργός enim
quali χειρουργός, & χειρουργία quasi χειρουργία dicitur.

Est igitur chirurgia, si nominis rationem spe-
ctes, manualis operatio, vel ars quæ docet rectū
vsum operationū, quæ in humano corpore ma-
nu exercentur.

Diuisio chi- Chirurgia bifariam diuiditur: Nempe in suas
rurgie du- Significationes diuersas.
plex. Partes.

Diuisio chirurgiæ in diuersas significationes,
Prima,
Secunda.

Prima diuisio chirurgiæ in diuersas significa-
tiones,

Chirurgia generaliter accepta.
Chirurgia speciatim sumpta.

Varia defi- Chirurgia generatim accepta & considerata, est
nitiones chi- Ars quæ manus opera, morbos, & eorum symptomata pro-
rurgie. fligat.

Chirurgia verò presiore vocabulo, ac speciali-
ter sumpta, est

Tertium therapeutices id est facultatis curandi, seu medici-
næ curatricis instrumentum, vel si manus, pars tertia thera-
peutices quæ morbis medetur incidendo, vrendo, artus luxa-
tos, & ossa suis sedibus mota in natium locum reducendo,
atque id genus alio conatu chirurgico, & manuum artificio.

Sed

Chirurgi Institutio.

Sed aliter quoque, ab omnibus ferè recentioribus tum medicis, tum chirurgis definitur, Nempe hoc modo,

Hæc definitio communiter solet chirurgiæ

Chirurgia, est scientia, quæ docet modum & qualitatem operandi, præsertim adglutinando seu consolidando, incidendo, & alias id genus, quæ manu fiunt, operationes exercendo: Homines quatenus licet sanitati restituens.

assignari, et essentialis nominari.

In introductorio verò medicorum hoc pacto diffinitur,

Chirurgia est alieni, ut propriè vocant, per diuisiones compositionesque cum via quadâ & ratione ablatio: adhuc vulnerum atque vlcerum humano corpori accidentiû curatio.

Alia definitio.

Nos autem ex ipsius subiecto & fine (ex quibus finitio omnis suscipitur) breuem, apertam & essentialem sic illi nunc definitionem accommodamus:

Chirurgia, est ars, quæ ad humani corporis (cuius præcipuè curam habet) aduersam valetudinem, manus præsertim opera & administratione, profligandam, comparata est. vel sic, Chirurgia est ars, quæ præcipuè manus opera & artificio, corporis humani morbos ac vitia propellit.

Propria & essentialis chirurgiæ definitio.

Secunda diuisio chirurgiæ, quantum ad illius significata attinet, communiter talis solet assignari,

Secunda diuisio chirurgiæ in sua significata.

Chirurgia theórica,

Chirurgia practica.

Chirurgia theórica est

Quæ docet, & scientia dicitur.

Hæc enim per demonstrationem acquiritur, & per cognitionem principiorum artis. Hanc autem quis habere potest, tamen si nulla vnquam artis opera exercuerit, ut peritus medicus, qui ad vnguem tenet præceptiones artis chirurgiæ.

Scientia.

Chirurgia practica, ea est

Quæ per scientiam & rationem inuenta sunt, manuali opera rectè ac promptè nouit perficere. Et hæc inter artes mechanicas adnumeratur. In qua quidem nemo vnquam absolutus

Ars.

lurus

Generalis & compendiaria

latus esse potest, nisi qui in ea frequenter se exercuerit, & alios artis huius peritos, sapissimè viderit operari, ac quæ viderit, diligenter obseruarit. Hanc nonnulli vsualem etiam appellarunt.

Diuisio chirurgiæ in suas partes.

Diuisio chirurgiæ in suas partes,

Generales,
Speciales.

Chirurgia quantum ad illius partes generales, gemina est.

- 1 Exercēs operationes in mēbris, seu particulis mollioribus.
- 2 Exercens operationes in particulis durioribus.

Partes chirurgiæ speciales, sunt scientia quæ docet recta cum ratione operari, circa

Tumores præter naturam

Plagas, seu vulnera [adhuc cruenta.]

Vlcera

Fracturas

Luxationes, seu dislocationes

Et circa alia id genus, quæ manus operam desiderant.

Subiecta chirurgiæ materia.

2 Subiectum attributionis chirurgiæ, id est, id quod maximè ac præcipuè consideratur in scientia chirurgica, & circa quod tota eius versatur intentio, est

Corpus humanum sanitati & ægritudini obnoxium, manus operam expostulans: omnia enim quæ ratione perlustrat chirurgia, & manu facere docet, ad ipsius vtilitatem refert & accommodat. Alia verò ratione consideratum, subiectum est alterius scientiæ.

Finis seu scopus chirurgiæ.

3 Finis, seu intentio chirurgiæ, est,

Manus opera & administratione, humani corporis morbos curatu possibiles profigare: Hunc autem scopum non semper assequitur, vt postea dicitur.

Modus procedendi in chirurgia.

4 Modus procedendi in discenda chirurgia, est

A communioribus ad particularia, siue ab vniuersalioribus ad minus vniuersalia.

A rebus notioribus ad obscuriores, & minus notas, quod & in alijs, similiter disciplinis obseruari solet.

Hactenus

Chirurgi Institutio.

Hactenus de ijs quæ ad cognitionem chirurgiæ atinent.
Nunc de ijs quæ ad eius executionem requiruntur: Et primum de operationibus.

2 Operationes quas exequi debet chirurgus ut allequatur intentionem seu scopum aut finem, quem sibi proponit: sunt tres, Nempe

Operationes ad scopum scientiæ chirurgicæ assequendum necessariæ.

1 Continuum diuidere, seu separare.

2 Diuisum seu disiectum coniungere, atque in probam unionem reducere.

3 Superfluum demere.

Porro continuum separamus,

Incidendo, & excidendo.

Phlebotomando, hoc est venam secando.

Scarificando.

Continui diuisionem.

Disiectum ac diuisum coniungimus,

Vulnera glutinando (seu ut dicunt) consolidando,

Luxata in locum suum adducendo:

Fracturas curando.

Coniunctio diuortij continui.

Superuacaneum adimimus

Tumores qui præter naturam consistunt, auferendo:

Ganglia, carcinomata, nodos, strumas, myrmecias, & id genus alia radicibus extirpando:

Serosum humorem ex ventre hydropicorum educendo:

Sextum, in manu aut pede, digitum refecando.

Superflui ablatio.

2 Manuales huiusmodi operationes obire atque exequi debet chirurgus.

Cito,

Tuto,

Citra dolorem,

Sine ulla fallacia, aut impostura,

Non lucri, aut corradendæ pecuniæ cupiditate, sed pia quadam erga proximum affectione.

Sine vanis promissionibus de curandis morbis, qui prorsus inexpugnabiles sunt atque insanabiles, cuiusmodi sunt cancri occulti & exulcerati, vel elephantiasis quæ iam inueterauit.

Modus exercendi manuales operationes.

Rursus ut tuto curet chirurgus, tria sunt propria, quibus intentus sit oportet.

Vnum,

Generalis & Compendiaria

*Lib. 14. Me-
tho. med.*

- 1 Vnum, primumque, vt omnino absolutionem operis consequatur.
 - 2 Alterum, vt sicubi hunc non consequatur, saltem cubantem non lædat.
 - 3 Tertium, vt vitium non facile reuertatur.
- 3 Media quibus chirurgus deueniet in cognitionem eorum quæ illi agenda sunt, tria statuuntur à Galeno.

- 1 Prima
 - 2 Secunda
 - 3 Tertia
- } Indicatio.

*Prima indi-
catio quid
sit.*

1 Prima indicatio (quæ insinuatio est eorum quæ agenda sunt) sumpta ex natura rei cuius finis intentio dicitur.

} Conseruatio eius quod secundum naturam est.
} Expulsio eorum quæ præter naturam sunt.

*Enumeratio
eorum quæ se-
cundum na-
turam sunt.*

Secundum naturam sunt,

- 1 Sanitas, id est, affectus secundum naturam ad efficiendum actionem idoneus.
- 2 Causæ sanitatis.
- 3 Effectus sanitatis, id est, actiones quæ secundum naturam sunt.
- 4 Vires, id est, natura quæ præsens est, & aduersus morbum certat.
- 5 Consuetudo quæ velut altera est natura.
- 6 Temperatura. Quæ omnia similibus conseruantur

*Quæ dicantur
præter
naturam.*

Præter naturam sunt,

- 1 Morbus, id est, affectus præter naturam per se ac primo actionem lædens.
- 2 Morbi causa. Quæ non per se ac primo, sed per accidens, ac secundo (morbo scilicet interueniente) actionem lædit, & impedit.
- 3 Symptoma speciatim sumpto nomine, id est, accidens quod morbum sequitur, velut vmbra corpus.

*Lib. de sym-
pta. differ.*

Hæc autem per contraria expelluntur.

Expulsio morbi (cui propriè debetur curatio)
Simplicis,

Compo-

Chirurgi institutio.

Compositi, & implexi. *compositi.*

Expulsio morbi simplicis, fit

Per applicationem eius quod morbo contrarium est.

Prima igitur indicatio, a re præter naturam sumptam, nobis insinuatur ab ipsa contrarietate, vt

Prima indicatio sumpta a re præter naturam, unde insinuetur.

Vnitio	} à	{	soluta continuitate
Refrigeratio			caliditate
Calefactio			frigidity
Humectatio			siccitate

Desiccatio ab humiditate

Minutio	} à	{	quantitate excedente
Augmentatio			quantitate minuta
Ablatio			numero excedente
Productio			numero deficiente

Apertio	} ab	{	obstructione
Ampliatio			angustia
Restrictio			ampliatione

Reductio in propriam figuram à figura mutata

Repositio in proprium locum à

{	positu variato, vt membro
	luxato, intestino infero-
	tum delapso, & ita de alijs.

In morbo composito que consideranda

In propulsione morbi compositi considerare oportet

Cuiusque morbi contrarietatem,

Ordinem contrarietatis cuiusque adplicandæ.

Vt ordo debitus contrarietatis admouendæ feruetur, cognoscere oportet

Quis affectus primum curari debeat.

Affectus qui primum curari debet, is est,

Cuius curatio causa est curationis alterius,

Sine quo, alter curari non potest,

Qui magis vrget, & periculosior est.

Secunda indicatio quid insinuet.

2 Secunda indicatio, est, que nobis insinuat an id quod tendimus, & prima postulat indicatio, sperari possit, vt

Generalis & compendiaria

An feruare possimus quæ secundum naturam sunt.

An quæ præter naturam sunt, expellere valeamus.

Secunda igitur indicatio, à re secundum naturam sumpta, disquirat, an

Sanitatis recuperatio speranda sit,

Vires ad vitam feruari possint,

Causæ sanitatis feruari possint?

Et ita de cæteris.

A re verò præter naturam sumpta hæc indicatio secunda, insinuat, an

Morbi aut symptomatis expulsio, sperari possit,

Causis possimus præcauere?

*Modis tribus
potissimum
cognoscimus
morbum non
posse propelli,
& incurabilem esse.*

Porro, nos cognoscimus morbi expulsionem fieri non posse

- 1 Quando morbus ex sua natura, seu essentia incurabilis est, vt elephantiasis iam absolura, & [vt dicunt] confirmata.
- 2 Quando laborans renuit auxilia, ad morbi alioqui ex se sanabilis curationem necessaria, vt exempli gratia, excisionem in cancro membrum aliquod particulare occupante. Aut in hydrope paracentesim, id est, perusionem, & ita de alijs.
- 3 Quando curatio morbi nobis propotiti occasionem præbet maioris mali: vt si malum mortuum (quod vocant) in ueteraturo, curetur. Aut diuturnæ hæmorrhoides omnino tollantur. Si enim vna ex ijs non feruetur, periculum est, aquam intercutem [maniam,] vel tabem adueniri.

*Hippo. aph.
lib. 6.*

*Morbus ex
sua essentia
incurabilis
à quibus de
prehendatur.*

Morbum autem ex se, siue ex sua natura incurabilem esse deprehendimus, ex lesæ partis

Substantiâ,
Actione,
Vsu,
Situ.

Substantia. Indicatio à substantia sumitur, vel

A missione in {
Calido
Frigido
Humido
Siccò,

A pri-

Chirurgi Institutio.

A primordio , vnde formata sit substantia , & eiusdem consistentia.

Indicatio à mistione, in calido, frigido, humido & sicco,

Aequaliter vitiata,	{	Insinuat id non posse praestari quo tendimus.
Inæqualiter vitiata,	{	Insinuat id praestari posse quo tendimus.

Indicatio à primordio, ex quo formata est partis substantia, & eiusdem consistentia,

A substantia	{	Solida læsa,	{	Insinuat non posse praestari id quo tendimus.
		Carnosa vitiata	{	Insinuat id posse praestari quod prima indicatio postulat.
		Spiritali oblæsa		

Indicatio secunda ab actione partis

Per quam est vita	{	Insinuat si perierit praestari non posse quo tendimus.
Sine qua vita esse non potest		
Per quam melior est vita		
Per quã conseruatur vita	{	Insinuat si perierit aliquo modo praestari posse quo tendimus. sed tamen noxam successu temporis maiorem futuram.

A. f. f. f.

Indicatio ab vsu, seu commoditate, ad alterius assequutionem, à natura insita

Partis	X	Necessaria ad vitam	{	Insinuat si perierit praestari nõ posse id quo tendimus.
Actionis		Non necessaria ad vitam	{	Insinuat si perierit praestari posse quo tendimus.

V. f. f. f.

Indicatio secunda à situ partis sumpta

Ad quam medicamenta pertingere	{	Possunt	{	posse	{	obteneri, quod prima indicatio postulat, insinuat.
		Nõ possunt		nõ posse		ma

S. f. f. f.

Generalis & compendiaria

Tertia indicatio. 3 Tertia indicatio (quæ remedia inuenit quibus
assequi possumus id quod prima indicatio postu-
lat, & secunda fieri posse sperat) nobis insinuat.

† Auxilia opportuna, ad finem quo tendimus, assequendum.

Remedia opportuna ad finem quo tendimus consequendum. * Vsum remediorum conuenientium.

† Auxilia conuenientia, quæ & instrumenta dicuntur,

Communia,

Propria.

Remedia communia.

Instrumenta siue remedia communia dicta, hoc est, quæ omnibus corporis partibus adplicari possunt,

Medicinalia,

Ferrea.

Medicinalia

Instrumenta medicinalia,

Bona viuendi ratio, siue (quod aiunt) bonum regimen, in rebus sex non naturalibus,

Pharmacia

Phlebotomia

Emplastra

Vnguenta

Pulueres, & similia

In ijs tribus primis applicandis, Chirurgus debet, peritum aliquem medicum consulere.

Vnguenta. Vnguenta, quibus munitus esse debet chirurgus, vt communioribus suæ artis intentionibus satisfaciatur, numero sunt quinque,

Basilicum

Apostolicum

Aureum

Album

Diathæum

} ad { maturandum, & pus mouendum.
detergendum siue purgandum.
implendū, seu (vt dicunt) incarnandū,
glutinandum seu consolidandum.
demulcendum, mitigandū, &c.

Ferrea instrumenta communia

Instrumenta ferrea communia, quibus vtitur chirurgus, sunt

Forfices

Nonacula, seu culter rasorius

Scalpellum chirurgicū quod

phlebotomon appellant.

} Ad incidendum & excindendum.

Caute.

Chirurgi institutio.

Canterium, ad vrendum.

Forcipes, vulgo tenaculæ

Vulsellæ, seu volsellæ,

Hamus recurvus,

Ferramentum, quod Diocleum era-

phisicum Græci vocant. Cuius descri-

ptionem & vsum vide apud Corne-

Celsum lib. 7. cap. 5.

Specillum, Ad explorandum.

Acus

Cannulæ, } Ad suendum.

Ad extrahendum.

Ex ijs magis necessaria, & quæ in vsum veniunt
quotidianum atque ideo semper à chirurgo cir-
cunferri debent, sunt,

1 Forfices, *sifcaux Gallicè.*

2 Vulsellæ seu

Vulsellæ, *pincettes.*

3 Nouacula,

4 Specillum, *essprouette.*

5 Scalpellum, *lancette.*

6 Acus.

*Instrumenta ferrea chî-
rurgo magis necessa-
ria sũt.*

Instrumenta propria ferrea, id est, quæ alicui par-
ticulari membro dicata sunt,

Modiolus, quem *χονίσιον* Græci vocant. capiti.

Falx, seu fauceolus. *iedi siue ano.*

Speculum oris,

Speculum matricis.

*Ferrea in-
strumenta
propria.*

* Vfus remediorum conuenientium ad finem
propositum assequendum, ex singulis tractatibus
habetur, iuxta varietatem rerum (vt vocant)

*Vfus reme-
diorum.*

Naturalium,

Non naturalium,

Et præter naturam.

Item eorum quæ illis

annexa dicuntur.

Res naturales dicuntur, quæ corporis nostri con-
stitutionem ingrediuntur, Et hæ numero sunt
septem.

*Res natura-
les.*

1 Elementa, ignis, aër, aqua, terra.

Generalis & Compen.

- 2 Temperamenta, calidum, frigidum, humidum, siccum, &c.
His annexa sunt. 2 Humores, sanguis, pituita, utraque bilis.
Aetas } Principalia. cerebrum, cor, hepar, testes.
Sexus } Potentias sortita in fitas, & manentes à principibus, pulmo, ventriculus, renes.
Vita industria. 4 Membra } Principibus subministrantia, arteriæ, venæ, nervi, vasa spermatica.
 } Ab infinitis sibi à natura facultatibus gubernata, os, charitil. ligam. &c.
 5 Virtutes
 6 Operationes } Animales, vitales, naturales.
 7 Spiritus

Res non naturales. Res non naturales, sunt, quæ corpus humanum, si rectè adhibentur, conferuant incolumem: si verò haud rectè accommodantur corpori, tunc idem destruunt. Sunt autem numero sex:

- Annexa sunt, tempus regio, venti, balnea, coitus, consuetudo.**
 1 Aër, siue ambientis aëris adhaesus.
 2 Cibus & porus, siue ea quæ assumuntur.
 3 Motus & quies, & totius corporis, & partium singularum.
 4 Somnus & vigiliæ.
 5 Inanitio & repletio, siue ea quæ excernuntur & retinentur.
 6 Animi affectus.

Res præter naturam. Res contra naturam, seu præter naturam dicuntur, quæ humanæ naturæ contrariæ sunt, ipsamque demoliuntur, vel lædunt, aut ægrotare faciunt. Et hæ tres sunt numero, ut supra dictum est.

- 1 Morbus
 2 Causa morbi
 3 Accidens, morbum sequens } Quorū diffinitiones supra descriptæ sunt: horū differentias Gal. peculiariter lib. explicuit.

Morborum tria genera. Morborum in vniuersum tria sunt genera,

- 1 Intemperies, siue mala cōplexio
 2 Mala cōstitutio seu compositio
 3 Vnionis dissolutio } in { similarib⁹ partib⁹.
 } { partib⁹ instrumēt. utriusque.
 Divisio perficienda ex lib. de differentiis morborum.

Causæ

Chirurgi Institutio.

Causæ morborum genericæ, recentioribus tres *Morborum causa tres.*
solent assignari.

- 1 Frægressæ, siue evidentes, quæ & primitivæ dicuntur vulgò.
Græcis autem προγεταρκτησι, Quæ extrinsecus corpori
adueniunt.
- 2 Antecedentes seu præcedentes. Græcè προηοιµουσι, Quæ
paratæ sunt statim morbos efficere.
- 3 Coniunctæ siue continentes. Græcè συνεκτησι, Quæ iam
morbum excitant.

Symptoma siue accidens morbum sequens, trifariam distinguitur. Aliud enim est, *Symptoma speciatum dicitur tripliciter.*

- 1 Actio læsa siue functionis noxa.
- 2 Qualitas mutata, vt caliditas vehemens in phlegmone.
- 3 Exiens mutatum, vt immodicæ } } Excretiones,
excrementorum. } } Suppressiones.

Actio læditur trifariam

Ablatè siue abolitè }
Diminutè, seu debilitè } vt { Cæcitas
Corruptè, siue depravatè } { Visus hæbes } in oculis
Deprauata visio }

4 Conditiones requisitæ ad manuales operationes probè exercendas, variæ sunt ac multiplices. Aliæ enim spectant ad

Chirurgicos ipsos,
Laborantes,
Assidentes,
Exteriora.

Quatuor conditiones in vniuersum requiruntur in bono chirurgo: Nempe vt sit

- 1 Doctus, & disciplinarum gnarus, earum præsertim quæ ad suam artem pertinent. *Boni chirurgi conditiones.*
- 2 Multis experimentis exercitus.
- 3 Ingeniosus.
- 4 Bonis moribus præditus.
- 1 Doctrina atque eruditio boni chirurgi, consistit in *Doctrina.*

Generalis & Compen.

Theoria seu speculatione, cognoscendo res { Naturales
Non naturales
Præter naturā.

Praxi { Exercendo probè, celeriter, concinne, & expedite operationes manuales.
Consulendo medicum in ijs quæ ad pharmaceuticæ artis & diæteticæ.

Ex rebus naturalibus, præcipuè illi cognoscenda sunt,

Corporū téperamenta, { Substantia
Téperamentū
Singularum partium. { Conformatio
Compositio. } Ab his enim curæ-
di indicationes de-
sumuntur.

Experiētia. Experientia chirurgi, consistit

In ijs quæ certa ratione excogitata sunt, & frequenti vſu confirmata:

Aliàs empiricus & temerarius censendus erit, nisi scilicet experientiam habuerit rationi coniunctam.

Ingenium Ad chirurgi ingenium pertinent,

Bona ac prompta apprehensio,

Tenax memoria,

Remiscentia facilis,

Rectum iudicium,

Operandi dexteritas,

Solertia ac pröptitudo in remedijs inveniendis.

Ex Corne. Ad operandi dexteritatem ac promptitudinem hæc requiruntur,

*Celfo. &
Hippo. lib.
qui hæc in
triplicis in-
scribitur.*

1 Acris oculorum acies claraque.

2 Manus strenua, stabilis, nec vnquam intremiscens.

3 Vt non minus sinistra quàm dextra sit promptus.

4 Optima corporis conformatio, atque habitudo.

Mores. Mores qui decent chirurgum, sunt, vt fit

Audax, & animo intrepidus, in rebus tutis, & necessarijs.

In rebus dubijs ac periculosis non admodum præceps.

Comis & affabilis erga laborantes.

Manuversus ac facilis erga suæ factionis homines, & vt græcè dicam *φιλῆται* id est, amator sociorum.

Prudens ac circumspectus in præsagiendo.

Cautus,

Chirurgi Institutio.

Castus, ac temperans.

Misericors erga pauperes.

Pecuniæ non nimis cupidus, nec exactor iniquus.

Conditiones quæ ad laborantem attinent, tres sunt præcipuæ, vt *Laborantis conditiones.*

- 1 Pareat medico, non secus ac seruus domino, & in nullo propriæ indulgeat voluptati.
- 2 Confidat in medicum, & chirurgum.
- 3 Patienter ferat omnia, quæ fiunt à chirurgo rationali & experto, gratia recuperandæ sanitatis.

Qui assident ægro, debent esse

Assidentes.

Prudentes,

Pacifici,

Fideles.

Exteriora omnia apparatus esse debent,

In utilitatem laborantis,

Et vt morbus desiderat.

Nomine exteriorum comprehenduntur.

Habitationes, vel { idoneæ, & omni turba vacantes.
parum commodæ, & turbarum plenæ.

Quæ nunciantur, aut aguntur.

Quæ iram, tristitiam, aut aliquem alium affectum infligunt ægrotanti.

Quæ somnum abrumpunt & interturbant.

FINIS COMPENDII CHIRURGICÆ

Tumorum, qui præter

NATURAM CONSI-

STUNT GENERALIS DIVISIO,

IN PRIMUM LIBRUM CHI-

RURGICARVM INSTITV-

TIONVM IOANNIS

TAGAVLTII

MEDI-

CI.

Primæ ac generales, tumorum præter naturam differentia.

- | | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|
| 1 Phlegmone, | } | { | Sanguinea fluxione | } | exuperante
procreatur. |
| 2 Erysipelas, | | | Biliosa fluxione | | |
| 3 Oedema, | | | Tenuis pituitæ sub- | | |
| 4 Scirrhus, | | | stantia | | |
| | | | Limoso & fæculento | | |
| | | | sanguine, | | |

- 5 Inflatio, seu Flatuosus tumor { Ex flatuoso spi-
ritu collecto na-
scitur.

- 6 Abcessus, Quod græci apostema nominant.

Phlegmoni.

- 1 Phlegmone duplex est,

- 1 Ex sanguine syncero, { Vera phlegmone vulgò ap-
pellatur.

- 2 Ex sanguine optimo alijs humoribus commisto, { Recentioribus chi-
rurgis phlegmone
non vera nomina-
tur.

Ex sanguine alijs humoribus commisto, fit

- Phlegmone { Erysipelatodes,
Oedemarodes,
Scirrholes.

Phlegmon

Gener. diuifio Tumo. præter natu. in lib. i.

Phlegmonofi affectus funt,

- Dothienes, { Furculi Celſo, Auicennæ Aldemurenul. Tuberculū acutū, cum inflammātionē & dolore.
- Bubo, Simplex laxarum partium inflammatio.
- Phygethlum, { Panus vocatur Celſo. Græcis Phlegmone eryſipelatodes, vel eryſipelas phlegmonodes. In inguinibus & aliis naſcitur.
- Phyma, { Inflammatio glandularum, Quæ citò augetur, & ad ſuppurationem accelerat. Celſo tuberculum dicitur.
- Carbunculus, Græcis Anthrax, { Cum puſtulis Sine puſtulis.

Nil aliud quoque quàm Phlegmonæ funt,

- Vux, { Gurgulionis, qui Græcè γαργαρίων, & σαφύλη: dicitur Latinis etiam columella.
- Tonſillæ, { Glandularum, quæ in faucium principio ſibi opponuntur, amygdalas vulgò appellantur.
- Parithmia, corporum, quæ in pharynge conſiſtunt.
- Hæc morborum & partium ſunt nomina.

Phlegmonem ſequuntur, atque eius proles funt

- Abſceſſus, { Qui etiam fiunt aliquando protinus ab initio, nulla inflammātionē præcedente.
- Sinus, { Græci κόλπον nominant, recentiores chirurgi vlcus profundum & cauernoſum, quod nondum occalluit.
- Fiſtula, { Græcis ſyrinx dicitur. Hæc nihil aliud eſt quàm ſinus arctus & oblongus, qui non ſtatim curatus, tēporis progreſſu obduruit, et callo obductus eſt.
- Gāgræna, Partis affectæ mortificatio, nō tamē abſoluta.
- Sphacelus, { Latinis ſyderatio. Abſoluta atque omnimoda partium etiam ſolidarum mortificatio & corruptela.

2 Eryſipelas bilioſæ fluxionis ſoboles, gemitus, & iſtericia num eſt,

- 1 Verum ac legitimum, { Solius cutis paſſio eſt, & abſque vlceratione incidit.
- 2 Non exquisitū ſeu illegitimū, { Non ſolā cutim, ſed etiam ſubiectam carnē occupat, ac moleſtat.
- Eryſipelas

Generalis diuifio Tumo.

Eryfipelas non legitimum, duplex eft,

- | | | | | | |
|---|---|---|-------------|------------|------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Ex bile craſſiore & acriore,
exaâta tamen & ſyncera, 2 Ex bile alijs humori
bus pmixta, alios ta-
mê ſuccos exuperâre. | } | Nominatur eryfipelas
cum vlceratione. | | | |
| | } | Dicitur eryfipelas { <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">Phlegmonofû</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">Oedematofû</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">Scirrhofûm</td> </tr> </table> | Phlegmonofû | Oedematofû | Scirrhofûm |
| Phlegmonofû | | | | | |
| Oedematofû | | | | | |
| Scirrhofûm | | | | | |

Eryfipelati fimilis eft herpes : Qui geminus eft Galeno,

- | | | |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Herpes exedens,
ſiue depaſcens. 2 Herpes milia-
ris, ſiue puſtu-
loſus. | } | Græcè <i>ἰσθίον</i> &c. A bile fit acriore &
exaâta totâ cutim vſque ad ſubiectam
carnê exulcerante. Eiuſdem generis eft
cum vlcerato eryfipelate. |
| | } | Cenchrias Græcè. Ex bile fit tenuio-
re & dilutiore, proinde & minus
acricalidaque. |

Ad eryfipelas etiam pertinent.

Bullæ ſimiles ijs, quæ in corpore à ſeruida aqua terrefacto
contingunt, Phlegmonæ à Græcis vocatæ.

Oedema

3 Oedema bifariam conſideratur,

- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Vt ſympto-
ma, 2 Vt morbus. | } | Tumor rarus, & ſine doloris ſenſu : ex pi-
tuita, vel flatulento ſpiritu, periculoſos
quorſdam affectus ſequens, vt tabem, cache-
xiam, hydropem. |
|--|---|--|

Oedema morbus duplicem habet originem,

*Oedema
morbus.*

- | | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Ex pituita ſola, 2 Ex pituita alijs humoribus
permixta, ſed tamen illis præ-
pollente. | } | Tumor etiam laxus, fungoſus, & abſq;
doloris ſenſu, ex tenuis pituitæ influxu
ortum habens, quod verum ac legitimum
oedema nominant. |
| | } | Recentioribus oedema
non verum atque illegi-
timum appellatur. |

Oedema morbus ex pituita alijs humoribus
commiſta, in treis differētias findi ſolet: Nempe in

- 1 Oedema phlegmonodes,
- 2 Oedema eryfipelatodes,

Oedema

Præter naturam, in lib. I.

3 Oedema scirrhomides.

Ad oedema referuntur.

*Tumores
oedematosi.*

Hydrocele, { Vulgò hernia aquosa. Quum humor aqueus
in testium tunicis congregatur.

Ascites, { Aquosus hydrops. Quum terotus humor in mē-
brana abdominis interiore continetur.

Leucophlegmaria, { Hypofarca, & anafarca etiam dici-
tur. Quū corpus inæquale est, tumo-
ribus aliter, aliterque per totum id
(vt Celiū ait) orientibus.

4 Scirrhus, tumor durus sine yllo dolore,

Σκίρρῶς

1 Exquisitus, Sensu caret, nec curationem admittit.

2 Non exquisitus, { Non omnino est sine sensu, ægrè ta-
men admodum sentit.

Scirrhus tam exquisitus, quàm non exquisitus,

1 Statim ab initio paulatim concrefcens, & augescens.

2 Ex coincidentia creatus.

Scirrhī qui à principio paulatim concrefcunt,
& augentur.

1 Ex pituita lenta, crassaque, tenuiore eius substantia reso-
luta,

2 Ex atra bile, seu melancholia.

Scirrhī ex atra bile, seu melancholia (vt vocāt)
naturalī,

1 Sola, & alijs humo- { Legitimi & veri scirrhī nostræ
ribus impermixta, { ætatis chirurgis appellantur.

2 Alijs humoribus commixta, domi- { Illegitimi cen-
nium tamen super illos obtinente. { sentur.

Scirrhus ex atra bile alijs permixta humoribus,

1 Phlegmonodes,

2 Oedemarodes,

3 Erysipelatodes.

Scirrhī ex coincidentia, vel transmutatione
sunt,

Phlegmone, {
Erysipelate, { impendiò refrigeratis.
Oedemate, }

Melan.

Generalis diuifio Tumo.

Melancholici ac fcirrhofi tumores cenfentur

Cancer, Græcè carcinoma. Fit ab atra bile, fine ebullitiõe.

Phagedæna cum } Cum cute pariter fubiecta attingit
tumore. } & depafcitur. In quo differt ab
herpete.

Vlcera cacoëthe, id eft maligna, } vt funt Chironia & Te-
cum tumore, } lephia.

Psora, }
Lepra, } Cutis tantum affectus funt.

Elephas, feu }
elephantia- } Ex fanguine melancholico ducit origi-
fis. } nem, tempore verò bilis atra fanguine
copiofior redditur.

Satyriafmus, id eft, elephas incipiens.

Vicina fcirrho funt,

Enchymomata }
Melafmata, } Senibus ex venarum contufione acci-
dētia, fanguine ex venis effufo ob ex-
tremas earum adaperfiones: & interdum ob tunicarum contufiones.

Aneurifma, } Arteriæ adaperæ affectus, ex quo interdum, grumo fcilicet innato, fphacellus gignitur.

Varices, } Id eft venæ dilataræ in cruribus à fanguine craffo.

Scirrhi funt à parte affecta nomina fortiti

Chœrades, } id eft Strumæ glandularum.

Sarcoccele, } Ramex teftium vulgò hernia car-
nosa, fit cum caro inter tunicas te-
ftium increfcit.

Inflatio. § Ex inflationum genere funt

Tympanias, feu } Hippocrati aqua intercutem ficca vo-
tympantes, } catur.

Priapifmus, qui & } Pudendorum intentiones non re-
satyriafmus qui- } mittentes, à fpiritu halituofò cauer-
busdam dicitur, } nofum neruū (qui propriam colis
fubftantiam conftituit) implente.

Sunt & parui quidam tumores in cute nafcentes, qui ad prædicta genera referuntur, vt

Acho-

Præter naturam, in lib. i.

- Achores, { Pituitæ salsæ & aluminosæ soboles. Parua in Parui tumo-
cure capitis vlcera, cum tumore modico. res in cute
- Fauis, { Ex his humor melteus effluit. Cum tumore quo- nascentes.
dam & foraminibus plurimis eueniunt.
- Ad scir- { Myrmecia, { Verrucæ, quæ latiore sunt basi,
rhû per- { & quasi sessiles. Latini formican
tinent, { res verrucas appellant.
{ Actochordones. { Pensiles verrucæ, & angu-
{ stiore basi.
- Psydraces, { Tumores parum supra summam cutē emi-
seu psydra { nentes, phlyctēnis, hoc est bullis, quæ ab
cia, { igne excitantur, similes.
- Epinyctides, { Liuentes pustulæ, sabæ magnitudinem nō
{ excedentes, noctu quidem magis, quàm in-
{ terdiu infestantes.

Tumores etiam sunt, sed non ex humoribus,

- Epiplocele, { Cum omentum in scrotum descendit.
- Enteroccele, { Intestinorum ramex,
{ Hernia intestinalis vulgō.
- Enterœpiplocele, { Cum intestinum summum cum omento
{ in scrotum delabitur.
- Cirsocele, { Vulgō hernia varicosa. Fit quam testium in-
{ tegris tunicis ramex innascitur.
- Bubonoccele, id est, in- { Fit rupto peritonæo, aut vulnera-
guinis ramex, { to iuxta inguen. Ad obliquos ven-
{ tris musculos pertinet, & ad ner-
{ ueam illorum tenuitatem,
- Exomphalorum eminentia, cum { Hic affectus ad transi-
vmbilicus indecorē prominet. { uersos musculos perti-
{ net, & nerueam eorum
{ tenuitatem.

Ex carne supercrecente fiunt

- Sarcocele, { Tumor testium, Quum caro inter tunicas ip- Tumores ex
{ forum increfcit. carne super-
{ crefcense.
- Epulides, { Superflue carnes ex inflammatione in extre-
{ mo molari dente, cui dolor quandoque & fe-
{ bris iungitur.
- Parulides, { Abscessuli circa gingiuas facti, qui nisi soluti
{ fuerint suppurantur.

Thymi,

Gener. diuifio Tumo. præter natu. in lib. i.

Thymi, thymia, } Verruculae infra tenues, supra latiores, capituli, id est, cacuminis floris
 vel thyma, } thymi fruticis furculosi, figurâ verius quàm colorem representantes.

Polypi, vel polypodes, id est multipedes. In naribus.

Abscessus.

6 Abscessus fiunt, vel

Natura fluorem vincentem,

Natura à fluore victa. Hi toto genere præter naturâ sunt.

Abscessuum, qui toto genere præter naturam sunt, materia,

Humores,

Solida corpora.

Humor qui in abscessibus toto genere præter naturam continetur, alius est, veluti

Lutum,

Cœnum,

Oleum,

Vini fex,

Urina,

Melleus mucosusque succus.

Vniuersa hæc, tunica quædam membranosa comprehendit.

Solida corpora in abscessibus inuenta sunt, veluti

Vngues,

Lapides,

Pili,

Pori,

Ossa,

Testæ,

Animalcula, propè omnibus, quæ ex putredine generationem habent, simillima,

Frequētissima abscessuum genera sunt tria, quorum natura ex nominibus constat

Atheroma,

Meliceris,

Stearoma,

in { Eo pulticula quæ simile inueniunt.

Quo mellis quod simile reperitur.

Eo aliquid simile senu visum.

F I N I S.

Institutionum Chirur-

GICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER PRIMVS.

De Tumoribus præter naturam, in vniuersum.

Quid sit Tumor præter naturam, qui vulgò generali nomine Apostema dicitur, & multiplex eiusdem definitionis examinatio.

CAPVT I.



VMORES omnes, qui præter naturam consistunt, recentiores tum medici chirurgi, atq; etiam vulgus ipsum, sub nomine Apostematis comprehenderunt.

Quum tamen ἀπόστημα Galeno & Grecis omnibus, vna sit species tumorum præter naturam incidentium, quam Latini appositè abscessum nominauerunt, & iuniorum turba, accepto ab Auicennæ interprete vocabulo, exituram, de qua in sequentibus

ἀπόστημα.

Abscessus.

fusius atque accuratius dicetur. Sed & Apostema nonnunquam speciem seu differentiam faciunt tumoris præter naturam, cum scilicet ipsum diuersum faciunt ab exitura quam vocant, & pustulis, de quibus etiam suo loco copiosius differemus. Nomine enim Apostematis gregarij isti medici ac chirurgi, ferè eos tumores passim intelligunt, qui & in magnam satis molem attoluntur, & ex humorum (vt loquuntur) naturalium influxu procreantur, atque ideo etiam vera apostemata vocant. Itaque cum Apostema generis nomen est, omnes præter naturam tumores sub se complectens, Auicennæ & eius sequacibus ita communiter definitur: Apostema, est gentudo composita ex triplici genere morborum, in vnam magnitudinem aggregatorum.

Apostematis definitio vulgaris.

2 Quam

Definitio-
nis examina-
tio.

Tria morbo-
rum genera
tumoris præ-
ter naturā
essentiam cō-
stituentia.

Definitio-
nes acciden-
tales.

Lib. 13. The-
rap.

Quam diffinitionem essentialem esse contendunt. Quippe quæ genere confiet & differentia naturamque ipsius definiti sufficienter explicet. Porro, generis definiti locum in ea obtinet ægritudinis vocabulum. Reliqua verò adposita sunt, ad differentiam aliorum morborum, qui in compositione seu constitutione instrumentorum contingunt, quorum differentias Galenus recenset libro primo de morbo & symptomate. Tria autem illa morborum genera, quæ in tumore hoc præter naturam, Apostemate vulgò nuncupato, reperiuntur, vnius morbi essentiam constituentia, sunt, intemperies, quam & malam compositionem appellant: incommodatio, quæ etiam mala compositio dicitur: & cōtinui, seu continuitatis, aut vnitatis solutio: Græcis autem vocibus dicuntur δυσκρασία, ἀμείστωσις, συνέχης λύσις. Cæterum alias multas Apostematis vulgariter dicti descriptiones adferunt, verius quàm definitiones, quæ neque cum ipso definito conuertuntur, neque eius naturam satis explicant, aut eius essentiam sufficienter constituunt: proinde & accidentales eas vocant. Cuiusmodi est hæc, ex initio libri de tumoribus præter naturam, à Galeno conscripti, ab eis desumpta, Apostema seu tumor præter naturam vnum aliquid eorum est, quæ corporibus accidunt, partem quam occupat, secundum omnem dimensionem, distendens. Quæ descriptio ex ijs Galeni verbis descripta est: ἐν τῇ συνβεβηκότῳ τοῖς σώμασιν ὑπάρχει, ὃ διελόμενον πρᾶγμα πρὸς τὴν ὕψος φωνῆς, πῶν καὶ οἱ μὴ καὶ πλάτος καὶ βάθος διάσπειν οὐκ ὀνομάζουσιν ἑλκυν. Hoc est: Quod tumoris vocabulo significatur, id eorum quæ corpori accidunt, vnum esse constat. Sic enim distensionem in longum, latum, & profundum, nominant: vel si ita dixeris, Apostema, incrementum est, naturalem statum excedens. Item & quæ sequitur, ex lib. 13. Therapeutices methodi deprompta: Apostema tumor est, in quo partes à naturali habitu in quantitate seu magnitudine recesserunt. Sic autem apud Galenum legitur: ἐν δὲ τῷ δὲ τῷ τεσσάρων δὲ τῶν ὅλων πραγμάτων ἐν τῇ πρὸς τῇ πρὸς τῇ φύσιν ὀγκῶν ἀρξομένη λίγην, ἐν οἷς διελονότι καὶ ἂν μὴ γινώσκῃται τὰ μέλη τῶν καὶ τῶν φύσιν: id est, In hoc verò torius operis tertio decimo de tumoribus, qui præter naturam incidunt, distendere incipimus, in quibus scilicet partes à naturali habitu in quantitate recesserunt. Itaque nisi his definitionibus particulam hanc addideris, actiones lædens, seu euidentem actionis noxam inducens, nequaquam absolutæ & essentiales erunt.

De Tumoribus præter naturam.

3

Non enim tumor omnis, distensionem in longum, latum, & profundum, ultra naturæ habitum, in toto corpore, aut particula aliqua efficiens, vel incrementum quodcunque, naturalem statum excedens, iuxta vulgarem acceptionem, apostema, aut tumor præter naturam, statim dici debet. Siquidem ut libro
 « de tumoribus præter naturam, Galenus ait: Incrementum cuius-
 « modi naturalem statum excedens, non ægris modò, sed &
 « sanis etiam, tam in toto corpore, quàm in qualibet particula
 « accidere potest. Obesi nanque tametsi ultra naturæ habitum,
 10 in latum & profundum distenti sint, non tamen iam præter naturam se habent, sed solum (inquit) non naturaliter. Nondum enim naturæ limites sunt egressi, neque in eis adhuc est actionis læsio, qui terminus est excessuum, qui præter naturam dicuntur. Tumores quoque illi, qui in particulis adhuc sanis existentibus, & citra omnem sensum doloris consistunt, rectè quidem supra, seu ultra naturam, non tamen præter naturam, dicuntur. Ut si utraque mamma, vel altera duntaxat immodicè increuerit, ita tamen, ut ipsa partis essentia ab omni noxa videatur immunis, nequaquam appositè præter naturam, hic tumor dicetur, sed ultra naturam duntaxat. Ergo si absolutam magis & essentialem tumoris præter naturam definitionem ex Galeni sententia placet colligere, hoc pacto definies: Tumor præter naturam, incrementum est naturalem statum in corpore excedens, & lesionem actionis inducens. Cæterum, aliam quoque ipsius apostematis improprie licet ita appellari, definitionem, ex Halyabb. medico, nominis inter Arabes percelebris, adferunt, quam absolutissimam & perfectissimam esse adfirmant: habet autem ad hunc modum, Apostema, est tumor
 « præter naturam, in quo aliqua materia replens, & distendens est
 « aggregata. In qua definitione tumor generis locum occupat,
 30 utpote pluribus communis. Præter naturam deinde in ea adiectum est, propter incrementum illud vel corporis totius, vel particulæ alicuius, naturalem symmetriam, seu naturæ habitum excedens, quod supra, vel ultra naturam, cum Galeno appellauimus. Item propter tumores naturales capitis, ventris & iuncturarum. Cum autem adijcitur, in quo est materia aliqua, subaudire oportet, superflua, utputa humoralis, vel quæ ad humorem (ut loquuntur) sit reducibilis. Adiecta præterea est particula hæc, aggregata, propter tumores qui in fracturis & luxationibus conspiciuntur, in quibus non humor, aut substantia aliqua, quæ ad humorem reduci possit,

Gal. lib. de
tu. præter
naturam.

Absoluta
tu. præternaturalis
definitio, ex Gale.
scriptis desumpta.
Halyabb.

Tumor.
Præter naturam.

Materia
humoralis.

Replens &
distendens.

Tumoris
præter natu-
ram diuisio,
in suas spe-
cies iuxta
recetiorum
sententiam.
Apostemata
Pustula.

tumorem committit, sed ossa quæ extant. Postremo adpositæ sunt hæ duæ particule, replens & distendens, quibus ostendetur, tria morborum genera supraposita (nempe intemperiem, prauam compositionem, & vnionis diuortium) in vnum esse congregata, atque vnius morbi essentiam constituere. Tumores autem eiusmodi, qui præter naturam dicuntur in tria genera, seu tres species, Guidoni & suæ ætatis scriptoribus, solent diuidi, in apostemata scilicet, pustulas, & exituras. Apostemata itaque tunc illi nominant, tumores maiores, in quibus materia, ex qua creantur, magis (vt dicunt) quantitate peccat, quam qualitate. Pustulas vero, exiguas quasdam eminentias, seu minutiores tumores, quos & Bothor appellant, in quibus substantia ex qua nascuntur, qualitate magis quam copia, molesta esse solet, imò & plerumque in eis (vt volunt) venenositas subest. At exituras, eos tumores vocant, quos Latinis abscessus, & Græcis ἀπὸ τῆς φύσεως recte nominari iam supra diximus. Sed liceat cuius nominibus quibus velit, vti, modò à rerum natura (vt Galenus ait) non discedat.

De differentijs tumorum, qui præter naturam
incidunt. CAPVT II.

20

Diuisio tu-
moris in su-
as differen-
tias.

A quibus su-
mantur dif-
ferentia tu-
morum præ-
ter naturam
recetioribus
Substantia.

Tumorum præter naturam, qui vulgò generali nomine apostemata dicuntur, variæ ac multiplices sunt differentia. Quæ omnes recentioribus chirurgis sumuntur, vel à substantia rei (vt vocant) vel à materia, vel ab accidentibus, vel à membris seu partibus affectis, vel à causis efficientibus. Itaque differentia tumorum, quæ à substantia, ipsius affectus desumuntur, his & eorum principi Auicennæ, sunt, tumor magnus, tumor paruus. Magna quidem apostemata illis censentur, Phlegmonosi tumores, qui in carnosis particulis tumidiorebus sunt: item œdematosi, erysipelatosi, & icthiosi, qui in molem, effatu dignam attolluntur. Parua verò apostemata eisdem dicuntur, minutæ eminentiæ, (quas pustulas & bothor appellant) in cute ac corporis, superficie non infrequentius apparentes: cuiusmodi sunt lepræ Græcorum, ψώρα, id est, scabies, impetigines, & id genus alia, de quibus in sequentibus latius dicemus. Porro materia tumorum præter naturam, sunt humores quatuor tam naturales (vt vocant) quam non naturales, san-
guis scilicet, pituita, & ytraque bilis, nempe flaua & atra: item humores qui toto genere præter naturam sunt, & solida aliquan-
dò

3 SOLA

Materia.

dò

De Tumoribus præter naturam.

5

dò quædam corpora, flatus quoque & serofus humor: à quibus omnibus aliæ sumuntur tumorum præter naturam differentiæ, vt in fequentibus amplius declarabitur. Symptomata seu accidentia, quæ communiter ipsis tumoribus superuenire solent, sunt veluti dolor, calor, mollities, durities, & id genus alia, à quibus etiam & differentias sumendas esse volunt.

Accidentia.

A membris quoque seu particulis ipsis laborantibus, quædam sumuntur differentiæ tumorum, qui præter naturam confistunt, vt sunt, ophthalmia, oculi inflammatio: synanche, gut-

Pars affecta

10 turis phlegmone: phymata, phygethla, partium laxarum, quas

glandulas vocamus, inflammationes, item & bubones. Causæ efficientes, à quibus & differentiæ quædam accipiuntur, sunt, congestio, & deriuatio, seu fluxio, quod & rheuma Græ-

*Cause effi-
cientes.*

cis dicitur: crisis, id est iudicium, quod in morbis fit: ac quædam aliæ tum interiores tum exteriores causæ, de quibus copiosius atq; accuratius in fequentibus edisseremus. Verumenimvero,

221/25

tumorum huiusmodi præter naturam incidentium, varietates ac differentiæ omnes, ex eius quod influit natura, & substantia, tumorem committente, nascuntur Galeno lib. quem de tu-

*Tumorum
præter natu-
ræ differen-
tiæ unde na-
scuntur Ga-
leno.*

20 moribus præter naturam inscripsit. Item secundo libro ad Glauconem, & 13. methodi medendi, vbi ad hunc modum

Gal. 13. Met.

* scribit, si saltem Græca Latina reddantur: Quinetiam omnium tumorum qui præter naturam sunt, varietas, ex eius quod influit natura, nascitur. Vbi enim flauilenta materia copiosius accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phlegmone verò magis similes vbi sanguis: sicut erysipelati, vbi flaua bilis: & cedematosis magis, vbi pituita: similiter scirrholi, vbi vel crassius, vel vehementer lentus humor est, qui parti est infixus.

Itaque tumores omnes præter naturam ipsi Galeno eo loci

30 fiunt, aut ab humoribus, aut à flatuoso spiritu, qui quando-

que sub cute, quandoque sub circumossalibus membranis,

quandoque in ventre, quandoque in intestis, nonnunquam

in medio horum, & peritonæi colligitur: Græci emphysema,

Emphysema

Auicenna apostema ventosum vocat. Si ab humoribus tumores eiusmodi fiant, aut calidi, aut frigidi sunt, aut mixti.

Calidi autem fiunt à sanguine optimo, id est, adamantis-

*Calidi tu-
mores.*

rubente, & consistentia mediocri, ac moderata qualitate, &

tunc phlegmonem Græci, Latini inflammationem vocant.

Aut à flaua bile, vel à sanguine feruente ac tenui, vel sangui-

40 ne & bile calidioribus, erysipelas illi, hanc ignem sacrum appel-

Tumores lant. Frigidi vel à tenui pituita suscitantur, atque hos Græci
Frigidi. œdema, nostri laxum tumorem vocare possunt. Auicenna vndi-
 miam appellat, aut ab humore atræ bilis, vel crassâ & lenta,
 tenaciq̃ue pituita, scirrhone illi, Latini duritiem, Arabes sephe-
 ros vocant. Ex serôsô quoque sanguinis recremento quandoque
 tumores fiunt, vt in sequentibus dicitur. Cæterum miscentur

Tumores
complicati.

aliquandò simul eiusmodi humores, atque tunc si alter alteri
 dominetur, ab eo qui in mixtura exuperat, nomen ipsi tumori
 inditur. Vt sanguine bili dominante, phlegmonem dicemus
 erysipelatôdem, seu erysipelatôsam. Sicuti ob flauâ bilem præ- 10
 pollentem, erysipelas phlegmonosum, seu phlegmonôdes. Iam
 verò aliarum mixtionum, similis est interpretatio, phlegmo-
 ne scirrhôsa & scirthus phlegmonôsus: œdema phlegmonô-
 sum, & phlegmone œdematôsa. Atque ad hoc exempli, reli-
 quos quoque tumores, etiam si trium, vel quatuor humorum
 inuicem commixtio sit, nominabis. Porro si pares sint, atque ex
 æquo mixti humores, ita vt alter alteri non præpolleat, tunc
 per copulam eorum, quos excitant, tumorum nomina con-
 iungemus. Vt si sanguis bili æqualiter misceatur, vitium illud
 per coniunctionem, phlegmone & erysipelas dicitur, vel cum 20
 Galeno, phlegmônes, erysipelatosq̃ue specie & natura medium.

Tumores
præcipui, qui
ex influxu
humorum
fiunt.

Tumores
ad phlegmo-
nem perti-
nentes.

Echi quidem sunt præcipui tumores, qui ex humorum in-
 fluxione fiunt Galeno: Phlegmone inquam, erysipelas, œdema,
 scirthus. Ad quos innumeri alij naturæ modum excedentes tu-
 mores, reducuntur, ac sub eis comprehenduntur, tametsi va-
 rijs ex causis diuersa sortiti sint nomina. Itaque ad phlegmo-
 narum genus pertinent, phygethlon, quod panus, Celso auto-
 re, à nostris vocatur. Phyma, tuberculum eidem Celso nuncu-
 parum. Terminthion, phymatis species Oribasio, sed Aetio phy-
 gethli. Dorthienes, quos Celsus furunculos vocat. Item gangræ- 30
 na, & sphacelus, qui à Latinis syderatio, & à principe Auicenna
 ascachilos, dicitur. Carbunculus quoque, Græcis anthrax nomi-
 natus: de quo scribit Auicenna capite de pruna & igne persico.

Erysipela-
tosi tumores

Ad erysipelata verò quodammodò referri videntur, herpes,
 qui specie sunt duplices miliares scilicet, & exedentes, quos
 ischiomîves Græci appellant. Vtranque speciem Auicennæ inter-
 pres formicas vocauit, sed eas cum verrucis illis, quas Græci
 myrmecias, Latini formicas vocant, nominis similitudine de-
 ceptus, eodem capite turpissimo errore commiscuit. Has bilio-
 sas inflammationes, herpetas à Græcis nuncupatas Celsus sub 40
 ignis

De Tumoribus præter naturam.

7

ignis sacri nomine videtur comprehendisse. Recentiores eas inter pustulas (vt loquuntur) cholicas adnumerant. A bile etiam ferè proueniunt, atque ideò ad erysipelas pertinent, phlyctænæ à Græcis vocatæ, de quibus agit Auicennas capite de vesicis & inflammationibus. Ad tumores pituitæ, hoc est, œdemata, referuntur nonnulli tumores sub apostematis nomine à Græcis comprehensi, qui ab Auicenna nodi, ab Halyabbate selas & dubelera phlegmatica dicti sunt, Latini abscessus vocant. Quorum iuxta diuersas materias in eis contentas, diuersæ etiam sunt

Pituitosi tumores.

10 species. Nihil autem refert, si & genera, vel differentias hoc loco dixeris. Porro tria sunt Galeno eiusmodi abscessuum genera frequentissima, quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita, ea sunt atheromata, steatomata, melicerides, à similitudine quidem contentorum in his corporum dicta, vt amplius in sequentibus declarabimus. Est & apostematum, hoc est abscessuum genus, in quo res aliæ continentur, quæ non humorum modò, sed & solidorum quorundam corporum proprietates repræsentant: verùm hæc (inquit Galenus) rarius. Ac

14. Thera.

20 nem faciemus. Ad hæc autem modò dicta abscessuum genera pertinent, tumorum quedam nomina, à recentioribus excogitata, & nusquam apud antiquos scriptores reperta, vt testudo, mollis tumor caluariæ inhærens, & talpa: hæc ad atheroma, illa ad meliceridem magis spectare videtur. Ad steatoma verò ferè pertinet, tumor dolore carens, quem Natam, vel Naptam appellant, de quibus suo loco dicemus. Huc quoque, hoc est, ad tumores pituitæ, spectant, vocata à Græcis ganglia, ab Auicenna glandulæ, quæ à vocatis nodis differunt. Scrofulæ quoque à vulgo vocatæ, à pituita fiunt, proinde & ad œdemata reducuntur: hæ Græcis charades, Latinis strumæ, dicuntur. Galenus tamen alicubi inter scirrhus, ob duritiem annumerat. Ad œdema etiam refertur Galeno ea hydropis species, quæ leucophlegmatia Græcis, & hypofarca nuncupatur.

Tumoris noua quedam apud recentiores melicos nomina. Testudo. Talpa. Nata.

Ganglium.

Struma.

30 ta reducuntur: hæ Græcis charades, Latinis strumæ, dicuntur. Galenus tamen alicubi inter scirrhus, ob duritiem annumerat. Ad œdema etiam refertur Galeno ea hydropis species, quæ leucophlegmatia Græcis, & hypofarca nuncupatur.

Leucophlegmatia.

Cæterum tumores, qui ad atram bilem spectant, & sub vocato scirrho continentur, sunt: Cancri, qui à Græcis carcinæ, & carcinomata dicuntur, Celsus tamen cancerum à carcinomate seiungit, vt illum ab his quæ extrinsecus incidunt, oriiri dicat & serpere, hoc corrupta interiori aliqua parte innascenti. Idem cancerum in multas species diducit, erysipelas scilicet,

Scirrhi tumores.

Cancer.

Carcinoma.

40 cer, gangrenam, & vlcus nigrum. Huius quoque farinæ est

a 4 elephan-

- Elephantiasis.** elephantus, seu elephantiasis, à vulgo medicorum lepra vocata. & quibusdam sancti Lazari morbus. Itaque lepræ nomen Auicennæ, & imperitæ multitudini, morbum grauissimum ac perniciosissimum significat: cum tamen Galeno, Paulo A Egine ræ, ac reliquis Græcis, leuis sit morbus, non multum à scabie differens, quæ p̄sora eisdem dicitur. Ex scirrhuso etiam tumorum genere censentur, Verrucæ ab Auicennæ interprete uocatæ Latina voce, quæ tumores sunt instar monticulorum quorundam in cute eminentes, vnde & nomen illis factum est, à vulgo porra dicuntur. Huius autem generis sunt, myrmecia, ac si formiculas diceret, & acrochordones, quæ nostris pensiles verrucæ dicuntur. Clauus, qui callus est figura teres, Græcis ἄλφιον vocatur, Auicennæ almismar. Thymion vel thymon verrucula thymi herbaræ capita representans, Auicenna videtur tusum, vel ut alia habet lectio, tarsecum nominasse. Ex verrucarum quoque genere sunt, vocata ab Auicenna cornua, ita quidem dicta, quod cum oblonga sint, instar cornuum recuruantur. Item & calli, quos Græci τύλλες vocant: hi ex labore obdurata cute gignuntur. Ad arram quoque bilem spectare videtur morbus, quem dracontion Græci appellant, Latini dracunculum ab eius nominis animalis similitudine, Auicenna venam medeni, Halyabbas, venam saniosam vocauit. De quo Paulus capite ultimo lib. quarti. Hic morbus apud nos parum est frequens. Præter hosce, quos iam recensuimus tumores, accidunt & alij, corporis superficiem non raro occupantes, nempe paruæ quædam eminentiæ, quas pustulas & borhor appellant. Quæ licet & inter se, & ab ijs tumoribus quos supra commemorauimus, differant: ab iisdem tamen humoribus fiunt, à quibus & magni iam dicti tumores. Proinde maioris, minorisue ratione ab illis tantum distare videntur. Cæterum ut eiusmodi minuti tumores (quos sanè ignorare non debet chirurgus) notiores, ac peruij magis cuique euaderent, operæpretium me facturum putauì, si nomina tum Græca tum Latina, tum etiam Barbaræ, ac rudem quandam (ut de alijs maioribus fecimus) descriptio nem hoc loco subiecerimus. Ergo ut rem ipsam aggrediamur, ex pustularum genere sunt, lepræ Græcorum, & p̄sora Latinis scabies appellatæ, affectus quidem inter se admodum affines: cutis enim sunt aspredines, cum pruritu & corporis colliquatione, ab eodem humore progeniti, nempe atra bile. In hoc tamen differunt, quod lepra cum manifestis squammis cutem profun-

profundiùs in orbẽ depascitur. Psora verò superficiem tantùm varijs figuris lædit, & furfuracea quædam corpuscula remittit.

Item ea levis cutis infectio, quæ Græcis lichenæ, Latinis impetigo, & vulgò quibusdam (vt Manardus refert) volatica nominatur. Hæc frequenter ac faciliè in prædictos affectus, lepram scilicet & scabiem, quam psoram vocant, Galeno autore degenerat. Sunt tamen qui Græcorum lepram, impetiginem vocari à Celso (qui eius genera quatuor facit) contendant. Fiunt autem lichenes testibus Galeno, & Paulo Aegineta, mixtis sanie
 10 bus tenuibus & acerbis, cum alijs crasis. Verum eminuerò cum Celso (vt diximus) quatuor impetiginis species faciat lib. quinto suæ medicinæ, euidenti argumento conuincitur, eum aliam rem per impetiginem intellexisse, quàm Græcorum lichenas. Quando quidem nullus autor Græcus legitur, qui tot genera in lichenis vnquam agnouerit. Carterum, quando cum sola leuiori cutis aspredine & peuritu manent lichenes, impetiginis nomen retinent. Dum autem peiores fiunt, nomen licuti & formam mutant. Si enim manifestas squammas lichenei impetigo excitat, atque aliùs curem depascitur, lepra propriè
 20 dicitur. Si verò per extimam tantum superficiem extenditur, & corpora furfuracea emittit, psora à Græcis, à nobis propriè scabies vocatur. Quanquam scabei nomen vulgò & medicis multis, latius longè pateat, qui omne cutis vitium, scabiem nominant. Itaque pura ac vera scabies Latinis is procul dubio affectus est, qui Græcis psora vocatur, ab Auicenna etiam albara & morphea (contra quorundam opinionem) diuerius. Porro quod ipsi Auicennæ & Punicis fere omnibus albaras dicitur, à Græcis & Celso leuce nuncupatur. Illorum verò morpheam Græci alphon vocant: in quo quidem affectu non tota
 30 quidem caro afficitur, sed corporis duntaxat superficies, veluti (inquit Galenus) squammis quibusdam inspergitur. Sunt autem alphi ipsi Galeno genere duplices, nempe albi, qui ex pituita: & nigri, qui ex melancholico humore prodeunt. Sed hæc à rerum consequentia tracti diximus. Neque enim leucæ, neque alphi ipsi, inter tumores præter naturam annumerandi veniunt, sed potiùs inter cutis maculas, seu defordationes. Quæ licet minime lædant, quia tamen dehonestant, maiori plerumque tudio (præsertim mulieribus) esse consueuerunt, quàm multi alij lædentes quidem, sed larentes
 40 morbi. Vtrunque autem hunc affectum, leucam inquam & alphon

Lichenæ.

*Quatuor
impetiginis
species.*

Impetigo.

Lepra.

Psora.

Scabies.

Albaras.

Leuce.

Lib. vii. de

causis sym-

ptomatibus.

Alphi.

alphon, vitiliginis nomine Celsus (qui tres eius species facit)
 complexus est: quamvis alij medicinæ interpretes, Græca Latina
Vitiligo. facientes, leucam passim vitiliginem conuertant. Itaque *vi-*
tiligo, si genere quodam comprehendatur, fœdus cutis color est,
 ex malo particulæ alicuius habitu proueniens, quæ nutrimentum
 probe sibi assimilare non potuit. Maximo enim facultratis
 alteratricis errore, vitium hoc contingit: cuius duplicem speciem
 alij conuertunt. Vnam quidem, quæ solam cutim inficit: alteram,
 quæ altius descendit, adeo ut carnem quoque ipsam attingat,
 ac pilos coloret. Vtraque autem albo vel nigro præcipue colore
 commacular. Prior species siue alba siue nigra sit, Græcis
 eadem voce alphas dicitur, & Auicennæ morphæa: Altera vero
 species, quam profundiorē diximus, Celsus & Græcis leuce,
 Auicennæ Albaras, Halyab. lepra nuncupatur, fœdus quidem
 & difficile curabilis affectus, non tamen perniciosus. Ex
 quibus intelligi potest, quod parum nominibus sit fidendum,
 nisi res (inquit ille) adamussim fuerit explorata. Eadem enim
 vox sæpe apud varios autores diuersam ac longè disidentem
 habet significationem, ut passim in ijs commentarijs demonstratur.
 Hæc autem obiter, de eiusmodi maculis, & cutis defecationibus
 annotauimus, ut rerum confusio, quæ ex perperam intellectu
 nominibus sequi solet, effugeretur. His igitur omisis, ad
 institutum reuertamur, ac reliquas pustulas, breuiter quantum
 fieri potest, percurramus. Ex quarum etiam genere præter
 iam enumeratas censentur Græcorum ionthi, epinyctides, hydroa,
 psyrdraces, exanthemata, Celsi papulæ, & Plinij mentagra.

Ionthi.

Ionthi, parui sunt, & duri in vultu, seu cute faciei tumores
 Galeno & Paulo, à crasso humore progeniti, qui vel resoluuntur,
 vel exiguo ingenito purè maturantur: Latini vari dicuntur.
 Meminit Galenus libro quinto de medicamentis secundum locos,
 ionthos curiuidam affectus, quem principium esse dicit elephantiasis:
 sub quo affectu videtur tertium & quartum genus impetiginis
 Celsi comprehendisse. Epinyctides Celsi pustulæ sunt
 pessimæ, colore vel subluido, vel subnigro, vel albo, fabæ
 magnitudinem non excedentes, in eminentibus partibus, ut
 tibijs & pedibus maximè, nascentes. Circa has vehemens
 inflammatio est, & cum adaperatæ sunt, reperitur intus exulceratio
 mucoſa: color est humori suo similis: dolor verò ex eis
 supra magnitudinem earum est. Neque enim ut diximus, fabæ
 maiores sunt. Nomen à nocte acceperunt, vel quod noctu

*Parum nominibus
 fidendum esse.*

Epinyctides.

De Tumoribus præter naturam.

II

- graviori dolore torqueant, vel (vt Celsus voluit) quòd noctu ferè oriantur. Plinius eas, pustulas liuentes ac noctibus inquietantes nominat: Arabes verò, eîlere, sere, vel faire eiusmodi pustulas sic noctu infestantes, vocauerunt. Quod Græcis sunt, hydroa, Latinis quibædam sudamina, & Plinio papulæ sudorum dicuntur: Auicennæ verò, planta noctis: & Almanfori, alhasaphum. Quò fit, vt epinyctis à planta noctis ipsius Auicennæ plurimum differat, tametsi vox ipsa Græca epinyctis (vt modò dicebamus) à nocte etiam originem trahat. Sunt autem sudamina hæc Galeno teste libro tertio aphorismorum, « comment. xxi. ex genere pustularum, in summa corporis parte hærentium, quæ instar vlcærum cutem exasperant: proueniuntque, vt & nomen ipsum (inquit) indicat, ob multos sudores, vel biliosiores, vel mordaciores, qui cutem mordent, & pruriginosam reddunt, ac per modum vlcærum exasperant. Porro hæc affectio, puerulis, atque iuuenibus, sed his præcipuè, qui naturâ sunt biliosi, ætus tempore communis est, adeoque facili cura- tionis, vt per se absque villo præsidio albicantibus quibuidam squammulis dimissis sanescat. Auicennæ autem deuadationes (vt ex earum constat descriptione) potius exanthematis Cel- si, quàm sudaminibus Galeni, respondere videntur. Si quis tamen nomina attendat, deuadationes ipsas principis Auicen- næ, putabit Græcorum hydroa, quæ Latini sudamina vo- cant. Verumenimverò, non tam nomina ipsa, apud Barbaros & Arabicæ sectæ autores, sequenda sunt, quàm ipsæ rerum descriptiones. Psyraces, seu psyracia, pustulæ sunt, parùm su- pra summâ cutè eminentes, phlyctænis, hoc est, bullis, quæ ab igne excitantur, persimiles. Hæ in capite præcipuè nascun- tur. Psysacion corruptè legitur apud Celsum pro psyracione.
- 30 Pustulæ illæ in cutè florentes, quæ vulgò morbilli & vario- læ nuncupantur, Galeno exanthemata, Hippocrati ecchyma- ta dicuntur, Plinius papulas & interdum pituitæ eruptiones vocat. Porro variolæ & scopuli vocati, à materia sunt cras- siore, morbilli à tenuiore. Papulæ tamen scopuli vulgò dictæ, maiores sunt variolis. Hæ minora, illi magna ecchymata sunt Hippocrati, lib. 3. Epid. Morbilli verò eidem herpes magni nominantur. Magnos autem (ait Galenus) herpes dixit Hip- pocrates, vel quia magnum occupant locum, vel quia cum ma- ligna contingunt erosione. Morbilli nanque, quandoque 40 altero tantum, quandoque vtroque modo magni visuntur.

Vnde dictæ
epinyctis.

Sudamina.

Planta no-
ctis.

Gal. de su-
daminibus.

Deuadatiões
Auicennæ.

Psyraces.

Morbilli.
Variolæ.
Exanthema-
mata.
Ecchymata.
Scopuli.

Corne-

*Papula
Celsi.*

Cornelius Celsus libro quinto suæ medicinae post tractatum de impetigine, meminit duplicis papulae: vnius quidem leuioris, quæ si ieiuna salua quotidie defricatur, sanescit: alterius maioris, in qua magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, difficiliusque sanescit. Hanc agriam, id est, feram dicit à Græcis appellari. In vtroque tamen genere, minus vitij, quam in impetiginibus agnoscit, adeo ut id quod difficilius sanescit, nisi sublatum sit, in impetiginem verti, ac transire, adfirmet. Galli (si quid iudico) genus vtrunque, sed prius maxime, dartras appellant. Id enim vitium maxime rotundum

*Dartra
Gallica.*

incipit, eademque ratione in orbem procedit, ac tardè serpit. Quæ omnia papulae primi generis Celsi conueniunt. Has autem Celsi papulas, nihil à Græcorum lichenis differre, nonnulli constanter asseuerant. Eumque solum autorem inter Latinos, lichenas, papulas vertisse legimus. Mentagra, Latina vox est Plinio, qua rem omnino aliam ab impetigine, in principio libri xxvj. visus est significasse, longeque peiorem affectum, quam quem Græci lichenis nomine intellexerunt: licet in medicinis quandoque Græcorum lichenas impetiginem sit interpretatus, & morbum eiusmodi mentagram appellatum, eo

Mentagra.

Plin. lib. 26.

loco etiam lichenas vocet. Porro refert idem Plinius, malum hoc Tiberij Cæsaris principatu, primum in Italiam irrepisse, omnique æuo priore vniuersæ Europæ, nedum Italiæ, incognitum: tanta quidem sceditate, ut quæcunque mors huic præferenda esset: tanta etiam contagione, ut osculo solo veloci transitu inficeret, sed procures maxime. Hæc lues, à mento ferè oriebatur, vnde & nomen illi factum est mentagra. Cæterum morbum hunc agnouisse videtur Galenus. Quinto enim libro de medicamentis compositis secundum locos, meminit scdisimæ cuiusdam menti impetiginis, quæ pruritus (ut ex Critone 30 refert) excitat: & affligit patientes, atque in discrimen non mediocre adducit. Nam interdum per vniuersam faciem serpit, & ad oculos usque procedit, & ferè supremæ deformitatis causa efficitur. Quæ impetiginis descriptio, per omnia mentagra Plinij conuenit. Errant autem vehementer, qui scdisimum hunc lichenem, mentagram à Plinio appellatum, morbum eum esse existimant, quem hodie vulgò quidam Gallicum, alij Neapolitanum, alij citra odium & iniuriam nationum, Venereum appellant. Hic cum veteribus & priori seculo omnino ignotus fuit, primumque apud Neapolim irrepit anno à Christo nato 40

*Mentagram
agnouit
Galenus.*

*Morbus Nea-
politanus.*

Morbus ve-

1493. Quo tempore Carolus Gallorum Rex inuictissimus, alpes *neruus quã-*
superabat, Italiam periturus, quamuis antea non longè per Hi- *do primùm*
spanias (vt quidam referunt) serpsisset: quapropter tanquàm in- *in orbem ir-*
de tracta origine, lues Hispanica cœpit appellari. Quæ pestis di- *repsit.*
uina veluti virione (vt par est credere) ob fœdos, illicitos, atque
à Deo veritos concubitus, in terras immissa, magnam generis hu-
mani partem sua contagione fœdauit, & prostrauit. Id enim ma-
lum sensere magistratus, sensere mancipia, sensere proceres, sen-
sit humilis plebs, veloci vnus ad alterum transitu: iamque per Hi-
spanias, Gallias, Italiam, totamque Europam magno mortalium
dispendio vagatur. Sunt & pustulæ quædam præter has modò *Pustula glã*
enumeratas, apud Auicennam libro quarto glandosæ dictæ, *dosæ.*
quæ nihil à ganglio differre videntur, nisi minoris tantum ma-
iorisve ratione. Mentio quoque est apud eundem Auicennam
lib. 3. de quibusdam pustulis, quas iuncturarū bothores vocat, &
lib. quarto almanim, quas cum nigras esse dicat, & viridibus gra-
nis similes, Græcorum procul dubio terminthi erunt, quos su- *Terminthi.*
prà inter phymatis species enumerauimus. Has videtur Celsus si- *Pustula al-*
miles varis facere, & putare à Græcis helcodes dici, id est vlceros- *ba.*
as. Pustulæ albæ vel lactæ Rasis & Serapionis, & bothor lenes
Auicennæ, si earum descriptiones penitus inspiciantur, ad ion-
thos Græcorum, quos Latine varos nominauimus, pertinere vi-
de buntur, quanquàm eadem remedia, quæ ad illas scribit Aui-
cenna, à Dioscoride ad ephelidas præcipiantur. Hactenus de
differentijs tumorum præter naturam, qui præcipuè foris in
corpore sunt.

De causis tumorum præter naturam, extrinsecus appa-
rentium, in vniuersum.

CAP. III.

- 30 **C**ausæ tumorum præter naturam, recetioribus medicis
& chirurgis, geminæ statuuntur, generales scilicet, &
speciales. Generales causæ sunt, fluxio, quod Græci
ἐννύα vocant, & congestio. Rursus fluxionis causæ
ijsdem sex numero constituuntur. Nempe membri propellentis
robur, excipientis imbecillitas, materiæ copia seu multitudo,
meatum deferentium, (id est, per quos fit fluxio) laxitas siue
amplitudo, propellentium angustia siue strictura, & loci fluxio-
nem excipientis situs inferior. Hæ autem ad quatuor reduci pos-
sunt, vt potè ad membrum propellens, particulam suscipientem,
40 humoris fluentis conditionem, & spaciū per quod fit deflu-
xio.

Causæ tumo-
rum præter
naturam.

Fluxionis
causæ sex.

Pars propellens. xio. Cæterum fluxio concitatur ratione membri expellentis, vel propter robur facultatis expultricis ipsius, vel propter connexionem naturalem, quem habet cum membro excipiente, vel propter propriorum meatuum angustiam. Pars verò aliqua fluxionem excipit, quia vel dolens, aut calida, vel imbecillior, vel rarior, atque ignobilior, vel in inferiori loco sita. Porro ratione humoris fit defluxus in partem aliquam, quia fit copia supernuacui, qualitate molestus, substantia tenuis: spacium autem fluxionis causa existit, ob meatuum amplitudinem, utpote venarum, articularum, & pororum. Congestionis verò (quæ altera 10 est causa generalis tumorum qui præter naturam incidunt) causæ geminæ assignantur: nempe error virtutis, quæ alteratrix & alitrix dicitur, & imbecillitas expultricis. Ex quibus colligitur, quòd tumores calidi, magna ex parte fiunt à defluxu humorum: frigidi verò eorundem congestionem potius excitantur.

Quomodo calida defluxio tumore creet.

Quomodo autem calida fluxio tumorem exciter, aperte ac scitè demonstrat Galenus, libello illo cui titulum fecit de inequali intemperie, ad hunc modum scribens: Statim defluxione calida ad musculum decumbente, primum arteriæ maiores, venæque opplentur, ac distenduntur: ab ijs verò minores, atque ita res procedit, donec ad minimas sit peruentum. In ijs ubi valenter impacta fluxio est, & amplius contineri non potest, pars eius per ipsarum orificia egreditur, pars per tunicarum foramina percolatur ad exteriora, atque exinde fluxione implentur spacia vacua atque intermedia primorum corporum. Sic omnia ab humore, omni que ex parte incalescunt, ac perfunduntur. Sunt autem hæc, nervi, ligamenta, membranæ, caro ipsa, & ante hæc arteriæ & venæ, quæ scilicet & primæ & præter cætera vario dolore afficiuntur. Quippe interius à fluxione tum excalfiunt, tum distenduntur, ac diuelluntur, distrahuntur. Exterior non modò excalfiunt, sed etiam premuntur, ac degaudentur. Reliquæ verò partiæ, aliæ quidem calfiunt tantum, vel comprimuntur, aliæ utroque modo laborant. Atque hic morbus phlegmone nominatur. Hactenus Galenus. Itaque in eiusmodi tumoribus præter naturam, qui ex humorum influxu fiunt, aliquid iam (per initia saltem, & antequam restiterit fluxio) factum ac generatum est, & aliquid adhuc futurum, atque in generatione est: hoc fiens, illud factum esse, vulgò dicunt. Quod adhuc sit siue fiens, materia est antecedens, quæ adhuc in fluxu est: factum verò, materia coniuncta, quæ iam influ-

xit, &

xix, & in parte laborante impacta est. Hinc non simplex, sed composita, in eiusmodi phlegmone, quæ in generatione adhuc est, (veluti in reliquis alijs tumoribus, ac morbis etiam omnibus, qui in gignendo adhuc sunt, necdum absolutionem sunt nacti) medentis sollicitudo est Galeno, ex ea scilicet quæ prouidet, & ea quæ curat: sed hæc alterius sunt contemplationis.

Cæterum tempestiuum est, ut speciales (quas vocant) tumorum, qui præter naturam sunt, causas subiiciamus. Hæ autem tres vulgò assignantur: Primitiua, quæ & prægressiua, & euidentes nobis dicuntur: antecedentes, & coniunctæ. Græcis dicuntur *πρῶτη, ἀγένητος, προγεννητός, συγγενής*. Prægressiua seu primitiua causæ dicuntur, quæ dum aduersam valitudinem seu morbosos affectus creant, separantur, ut casus, percussio, fractura, distensio, luxatio, aut error qui in victus ratione committitur. Antecedentes seu præcedentes causæ dicuntur, quæ paratæ sunt morbos efficere, ut sunt humores: quatuor tam naturales (ut loquuntur) quam non naturales.

Naturales humores sunt, qui ad corporis nutritionem sunt idonei, & in massa sanguinaria continentur: proinde & una sanguinis appellatione continentur. Qui si ex venis aut arterijs effundantur, subito concresecunt, siue extra corpus manent, & profuant, siue in ipso adhuc quocunque loco contenti, remaneant. Non naturales verò eos appellant, qui à sanguine, quo partes nutriuntur, hoc est, massa sanguinaria, separati inueniuntur, & ob suam prauitatem vel corruptelam, ex seipsis, hoc est, ex natura sua, inepti sunt ad corporis nutritionem, & ad alimoniam illi præstandam: qui quantumvis etiam in aëre nos ambiente permaneant, nunquam concresecunt. Hi autem vel quadam naturæ providentia, certi

alicuius usus gratia, in conceptacula quædam relegantur, aut foras ad corporis extima propulsi, tumores non veros, ac illegitimos appellatos, abscessus inquam, pustulas, & cutis defecationes generant. Interdum verò insensibili perspiratu, vel sensibilibus per sudores, digeruntur, atque exhaunt. Nonnumquam intrinsecus putrescunt, & febres excitant. Atque hi (inquiunt) equiuocè & improprie humores dicuntur, naturaliumque nomina sibi usurpant. Solùm enim eos succos, qui ab hepate in sanguinea generatione, nutritionis, ac floris nostri corporis reparandi gratia conficiuntur, proprie humores censent appellandos. Cuiusmodi est sanguis verus ac purus,

Omnium morborum qui adhuc in gignendo sunt duplicem esse indicationem.

Causæ speciales tumorum præter naturam.

Prægressiua. Antecedentes.

Naturales humores qui dicantur.

Humores non naturales qui dicantur.

Qui succi proprie humores dicantur

*Ex quatuor
humoribus
naturalibus
quatuor fi-
unt legiti-
mi ac præci-
piui tumo-
res.*

*Ex humori-
bus nō natu-
ralibus qui
tumores fi-
ant.*

*Causæ con-
iunctæ tu-
morū præ-
ter naturā.*

*Cōtinēs cau-
sæ quæ dica-
tur.*

ac purus, biliosus, pituitosus, & melancholicus, quo singulæ no-
stri corporis partes nutriuntur, instauranturque. Aliæ quidem pu-
riores, & (vt ita dicam) magis sanguineo, aliæ verò biliosiore, aliæ
pituitoso magis, aliæ melancholico, prout cuiusque natura ex-
postulat. Itaque humores vniuersi in venis & arterijs continen-
tur, quod & coloris ipsius, & consistentiæ varietas indicat, vt li-
bro de atra bile Galenus expressit. Porro ex ijs quatuor humo-
ribus naturalibus dictis, quatuor præcipui ac legitimi tumores
præter naturam fiunt. quæ vulgò apostemata vera nominare so-
lent. In quibus scilicet tumor ad sensum magnus est, & materia, re
vnde procreantur, magis quantitate peccat, quàm qualitate. Hi
autem proprijs nominibus dicuntur phlegmone, erysipelas, cede-
ma, scirrhus. Ex non naturalibus verò (vt vulgaribus medicis
placet) abscessus, quas exituras vocant, & pustulæ oriuntur, de
quibus in præcedentibus abundè diximus. Atque hos tumores,
abscessus inquam & pustulæ, apostemata non vera eisdem cen-
sentur. Ad quæ, & alia duo tumorum genera reduci volunt, fla-
tuosos scilicet (quas & inflationes vocamus) & aquosos, qui ex
serosa substantia procreantur, vulgò apostemata ventrosa & aquo-
sa nuncupant. Itaque sex sunt nomina simplicium (vt loquun- 20
tur) apostematum: nempe apostema phlegmonosum, erysipelato-
sum, œdematosum, scirrhusosum, flatusosum, & aquosum. Compo-
sitis verò, (quoniam horum infinita propemodum turba est) nō
omnibus propria sunt indita nomina, sed illis duntaxat, in quib-
us humor aliquis supra cæteros dominium obtinere euidenti
rationeprehenditur, vt iam ex præcedentibus satis innotuit,
& rursum in sequentibus suo loco plenius ostendemus. Cæte-
rùm causæ coniunctæ seu continentes tumorum præter natu-
ram, quos apostemata, pustulas, & exituras vocant, sunt materiæ,
quæ in particula ipsa laborante, aggregatæ & infartæ reperiuntur, 30
quæque adhuc permanent, postquam tumorem excitarunt:
ac dum increscunt, tumores ipsi augentur: cum decrescunt, mi-
nuuntur: & cum desinunt, finiuntur. Causa enim coniuncta siue
continens, morborum omnium ac dispositionum quæ in corpo-
re sunt, in vniuersum ita ab Auicenna, & vniuerso iuniorum me-
dicorum certu definitur. Quæ cum præsens est, eius quoque mor-
bus adest: cum verò tollitur, etiam morbus euanesceat. Verum-
enimverò quidam huius ætatis medici non vulgariter eruditi,
duas tantum esse morborum causas Galeno contendunt, exter-
nam videlicet & internam, siue vt nunc loquuntur, primitiuam 40
& antec-

De Tumoribus præter naturam.

17

& antecedentem. Itaque primitiuam atque externam causam (inquiunt) appellat Galenus, quæ extrinsecus corpori aduenit, ipsumque vehementer alterat, atque immutat, quæque dum aduersam valetudinem creauit, separatur veluti calor, frigus, scorpio pungens, Græci (vt diximus) eam *προκαταρκτική* vocant: internam verò siue antecedentē nominat Galenus, quæ in ipso animalis corpore consistit, & iam morbum facit. Eam autem, quam coniunctam appellant, ne (inquiunt) somnietur quidem, cum secundū huius sententiam, affectus actionem impediens, aut vitians, morbus sit, & non morbi causa. Coniuncta autem illa causa, quam Auicenna cuiusque sequaces somniantur, (vt ex data ab ipsis descriptione constat) affectus sit actionem lædēs, quæ propria est morbi definitio. Nihil igitur causa illa coniuncta, à recentioribus medicis, & eorum principe Auicenna introducta, à morbo prorsus differt, à quo primum ea, quæ secundum naturam est actio, læditur. Cæterum cum hæc de triplici causarum morbosicarum genere opinio iam inueterauerit, & apud omnes ferè nostræ ætatis medicos irroboraueit, nō absurdum videbitur, si eas morbosas causas passim in hoc opere, dilucidioris doctrinæ gratia, huiusmodi nominibus distinguamus: nempe primitiuam, antecedentem & coniunctam. Atque hæc de causis tumorum præter naturam dicta sufficiant: nunc postulat ordo ac orationis series, vt eorum signa, & iudicia subiiciamus, modò tamen pauca de abscessuum natura & generatione præmiserimus. Itaque abscessus, qui Græcis *ἀποσμήματα*, & vulgò exituræ dicuntur, Galeno libro de tumoribus præter naturam, & secundo ad Glauconem, dispositiones sunt, in quibus abscedunt, atque inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora. Materia enim quæ eiusmodi tumores excitat, extra carnē musculi propulsa, continentia à subiectis diducit, & abscedere facit. Spacium igitur (inquit Galenus) vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, vel humidam, vel mixtam ex vtriusque comprehendit, quæ temporis diuturnitate in multiformes & varias substantias alterantur. Duplex autem est eiusmodi abscessuum genus: vnum, cum inflammatio in pus versa, pus ipsum tanquā in sinu aliquo est collectū: alterum, cum nulla præcedente inflammatione, humor aliquis: siquē aliās species alius, vel spiritus aliquis vaporosus, aut substantia ex vtriusque mixta, in parte aliqua colligitur. Quod bifariam accidunt: nam vel in spacio ipso, quod abscedentes interiacer partes,

Coniunctam causam nihil à morbo differre, quorundam opinione.

Abscessus qui dicatur Galeno.

Duplex genus abscessuum Gal. lib. 14. therap. meth. & lib. 2. ad Glau.

b eius.

ἀπορροήματα.

eiusmodi substantia, sine præuia defluxione generatur, aut aliunde in ipsam laborantē particulam confluit, vel statim quidem ab initio, vel ea ratione, qua sunt illa quæ ἀπορροήματα vocantur. Nomināt verò (inquit Galenus) sic huiusmodi dispositionem, cūm qui prius vnum membrū infestant humores, eo relicto, ad alterum transmutātur. Spatium autem sibi molitur eiusmodi substantia, quæ abscessum creat, vel inter duas tunicas, vel sub quibusdam membranis. Porro excoriat tandem circumposita corpora, vel quia omnino acris, aut omnino ipsa copia distendens, aut putredinem quandam tempore contrahens: Sed & iam tunc acris est. Quod si humiditates ipsæ, quibus spatium, quod abscedentes interiacet partes, complerur, & abscessus excitatur, longo interdū tempore perdurauerint, plures (vt suprà diximus) habent alterationes, atque in varias substantias transmutātur, quæ non humorum modò, sed etiam solidorum quorundam corporum proprietates repræsentant. Nam & lapidibus, & harenis, & testis, & lignis atq; carbonibus, & luto, & olei limo, & vini feci, & stipulæ, ac multis alijs talibus, familia corpora, in abscessibus contineri inueniuntur, vt iam suprà de differentijs tumorum explicuimus, 20

Que in abscessibus inueniantur.

De signis tumorum, præter naturam extrinsecus apparentium, in vniuersum, & eorundem iudicijs. CAP. IIII.

Nota tumorum præter naturam vniuersales.

NOrx tumorum præter naturam summa corporis occupantium (quorum duntaxat speculatio ad chirurgum pertinet) sensuum organis, ac cuiusq; particulæ laborantis præsentia, facillè deprehenduntur. Vbi-
cunq; enim incrementum apparet naturalem statum excedens, ac præter naturæ modū particulam quam occupat distendens, eiusq; actionem lædens, quod vel humor aliquis, vel substantia ex humore procreata, aut quæ ad humorem (vt loquuntur) sit reducibilis, vel vaporosus spiritus gignit, ibi & tumorem præter naturam, seu (vt dicunt) apostema generaliter loquēdo, esse necesse est. Caterū tumores, quæ vera apostemata appellant, tumore, dolore, & calore, magis vel minus intrinsecis, dignoscuntur. Non vera autē, quæ pustulas & abscessus nominauimus, præter tumorem, malignitate quoq; seu (vt eorū verbis vtar) mala morigeratione, & sequestratione etiam maiore vel minore, hoc est, secundum magis & minus (vt ab eorū vocibus non recedam) determinata, deprehenduntur & significantur. Signa autem par- 40
ticula-

- ticularis cuiusq; differentiæ & materierum ex quibus sunt, in
 sequentibus suo loco dicentur, dum scilicet de simplicibus ip-
 forum, qui præter naturam cōsistunt tumorū differentiis tracta-
 bitur. Ex quibus & compositæ faciliè dignoscuntur. Verum-
 enim uerò non prius ad particularia est accedendum, quàm de
 vniuersalib⁹ sermo fuerit absolutus: is enim ordo in disciplinis
 obseruari solet: nec immerito sanè. Nam vniuersalia ipsa atq;
 cōmunia manifestiora sunt nobis q̃ particularia, quippe quæ
 magis promiscua, confusioraq; sint, quàm particularia. vt pri-
 mo cap. lib. i. physicorum, docet Aristoteles. Nemo igitur mire-
 tur, si passim in hoc opere chirurgico, à cōmuniōibus & plura
 comprehendentibus semper inceperimus, tum ob nuper addu-
 ctam rationem, tum q̃ secundum naturam generalitatis specia-
 litatem antecedit, vt idem testatur philosophus. Sed ad propo-
 situm reuertamur, & iudicia tumorum præter naturam cōsū-
 stentium persequamur. Circa quæ primū aduertendū est,
 omnes eos tumores, quæ vera apostemata vocant, si Galeno &
 Auicennæ credimus, inuicem magna ex parte complicari, neq;
 facile aliquem eorum syncerum & purum inueniri. Nam (vt Ga-
 lenus inquit) phlegmonæ hoc est, inflammationi ex sanguine,
 « magna ex parte miscetur aliquid, quod vel erysipelatis, vel cede-
 « matis, aut scirrhi naturā seruet. Erysipelati autē quod phlegmo-
 « nes aut cedematis, aut scirrhi specie referat. Et ita in reliquis o-
 « mnibus similiter perpende. At verò ij præter naturam tumores,
 quæ nō vera apostemata appellitāt, vt plurimū synceri ac puri
 reperiuntur. Cæterū simpliciu ac syncerorū curationes in se
 quentibus persequemur, ex quibus & cōpositorū, & implexorū
 curatio faciliè intelligitur. Nā omnes & persequi & cōponere,
 superuacaneū mihi videtur. Si enim simplices ipsos tumores o-
 mnes cognoueris, deinde quo pacto inter sese componātur di-
 diceris, satis idoneus eris, qui in reliquis particulatim te exer-
 ceas. Sed iam reliqua quæ in vniuersum de tumoribus ipsū
 tur iudicia persequamur. Periodi, paroxysmi, & crises tumorū
 qui præter naturam sunt, humorū ex quibus cōstantur analo-
 giam (inquit Guido) sequuntur. Analogiam autem hic interpre-
 tamur proprietatem, seu proportionem, naturam, ac substantiæ
 similitudinem, quam formam specificam & occultam appel-
 lant. Tumores eiusmodi præsertim salubres, & qui per humo-
 rum influxū sunt, quatuor temporibus distinguūtur, principio,
 augmento, statu, & inclinatione. Principij nota est, cū particu-

Aristo. lib. i.
Physico.

Generalitas
specialitatē
antecedit.
Iudicia.

Lib. de differe-
ntiis morborum.

Quatuor tē-
pora tumorū
præter natu-
ram.
Principiū.

incipit distendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc exiguo. Incrementum adest indicabis, cum videris tumoris molem attingi, locumque affectum impleri, & in sublime efferri, ac symptomata, quæ vnumquemque tumorem, sequi solent, manifestè augeri. Status verò indicium est, cum prædicta omnia, tumor scilicet & symptomata cuiusque tumoris differentie, proprium vigorem suum obtinent, nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia faciens tumorem, in aliam formam seu substantiam alteretur, & transmutetur. Declinatio autem tunc adest cognoscitur, cum tumoris moles, & propria ipsius symptomata, imminuuntur, vel materia quæ tumorem facit in aliam substantiam incipit transmutari. Itaque tempora hæc (ut inquit Guido) penes tria potissimum distinguuntur: nempe penes ipsius tumoris essentiam, hoc est, magnitudinem, vel paruitatem, penes materie dispositionem, & accidentia, quæ curandi indicationem plurimum immutant. Ceterum quatuor hæc tempora simul aliquando coincidere videntur, propter brevem scilicet ac pene imperceptibilem vniuscuiusque durationem, ut contingit in venenosis inflammationibus non letalibus quæ statim vigent ac florent. Porro tumores huiusmodi, qui ex humorum præsertim sunt influxione, nisi retrocedant (hoc est, fieri prohibeantur, per repressionem scilicet fluentis materie) vel sponte, & citra ullam rationalem causam, intro recurrente fluxione, minimè delitescant, altero istorum quatuor modorum terminantur: nempe vel insensibili exhalatione seu resolutione, vel facta suppuratione, vel corruptione, vel induratione. Omnium autem istorum modorum optimus, & magis expetendus, is est, qui per sensu imperceptibilem fit dissolutionem: post illum verò, qui per suppurationem. At quæ per indurationem fit tumoris præter naturam terminatio, simpliciter atque absolute mala dicitur. Quæ autem fit ad corruptionem particulæ laborantis, omnium peïssima censenda est, ut apertè nobis Galenus insinuat, libello de inequali temperie, ad hunc modum scribens, postquam docuit, quomodo fiat phlegmone, ex calida defluxione in musculum decumbente. Itaque (inquit) » duorum alteri, sequi est necessariū, vel superante fluxione, corporum quæ succubuerit, sequi corruptionem, vel ea deinceps, musculum ad naturalem habitum reverti. Subijciamus igitur ipsam » primum fluxionem superari: rectius enim à melioribus incipitur. Duplex hæc incidit curationis modus: quæ scilicet vel digere »

De Tumoribus præter naturam.

21

« rur, seu dissoluetur, quicquid humoris in particulam procumbit,
« vel concoquetur: verum dissolutio optabilior existit. Ad conco-
« ctionem autem hæc duo necessario consequuntur: nempe puris
« generatio, & eius in aliquod spacium abscessio. Et paucis inter-
« lectis subiungit, At si vitæ à fluxione particulæ fuerint, in tan-
« tam hæc deuenient intemperiem, q̃ eorum operatio destruetur,
« & ipsæ temporis processu corrumpentur. Hactenus Galenus.

Dissolutionis autem seu resolutionis indicia sunt, leuitas mē-
bri, & deficiens pulsatio. Signa, tumorem verti in suppurationem, indicantia, sunt, dolor intrinsecus, pulsatio, & caloris incrementum. Fluxionem vitricem esse, & particulæ laborantis corruptelam, testantur, nigror, & liuiditas, quibus nonnunquam & graueolentia accedit. Tumorem lapidescere, hoc est in lapideam abire duritiem, aperte demonstrat, tumoris imminutio, & cum hac, durities remanens. Regressionis vel delitescentiæ notæ sunt, subita tumoris diminutio, quæ interdum propter nimiam refrigerationē, nonnunquam verò propter venenositate (nullis forinsecus admotis reprimentibus) accidit. Ad hanc autē subitam atque affatim factam tumoris imminutionē, febris statim consequitur, ac multa alia praua symptomata. Hactenus de signis & iudicijs eorum tumorū, quos vulgò apostematis nomine propriè censent appellandos. Puscularū autem vulgò nuncupatarū notæ & iudicia suo loco, cū de illis tractabimus, dicentur. Abscessuum verò (quas exituras vocant) iudicia, ac signa, quæ vel statim eos futuros denunciant, vel iam præsentēs adesse demonstrāt, hæc sunt: Cū videris (inquit
« Auicennas) pulsationum aut duritiem, in longū iam tēpus pro-
« ductam, vel caliditatem aut dolorē incrementem, tūc existima-
« q̃ apostema proximum est, vt in suppurationē vertatur, & fiat
30 exitura, id est, abscessus. Cū autē conspexeris ac deprehende-
« ris leuitatem quandā affectæ particulæ, & doloris sedationem,
« ac remissum calorem, quodq̃ tumentis loci pars aliqua cæteris
« emineat, atque in mucronem subducatur: ad hæc cū premendo
« digitis inundationem (vt loquuntur) perceperis, viderisq̃ gibbi
« illius seu mucronis colorem iam albescere, tunc certò credere
« oportet, pus eo loci subesse, & tumore iam abscessisse. Vnde
« & ab Hippocrate rectè est iudicatum, Quòd dum pus confici-
« tur, dolores ac febres magis accidunt, quàm iam confecto pu-
« re. Porro notæ eiusmodi tum iam facti abscessus, tum mox
40 futuri, vulgaribus ijs verruculis communiter exprimuntur:

*Dissolutio-
nis indicia.*

*Suppuratio-
nis nota.*

*Corruptio-
nis signa.*

*Induratio-
nis nota.*

*Regressionis
& delitescen-
tiæ indicia.*

*Signa mox
futuri absces-
sus, ex Auic.
Nota absces-
sus iam facti.*

Ap. 47. lib. 2

Durities longa, vultus, dolor, & calor aucti
Signant pus fieri: sed factum, dicta remissa,
Sub digitis vndans, albescens pars, & acuta.

Cæterum, in pure ipso cognoscendo ac dijudicando, maxime te attentum esse conuenit. Quandoquidem suppuratio ipsa, seu puris in loco aliquo comprehēsi notitia, multoties occultatur, nec satis medico innotescit, ob loci scilicet & puris crassitudinem, vt hac aphoristica sententia nobis expressit Hippocrates:

Aph. 41. li. 6. Quibuscunque suppuratio in corpore existens, non innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci, non innotescit. Atque hoc de signis abscessuum, quas exituras vocant, dicta sufficiant. Porro de horum iudicijs, hæc ab Auicenna & recentioribus chirurgis scriptis tradita sunt. Abscessus vulgò exitura dictus, qui iuxta membrum aliquod nobile, vel prope iuncturas fit, atque adco in venosis, aut nervosis ipsis partibus, qui que in debili particula, & natiuo calore propemodum destituta, prædura quoq; & densa cute obiecta, consistit. Ad hæc qui crassiore materia, & ad motum tardiore constat. Planus etiam seu æquabilis, & in coni formulam non subductus, suspectus admodum est, ægreq; ac tardè maturatur. Quocirca maturantibus, & pus mouentibus, auxilijs, ac celeri maturave apertione indiget. Qui verò huic ex aduerso respondet, boni moris est, & laudabilis.

Iudicia abscessuum.

Qui abscessus facile coquantur.

Citò enim & facile maturatur, & in suppurationem vertitur, sæpiusq; nullo forinfecus adhibito auxilio, per se dehiscit, aperiturve. Itaq; si abscessus tendit in acutiem, & puris substantia tenuis fuerit & acris, nec prædura aut densa cutis extiterit, natura seipsa, hoc est, sua facultate alienorū expultrice, & citra aduentitium aliquod subsidium conceptum humorē foras propeller: nisi quis facta incisione protinus ipsam spontaneam apertionē anteueriat. Cæterum, abscessus ipsi nonnunquam per halitum digeruntur, hoc est, per resolutionem terminantur, nulla tunc in cute facta continui solutione, vbi scilicet pus & modicū est, & bonum, tenue quoq; & non in alto delitescēs. Sa pius tamen factò à natura vel arte emissario, conceptus humor profunditur, quàm digeratur resoluaturve. Quæ autem à natura fit apertio, multò ruior est, quàm quæ arte tentatur: quod si arte fiat, secarius adhuc & melius scalpello aut candenti ferro illam molimur, quàm adurente medicamento, quod ruptorium appellant. Ideo autem ea sectio, quam in abscessibus manu & arte molimur, deterior est ea apertione quæ naturæ beneficio accedit, quoniam

Qui abscessus per resolutionē maxime terminantur.

Melius acutius scalpello, quàm ruptorio abscessus aperiuntur.

30
40

De Tumoribus præter naturam.

23

quoniam (vt inquit Auicennas) generatiua sit saniei (quã virus & virulentia appellat) sordicie quoq; & fistularum. Vbi tamẽ vrget necessitas, nec alio datur vt meliori & præsentiori auxilio, ea intrepidẽ aggrediunda est. Hæc autẽ modò cõmemorata incõmoda vitabis, si facta (cũ res expositular) sc̃ctione, & continui solutione, pus mouentia, ad reliquiarum concoctionẽ seu maturationem & detergentia, prout res exigit, laboranti particulæ, mox adhibueris. Ceterũ puris optimi, ac deterrimi notas, oraculo vltimo libri primi præfagiorum, nobis expressit

*Puris optimi
& deterrimi
nota, ex
Hippocra.*

- 10 Hippocr. ad hunc modũ inquit: Pus illud optimum censetur, « quod albũ, æquale, [id est, sibi vndiq; simile] leueq; [tangẽti] & « quã minimẽ fœtidũ est. Quod verò huic maximẽ contrariũ ap-
« caret, pessimũ est. Porro reliquorũ aliorũ, tũ humorũ, tum soli-
« dorum corporum, quæ in abscessibus cõtinentur, signa & iudicia in particularibus capitibus subsequẽtibus explicabuntur.

*De curatione tumorum præter naturam in vniuersum,
(eorum maximẽ, qui ex influxu humorum sunt, veraq; apo-
stemata vulgò dicuntur) & abscessuum, quas exituras vocant.*

20

CAPVT

V.

Tumorũ omnium, qui præter naturam sunt, iam factorum, & qui non adhuc in generatione sunt, communis ac prima curandi indicatio: vna est Galeno lib. 13. & 14. metho. med. nempe vt quod præter naturam

*Tumorum
omnium cu-
randorum
communis
indicatio.*

in particula est, & eam in tumorem attollit, totum vacuetur.

Qui verò adhuc in generatione sunt, in his prior vacuatiõẽ est, confluentis ad effectum locum humoris inhibitiõ. Proinde in illis non simplex, sed cõposita est, medentis sollicitudo ac curandi indicatio. Hæc autem communes indicationes pro tumoris

- 30 ipsius differentia, & particulæ laborantis natura, ac ratione, plurimum variant, & immutantur. Siquidem in omnibus iam factis tumoribus, & qualibet corporis parte, eius quod infestat vacuatio, haudquaquã similiter administratur, vt libro secundo ad Glauconem, & locis nuper citatis docet Galenus: quod ex sequẽtibus etiam euader manifestum. Sed neque ijsdem semper auxilijs, quibuscunq; incipientibus adhuc tumoribus, & quamlibet particulã occupãtib; occurrimus, & præcauemus, aut quod in illis iam factum est, vacuamus: sed alijs atque alijs prout tumoris genus seu differentia, & partis affectus natura, po-

*Communes
curandorũ
tumorũ in-
dicationes,
pro tumoris
differentia,
& laboran-
te particula
variari.*

- 40 stular, inhibentibus fluxionẽ, & vacuantibus quod generatũ est,

b 4 præ-

*Curandorū
tumorū in-
dicationes à
duobus po-
tissimum de-
sumi.*

*Tumoris ef-
fectiā tria
in se conti-
nere.*

*In indicatio-
ne, quæ à na-
tura partium
desumitur
quatuor po-
tissimum spe-
ctanda esse.*

*Libr. 2. ad
Glaucanem.
Ordo tracta-
dorum in se
quentibus.*

præsidij vti nimirum cogimur, si rectam saltem agendorum rationem sequimur. Itaque ab ijs duobus, nempe ab ipsa dispositione, seu morbi essentia, & partis affectæ natura, tumor qui præter naturam sunt, curandi indicationes potissimum desumuntur Galeno. Porro dispositio ipsa, de qua nunc agimus, seu morbi essentia, tria in se iuxta recentiorum placita completur. Nempe quantitatem, qualitatem, & materiam, seu substantiam quæ tumorem efficit. Quorum ratione, prima illa & communis indicatio immutatur, atque ab ijs etiamnum particulares curandi indicationes desumuntur. Aliter enim tumor magnus, aliter parvus curatur. Siquidem magnitudo & paruitas tumoris (vt existimant) differentiam constituunt. Alia enim ratione ingens phlegmone, alia minutus herpes curatur. Aliter quoque qui per defluxionem fit, & adhuc in gignendo est, quàm qui per congestionem procreatur, aut iam factus est. Sed & calidus tumor vt erysipelas, alia ratione quàm frigidus, vt est œdema vel scirrhus, curatur. Quantitas igitur, in tumore præter naturam curationem euarians, est, magna, parua. Qualitas, fluxio, seu (vt loquuntur) deriuatio, & congestio. Materia, humor calidus, frigidus. Cæterum in partium laborantium natura, quatuor potissimum spectanda sunt: temperatura, formatio, situs, virtus seu potentia. Quibus & quintum addi potest, facilitas scilicet ac difficultas sentiendi. Nisi maior istud cum Galeno, sub virtute comprehendere atque includi. Hæc itaque communem etiam illam, quæ per singula dispositionis ipsius, id est, tumoris præter naturam, genera obseruatur, curationem plurimū euariant. Proinde & has omnes, quæ ab ipsis sumuntur indicationes, in curandis ijs, qui præter naturam incidunt, tumoribus, memoriā tenere oportet. Aliter namque curatur phlegmone, aut quouis alius tumor, in carnosus partibus, quàm in neruosis: aliter in oculo, quàm in genu vel collo: aliter in aduenibus, quàm in alijs partibus non glandosis. Breuiter particula ipsius laborantis, ac tumore obseisæ, temperatura, & formatio, & situs, & virtus seu potentia, singulas quas ipsi in morbo curando molimur operationes, commutant: cōmuni etiamnum intentione seruata, quam semper à morbo assumendam esse Galenus edocuit. Itaque communem curandorum tumorum præter naturam methodum, eorum præsertim, qui ex humorū influxu procreantur, sumpta ab ipso affectu indicatione, nulla partis ipsius affectæ habita ratione, tradere hîc primum instituiamus. Deinceps

corum.

corundem, sed maximè inflammationum, cum in abscessum degenerauerint, vniuersalem curationem subiiciemus. Post hæc verò particularem singularum differentiarum, simplicium præfertim (ex quarum analogia compositorum curatio facile addiscitur) curandi rationem persequemur. Atque interim ubi locus exposulabit, nonnulla de curandi indicationibus, quæ à laborantibus & tumore obfessis particulis assumuntur, ex Galeno proferemus. Quibus rectè intellectis, facile erit cuique rationali medico ac chirurgo, tumores quoscunque quibusvis partibus insidentem, certa methodo ac ratione curare. Galenum

- 10 igitur imitantes, principium curationis tumorum qui præter naturam dicuntur, ex humorum influxu procreatorum, ab inuentione occasionis ipsius affectus, desumemus, ut scilicet quæ eum excitant ac faciunt causæ abscindantur: quod verò in eo iam factum est, tollatur, saneturve. Itaque ut vnius differentiarum tumorum qui per defluxionem fiunt (de ijs enim duntaxat modò hic agimus) exemplo atque analogia, ceteras etiam differentias, quæ ex influxu humorum nascuntur, intelligamus, vnius phlegmones breuem ac compendiosam curationem hic subiiciemus.

- 20 Hæc namq; & frequentissimè incidit, & febres aliq; symptomata periculosissima excitat. Nomine autem phlegmones hoc loco, non omnem calidam, ac veluti flammeam dispositionem, quam Græci etiam phlogosin appellant, intelligi volumus, sed eam duntaxat, quæ fluxionis sanguineæ soboles est, in carnosa corpora maximè incidens, in qua dolor est vehemens, rubor per summa vigens, calor veluti deurens, tensio, renixus, & cum malum increuerit, pulsationis tensus. Hanc enim inflammationem cum Galeno, & alijs, qui eam tanquam ducem optimū sequuntur, Græcis scriptoribus, ut Paulo, Aëtio, & Orbasio, propriè

- 30 phlegmonem appellamus. Ut igitur rem ipsam aggrediamur, « Communis omnium phlegmonarum generatio, ex sanguinis influxu est, copiosioris, scilicet quàm sit parti ex viâ. Influit autem copiosior sanguis, alia quapiâ, aliisve particulis eum aliquid quando mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquândo verò particula quæ affligitur, hunc ad se trahente. Partes autem quæ mittunt, vel ut copia superuacuum, vel ut qualitate molestū, vel utroque nomine succum persequuntur. Quæ verò attrahunt, hæc morboſo calore vel dolore trahunt.

- 40 Sed & his coadiutrices causæ sunt, particulæ imbecillitas & ignobilitas, canalium seu viarum, per quas fit defluxio, amplitu-

*Inuentio oc-
casiois, prin-
cipiū est cu-
rationis tu-
morum præ-
ter naturā.*

*Phlegmone
quid.*

*Gal. lib. 13.
meth. med.
Communis
omniū phleg-
monarū ge-
neratio.*

*Causæ coad-
iutrices flux-
ionis.*

*Tres scopi in
curandis tu-
morib⁹, qui
ex humorū
irfluxu fiūt
chirurgo p-
ponuntur.*

*Primus sco-
pus.
li. 13. Thera.*

*Plethora
quid.*

Cacochymia

*Antispas-
is.*

*Secundus
scopus.*

*Tertius sco-
pus.*

do, meatum quoque partium expellentium angustia, & situs inferior, ut iam supra dictum fuerat. Itaque ex omnibus has tres colliguntur recentiorum chirurgicorum turbae, curando- rum tumorum, qui ex deduxione ortum habent, intentiones.

Prima est, fluxionem auertere, ac eam omnino intereipere.

Secunda est, dolorem demulcere, atque eam occasione, propter quam particula fluxionē excipit, vel etiam attrahit, in totū summouere. Tertia est, id totum quod iam factum est curare, id est, totum eum humorem, qui in partem affectam confluit, vacuare. Ceterum quomodo prima intentio perfici debeat, 10 appositè docuit Galenus lib. 13. methodi medendi, ubi modos omnes auerendae fluxionis, methodumq; ac rationem inhibē- dae phlegmones, quae adhuc in generatione est, nobis expressit, ad hunc modū, si Graeca Latina faciamus, scribens: Vbi equa

liter succi inter se sunt adaucti (quod Graeci plethorā vocant) imò etiam ubi purum ab excrementis totum corpus est, & suc- corum mediocritatē cōtinet, dolore, & membri, in quo phleg- mone fedit, calore fluxionem excitante: sanguinis missione in- cipienti adhuc phlegmone succurrimus. Curatur etiā plethora, tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum multa frictione. 20 Præterea digerentibus medicamentis, modò febris non adsit, & præter hæc omnia, inedia, ac proba victus ratione, etiā si fe- bricitet æger. Cum verò flaua bile, vel atra, pituitaue, aut fero- sis humoribus refertū corpus est (cū habitū Graeci cacochymia nomināt) purgatione, quæ cuiq; suppurati succo sit accommoda, vacuatio molenda est. Ac de ijs quidē in particularibus capitibus diffusius tractabitur. Ceterū antispas, id est, in contrariū reuulsio, cōmune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxiliū dum fluxio adhuc valenter irruit, utpote in principio morbi & in augmento: in fine verò status. & in ipsa declinatione, dū sci-

licet iam fluxio resitit, atq; in mēbro inhesit, & corpus totum abundè vacuatū est: vel ab ipsa quæ affligitur particula, vel à maximè vicina vacuatio amollienda est. Secūda intentio cō- pletur anodynīs remedijs, id est, sedātibus dolorē, & (ut cōmu- niter loquūtur) rectificantibus malā qualitātē: item adstringen- tibus, & intercipientibus fluxionē. Ad hæc relaxantibus naturales meatus, per quos membrū affectū consueuerat repurgari. Ter- tiā verò intentionem assequemur, ijs quæ matē, tumorē exci- tantē, à loco affecto euacuant. Euacuatur autē cōtēta iam in loco materia, nō solum diaphoreticis, id est, euaporantibus seu 40

resol-

resoluentibus medicamentis, sed etiã repellentibus seu repercutientibus. Itaque incipientibus phlegmonosis tumoribus, atque etiã alijs quibuscunq; qui ex humorũ influxu procreantur, magis utendũ est reprimentibus quã euaporantibus, quibuscunq; exceptis casibus: ex quibus (inquit Guido) Galenus visus est quatuor posuisse. Primus est, quando tumor eiusmodi fit in emunctorijs. Secundus, quando fit à materia venenosa. Tertius, quando materia est crassa & repulsiõni inobediens. Quartus, quando vehemẽter est impaãta. Auicennas duos dũtaxat casus excipit:

Casus in quibus nõ licet repellere siue repercutere.

10 nempe cùm tumor est in emunctorijs, aut loco aliquo, ex quo fit timendus refluxus, seu reditus materiæ ad membrũ aliquod præcipuum & nobile. Alij vnicum tantũ casum eximunt, alij sex, alij decem, alij 19 alij 23 Ego autem (inquit Guido) distinguendo de repercutiuis, dico q̃ quædam sunt repercutiua propriè dicta, vt oxycratum, quod constat ex aqua & aceto: plantago, solanum, bolus Armenius, absinthium, cinnamomũ, & alia id genus, quæ repellunt materiam, cui occurrant, ad profundum. Alia verò sunt repercutientia communia seu cõmuniter dicta: cuiusmodi sunt, oui candidum, quod albumen no-

Repellentia propriè dicta. Repellentia communia.

20 minant: malua, oleum rosaceum, oleum chamæmelinum, & mastichinum: item collyria alba, & eius generis alia, quæ alterando membrum ipsum à superfluitatum receptione vindicant ac tuentur. His suppositis duo proloquia subiungit Guido. Primum (inquit) dico, q̃ in principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu fiunt, & maxime phlegmonosorum, conferunt reprimentia propriè dicta: ijs decem casibus solũ exceptis.

Primum Guidonis proloquium de re percutientibus.

Primus est, quando materia est in emunctorio. Secundus, quando tumor fit ex materia venenosa. Tertius, quando ex materia fit admodũ crassa, & ad motũ inepta. Quartus, quando

30 materia particulæ laboranti vehementer est impaãta. Quintus, quando tumor criticus est. Sextus, quando excitatus est à causa primitiua. Septimus, quando in corpore est plethorico, & admodũ pleno. Octauus, quando imbecillum & viribus penè destitutum corpus occupat. Nonus, quando sedem habet, iuxta principem aliquam particulam. Decimus, quãdo cum vehemẽti dolore incidit tumor: tunc enim mitigatorijs auxilijs, & nõ repellentibus propriè dictis opus est. Secundũ proloquium ad hunc modũ habet. In principio omnium tumorũ phlegmonosorũ cõducum reprimentia cõmunia & largius (vt dicitur) sumpta

Galæ ad Glauc. Secundum Guidonis proloquium.

40 tribus duntaxat exceptis casibus. Primus, quando est in emunctorio.

*Si tumor iam
factus est.*

*Artis canon
generalis.*

Acetio. Secundus, quando per crism excitatus est. Tertius, quando ex materia venenosa procreatur. Caterum in omnibus istis casibus, præcipue verò quâdo ferè iam constitit fluxio & tumor iam factus est, seu (vt loquuntur) in facto esse, ita vt materia in parte aliqua sit relicta, oportet materiâ ipsam resolvere ac discutere, ad motus ipsi tumeti particulæ diaphoreticis, id est per halitum digerentibus, seu euaporantibus, nō quidem mordacibus & acerbis valde, sed potius domesticis ac familiaribus, modicè quidem seu mediocriter calidis & humidis: maxime verò in tribus vltimis casibus, in quibus studere debemus materiam attrahere ad locum tumore obsessum, ipsūque tumorem augere, & materiæ iam fluxæ ac coniunctæ refluxum prohibere. Quod interdum quidem facimus emplastris attrahentibus: nonnunquam verò cucurbitulis dolenti loco affixis, vt docet Auicennas. Sit ergo regula seu canon artis generalis, quòd in principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu creantur, exceptis paulò antè memoratis casibus, sola ac pura reprimentia sunt adhibenda. In augmento verò ipsis repellentibus, nonnihil ex ijs quæ discutunt, admiscendo. At in statu & paulò antè statum, æquis portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus. Cùm autem declinatio, vel finis status adfuerit, solis resoluentibus & relaxantibus vti licet. Quibus verbis nihil aliud innuitur, nisi quòd perseverante adhuc fluxione, repellendum est: vbi verò iam confutit, digerendū seu resoluendum. Verum si medio modo res habeat, id est, partim iam aliquid fluxerit & loco inhæserit, partim verò aliquid adhuc influat, mixtis auxiliis vti oportebit, hoc est, partim resoluentibus, partim regerentibus, quæ & repercussiva vocant. Coeuntibus enim vnâ contrariis indicationibus, compositum quoque esse præsidium oportet, vt 13. Therap. Galenus ait. Porro hæc omnia sanè intelligenda sunt, vtpote si tumor præter naturam resolutione, seu (vt communiter dicunt) via resolutionis terminari debeat. Auxilia autem, quibus singulæ modò dictæ intentiones complentur pro ratione diuersitatis materiæ tumorem excitantis, in sequentibus particularibus capi- bus, & in antidotario describentur.

De curatione abscessuum in vniuersum.

*Curatio tu-
morū in ab-*

CAeterum si phlegmone, aut quouis alius tumor degeneret in abscessum (quam exituram vocant) eius curatio per initia

initia præstatur. Gal. lib. 2. ad Glauconem, per mitigatoria seu *secessum dege-*
indolorosa auxilia, quæ Græci chalastica vocant, id est, rela-
nerantium.

xantia, siue remittentia, cuiusmodi est medicamentum, quod à Galeno tetrapharmacum appellatur, molle quidem & anodynum, id est, mitigatorium. Cui ex sententia eiusdem 13. Therap. mellis paululum admixtum sit, oportet. Constat autem tetrapharmacum, ex ceræ, resinæ colophoniz picis, seu taurini, pari portione. Procedente verò tempore, ad ea quæ concoquendi, seu maturandi, ac suppurandi vim habent, transire oportet.

Tetraphar-
macum.

10 Quæ autem in aliam speciem, hoc est, in alienam substantiam,

& toto genere præter naturam degenerauerunt, ea per chirurgiam summouenda sunt. Porro in iis amouendis iuxta Galeni consilium 14. Therap. id agere oportebit, vt rationibus, quibus

Gal. lib. 14.
meth. med.

id fiat, quod intendis, pensitatis, optimam semper earum deli-

gas. Sanè optimæ rationes tripliciter indicantur: nempe ex tē-

Optimā cu-
rand. ratio-
nem triplici-
ter indicati.

poris curandi breuitate, ex curando citra dolorem, & ex maxi-

mè tutè curando. Rursus vt tutò cures, tria propria sunt quibus

intentus sis oportet. Vnum primumque, vt omninò absolutio-

nem operis consequaris. Alterum, vt sicubi hunc non consequa-

20 ris, saltem cubantem non lædas. Tertium, vt vitium non facilè

reuertatur. His considerationibus si optimam curationis viam

indicaueris, inuenietur quidem in omnibus modò propositis

tumoribus, quando potius chirurgiæ, & quando potius medica-

mentorum ope sit curandum. At chirurgiæ quidem studium in

his præfertim, quæ nunc sunt propositæ (hoc est in iis tumoribus

qui toto genere sunt præter naturam) ad interemptionem eorū

festinat, vtque prorsus tollantur sibi proponit. Quod si perforce

re nequeat, proximum illud consilium habet, vt vitium transire

rar, veluti in hypochymatis, id est, suffusionibus. Quod verò ex

30 medicamentis petitur, primum hunc tendit, vt quod præter na-

turam est, tum in pus vertat, tum putrefaciat: hoc verò secundo

loco destinat. Hæc Galenus. Itaque, vbi partes, quæ phlegmone

infestantur, vehementius pulsant, sic vt iam desperetur de

horum, citra pus, curatione, veteres omnes (inquit Gal. 4. The-

rap.) eiusmodi applicant medicamenta, quæ celerrimè pus mo-

uent: ante verò nequaquā. Cæterum sicubi cataplasmate quod

calfaciat humectetque[& ad suppurationem perducat] illinun-

tur quæ phlegmone infestantur, id nequaquā ex prima ratio-

ne fit, hæc est, vt remedium affectus, sed vt symptomatis miti-

40 gatio, vt prope doloris. Si quidem ipsius phlegmones remedia sic

ciorum

Ex libro 4.
The. meth.

Auicenn.

Quando potissimum secandi sunt abscessus.

*Tutius ferro quàm medicamentis adu-
rentibus suppuratus tumor aperit.*

*13. Therap.
Sectio oliuæ aut myrti foliū imitans.*

Noxa ex amplis sectionibus.

Sectio in suppuratis bubonibus cur fiat per trāsuersum.

ciorum sunt virium. Et paucis interiectis subdit. Cōpendiosa
obfessorum phlegmone partium curatio, per id genus præsidia
[hoc est per siccantia & resoluentia] obitur ac perficitur, quæ
sanè vel affectum prorsus summouent: vel si quid exiguum quod
suppurat, reliquerint, alterum medicamentum acre, quod edu-
cere pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita, curis sit, ve-
litque celerius explicata, ægrum, sectione seu incisione opus
est. Et hoc sanè est, quod dicebat Auicennas: nempe quòd cura
apostematis, quatenus apostema est, extractio est materiæ
extraneæ, quæ excitat apostema. Auxilia autem quibus moue-
re pus expedit, & alia quæ supra dicta sunt perficere, in particu-
laribus capitibus, & in antidotario dicentur suo loco. Porro
suppurato iam abscessu, aut transmutato, vel valenter impacto,
si pus, aut alia quæuis materia ibi cōtenta non discutiatur, vel
si tempore conuenienti, & dum iam tempestiua adest occasio,
sponte, hoc est, citra manus operam, non aperiatur: fecere exitū
ei quod digestionem, seu resolutionem non cessit oportet. Potissi-
mè verò id moliedum erit, si timeatur futura aliqua cōfessio, vel
aliud quoduis nocumentum: imò si necessitas urget, ex aduer-
so etiamnum aperiri debet, & quàm promptissimè ac tutissi-
mè fieri poterit, materia extrahi, ob causam superius adductā.
Tutius autem ferro, quàm medicamentis causticis, & adurenti-
bus aperitur, ut amplius docebitur in antidotario. Communi-
ter autem phlegmonosi cuiusmodi tumores, iam in suppuratio-
nem versis, scalpello inciduntur. Porro apertio ipsa, seu puris e-
missarium fieri debet pro ratione tum quantitatis, seu copię
materiæ ibi collectæ: tum etiam ipsius loci affecti. Quòd si cō-
putruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excidi eā
est necesse, ad formam seu similitudinem folij oliuæ vel myrti,
quò facilius sanescat. Cæterū Galenus maximas sectiones sem-
per vitandas præcepit, sanabatque huiusmodi suppuratas parti-
culas, etiā inguina & axillas sola ut plurimum incisione, & me-
dicamentis valenter siccantibus. Quòd si aliquando excindere
aliquid propter multitudinem, non puris modò, sed etiam cor-
ruptarum partium fuit opus, contentus erat sectione quæ myr-
ti foliū imitatur, planè (ut inquit) non magna. Ex amplis enim
sectionibus, ubi ad cicatricem perducta est particula, præter-
quàm quòd turpissima redditur, fit etiam imbecillior, & ad mo-
tum ineptior. Fiunt autem huiusmodi sectiones, myrtaceum
folium imitantes, in ijs potissimum tumoribus, qui in axillis & 40
bubo

bubonibus suppurant. Et in ijs quidem longitudo per transuer-
sum ducta esse debet, non autè per cruris aut corporis rectitudi-
nem. Quippe ita cùm crus aut brachium inflectimus, natura
liter cutis sibi applicatur. In alijs verò locis incisione simplici fe-
rè semper vitumur. In ipsa autem apertione siue incisione, septē
potissimùm sunt attendenda, iuxta iuniorum sententiam. Pri-
mum, vt sectio fiat eo loco, quo materia continetur. Secundū,
vt fiat in loco inferiori, quò melius purulenta illa colluuiēs va-
cuari possit. Tertiū, vt fiat secundū rugas & processum muscu-
lorum. Quartū, vt vitentur nerui, venæ & arteriæ, quoad fie-
ri poterit. Quintū, vt nō tota materia semel atq; affatim educa-
tur, præferim in magnis abscessibus, ne scilicet ex nimia subi-
taq; inanitione, & spiritui resolutione, virtutis sequatur pro-
stratio. Sextum, vt blandius, & minime quam fieri potest do-
lore, locus tractetur. Septimū, vt facta apertione locus deter-
geatur, carne impleatur, & ad cicatricem more aliorū vlcenum
perducatur. Galenus autem lib. 13. Therap. duo potissimū mo-
net esse attendenda in sectione suppurati abscessus, ad hūc mo-
dum scribens: Sin aliquando puris copia medicamēta superet,
nec ea videantur tibi totū digerere posse, secare exitum ei quod
digestioni non cedit, eo potissimū loco oportet, quo est edi-
tissimum. Quippe tenuissimam etiam illic inuenies cutem. Me-
mineris præterea in sectione, & alterius indicationis, quæ ad
effluxum pertinet, atq; ad ambo respiciens, ita quod suppu-
rauit, incide: ac deinceps medicamentum aliquod eorum, quæ si-
ne erosione siccant, impone. Auxilia autē deteriora sunt Gui-
doni linamenta, stupæ, emplastra & vnguēta quæ in particu-
laribus capitibus, & in antidotario recensentur. In primis ta-
men diebus (inquit Guido) sufficit vitellus oui cum albumine,
aluminis zuecharino inspissatus, vt facere (ait) solebat Guillel-
mus & Saliceto. Postea verò transeundum est ad mel rosatum,
& mundificatiuum ex apio, & postremo, ad vnguetum aposto-
lorum, & ægyptiacum, si res ita desideret. Suprà verò admo-
uenda vnguenta, basilicon, diachylon, & diapalma vulgò nun-
cupata, atq; alia id genus, quæ ad vlcera instruntur. Post aper-
tionem enim exitura siue abscessus, excrecentiæ, & pustulæ
(inquit ille) ad vlcenum curationem reducūtur. Gal. lib. 13. Ther-
rap. post excisam curim in phlegmonis axillarem & inguinum,
medicamento quod Græci mannā, id est, thuris purgamentū
vocāt, affectam partem implebat. Hæc autem leui adstrictione
præ-

*Septē atten-
denda in a-
perture iam
suppurati
abscessus.*

*Duo spectan-
tur Galeno
in apertio-
ne suppurati
abscessus.*

Detergentia.

*Hic variās
exemplaria.
Vnguēta sū-
per tumore
iam apertū
applicanda.
Manna &
thuris vsus
post incisio-
nem, & eo-
rum vires.*

Partem incisam prius mitigandū esse. Quæ in vlcere ponenda.

Auicennas, in sine trat. I. fen. 3. li. 4

prædita est. Sed & mitigare (inquit) prius incisam partē, quantum poscere videbitur, oportebit: fomentis primū, dein cataplasmatis, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccatē, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere, tum manna (vt dictum est) tum ex præditijs, quæ linteolis excipiuntur: primū quidem ea quæ pus citant, dein ea quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cavitās etiā mansit, quæ impleant, adhibenda sunt: sin aliter, ea quæ cicatricem inducūt. Porro si laborans nec ferro candente, nec scalpello, fieri sectionem præmollicit admiserit, medicamentis adurentibus erit emollienda apertio. Ad hoc autem laudat Auicennas semen lini, fermentum, & sterus columbinum. Et si incorporarentur (inquit Guido) cum sapone molli, aut mucilagine feminis sinapis, bonum esset. Ceterū ruptorium seu causticum, quod fit ex calce, & sapone, in hac re principatū obtinet. Hactenus de tumoribus præter naturam in vniuersum: ac deinceps de particularibus eorum differentijs.

De phlegmone vera, & alijs à sanguine procreatis tumoribus.

CAPVT VI.

20

ABSOLUTO iam in vniuersum sermone de tumoribus, qui præter naturam consistunt, tempestiuum est, de singulis eorum differentijs particularim disseramus, à phlegmone fumentes exordium, vt quæ & frequentissimè incidat, & symptomata (vt Galenus ait) periculosissima excitet. Itaque phlegmone Galeno lib. primo de morbis & symptomatis, bisariam accipitur. Vno modo communiter, veterū, cui ante illum fuerunt, more, pro omni partium veluti inflammatione, & quadam efferuescentia, hoc est, pro omni calida, ac veluti flamma quadam dispositione, quam Græci propriè phlogosin appellant. Altero modo à Galeno & iunioribus accipitur pro tumore ex sanguine vero ac puro, hoc est optimo, ac mediocrem crassitiem obtinente, procreato. Et hæc quidem generis sortitur appellationem: atq; inflammatio æquiuocè generi Latinis nominatur, Græcis verò absolute phlegmone. Ea autem recentioribus duplex est: vera scilicet, & non vera. Vera phlegmone fit à sanguine benigno, hoc est, qualitate, & substantia seu consistentia optimo, sed copiosiore quàm fit parti ex vsu. Non vera & illegitima phlegmone, ex prauo & non naturali sanguine efficitur. Est autem sanguis, humor calidus

Duplex accipit phlegmones.

Phlegmone phlogosi.

Phlegmone pro inflammatione ex sanguine optimo.

Phlegmone duplex.

Sanguis quid & quotuplex.

34

44

- calidus & humidus ex temperationi parte ipsius chyli progenitus. Et hic quidem duplex est: Naturalis, & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & humidus, substantiâ quidem mediocris, colore verò multum rubens, odore, autem & sapore dulcis, mitis, ac benignus. Verum non naturalis ille dicitur, qui ab isto nuper descripto deflexit, degeneravitq;: intra tamen suæ latitudinis terminos, quos si transgreditur, non iam sanguis, sed alius humor veniæ appellandus. Hoc autem (sanguinē inquam degenerare à propria sua natura) contingit dupliciter. Vno modo (vt aiunt) in se, hoc est, ratione sui, permutata propria eius substantia, citra alterius admisionē. Altero modo, per alium, seu ratione alterius. Et per se quidem adhuc bifariam: nempe, vel quia eius substantia crassior est, aut tenuior quàm debeat: vel quia aduritur, & quod ex tenuius est, in flauam bilem mutatur: quod verò crassius, in atram, idq; absque separatione. Alterius verò ratione sanguis fit non naturalis, quando alius humor illi permiscetur. Quod multifariam contingere potest, prout scilicet variz species bilis, pituitæ, aut melancholiæ, cum ipso sanguine misceri possunt. Ex quibus liquet, quòd ex sanguine quatuor species seu differentiz tumorum præter naturam procreantur. Primum ex sanguine naturali & benigno generatur vera phlegmone. Ex sanguine verò illaudabili factò per admixtionem aliorum humorum, tres enascuntur differentiz phlegmones non veræ, atq; illegitimæ: quippe quòd tres alij humores (pituita inquam & vtraque bilis) ipsi sanguini permisceri possunt. Itaque si flaua bilis sanguini commisceatur, quod ex ambobus tum est conflatum, vocatur phlegmone erysipelædes: si pituita, phlegmone cedematodes: si atra bilis seu melancholia, phlegmone scirrhus. At ex sanguine illaudabili & maligno per adustionem & corruptionem propriæ substantiæ, pro ratione tenuitatis aut crassitiei ipsius generantur, vel carbunculi, qui Græcis anthraces dicuntur, vel gangræna, vel sphacelus. De quibus in sequentibus dicemus.

Sanguis bifariam degenerat à propria sua natura.

Quatuor tumorum differentie ex sanguine.

De causis, signis & iudicijs phlegmones.

- P**hlegmones causæ sunt tres, vt & aliorum omnium tumorum præter naturam qui per defluxionem fiunt. Primitiua scilicet, quam & pregressam & euidentem appellamus: antecedens, & coniuncta. Euidentes causæ inflammationis, sunt occasiones externæ: vt contusio, disruptio, conuulsio, fractura, vulnus, c
- Causæ phlegmones tres. Prægressa.*
- vltus*

Antecedens.

ulcus spontaneum, luxatio, & alia id genus, quæ quatenus dolo-
rem in laborante particula excitant, fluxionē accerfunt. An-
tecedens, vt sanguinis exuberantia, probi quidē & inculpati, vt
cum ad immoderatam venarum repletionem venæ pertingūt.
Tunc enim cogitur sanguis (veluti quid superfluum) ad partē
aliquam vel imbecillam, vel plus iusto exalfectam, vel dolore
affectam, effundi, ac defluere. Vbi tandem compingitur, atque
impactus manet, nisi prius ab initio reprimatur, vt iam supra
in capite vniuersali dictū est. Ad quod subinde recurrendū tibi
est, vt absolutam magis particulariū tumorum, de quibus nunc ¹⁰

Coniuncta.

*Nota vera
ac legitima
phlegmōes.
Lib. de tum.
præter nat.
& 13. meth.*

*non facile
ist. Digesto.
Phlegmōes
tēpora qua-
tuor.*

Iudicia.

tūnes, est ipse sanguis, qui iam loco affecto infartus est. Phleg-
mōnes notæ sunt, tumor, seu incrementum partis supra natu-
ralem habitū. Calor vehemens, adeo vt membrum comburi vi-
deatur. Rubor per summa vigens, qualis ex balneis, vel igne, aut
quouis alio modo calfactis aduenit. Dolor vehemens, nisi mem-
brum difficilem omninō sensum habuerit. Pulsus, seu pulsatio-
nis sensus in profundo molestus. Tensio seu extensio membri,
quam non modō ipū tantū deprehendimus, sed etiā ipse eger
proprio sensu aduertit. Renixus partis tangenti eam, pro tensio ²⁰
nis modo. Et si quæ sint alia, quæ præsentē sanguinis abun-
dantiam in parte aliqua testantur. Phlegmone quatuor habet tem-
pora, principium, augmentū, statum, & declinationē: nisi saltem
fluxio intro recurrat, vel repellentibus medicamentis statim re-
primatur ac retrocedat. Vbi autem hæc quatuor tempora per-
curterit, necesse est terminetur vel per exhalationem, seu resolu-
tionem (quā diaphoresin Græci vocāt) vel per suppurationem,
vel per corruptionem, quam et putrefactionē nominant, vel per
indurationem, dū scilicet resolutio tenui, in scirrhi abit duritiæ.
Et horum quidem omniū signa ex capite vniuersali sunt requi- ³⁰
renda: vbi explicatæ sunt notæ omniū temporū, & modorum
terminationis tumorū præter naturam, quæ vulgō apostemata
vocat. Cæterū phlegmōnem plærumque mala comitantur
symptomata, quæ eius curadi rationē interpellant, immutantq;.
Cuiusmodi sunt dolor vehemens, partē admodū sensibilem
occupans: recursus materiæ ex glandulis (quas Græci adenas &
vulgō emunctoria vocāt) ad partes internas item partis affectæ
mortificatio (quam corruptionem ethiomenicam appellāt) ex
nimia scilicet refrigeratione & valido infartu, ipsius materiæ
(quæ inflammationē cōmittebat) proueniens. Durities quoq; la- ⁴⁰
pidea

pidea, & pene indissolubilis, vulgò sclerotica nūcupata, ex perperam ac temerè facta tenuioris humoris dissolutione. Quocirca diligenter ac sæpius quidem obseruare oportet, in curandis tumoribus, qui præter naturam consistunt, quò quisq; tandem sit euasurus, & quæ inopinatè superuenerint accidentia, vt circa id quod apparet, & vrgens est, maximè insistamus. Quod nos probè Galenus admonuit libro secundo ad Glauconem, & 13.

Galenus.

« Therap. ad hunc modum inquit: In morbis quidem qui diffracti
« culter resoluuntur, verendum est, ne eorum reliquæ præduratio
re liquantur. Quare in singulis resolutionibus attendere oportet,
« ad quid transmutetur omnis, cuius curatio suscipitur, tumor.
« Nam ea quæ cum fortiter exiccantibus agitur, reliquias prædurat
« ras operatur. Hæc Galenus. Sed tempestiuum est, ipsius phlegmones
curationem aggrediamur.

Ratio curande phlegmones ex defluxione concitate, corporis summa occupantis.

Cum inflammatio, quæ Græcis peculiariter phlegmone, dicitur, ex influxu sanguinis, copiosioris scilicet quàm ut parti ex usu, nascatur: fluxio autè incipiente adhuc phlegmone, partim fiat, partim iam facta sit: geminus sanè erit curationis ipsius adhuc incipientis phlegmones scopus, nempe vacuandi quod influxit, & prohibendi quod influit. Porro fluxionē inhibebimus, si humorē influentem retraxerimus ac repulerimus, si afflicte parti robor addiderimus, & si quid fluxionē accersit, summouerimus. Retrahemus autè atq; in contrarium humorū defluxum reuocabimus, venæ sectione, si quidē vires valeant, & etas omiserit. Sin minus, admotis cucurbitulis, vel ligaturis, vel frictionibus, vel calfactis partibus, directe affecto loco respondētibus. Regeremus autè repellemusve, admotis medicamentis, quæ hac facultate prædita sint, hoc est, quæ aliò fluxionē propellere ac transmittere possint. Causas verò defluxionē ad partē iam phlegmone obsessam accersentes summouemus, particulā ipsam, si imbecilla sit, cōfirmantes, roborantēve: si laxa nimis, adstringentes: si calida est, vt esse solet, refrigerantes: & dolorē, si distruciat, demulcentes: ac corpus vniuersum, si sanguine abundet, & parti contagiū trāsmittat, venæ sectione vacuantes: de quibus omnibus mox dicetur. Vacuamus autè quod iam influxit, & in partē affectā se recepit, nō modò medicamentis ijs quæ digerūt, hoc est, discutunt ac resoluunt, sed etiā quæ adstringunt, & refrigerant.

Magisque profectò (inquit Galenus) ad incipientes phlegmones,

Methodus curande phlegmones quæ adhuc in generatione est. Fluxio quibus prohibetur.

Retractio.

Repulsio.

Cause summotio.

Vacuatio eius quæ iam influxit.

Gal. 13. The resp.

Scarificatio.

nota

nas, frigidis, astringentibusq; quam ijs quæ digerunt est vtendum. Atq; etiam magis, vbi crassum quod confluunt non est. Sed si sanguis in particula, quam phlegmoneprehendit, vehementer est impactus, non est amplius repercutientibus vtendum: vt in præcedentibus dictum est, sed tum digerere est tempestiuum. in veteratente quoque inflammatione, quæ post totius corporis vacuationem, aliamq; idoneam curatione, duritiem quandam ac nigrorem in partibus reliquit, sanguinem scarificationibus auferre (Galeno etiam autore) non est incommodum. Atque hæc summarim ac vniuersali quadam methodo dicta sint de curatione inflammationum, quas Græci peculiariter phlegmonas appellare consueuerunt, ex humorum defluxu incidentium. Quæ certe rationali medico, & in artis operibus exercitato, satis esse possent. Verumenimvero quoniã chirurgiæ candidatis, & non ita eruditis, hæc scribenda suscepimus, non abs re, neque alienum à nostro instituto factum videbitur, si quæ de phlegmonarum curatione scriptis suis non modo veteres medici, sed & recentiores chirurgi nobis scripto reliquerunt, post hanc vniuersalẽ ac compendiariam methodum sermone magis peculiari, & vulgari subiiciamus. Itaq; rationem curandi phlegmonem, præter regimen (vt vocant) vniuersalẽ, in quatuor scopos, seu intentiones, particulares, reuocare solent posterioris huius seculi chirurgi: nempe in debitam vitæ rationis obseruationem: in fluxionis inhibitione, seu materie (quod aiunt) antecedentis auersionem: in humoris, qui iam se in parte recepit (quam materiam copiuuntam vocant) vacuationem, & in symptomatum seu accidentium correctionem. Prima itaque intentio perficitur debita sex rerum (vt vocant) non naturalium, & eorum quæ illis annexa dicuntur administratione. Sunt autem res non naturales à medicis dictæ numero sex, vt statim ab initio huius operis dictum est, aer, cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, inanitio & repletio, animi affectus, seu accidentia. Quæ omnia (quoniam phlegmone subindẽ febres accendit) ad frigiditatem, & moderatam humiditatem, spectare debent. Pro quibus sequentia subieciimus præcepta:

Quatuor
intentiones
curationis
phlegmones

Prima intentio qua est vita institutio.

Res non naturales.

Aër.
Cibus.
Potus.
Vinum oligophoron.

Aërem sincerum & clarum eundemq; frigidiusculum deligito.
Victum teneum frigidum & humidum seruato.
Vinum debile & pauciferum, id est, quod intemperando haud multam aquæ mixturem sustinet (Græci oligophoron vocant) assumito,

Quod

De Tumoribus præter naturam.

37

Quod si febris vehemens (vt sæpè affolet) accesserit abstinere esto.

Partem phlegmone obsessam ne exercitato.

Quietem quantum potes, præsertim si plurima succorum abundantia sit, seruato.

In somno & vigilijs modum teneto.

Somnum diurnum, & præsertim meridianum, vitato.

A crapula & ingluuie summopere caueto.

Alius fusa, & mollis tibi semper esto, atque eam interdum,

10 si opus est, clysteribus sub ducito.

Iram, clamorem, contentionem, vt inimica, fugito.

A veneris vsu, seu concubitu, velut ab hoste intestinisimo, te subtrahito.

Secundum scopus curandæ phlegmones, qui est fluxionis auersio, perficitur venæ sectione, si vires & ætas ferant. Semper autè in omnibus mèbris è regione siue è directo (quod Græcè *αὐτὸς* dicitur) siue reuellere, id est, in contrariū, retrahere velis, siue ad latus deriuare. Vena secanda est, etiā si plethora ad sit. E dire-

10 cto autè sunt dextra dextris, & sinistra sinistris. Ergo si ophthalmia oculum dextrū infestet, vel synanche partem gutturus dextram occupet, humeralis vena, vel eius loco (si nō appareat) alia, statim per initia fluxionis, in brachio dextro incidenda est. At si humor in genu cōfluat, secanda est cubiti vena, vel interna, vel media, nisi alterū crus malis scarificare, aut in eo venā pertunde re, vt alicubi Galenus consuluit. Itaq; venæ secandæ electio, & auersionis in contrariū (quæ ab Hippocrate antispasis dicitur) inuentio, à laborante particula, & curandi membri positu præstat, indicaturq; vt 13. & 14. meth. med. ac sæpè alibi Galdoct. Cæterum corpus ipsum, quod phlegmone occupatur, non

30 modò cum plethoricum est, sed etiam vbi morbi magnitudo suadet, cum mediocritatem succorū continet, sanguinis emissionem vacuamus, si saltem Galeni cōsiliū sequamur, qui lib. 13

meth. meden. ita fieri præcipit, inquit: Dolor siquidem, &

« membri, in quo phlegmone sedet, calor, etiam si purū, ab excre-

« mentis totū corpus sit, fluxionis causa fiunt. Expedi autè tunc

« parcius id efficere [hoc est, sanguinē detrahere] ac vacuare qui-

« dem prout maximè tum ætati laborantis, tū naturæ congruit

« Aestimatis præterea tum anni tempore, tū regione, tū hominis

« ipsius cōsuetudine. Conferunt etiā non parum ad retractionē

40 sanguinis in partē affectā confluentis, motus restrictio, & ligatura

Motus.

Quies.

Somnus.

Repletio.

Inanities.

Animi pa-

thematia.

Venus.

Auersio flu-

xionis, qua

secunda est in

tentio.

Vena semp

è directo se-

canda.

Vena secan

da electio à

laborante

particula

indicatur.

Gale. 13. The

rap.

que sunt etiam

in somno

in missis

partis oppositæ, sed maximè celebrata prius (vt dictū est) sanguinis detractiōe. Itaque si in manibus phlegmone est orta, crura exercitanda sunt, vincienda, fricanda. Sin in cruribus, manus. Sed hæc magis ad medicum quam chirurgum pertinent.

Tertius scopus
quis est
humoris in
in parte re-
cepti vacua-
tio.

Reprimētia
in augmēto
præpollere
debent dige-
rentibus.

Si phlegmo-
ne in abscef-
sum degene-
ret.

Repellentia
1864 circa initium
phlegmones
admonēda.

Oxycraton.

lib. 13. meth.
meden.

Galenic cata-
plasma lib.
2. ad Glau.

Ternum scopum assequimur solis, per initia phlegmones, repellentibus (exceptis prius memoratis casibus) parti inflammatione laboranti admotis. Vacuatur enim (vt Galenus ait) quod impletum est, non modò medicamentis ijs quæ digerunt, sed etiā quæ adstringunt & refrigerant: cuius generis sunt, quæ repellentia & reagentia dicuntur. In augmento autem ad præ-
10
iuentem intentionem, id est, ad vacuandum quod iam influxit, si mul & prohibendum ne deinceps amplius aliquid confluat, mi-
scenda sunt digerentibus reprimētia: ita tamen vt horū copia ac potentia, illis adhuc præpollcat. In statu verò æquis portioni-
bus inuicem cōmiscenda sunt, ac mitigatoria (cū vehementis-
simi tunc dolores adfint) applicanda. At in fine status, & in de-
clinatione, solis digerentibus quod impactū est, vacuare oportet, si saltem ipsa phlegmone resolutione seu discussione termi-
nari debeat. Si verò degeneret in abcessum, & fieri nō pos-
sit, vt puris collectio ac eruptio impediatur, tū suppurantibus,
aperientibus, ac detergentibus medicamentis vri licebit. Porro
exiccātia conferunt in fine vtriusq; affectus, hoc est, phlegmo-
nes & abcessus. Hæc enim quod reliquum humoris est prorsus
absument. Verū facta sectione in abscessu iam suppurato, me-
dicamentū quod sine erosione siccet, imponendum est, vt in se-

quentibus dicitur. Porro ad incipientes phlegmonas repellē-
do aptissimū auxilium est Galeno oxycraton, quod Latini: pu-
scam aquosam nominant. Est autē mistura ex aqua & aceto, ita
quidē reperiata, vt adhuc bibi possit: spōgia ergo hoc ipso oxy-
crato perfusa atq; imbuta, parti, in qua phlegmone residet, im-
ponenda est. Loco autē oxycrati, Galeni ipsius cōsilio, sumi po-
test vinū aliquod austerū, vel frigida solū in particulis scilicet,
quæ circa artus sunt. Galeni verba hæc sunt, si Romano sermo-
ne loquatur: In particulis, quæ circa artus sunt, sat fuerit [per
initia phlegmones] etiā spongiā vel ex frigida aqua, cui pau-
lulū aceti sit immixtū, vel aqua sola imponere, sicut etiā ex vino
aliquo austero. Ad idē summè efficax est eiisdē Galeni cata-
plasma, ex semperviuo, & malicorio in vino decoctis, rhu. i. su-
mach, & polenta. Repellit enim quod influit stringēdo, atq; id
quod continetur exiccādo vacuat, affectasq; partes vtroq; no-
40
mine

- hinc confirmat & corroborat. Hoc remediū à recentioribus,
 « ex Auicenna, sub hac formula postea descriptum est: *℞ fucci* *Fen. 3. lib. 4.*
 « semperuiui libram vnā, vini quod crassā sit substantiæ, & sapo *tracta. ca. 3.*
 « ris acerbi lib. semis, farinæ hordei quart. vnum, corticis malorū
 « granatorum, & sumach puluerisatorū ana vnciā semis, coquan
 « tur, & fiat linimentum. Aliud quod ad idem efficaciter auxilia *Halyab. li.*
 « tur, ex Halyab. Saniali albi & rubri singulorū drach. tres, meni *nimentum.*
 « thæ, id est glauci, drach. duas, terræ cimoliæ, boli Armenicę, sin
 « gulorū drach. vnā & semis: omnia in tenuissimū pollinem te
 « rantur, & diligenter cribrentur, postea dissoluantur in succo sem
 « peruiui, aut portulacæ, vel lactucæ, & fiat linimentū. Aliud ad
 incipientes etiā inflāmationes phlegmonosas, tritū & vulgare,
 quod & recentibus vulneribus, & nuper acceptis cōtusionibus,
 valde vile est. Constat omi candido liquore, rosaceo, & stillari-
cia rosa, hoc est, aqua rosarum. Panniculi hoc imbuuntur, parti
inflāmatae apponuntur, & subindē mutantur. Cæterū plurima
 alia tum simplicia, tum composita medicamenta, ad incipientes
 phlegmonas stringendo, & fluxionē reprimendo conferunt, que
 partim ex libro sexto (quem antidotarium vocauimus) partim
 30 ex alijs autoribus, qui de hac re scripserunt, requirēda sunt. Sed
 hæc ad præsens nobis visa sunt sufficere. Inter remedia, quæ
 phlegmonarum incremento forinsecus ad mora subueniunt, ef- *Remedia in*
 ficaciter auxiliatur rosaceum, Græci rhodinon vocant. Hoc *phlegmona-*
 enim (vt Galeno visum est) partim repellit, partim per hali- *rum incre-*
 tum digerit; quippe quod olei rosæque mediam ad vnguem *mēto admo-*
 naturam obtineat. Itaque rosaceo paucula quædam inest ad- *uenda.*
 strictio, quæ tenues ipsius particulas præuerrere quidem (in- *Libr. 3. de*
 quir Galenus) nequit: sed vbi illæ altius penetrauerint, in *simpl. medi-*
 ipsam iam superficiem agere incipit, pro viribus consupando,
 30 contrahendo, ac condensando. Proinde fit, vt rosaceum phleg- *Rosaceum*
 monarum augmentis optimum sit & aptissimum præsidium. *in phlegmo-*
 Aliud Auicennæ phlegmonarum incremento valde efficax. *narum aug-*
 Concipit foliorum malux M. vnum, absinthij, rosarum ana vn- *mentis opti-*
 ciam semis, farinæ hordei vnciam vnā, olei chamæmelini *mū esse præ-*
 quart. semis: coquantur, & pinfantur, ac in formam emplastri *sidium.*
 mollis redigantur. Aliud eiusdem, habet vini ad dimidias vel
 tertias cocti (hoc sapam, illud defrutum appellamus) quart. vnū
 aquæ rosacæ, aceti ana quart. semis, croci, drach. duas: modera-
 to igne parum ferueant, postea colentur, & panni co liquore
 40 imbuti parti phlegmonæ obfessæ applicentur, epithematis more.

*Quæ in sta-
tu phlegmo-
nes conue-
niant.*

*Emplastrū
Galenī.*

*Quæ in sta-
tu phlegmo-
nes conue-
niant.*

*Quibus sit
videndum au-
xilij in de-
clinatione
phlegmones*

Porro eiusmodi præsidia, quæ in augmento inflammationis adhibentur, mixtasq; ex reprimētibus & digerentibus facultates habent, tardius amoueri, & mutari debent, quàm pura repellentia, initio ipsius phlegmones accommoda. Auxilia, in vigore seu statu phlegmones, & cum in ea vehemētes vrgent dolores, idonea sunt Aëtio, malua priuatim, & cum modico pane, & rosacco illita. Melilorum quoque in passio decoctum, & cum pane admodum. Idē possunt (inquit) & palmulæ in passio elixatæ, & cū pane & rosaceo confectæ & mixtæ. Aliud quod per halitū digerit, in vigore phlegmones summè efficax. Perdicij, id est 10 parietariæ, maluæ ana. M. I. fursus, subtilis farinæ volatilis, ana p. I. fœnigræci, anethi, ana, vnciā. β. olei chamemelini quart. β. coquantur in vino, & exactè subigantur, donec in vnitatem coëant, & fiat emplastrū. Aliud ex Gal. de sumptū lib. 13. Thera. Recipit medullæ panis frumētacei lib. vnam, maceratur ipatio vnus horæ in aqua feruenti, postea exprimitur, & huic admiscetur mellis optimi quart. vnum, formaturq; emplastrum molle. Hoc discutit, & dolores mulcet. Vnguentū basilicō, & quod è succis conficitur, diachylon nominatur, in vigore phlegmones admoenda esse consuluit Arabs ille Auicennas: verum hoc 20 remolliendo, illud verò maturando magis est idoneum: quamquam tamen vtrumque vi aliqua etiam digerente polleat. Horum autem descriptiones ex antidotario requirendæ sunt, vbi & valde multa discutientia tum simplicia, tum cōposita recensentur, quæ in statu eiusmodi inflammationum efficaciter auxiliantur. Cæterū hæc & similia, quæ ad discutiendū quod iam 30 influxit, & ad dolores mitigandos, præsidia adferuntur, cum multa humiditate participant, tardissimè mutanda erunt. Porro cum ex admotis nuper memoratis auxilijs, humor in particulam phlegmone obsessam delapsus discutitur, tumorq; & ex- 30 tensio minuuntur, doloresq; mitiores fiunt: tunc inflammationis declinationem adesse putato, quo tempore solis discutientibus vtendum est. Cuiusmodi sunt, agrestis malua illita, & passulæ exemptis acinis cum pane & modico melle, & hordei farina cū melle applicata. Item lana succida, stupæ, spongia, aut quid simili, vino calente imbuta, postea expressa & apposita: hæc enim omnia discutiendi vi pollent, & dolorem non excitāt. Cæterū si ob morbi pertinaciā & difficultatē locus affectus nimis multam, & resolutioni contumacem materiā continuerit, non ideo 40 protinus, vt quidam faciunt, ad chirurgiam, id est, sectionem

aut

aut vitionem, prorumpere oportet, sed eniti, vt collectus humor
discussorijis medicamentis per halitum digeratur. Moliri enim
prius digestionem oportet, medicamentis ad id conducenibus,

quàm inflammationem incidere. Quod si tumor digerentibus
medicamentis non cedat, nullaq; amplius discutiendi quod in
eo continetur, spes relinquatur: sed videatur potius materia ad
suppurationem spectare, ad ea quæ maturant, & pus mouent,
transeundum erit. Speramus autem tumorem (etiam si iam in
abscessum degenerauerit) per halitum digeri posse, si materia,

10 quæ eum excitauit, tenuis & pauca, resoluq; idonea fuerit: si &
in loco minimè profundo delitescat, cutisq; particulæ labora-
tis rara exiterit. Si verò humor multus sit & crassius, atq; in al-
to sinu reconditus, cutis verò densa, exhalatio seu resolutio ne
quaquàm speranda est. Proinde ad maturantia & pus mouen-

*Quando spe-
randa re-
solutio.*

tia veniendum erit: cuiusmodi est cataplasma, quod ex farina
triticea, in aqua & oleo temperatè ac mediocriter cocta, con-

*Pus mouen-
tia.*

stat: hoc enim celeriter inflammationes, quæ digestionem non ces-
serunt, ad suppurationem perducit, vt etiam Galenus nobis
autor extitit. Siquidem & calorem habet nostro calori persimi-

*lib. ad
Glauc.*

30 lem, nempe teporatum ac mediocrem, & ratione farinæ, & olei
(quæ lentoris quippiam habent, quo meatus obstruendo partis
calorem natium digeri prohibent) vi emplastica præditum est.

Quæ duo maximè in maturantibus & pus mouentibus medica-
mentis desiderantur. Sunt qui huic cataplasmati croci momen-
tum coloris gratia adiiciunt. Cæterum si tumor, ob infartos in

eo crassos & viscosos humores, ægrè ad suppurationem ducitur,
eximie subueniet cataplasma ex radicibus altheæ, & caricarum
dulcium ac pinguium decocto, quod mellis crassitudinem re-

30 præsentet, & farina triticea compositum. Ergo accipe prædicti
decocti lib. vnam, farinæ triticeæ selibram, incoquantur simul,
& in formam cataplasmati reducantur. Si autè loco farinæ tri-

ticæ hordeacea apponatur, vel cibarius panis, quæ Græci syn-
comistum vocant, discutiendæ inflammationi magis quàm sup-
purandæ conueniet, vt libro ad Glauconem secundo Galenus an-

notauit. Aliud in declinatione phlegmones puri mouendo ap-
primè idoneum, quod à vulgariis chirurgis cõmuniter viur-

*Huius cata-
plasmatis
meminit
Halyab.*

paratur. Habet autè corticis radicis maluauisci, id est, altheæ, radi-
cis lilij, senecionis, Græcis erigeron dicitur, & foliorum maluæ,

*Cataplas-
ma cõmune.*

40 singulorū M. vnum, farinæ triticeæ quart. vnum, farinæ sem. lini
vnciam vnam, axungie suillæ recentis lib. semis: coquantur
herbæ

herbæ in aqua quantum satis esse videbitur, & tundantur cū reliquis in mortario, fiatq; cataplasma. Pluræq; alia puri mouēdo accommoda, libro sexto descripta sunt, ex quibus peritus quifque chirurgus, & in artis huius, quam docemus, operibus exercitatus, præstantiora, & naturæ laborantis, ac particule cui medetur, magis idonea sēligere atque in vsum præsentem assumere poterit. Cæterum si collectio ac iam confectio pure, abiceffus in quem phlegmone degenerauit, sponte non aperiatur, scalpel lo, vel cauterio, aut medicamento quopiam erodente (liberis iam ab inflammatione partibus) molienda puri, quod digeri nō po-
ruit, euacuatio est. Deinde vlcus ad cicatricem, similiter reliquis vceribus, perducendū est, nempe detergendo, carne implendo, glutinando, & demū cicatricem inducendo. Porro si materia, quæ tumorem parit, crassa est, & resolutioni, atque etiam concoctioni cōtūmax, vehementerq; carnis meatibus impa-
cta (qua
lis esse solet in diuturnis inflammationibus malè curatis, resoluta scilicet tenuiori humoris parte, & crassiore in meatibus relicta) scarificatio timenda non est, præsertim (vt 2. lib. ad Glau. Gale-

*Symptoma-
tum corre-
ctio.*

nus admenit) vbi durities, humor, ac nigror, apparuerit. Quartus scopus, qui in curanda phlegmone chirurgus ac medico pro-
ponebatur, est symptomatum seu accidentium, quæ ipsi inflammationi superueniunt, correctio, & summoio. Ea autem ferè sunt, dolor, regressus materię, ex qua tumor excitatur, ad interiora, putredo & corruptela partis suppurantis, & veluti lapidea quædam durities, ex valenter exiccantibus & digerentibus relicta. Ergo si vehemens dolor inflammationi accesserit, modis omnibus laborandum est, vt statim mitigetur. Quandoquidem præterquam qd vires prosterit, & legitimas actiones impedit: fluxiones quoque accersit, & sanguinem ad se allicit. Itaque si dolor acrius vrget in phlegmone, confestim imponenda medi-
camenta sunt, quæ doloris vehementiam citra vllam noxam leuent, & demulceant. Quale est, quod ex passio, oleo rosaceo, & paucula cera, cum his ambobus liquata conficitur Galeno: hoc autē lana succida, quę plurimum habet æsypi, excipiendum est, ac estate quidem frigidum, hyeme verò tepidum apponendum. Itaque medicamentum eiusmodi, sicut dictum est attemperatū & admotum, rarefacit, extenuat, digerit, euacuat: humorē acré, lentum, crassum, aut multum, partibus dolentibus hærentem, æquabilem reddit, vaporemque crassum, commodum exitum non habentem, discutit, atque sic dolorem mulcet: nullam verò

*Dolorem in
phlegmone
lenientia.*

30
40
sua

- sua caliditate noxam inuehit: rosaceum namque calorem retū-
 dit, & infrenat. Quo fit, vt hoc remedium citrà noxam, vllā do-
 lorem mitiget, & affectui non incōmodet, vt aqua calida, oleū,
 & triticea farina, quæ in inflammatione cum dolore incidente
 ex vsu esse non possunt, vt testis est Galenus: Hæc enim calfaciē
 do ac humectando relaxant, ac robur partis resoluunt, vnde &
 imbecillior redditur, & ad fluxionem excipiendā pronior. Ad
 eundē vsū (nempe ad mitigationem doloris in phlegmone)
 efficaciter apponitur, rosaceum, ouorum lutea, quæ & vitellos
 20 appellant, mica panis albi, in aqua calente macerata, postea ex-
 pressa, & rosaceo permixta. Præsertim etiam auxilio sunt, mal-
 uæ in aqua decoctæ, mixtæ cū fursure & rosaceo, vel oleo vio-
 laceo. Crocū autem in omnibus sedandis doloribus assumitur
 Auicennæ, atque alijs anodynīs, id est, dolorem mitigantibus,
 vtiliter commiscetur. Porro si tanta tamq; vehemens sit doloris
 acerbitas, vt iis quæ à sedando, leniendoq; dolore quā suppe-
 tiis latis naturæ, propriè anodyna & paregorica dicta sunt, de-
 mulceri non possit, ad narcotica, id est, stupefacientia, transeun-
 dum erit. Inter quæ hyoscyamum admirandam opem sæpe cō-
 30 tulisse, quorundam scriptis prædicatur, & à nobis, aliisq; valde
 multis frequentī experimento comprobatum est. Itaque folia
 eius sub calidis cineribus coquito, recenti axungia misceto, &
 admonero. Hoc vehementes dolores mulcet, & phlegmonosos
 tumores ad suppurationem perducit. Cauenda autem semper
 est, dum hoc moliris, nimia humectatio: quippe quæ per initia
 inflammationū, cum magno dolore fluxu incidente, pernicio-
 sa sit, vt paulò antè diximus. Cæterū si metus adsit recursus ma-
 teriæ phlegmonē excitantis, ad loca penitiora, & maxime ver-
 sus principes partes, trahētibus medicamētis (de quibus li. sexto
 30 fusissimè egimus) vel etiam admotis cucurbitulis, quæ vehemē-
 tius & ex penitioribus partibus trahunt, eā forās euocare opor-
 tet. Si verò à vehementer exiccantibus ac digerentibus inflāma-
 tioni temere admotis, reliquæ tumoris in scirrhum abierint, ra-
 dices cucumeris agrestis (qui vulgò herbariis & officinis cucu-
 mer asininus dicitur) aut bryoniæ, aut asari, in aqua incoques:
 sæpe quidem (vt præcepit Galenus) has solas, nonnunquam ve-
 rò & caricæ pingues adiciens. Deinde farinam cū aqua misce-
 to, cui & aliquid adipis, præsertim, aniserini aut gallinacæ, adi-
 cito. Quod si horum copia non sit, iuillum addito, & cataplas-
 40 ma cōficio. Hoc, scirrholū affectū, ex valentius exiccantibus
 & di-

Libr. 2. ad
Glauc.

Crocum.

Nota de hy-
oscyamo.

Recurfus
materiæ ad
interiora.

Durities re-
licta.

Galenī cata-
plasma, ad
induratos
tumores.

& digerentibus medicamentis in parte, quæ phlegmone occupabatur, relictum, efficaciter sanat. Prædictarum quoque herbarum, & cum his althææ radices, post moderatam decoctionem cum panc & adipe contritæ, & admotæ eiusmodi induratos tumores discutunt, vt libro secundo ad Glauconem luculenter docet Galenus. Itaque si phlegmonosos tumores, qui ægrè per halitum digeruntur, nec facillè concoquuntur, in scirrhum mutari timuerimus, valenter digerentibus semper emollientia remiscebimus. Sed de ijs iterum libro sexto, cui nomen fecimus

Putrefactio antidotarium, locupletius dicemus. Porro si portio aliqua suppuratis particulæ cõputruerit, eam protinus excidere oportet, vel plurimis scarificationibus profundis incidere: dein aqua falsa perfundere: & demum emplastrum apponere, ex fabarum, aut orobi farina cocta in oxymelite. Reliqua quoque tibi molienda erunt, quæ in curatione gangrænæ mox subiiciemus. Sed melius fuerit capita curationis eiusmodi phlegmonosi affectus, breuius quibusdam sententijs complecti.

Capita curationis rheumaticæ, id est, ex humorum influxu factæ phlegmones adhuc incipientis, & cum dolore non vsque adeo magno, affligentis. Ex Galeno lib. 2. ad Glauconem. 29

- 1 **C**orpus vniuersum congruis vacationibus, sed præsertim venæ sectione, modo nihil obstiterit, inanito.
- 2 Partem inflammata[m] his, quæ influentis humoris repellendi vim habeant, perfundito, ac illinito.
- 3 Humorem qui in affecto loco continetur, ad motus exiccantibus, ac digerentibus medicamentis, vacuato.
- 4 Robur ac virtutem affectæ parti, & eam circumstantibus, addito. 30

Capita curationis eiusdem phlegmones, quando cum grauiore dolore affligit.

- 1 **V**bi inflammatio ex deffluxione orta, grauiore cum dolore affligit, doloris vehementiam citra vllam noxam leuato, mitigatoue.
- 2 Ergo quæ vehementer stringunt, aut quæ calfaciendo & humectando relaxant, ac robur resoluunt, ne admoueto.
- 3 Sed quæ quod influit, mediocriter stringendo, repellunt, & 40 quod

quod iam affectam partem obsidet, vacuant, inflammato loco adhibeto.

Spongiam acerbò vino, aut poscâ imbutam, vt fluenti hu-
moni via præcludatur, applicato.

Si hæc profecerint, & nusquam adhuc pus appareat, molli-
bus, & iis quæ aduersus fluxiones temperantur emplastris, vtor.

Ex iis autem, quæ exiccare, & fluentem sanguinem repelle-
re citra dolorem possint, tanquam optima deligito. Quale est,
quod chalcite constat, rosaceo resolutum. Deinde lanam purâ,
10 ex vino acerbò, madentem, superponito.

Vbi verò pus in parte ipsa apparuerit, semel atque iterum
supradictum cataplasma, aut potius quod ex hordei farina con-
stat, admoueto.

Si puris cuiusque crassi copia, medicamenta superet, adeò vt
nulla exhalationis seu resolutionis spes habeatur, exitum ei
quod digestionem non cedit, eo potissimum loco, quo est editis-
simum, parato.

Post sectionem, nisi dolor vrgeat, vulnus exiccato, ac citra
dolorem detergito.

Si post sectionem dolor vrgeat, cum fomentis primum, deinde
cataplasmate, mox humectante aliquo medicamento, aut salte
non siccante, mitigato.

Si verò pars adhuc inflammata sit, cataplasma ex lenticula,
quod vacuat, & repellit, imponito.

De carbunculo, gangræna & sphacelo, quas sanguineas
pustulas vocant.

CAP. VII.

30 **P**ostquam de phlegmone prima inflammationum diffe-
rentia, & nostris corporibus frequentissimè incidente,
abundè satis, quantum ad chirurgum attinet, discerui-
mus: consequens visum est, vt primum de carbone seu car-
bunculo, qui Græcis ἀνθράξ dicitur: dein de gangræna & spha-
celo (quem vulgò cum Auicennæ interprete esthiomenon ap-
pellant) dicamus. Ille enim ex sanguinea fluxione, vti & phleg-
mone, ortum habet, febremque acutissimam infert. Hæc verò
magnas phlegmonas subindè concomitari solent. Vt libello de
tumoribus præter naturam, & plerisque alijs locis Galenus an-
notauit. Itaque carbo ex influente sanguine, nigro, crassoque,
ac feculento, eodemque feruente, atque impenitè calido, nasci-
40 tur. Cui si tenues quædam humiditates admixtæ fuerint, pustule

De carbun-
culo.

ἀνθράξ.

Γαγγραινα.

Σφακέλ.

Gangræna

et sphacelus

magnas com-

sequuntur

phlegmonas.

Carbunculi

le

generatio et læ quædam ambustis confimiles, per summa cutis excitantur,
descriptio. appellaturque tunc hæc inflammatio, carbunculus cum pustula. Quod vitium sanè frequentissimè incidit. Interim tamen (licet rarò) & citra pustulam, pustulæ sue incipit: verùm omnibus
Carbunculus duplex. crustosum vlcus fit. Dixi autem, citra pustulam, pustulæ sue. Quoniam una duntaxat aliquândo pustula maiuscula cū hoc morbo
Nota carbunculi. exoritur, quæ rupta, vlcus cum crusta gignitur. Sæpè verò non
Vlcus crustosum. una tantum pustula erumpit, sed multæ exiles, veluti milij semina, crebræ in particula residentes, quibus præruptis, similiter
Pustula una maiuscula, crustaceum vlcus provenit, quale ferramenta cædentia excirant. ¹⁰
vel plures exiguae. Cæterū inter initia priusquàm pustulæ enascantur, scabūt particulā omnino. Crusta autem ipsa modò cinereum colorem,
Crustæ color cinereus aut niger. modò nigrore præ se fert, eoque loco leuari cutis non potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Circūiacens caro in summā ac feruīdā peruenit inflammationē, quā Græci phlogosin appellant, & colore nigrescit, splendetque bituminis & picis modo, veluti si plusculo rubro minus misceas nigri. Talis autē est color bilis exactæ atræ. Et hæc quidē notæ sunt carbunculi ex ipso affectu desumptæ. Quibus accedit grauis & molestus admodum laborantis particulæ dolor, perindè ac si vinculis esset ²⁰
Doler grauis. vehementer conficta. Necessariò quoque qui ita sunt affecti, febrecitant, idque etiā magis, quàm illi, quibus cryspelatosa est
Febris vehemens. phlegmone. Quod si venenositas aliqua subsit (vt ferè semper
Nausea. affolet) nausea quoque & frequenti vomitu, vnà cū omnimoda
Vomitus. appetitus prostratione miserè torquētur laborantes. Sed & cordis tremor, & palpitatio, & frequēs animi defectio illis adsunt.
Prostratio appetentia. Quod vitium tunc huius ætatis chirurgis peculiari nomine anthrax appellatur, à carbunculo quidem malignitate & venenositate (vt volunt) differens. Cū tamen ἄνθραξ Græcis sit
Cordis tremor. idem, quod carbo, vel carbunculus Latinis. Proindè superuacuum est, eorum signa & curationem (quod ferè omnes chirurgi faciunt) distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertrastare. ³⁰
Animi deliquium. Cæterum carbunculi ipsi ex causis populatim grassantibus, magna ex parte oriuntur, & pestiferam luem consequuntur. Quocirca diligenti animaduersione circa eos opus est, tātum abest, vt negligi debeant. Porro tamen si ἄνθραξ, seu carbūculus omninīs morbus sit acutus, periculosus & cōtagione inficiēs, omninū ⁴⁰
Carbūculus qñ maximè lethalis, sumpto à loco tamen periculosus est Auicēnæ, & maximè lethalis, qui in emūstionis, & prope mēbra principalia enascitur. Timendū enim est ne ad interiora & partē aliquā principē materia hec venenosa, quæ ⁴⁰
car-

carbunculū excitauit, subito recurrat. Quod si acciderit, in maximo vitæ discrimine ager est præsertim si mala aliquot signa se prodiderint. Quin sola illius putida; & plusquam lerneo tin-
 cta veneno exhalatio, sufficiens est hominem enecare. Si cir-
 ca stomachum, siue cesophagum, faucē siue incidat carbuncu-
 lus, subito (vt ait Celsus) spiritum saepe elidit. Minus lethalis est
 carbūculus, Auicennæ, qui primum ruber, deinde citrinus appa-
 ret. Qui verò luescit, aut nigricat, neminem ferè non iugulat.
 Nullus tamen ex sua natura non periculosissimus censeatur. Si
 accidētia quæ morbū hūc comitari solēt, plurimū remittātur,
 spes aliqua nobis promittitur. Si verò magis atque magis sem-
 per intendantur, & vehemetiora fiāt, tū planè est desperandū.

De curatione carbunculi.

Carbunculi curationem (supposita conuenienti victus ra-
 tione) statim ab initio (si nihil obstitit ex iis, quæ
 venam incidī vetant) auspicandam esse à sectione venæ Gale-
 præcepit lib. metho. meden. 14. & secundo ad Glauconem: vult-
 que sanguinis vacationem, ad animi defectionem vsque fie-
 ri. Quippe quæ plurimum commodi hoc vitio laborantibus fir-
 allaturā, idque perpetuū est obseruandū, vt vena è directo per-
 tundatur. Venæ autē secundæ electio ex laborante particula
 (vt in curatione phlegmones dictum est) nobis indicatur. Quo
 circa ea in re consulendus est à chirurgo peritus aliquis medi-
 cus, qui vnde, & quatenus sanguis mittendus sit, probè nouerit
 definire. Secta vt decet vena, si nihil, vt dixi prohibuerit, alie-
 num non fuerit eiusmodi tumorem scarificare, plagis quidem
 (ob instantis succi crassitudinem) satis profundis: nempe quæ
 mediocribus (vt Galeno visum est) sint altiores. Sunt qui præci-
 piant ipsos scarificatus in crustaceo vlcere duntaxat esse facien-
 dos. Ipsas verò incisiones aqua salia calente statim perfundunt,
 ne in illis sanguis coëat, concresecatue, sed foras egrediatur. In-
 terdum etiā erodens aliquod medicamentū imponit, cuiusmo-
 di est arsenicum, quod in ea re inter cætera primatum obtinet.
 Quidā verò loco scarificato sanguifugas admovent. Cæterum
 laboranti particulæ (tamen quod ad inflammationē spectat,
 refrigerantia desideret) valde repellētia haudquaquam admo-
 ueri debēt. Nec enim eiusmodi fluxionē, propter humoris cra-
 sinē, atque etiā malitiā auertere poteris. Et si quādo id feceris,
 aliud quippiā (vt Galenus ait) quod in alto sit corpore offendes.

Atqui

affecto iudi-
cio.Aliud iudi-
cium à loco
affecto.Iudicium à
colore.Iudicium ab
accidentibus.Carbunculi
curatio à sē-
guinis mis-
sione statim
auspicanda.Vena è direc-
to secunda.Scarificatio-
nes profun-
de.Perfusio ex
aqua salia
calente.

Arsenicum.

Sanguifuga.

Fluxionē in
carbunculo

nec auerti

posse, nec de

bere, lib. 14.

Th. 17p.

Cataplas-
mata carbū
culo idonea.

Atqui nec affatim affluere is humor, ipso Galeno autore, per-
mittendus est. Inquirenda igitur remedia sunt, quæ cum modi-
cè reprimendo, etiam digerere seu dissipare possint. Tale profe-
cto est cataplasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod
ex bis cocta lente constat. Sed hic admiscenda nobis erit mi-
ca panis, qui furno sit coctus. Esto autem panis (ex Galeni con-
silio) nec omnino à fursure purus, nec nimium eius habens. Hu-
iusmodi autem cataplasma recentioribus appellatur emplastrū
de arnoglossa, cuius forma apud eos est talis: arnoglos-
sæ silentium, panis furnacei, singulorum partes æquales, coquan-
tur in aqua. His gallas addidit Auicennas, qui & ad eandem in-
tentionem probat emplastrum, quod constat duobus malis gra-
natis, coctis in aceto, aut aqua acetosæ. Et hæc quidem tum
parti ipsi laboranti, tum circumiacentibus imponunt. Huic sen-
tentia accedit & Paulus Aegineta, inquit, Vt radicitus car-
bunculos diuella, dirimasque ab adiacentium commercio, ma-
lum Punicum acidum minutatim coctum in aceto coques: ubi
autem intrabuerit, in lauiorem deteres, linteoque illitum indu-
ces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis auellanae vete-
ris, vel etiam non veteris medulla, carbunculos maturat, rum-
pitque. Opimum autem etiam fuerit perpetuo circumiacenti-
bus ipsis partibus vnguentum ex bolo Armenia, rosaceo, vel
myrtaceo oleo, & aceto confectum, inducere: ne scilicet intro,
qui iam fluxit humor, recurrat. Sunt qui virus ipsum, & mali-
gnum humorem in pestilenti carbunculo, fuctu, cucurbitulis,
& medicamentis attrahentibus ad locum carbone obsessum euo-
cant & alliciunt. Quod sanè & faciendum consuluerim, si ar-
tus, & minoris notæ partes, ἀνθραξ occupet, & pigre moueatur
fluxio. Si verò validè, atque affatim valde irruat, modicè reprimen-
tibus (vt modò ex Galeno adductum est) infrenandus vt-
cunque est fluxionis impetus, ne scilicet ingens nimis dolor ex
fluxione tam valenter irruente in laborante particula excite-
tur, atque ita malum exasperetur. Super ipsum verò vlcus cru-
stosum, ubi præcipue membrum putreht, valens aliquod medi-
camentum, & quod vehementer exiccet, non autem quod con-
coquat, & pus moueat (quando ita putredinem particulæ foue-
ris) imponendum est. Cuiusmodi est Andronis, Musæ, Passonis,
vel Polyide: diluique id vino aliquo dulci, vel sapa, ad sordium
crassitudinem debet. Cataplasma etiam, quod ex orobi fari-
na, & oxymelite constat Galeno, rectè apponitur, ubi vlcus ma-
lignum

~~micapans~~

Emplastrū
de arno-
glossæ.

Emplastrū
ex malis Pu-
nicis.

Paulus.

Medulla nu-
cis auellana
carbunculos
maturat, et
rumpit.

Auxilia at-
trahentia vi-
rus.

Quid super
vlcus crusto-
sum imponen-
dum.

Cataplas-
ma ex orobi
farina & o-
xymelite.

tur, atque ita malum exasperetur. Super ipsum verò vlcus cru-
stosum, ubi præcipue membrum putreht, valens aliquod medi-
camentum, & quod vehementer exiccet, non autem quod con-
coquat, & pus moueat (quando ita putredinem particulæ foue-
ris) imponendum est. Cuiusmodi est Andronis, Musæ, Passonis,
vel Polyide: diluique id vino aliquo dulci, vel sapa, ad sordium
crassitudinem debet. Cataplasma etiam, quod ex orobi fari-
na, & oxymelite constat Galeno, rectè apponitur, ubi vlcus ma-
lignum

De Tumoribus præter naturam. 49

lignum & cum putredine fuerit. In communi autem vsu est vnguentum vulgò Aegyptiacum nominatum. Quòd si hæc parum proficiant, ad acriora, & quæ ignis vires habeant, deueniendum erit. Cuius generis sunt, radix dracunculi, vel aristolochiæ, ex aceto trita, & imposita, calx, arsenicum, & sandaracha, & alia huiusmodi, quæ nõ aliter, quàm ignis adurant. Hæc proficiunt satis, si protinus à viua corruptam partem resoluant. Quo facto, quicquid corruptum est & emortuum, protinus auellere & radicibus extirpare oportet. Cum autem sub ipsis erodentibus medicamentis sequatur crusta, vndiq; à viua carne diducta, vulnus quidè, quod ex eis excitatur, vt cætera adusta curandum est. Cæterum cum extremis morbis (vt inquit Hippo.) exquiruntur extrema remedia optima sunt, cogimur aliquando (videlicet malo medicamentis) malignum carbunculum, cauterio, vt vocant, astrictum, hoc est, candente ferro extirpare. Finis autè adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est, vt rectè Celsus admonuit. Post hæc crusta vlceribus inducitur, auxilijs ad id accommodis, resoluenda est. Quòd si adustionem laborans pati recusauerit, aliquis ex humili plebe adhibendus est, qui carbonem ipsum medicus apprehensum radicibus euellat. Quales olim erant Psylli in Italia nominati, qui vulnera ex morfu serpentum illata, innoxie exugebant. Porro auulso sic vel quomodocunque absumpto carbunculo, sinus, cessante iam inflammatione, primùm detergeri, deindè iam purus factus, implentibus medicamentis (quæ Græci synulotica vocant) curari debet. Vbi verò iam penitus fuerit impletus, nec amplius quicquam illi cauum remanserit, ea quæ cicatricem inducunt, similiter reliquis vlceribus adhibere fuerit tempestiuum. Horum autem omnium materia ex antidotario & tractatu de vlceribus requirenda est. Cæterum si non admodum sæuiat malum, nobisq; aliquas dederit inducias, maturatur, & aperitur Auicennæ, ad moris sicubus, fermento, & sale adinuicem mixtis. Vbi autem bis vel ter appositum fuerit huiusmodi emplastrum, locus omnino niger & dehiscent apparere solet. Atque tunc mundificatio ex apio locus detergendus erit. Medicamen quoque ex vitellis ouorum & sale confectum, si sæpius admoveatur, maturat & aperit carbunculum, vt scribit Theodoricus. Ad eundem finem in communi vsu est hodie emplastrum ex melle, sale, triticea farina, & ouorum luteis compositum. Consolida maior (quod Græci symphyton appellat) inter quos lapides contrita, diuino quodam (vt referunt)

Vnguentum
Aegyptiacum.

Adurentia
medicamenta

Quando adu-
sionem pro-
perandum.
Finis adu-
rendi.

Psylli. ~~medici~~
Auulso vel
absumpto
carbunculo,
quid postea
agendum.

Maturati-
uum Auicennæ.

Mundificati-
uum ex apio.

Emplastrum
vulgare o-
ptimum, quod
vsurpat in

Parisiorum runt) miraculo anthracem sanat , & ex toto intra diem vnum
Nosocomio. interimit, ita vt nulla amplius deinceps curatione egeat, præterea
Consolida quàm ea quæ communis est alijs vulneribus. Miranda etiam
maior. narrant alijs de scabiosa: nempe quòd comesta vel ex vino pota,
Scabiosa. internos tumores ad exteriora protrudit, & insensibiliter dissoluit, discutitque.

Quæ crustas vlceribus resoluunt.

*Emplastrū
 escharam re
 soluens.*

Crustas huiusmodi carbūculi vlceribus resoluunt, butyrum
Creceus. axungia porci, & alia id genus pingua. Ad id etiam ¹⁰
 mirè proficit subsequens emplastrum. Nam præterquàm quòd
 escharam, id est, crustam, citius multò quàm prædicta resoluunt,
 dolorem etiam ab acris & adurētibus medicamentis, vel can-
 dente ferro excitatum, demulcet: atq; malignum ipsum succum:
 qui carbunculum creabat, potenter disc utit. Habet autem fari-
 næ triticeæ & hordeaceæ, singulorū vncias tres. Ex quibus cum
 decocto maluarum, violarum, & radicū altheæ fir solidum
 emplastrum, addendo butyri, & axungie suillæ liquefactæ sin-
 gulorū vncias duas, vitellos quoque duorū ouorum, qui adijci
 debent quando ab igne remouentur: atque hæc omnia rursus ²⁰
 cum radice & folijs prænominatis, diligenter contusis, & sub-
 actis, ac per incerniculum cretis, adinuicem miscenda sunt. Vi-
 ctus ratio, epithemata, opiatæ, & alia id genus, quæ cordi ro-
 borando dicata sunt: Item vacuationes, si quæ necessariæ sint,
 ad diætericem & pharmaceuticem omninò pertinent. Quare
 in ijs administrandis peritus aliquis medicus erit consulendus.
Theriace. In communi autem vsu est apud omnes theriace, quæ ad fabæ
 magnitudinem exhiberi solet, ex aqua scabiosæ, vel si febris ad-
 sit admodum acuta & vehemens, ex aqua rosacea, vel buglossi:
 debetque à laborante assumi sex horis à pastu. Cæterum quo- ³⁰
 niam superius facta est metio de trochiscis Andronis, Polyidæ,
 Pasionis, & Musæ, quos tantoperè celebrat Galenus, non aliq-
 num fuerit eorum descriptionem hîc subijcere.

Andronis trochiscus hæc recipit.

CYTINORUM, id est, florum seu capitulorum mali Gra-
 nati, drachmas decem, aluminis scissilis drachmas quatuor,
 chalcanti drach. duodecim, myrrhæ drachmas quatuor, thu-
 ris, aristolochiæ, gallæ, singulorum drachmas octo, salis ammo-
 niaci drachmas quatuor.

Polyidæ sphragis pastillus hæc continet.

Mali.

De Tumoribus præter naturam.

¶

MALICORII * pondo sex, myrrhæ * pondo octo, aluminis scissilis * pondo quinquē, thuris * pondo quatuor, chalcanti * pondo trium, fellis taurini * pondo sex: vino dulci excipiuntur.

Polyida pastillus alius.

ALVMINIS scissi pondo denarium trium, thuris pondo denarium quatuor, myrrhæ tantundem, chalcanti pondo denarium duum, cythorum pondo denarium duodecim, fellis taurini pondo denarium sex, aloës pondo denarium octo: vino austero excipiuntur.

Muse trochiscus hæc habet.

ALVMINIS scissi, aloës, myrrhæ, chalcanti, singulorum pondo * sex, croci, crocomagmatis, singulorum pondo * tres, cytini pondo * quatuor: melle ex talerno facto assumuntur.

De gangrena & sphacelo.

Gangrenas nominat Galenus libro 2. ad Glauconem, eas quæ ex magnitudine inflammationis huius mortificationes, nondum tamen integrè factæ sunt, & iam confirmatæ. **Enur** mali tanta vis est ac tyrannis, ut nisi celerrimè succurras, facile affecta pars mortis habitum repræsentet, hoc est, promptissime, vitæ, sensus & motus extinctionem contrahat. Vbi vero membrum sic vitiatur, & languens, in totum sensu fuerit destitutum, ac omnino emortuū, ita ut percussum, vel sectum, vel adustum, non sentiat quæ patitur, affectū hunc non iam amplius gangrenam, sed sphacelon Græci nominant. Latini verò syderationem, recentiores esthiomenon appellant: quod nomen etiā ad gangrenam extendunt. Avicenna autem esthiomenon vocat, quando ad partes continuas transit corruptio, quo nomine in re alia videntur Græci. Quidam affectū hunc modò herpetæ esthiomenon, modò cancerum ulceratū nominant. Accidit autē hic affectus etiam ossibus, cum caro ipsis circumdata ac circumfusa terros gignens ichoras, id est, depravatā saniem generans, hoc terro viru ea imbuerit, ac foetidissima putrilagine cōsumpserit. Cum itaq; membrū ita ex toto, vita, sensu, motuq; privatū apparuerit, confectum ad viuū vsque, quā proximè sanæ parti erit resecandum. Itaque differt sphacelus à gangrenā, quod ille ossibus etiam (ut dictum est) innascitur: nedum carni & vasibus: hæc verò ossibus non adueniat: vna tamen species sphaceli est, sed proprium nomen & singulare præter commune sortita.

*Quod sic
* scellatum
decussatur.
nota est de
nary, quæ p
drachma hic
ponitur.*

*Gangrena
quid, et unde
ortum habeat.*

*Gangrenas
pestis ty-
tannus.*

Sphacelus.

*Ossium syde-
ratio.*

*Syderatum
membrū con-
fectum reuo-
candum.*

*Ignis sancti
Antony.*

*Mortifica-
tionis causa*

*Quæ mēbri
missionem
dissoluunt.*

via Simonom

*Signa gan-
græne &
sphaceli.*

*Iudicia,
Lib. 4.*

Huiusmodi absolutam partis affectæ corruptionem, sensum pe-
nitus auferentem, vulgus Gallicum appellat ignem Sancti An-
tonij, aliàs Sancti Martialis. Alij verò (vt diximus) herpeta,
esthiomenum: alij cancrum vlcerarum vocant. Accidit autem
trifariam eiusmodi membrorum mortificatio, seu vitæ in mem-
bris extinctio, ac destructio. Vno modo, quando membrum non
amplius potest recipere vitam sibi à corde per arterias transmis-
sam, propter dissipationem seu dissolutionem mixtionis atque
harmonia ipsius laborantis membri. Dissoluitur autem ac de-
perit mixtio atq; harmonia partis, vel ob nimiam frigiditatem, 10
vt aliquando cōtingit per hyemem validam atq; asperā: vel ab
immoderata, & inconsultē ac temerē molita inflammationum
refrigeratione: aut ab excedenti ac supra modum vehementi ca-
liditate, & venenositate inflammationum ac malignarum (vt
vocant) pustularum. Altero modo gangrænā & sphacelū fieri
contingit, quando vita in membro recepta præfocatur, atq; ex-
tinguitur, vt nonnūquam euenit in magnis inflammationibus,
quæ ita interdum venas, arterias, & poros cutis obturant, con-
stupantq; vt spiritus ibidem, prohibita in rotum effluuij vapo-
rosi transpiratione, & aeris externi attractione, strāguletur, sus-
foceturq; 20
Tertio modo, hæc mortificationes & vitæ extin-
ctiones sunt in membris, quando prohibetur transitus atq; in-
fluxus vitalis spiritus, à corde ad membrum aliquod: idque vel
propter vehemētē ligaturam, vel contusionē aliquam in vijs,
ac meatibus ipsis, per quos defertur spiritus, factam. In summa,
gangrænā & syderatio, quam Græci necrofin, & sphacelum vo-
cant, nostris corporibus accidunt, vel denegata parti virali fa-
cultate, vel natiuo eius corporis calore, ac temperie pereunte.

Cæterū signa gangrænæ & syderationis, Galeno in opuscu-
lo de tumoribus præter naturam sunt hæc. Primū quidem illud 30
coloris floridū, quod phlegmonis, id est, inflammationibus ad-
fuerat, in ipsis extinguitur. Deinde dolor & pulsus seu pulsatio,
hoc est, arteriarum motus ipsi ægro sensibilis, recedunt, non fi-
nira adhuc dispositione, verū sensu iam emortuo. Vnde mem-
brum mox nigrū conspicitur, molle quoque & putridū, fetorēq;
expirans, cadauerosum efficitur. Quo fit, vt cū præmitur
digitis, facilē cedat in profundū, nec postea reuertitur aut resi-
lit, imò apparet cutis à carne sciuncta. Hæc autē partis affectæ
mortificatio, quam Græci gangrænā appellāt, tantæ est (inquit
Paulus) scroctaris, vt nisi quis rupta omni mora præsentissimas 40
iuletis

tulerit suppetias, laborans particula facile emoriatur, & vicinas fedes inuadat, ac hominē ipsum ingulet. At si (vt refert Celsus) Lib. 5.
nondum plane tener, sed adhuc incipit, eam curare non difficilimum est, vtiq; in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nervi vel laxi non sunt, vel leuiter affecti sunt. Vbi verò penitus insedit hoc malum, & iam in sphacelū abiit, insanabile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

*De curatione gangræne ex magnis inflammationibus genite,
& sphaceli ex gangræna creati extirpatione.*

10

Cum sanguinis copia gangrænam generet, eius curandi ratio statim auspicanda est à copiosa corrupti sanguinis, qui in membro laborante compingitur, vacuatione. Sed interim negligi non debent, quæ ad dieteticam, pharmaceuticam, venæ sectionem (si necessaria fuerit) & cordis tutelam pertinere videbuntur, pro quibus cōsultendus erit chirurgus peritus aliquis medicus, qui omnia probe, & vt res exigit, norit institere. Fit autē largi illa sanguinis ita impacti (cuius occasione fiunt mortificationes) ex parte affecta emissio, vel vena incisa, si quæ amplior, ac turgens circa eandem partem conspicitur, vel cute vniuersa partis affectæ, vnā cum subiecta substantia, excisa, vel pluribus & altis scarificationibus diuisa. Alij ad eundem finem sanguisuga admovent, & venas minores proximas aperiunt. Verū profundæ illæ ac frequentes sectiones aut scarificationes, multo sunt ad eius mali curationē efficaciores. Cæterum pro affectus magnitudine, vel maximæ sectiones sunt, vel incisiones (quas scarificationes appellamus) vtræque frequentes, illæ, vbi putredini vicinior malū est: hæ, vbi tantū putrescere incipit. Quo enim vitium maius est, eo maior remediū, vt cuique constat, indiget.

30

Vbi autem abunde sanguinem ex altis illis plagis emanare permiseris, locus aqua salia abluendus erit, vt sanguis rarior, & qui alioquin ibidē cōcresceret, foras egrediantur. Deinde medicamentū aliquod putridis consecratū, id est, quod putrefactione prolibeat, ac resoluat, induci debet, quale est farina orobi, aut selij (quod Franci iuriam, q̄ vini modo remulcentiam cōcitet, appellat) aut si harū facultas non sit, sabacea ex oxymelte, vel syrupo acetoso. Vtile etiā fuerit, locū scarificatū in die aceto calente, sed multo præsertim lauare. Hæc enim sua siccitate sanient & putrilagine absumant, eamq; detergunt: frigidityte vero, quod nondū vitiatum ac corruptū est, à putredine vindicant.

Corrupti sanguinis vacuatio.

Post scarificationem locus aqua salia abluendus.

Medicamentum putridum consecratum.

De aceto

*Vnguenti
Aegyptiaci
viti.*

Vbi verò iam ipse veluti feruor subsederit, ac mali furia sese remiserit, vnguentum id, quod vulgò Aegyptiacū appellatur, ex flore aris, alumine, melle & aceto, ad æquas portiones mixtis & coctis compositum, superimponendū erit. Hoc enim putrefactionem prohibet, ac resoluit, putrefactum quoq; ad corruptū ab integro & sano adhuc dirimit, & decidere cogit. Deniq; crustam inducendo, quod sanū est, conseruat, ac tuetur. Quod si valentius atq; efficacius medicamen velis apponere, sale predictis adijce: aut si malum magis adhuc increuerit, aliquem ex trochiscis paulò antè memoratis exquisitissimè tritum aceto & vino dilutum, vrpote vel Andronis, vel Polydæ, vel Musæ, vel Passi-
19
nis, vel vnam ex ijs qui in antidotario dicuntur, calidicorū, alda-
ron, & ex asphodelo, qui ob suam vim causticam corruptum à sano dirimit. Probatum in ea re ante omnia arsenicon quod vo-
cant sublimatum, purum, aut correctū, idq; vel in puluere, vel ex vino dissolutum, & linamento, aut xylō, quod Galli cotoneem
appellant, exceptum, inter sanum & corruptum applicatū. Hoc enim confestim malum sistit, & id quidem sine dolore. Quod si
necessitas exigit, spatula vel specillo separandum est sanum à
corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhibendis, vt res
21
securius tractetur, attentos sedulo nos esse oportet circa naturā

*Lib. 2. ad
Glauco.*

corporis ægroti, sicuti rectè nos Gal. admonuit, inquit, si cor-
pus rusticū fuerit & durum naturā vehementiora desiderat me-
dicamenta: femineū vero, & molle carnē habens, imbecilliora.
Infantes quoq; vel pueri, & quicūq; inter viros & balneas amat,
& in otio degunt, mollia exigunt medicamina. Consideranda
intuper est partū, quæ malè affectæ sunt, pedum corporis totius.
Naturæ quando abicindis, aut circūcidis id quod iam computruit.
Quædam enim sunt, quæ citissime ad putredinem veniunt, si
negligenter curentur: aliæ verò tardiusculæ. Quædā nem medi-
camen vires ac beneficia tardius, sentiunt, aliæ citius. Porro si
nihilò magis malū his causiis medicamentis constiterit, vti id
quod est inter integrū, ac vitiatū locum, debet. Solent verò hæc
auxilia omnia, nihil interdū præficere, atq; tunc vnicū: ramentū
(vt Celsus ait) miserū auxiliū est membrū quod paulatim emor-
ritur, abscondere, vt cetera pars corporis tuta sit. Nam quod co-
putruit, veneni in modū suo contactū, quod adhuc sanum & in-
tegrum est, inficit, & corrumpit. Si quando autē putrefactū hu-
iusmodi atq; emortuam partē abscederis, vel quod in membro
quopiam computruit vsq; ad sanū corpus concideris, eam quæ
veluti

*Vt q̃ quan-
da adhibēda
si gangre-
na in sp̃ha-
celū abierit.*

- veluti quædã radix est, sanæ atq; integræ parti adiunctam, ob maiorē securitatē, ex Galeni consilio, candenti ferro adurere conuenit. Ita enim celeriter sanguinis proflumiū compescēs, & putredinē arcebis. Facta verò aduisione, porri succo, vel (vt Paulus ait) sale cum porro vtendum est, vel aliquo ex ijs, quæ paulò antè diximus. Hæc enim siccant, & stringunt putredinem, atq; humorū affluxū prohibent. Vbi verò tibi videbitur his remedijs adhibitis cessare putredo, vt crustæ citius decidant, cataplasmate vtendū est ex pane vel hordeacea farina, vel triticea ex hydreleo incocta. Itē medicamento, quod cephalicum vocant, ex melle illitum. Hæc enim detergendo, crustam à subiecta carne resoluunt. Quinetiam medicamentū, quod tetrapharmacū dicitur: præterea & Macedonicum, pus mouendo, ac emolliendo, crustas à subiectis corporibus diducunt. Quemadmodū & reliqua omnia, quæ ad suppurationē perducūt. Hæc enim præterquā q̃ emolliunt, pus sub crusta conficiūt, quod eam resoluit, scilicet inter carnē subiectā & crustam ipsam interiaccens. Panis quoq; cum apio tritus, aut ocymo, optimè crustas à sanis partibus citra erosionem detergendo, detrahit. Sic & iris, vel radix
- 20 panacis, vel aristolochiæ, vel acori cum melle. Solent autē vlgō ad crustas resoluendas vti butyro, aut alio quouis vntuoso. Vbi verò crusta exciderit, locum aceto abluunt, postea sequens emplastrū admouent, quod ad Guilielmum à Saliceto refertur. Recipit autē mellis sēlibram, vitellos ouorū crudos tres, aut quatuor numero, farinæ hordei sēlibrā: hæc miscentur in formam emplastri. Post biduū verò vel triduum, vt melior fiat mūdificatio, huic emplastro addi possunt drachmæ decē myrrhæ electæ. In teneris autē corporibus ad escharæ separationē, & sordiu detersionem, abunde sufficit Galeno orobi farina cum melle, vel
- 30 thure. His rite peractis, huiusmodi vlcera ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem producant, & cicatricem inducant: slynulonica, & epulonica Græci vocant.

Capita curationis gangrena & sphaceli.

Vitiatū sanguinē in affecta parte impactū affatim vacuato. 1
Post scarificatus aut sectiones, locum affectum aqua sal- 2
sa abluito.

Deinde medicamentum putridis consecratum inducito.

Vbi mali furia se remisit, vnguentum Aegyptiacum su- 3
perimponito.

*Lib. 2. ad
Glauc.*

Lib. 4.

*Crustas à
partibus
exustis sol-
uentia.*

Butyrum

*Emplastrū
Guilielmi à
Saliceto.*

*Lib. 2. ad
Glauc.*

- 4 Si malum ijs remedijs non cesserit, id quod inter vitiatum & integrum est, ferro candente adurito.
- 5 Quod si hæc omnia nihil profecerint, & iam gangræna in sphacelum degenerauerit, membrum quod sic plane emortuū fuerit, usque ad partem sanam, ita ut nihil prorsus putridi relinquatur, ocysissime abscindito.
- 6 Vbi quod computruit rescueris vel amputaueris, quò securius mali radicem euellas, ferramenta igne flagrantia adigito.
- 7 Post exustionem porri succum, atque alia id genus, quæ siccant, stringunt, & fluxionem arcent, admoueto. 10
- 8 Crustam vel medicamentis adurentibus, vel ignito ferro inductam, à subiectis corporibus resolvere (solet enim inde sanguinis profluuium sequi) ne properato.
- 9 Cum putredo cessauerit, nec amplius sanguinis profluuium reformidaueris, ea quæ crustam detrahunt, applicato.
- 10 Vbi crustæ exciderint, curationem reliquis viceribus communem adhibeto.

Qui sequuntur aphorismi, ad medicum pertinent.

- 1 **V**ictum tenuem, & refrigerantem, gangræna & sydera- 20
tione, id est, sphacelo laborantibus insituito.
- 2 Fluxionem sanguinis missione, si nihil obstitit, auerito:
atque eadem plenitudinem (si adfuerit) vacuato.
- 3 Medicamento quod catholicon appellatur, vel nigra cassiæ
fistularis medulla, ad hæc tamarindorum, lupuli, ac fumarie de
cocto, sanguinem mundificato, depuratoque.
- 4 Theriacam, atque id genus alia, quæ cor vitæ fontē ac prin-
cipium, à putridis, & graucolentibus illis, à parte vitiosa subla-
tis effluuijs, tuentur, laboranti sumenda exhibeto.

De erysipellate, & alijs tumoribus à bile creatis.

CAPVT VIII.

*Pituita in
humorū ge-
neratione
sanguini
proxima.*

T Amersū phlegma, quod Latini pituitam vocant, in ge-
neratione humorum, sanguinem consequatur, maior-
que eius humoris portio sit in corpore secundum san-
guinem, quam aliorum humorum: quia tamen tumo-
res præter naturam à bile procreati (quæ apostemata cholerica
communiter vocant) in valde multis conspirant cum sangui-
neis: consequens est, post determinationem phlegmones, & alio-
rum qui à sanguine sunt, tumorum præter naturam consisten- 40
tium,

- tum, de ijs nunc dicamus, qui à bile excitantur, & nomine qui dem communi erysipelata vocantur Græcis, Latinis verò antiquioribus ignes sacri. Est igitur erysipelas biliosa fluxionis germen, circa cutim vtramque maximè consistens, & eam scilicet, quæ foris est, omnium partium cōmune regumentum: & membranosam illam ac tenuem, quæ singulis internarum est circumdata. Nonnunquàm verò & aliquid quoque subiectæ sibi carnis occupat, sicuti & phlegmone (quæ fluxionis sanguineæ soboles est, in carnosa corpora maximè incidens) etiam cutis ali-
- 20 quid apprehendit. Itaque cum flava bilis verè tenuis, vel sanguis feruens & consistentia tenuis (qui recentioribus cholera dicitur naturalis, Galeno verò *χολα φαινή*) per solam cutē diffusus fuerit, nihil inferiorem carnē molestant, particulam tamē in tumorem aliquantum attollens, cum inflammatione & rubore in flauum elanguescente, ac protinus ad tactum evanescente: affectus hic priuatim ac propriè Galeno verum atque exquisitum erysipelas nuncupatur. Hoc autem vnius rationis est, seu (vt dicunt) vniiforme, & absque vlceratione incidit. Auicennas spinam vocauit. Cum verò amaræ bilis succus crassior acior-
- 20 que, quàm pro naturæ modo redditus fuerit, summam cuticulam (quam epidermidem Græci vocant) exulcerat, exoriaturque atque aliquando cutis exulceratio spacio temporis ad profundū peruenit, ita vt inferiorem seu subiectam carnem attingat. Nuncupaturque tunc eiusmodi affectus etiam erysipelas, sed cum vlceratione quod (Galeno autore) eiusdem generis est cum herpete. Verum enimverò, si nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio sit, sed ex ambabus mixta, non iam tantum erysipelas, sed dispositio permixta erysipelate atq; inflammatione nominatur Galeno. Ab eo autem quod in mixtura exuperat, nomen vitio-
- 30 indetur. Etenim vbi sanguis præcellit, phlegmone erysipelatosa dicitur. Vbi verò flava bilis præpoller, erysipelas phlegmonosum appellabitur. Verum vbi neutrum vincit, & æqualia vtriusque apparuerint accidentia, tunc vitium id phlegmones erysipelatosque medium vocabitur. Iam verò & aliarum mixtionum similis vique erit interpretatio: nempe si multa bilis, paucum humori pituitoso aut atrabiliario remisceatur, erysipelas cedematosum, vel scirrhosum dicitur. Fortò cum simpliciter bile dicimus, vel biliosum humorem, more Galeni & aliorum Medicorum, nos pallidam bile seu flauam, & amarā, non autē acidā &
- 40 nigram, inaudimus. Hæc autem naturalis cholera, & certa alijs nomi-

Erysipelas
quid.Erysipelas
exquisitum.

Spina.

Erysipelas
cum vlceratione.Erysipelas
non legitimū
Erysi. species.Phlegmone
erysipelatosa.

Erysi. phlegmonodes.

Medium vitium.

Bile.

*Bilis flama
duplex.*

Naturalis.

*Non natu-
ralis.*

*Bilis duobus
modis deficit
à sua natu-
ra.*

*Vitellina ex
meracabile.*

*Bilis porra-
cea.*

*Aeruginosa.
Crocea bilis.*

*Vitellina,
ex admixtio-
ne pituita.*

*Auicenn.
Halyab.*

*Porracea bi-
lis quomodo
signatur.*

*Quatuor in
flamationū
differentia,
ex flama bi-
le oriuntur.*

nominaur, ex sanguine quidem tenui & feruente generationē obtinēs. Atram verò bilē nunquā absolute bilem nominamus, sed semper cū adiectione humoris, appellationi colorē adiungentes. Est igitur bilis, quæ χολη Græcis dicitur, vulgò autē cholera, humor calidus & siccus, ex tenuiori & calidiori parte chyli, vel ex sanguine tenui & feruente, vt modò diximus, procreatus. Hæc autem duplex est iuxta naturæ rationem diuisionem, naturalis scilicet, & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & siccus potestate: substantiā quidem tenuis, colore verò flauus, aut ruber, declinans ad quandam citrinitatem seu flauitiē: sapore verò exactē amarus, nō autē acutus siue acris, vt quidā male affirmauerūt. Non naturalis verò, bilis dicitur, quæ à prædicto humore verè bilioso degenerat, intra terminos tamē suæ latitudinis cōtinetur, quos si egrediatur, non iā bilis, sed alius humor reputabitur. Hoc autē (bilem in quā egredi limites suæ latitudinis) cōtingit bifariā: vno modo (vt sic dicatur) per se, & in se: Altero modo, per admixtionem. Per se, & in se adhuc dupliciter: Vno modo, quādo bilis illa naturalis putrescit, & aduratur, & talis dicitur adusta per putrefactionem. Altero modo, quando bilis non naturalis vitellina dicta, igneo calore percoquitur in hepate, aut in ventriculo, aut in venis, & efficitur porracea, quam etiam prasinā vocāt, vel æruginosa, quæ extremē quidē male sunt. Per admixtionē verò bilis efficitur nō naturalis, seu præter naturam, cū alius humor illi extrinsecus accedit. Et hoc quidem fit multifariā. Nempe si phlegma tenue & aquosum illi admiscatur, citrina seu crocea efficitur, si crassum & viscosum, vitellina: si verò melacholia adusta illi permiscetur efficitur bilis adusta per admixtionē. Et sic iuxta Auicennę placitū, sex sunt species bilis nō naturalis. Apud Halyab. verò quatuor dūtaxat. Nullam enim prorsus mentionē fecit de duabus speciebus adustis. Galeno autē lib. 2. de virtutibus naturalibus, nulla bilis præter naturā esse dicitur, præter vitellinā, quæ ouorū vitellis, rū colore, tum crassitudine est adfinitis. Siquidē porraceā & æruginosā ex prauis ac corruptis humoribus, propter quorundā esculentorū aut olerū cruditatem, qualia sunt, betā, cepa, brassica, sæpenuerò in ventriculo aut generari. Atq; etiā interdū talibus nequaquā ingessis, ratione ægritudinis, aut male alicuius dispositionis in venis ipsis generatur. Ex ijs itaq; colligitur, quatuor species seu differentias inflammationū (quæ vulgus cholericæ apostemata vocat) ex bile ipsa generari. Nēpe ex 4
bile

De Tumoribus præter naturam.

59

bile vera, sincera, & laudabili (quam tenuem feruētēque sanguinem appellamus) procreatur ea species inflammationis, quæ Galeno verum atque exquisitum erysipelas appellatur, lib. 2. ad Glauconem quod tanquam cutis solius passio est. Græcè autē *ἐρύσιπελας* nominatur. Ex bile verò nō naturali, & aliis humoribus permixta, tres aliæ nascuntur differentiæ, utpote erysipelas phlegmonodes, erysipelas œdematodes, & erysipelas scirrhus, seu scirrhusum. Ex bile autē quæ præter naturā ex aduisione facta est, pro ratione tenuitatis aut crassitici, substantiæ

Verum erysi-
pelas.

Tria erysi-
pelas illegiti-
ma.

- 10 ipsius generantur, vel herpes esibiomeni, id est, exedentes (qui eiusdem generis sunt cum erysipelatis, quæ cum exulceratione incidunt) vel phagedæna (quæ cum cute pariter subiectā carnem altius erodunt) & exulceranti cācri, aliæque eiusmodi erodentiæ, & cacœthæ, id est, maligna vlcera, quæ pustulæ corrosivæ recentioribus chirurgis dicuntur. Itaque tenuissimus quidē in eiusmodi humoribus, est is, qui vlceratum herpetem excitat: crassissimus, qui cancrum. Proximum deinceps locum occupat: quod ad crassitudinem attinet, qui phagedænas creat, ut libro 14. methodi medendi Galenus annotavit. Causæ verī erysipelatis
- 20 vñ & phlegmones veræ, sunt tres. Pregressæ, quæ & primitivæ dicuntur: antecedentes, & coniunctæ. Cæterū rarō fit erysipelas à causa prægressa, frictiones tamen violentæ, insolario & admotio medicaminum attrahentium ipsum nonnunquam excitant.

Herpes ex-
edens.

Phagedæna.
Cancro exul-
ceranti.

Causæ veri
erysipelatis.

De signis & iudicijs veri erysipelatis.

Signa & iudicia veri atque exquisiti erysipelatis sumuntur ex collatione ipsius ad phlegmonē iuxta Galeni doctrinam, 14. Therap. & 2. ad Glauconem: ex quo aperte colligitur verum ac legitimum erysipelas veluti quandam speciem esse phlegmonis, id est, inflammationis generaliter acceptæ. Notæ igitur erysipelatis sunt, color aspectu rubidus, in flauum elanguescēs, qui (rubor inquam) flavescent, ad rictum, hoc est, digitorū ap-pressu facile subterfugit, rursusque illabitur. Tumor exiguus, in cute potius consistens, quā altè descendens. Calor vehemens febrem excitans maiorem, cā, quæ ex phlegmone accenditur. Siquidem calidius multo est erysipelas, quā phlegmone. Pullatioque magnæ phlegmones proprium est symptoma non admodū fortis. Dolor mordicans & pungens nullam (ut in phlegmone contingit) inveniētiā rationem, & si quæ sunt

Nota erysi-
pelas.

Rubor flauo
scens, ad ric-
tum subter-
fugiens.

Tumor par-
vus.

Calor veho-
mens.

Pullatio exo-
gra.

Dolor pun-
ctorius.

Iudicia.

40 alia bilis dominium significat. Quod autem ad iudicia per-

pertinet, erysipelas ut plurimum faciemprehendit, incipitque maxime in ea nasi parte, quæ vulgò lepus appellatur. Deinde mox in faciem totam expanditur, gemina quidem occasione: nempe ob faciei raritatem, & ipsius bilis lenitatem. In ossis autem exuritione seu denudatione, erysipelas superueniens malo est, ut scribit Hippo. Aph. 19. lib. 7. hoc est, symptoma prauum est, si osse nudato caro circumstans ab erysipellate occupari videatur. Hoc autem Galeno teste, rarissimè accidit. Rursus sequenti aphorismo scribitur ab eodem Hippo. quòd ab erysipellate putredo aut suppuratio, malum. Hæc enim (inquit Galenus) nunquam erysipelatis superueniunt, nisi valde malignis. Verum, ac legitimum erysipelas quatuor habet tempora, uti & alij præter naturam tumores. Horum autem signa ex præcedentibus sunt requirenda. Exquisitum erysipelas raro terminatur suppuratione, sed magna ex parte insensibili transpiratione seu resolutione. In erysipellate quædam interdum contingunt accidētia, seu (ut Græci dicunt) symptomata, quæ nonnunquam magnitudinem ipsius morbi causam exuperant, atque ideo curandi ratione interpellant, hoc est, curationis ordinem enariant, peruertuntque, ut etiam superius de phlegmone dictum est. Ad hæc erysipelas

*Erysipelas
motu sequitur
tertiana febris.*

*Erysipelata
circa caput
curatu difficillima.*

*Erysipelas
in vtero prægnantis
seutum enecat.*

motum sequitur tertianæ febris, nam ad eius materiam quandam habet analogiam. Vtriusque enim materia, humor est biliosus. Cæterum erysipelas ab exterioribus verti ad interiora non est bonum: ab interioribus autem ad exteriora, bonum, ut ab Hippo. scriptum est aph. 25. lib. 6. Erysipelata verò quæ pati oboriuntur, plus faciunt negotii, adeoque (ut Paulus ait) periculosa esse solent, ut nisi efficax consequantur auxilium, interdum affectos strangulent. Scribit etiam Hippoc. lethale esse, si erysipelas sit in vtero mulieris prægnantis. Facto enim sic in vtero erysipellate, foetus ex necessitate moritur. Siquidem acuta febris (ut Galenus ait in commentario) sæpe eum citra inflammationem interficit.

Erysipelatis curatio.

*Curationis
erysipelatis,
scopi vniuersales duo.*

¶ Cum erysipelas, sicut & phlegmone, de qua paulò antè egimus, affectus calidus sit, & ex humorum deflexione fiat, geminus etià erit totius curationis ipsius scopus, nempe refrigeratio & vacuatio. At veluti vacuationis indicatio in phlegmone, refrigerationis indicationem vincebat: ita refrigerationis indicatio in erysipellate, magis urget quam vacuationis. Illa enim quan-

quantitate hoc verò qualitate magis premit & disruiat. Itaque erysipelas magis refrigerari, & minus vacuari: inflammatio contrà magis vacuari, & minus refrigerari debet. Quanquam vniufq; affectus curandi (vt inquit Galenus) comune caput fit, infestantis scilicet humoris vacuatio: ideoque postquam refrigeratū erysipelas fuerit, ad ea quæ digerunt seu disruiunt medicamenta conuertimur. Porro vt geminū hunc scopū vniuersalem refrigerationē in quā & humoris infestantis vacuationem, assequamur, quatuor aliis scopis particularibus iuxta posterioris ætatis chirurgorum placita, est opus. Primus scopus, consistit in recta vitæ institutione atque obseruatione. Secundus, humoris ad partē affectā confluentis, quem antecedentem materiam appellant, auersionem concernit. Tertius in humoris, qui iam in partem ægram influxit (quem materiam coniunctā dicunt) vacuatione consistit. Quartus verò & postremus circa symptomatum correctionem: ac propulsionem versatur. Primum scopū facile assequemur, si rerum omnium, quas nō naturales vocant, administratio, ad humiditatē & frigiditatē (vt in febre tertiana) spectauerit. Quandoquidem erysipelas ex fluxu bile ortum habet, quæ temperaturæ est calidæ & siccæ.

*Particula-
res curandi
eryipelatis
scopi qua-
tuor.*

Ergo aërem atque habitationē, quoad fieri potest, qualē esse expedit, id est frigidiorē & humidiorē deligito, præparatoque. Aestate igitur iubterraneas domos frigidissimas, maxime perforatas, & ad arcū versas, tibi deligito. Si loci huiusmodi occasio non datur, & calidior aër extiterit, ipsum sic præparato. Aquam frigidam ex vasis in vasa subinde transfundito. Pavimenta domus assidue aqua, quæ pronius gelida sit, aspergito.

*Primus sco-
pus.*

*Aëris dele-
ctus.*

*Ambientis
præparatio.*

Rosas, & violas plurimas, vitæ folia, & capreolos, salicis quoque ramulos, & reliquos flores ac germina, quæ frigidæ humidæque facultatis sunt, humi spargito, ac in aërem proicito.

Turbam hominum conciaue laborantis ingredi prohibeto. Pinguia, dulcia, acria, calidæque omnia vitato.

Cibus.

Lactuca, cucurbita, portulaca, oxalide, (quam acetosam vocant) hordearo, oriza, & aliis id genus, quæ sanguinem incrassant, & refrigerant, lobens vescitor.

A vino in totum abstineto.

Potus.

Cremor prillanti, aut aqua hordei tibi potus esto.

Victus temperantiam serua.

*Repleti-
o.*

Aluus tibi semper mollis esto.

Inanuita.

Ab

Motus. Ab omni motu, præsertim vehementi atque immoderate abstinet.

Animi affectus. Iram, contentionem, atque omnem animi vehementiorē motum, aut perturbationem, tanquam aduersissima fugito.

Nitida, ac munda circa te omnia sunt.

Venus. Venerem ne exerceto. Atque hæc de primo scopo dicta sufficiant.

Secundus scopus.

Secundum autem scopum curationis erysipelatis consequemur, si succum in corpore delinquentem commoda vacuatione ademerimus. Ergo in vero ac legitimo erysipelate nō necessario, ut in phlegmone, sanguinē ex vena detrahemus: sed medicamento quod flauam bilem eximat (cholagoga Græci vocant) ventrem per inferiora expurgabimus, si saltē affectus magnus sit, & corpus bile abundare videatur. Itaque cum erysipelas febres accendat, & eas vehementiores quā phlegmone, medicamenta, quæ impense calida sunt, & scammonii succū, quod recentior Græcia dacrydion vocat, recipiunt: (cuiusmodi est, quod vulgò in officinis electuarium de succo rosarum appellatur) huic affectui minimē idonea sunt. Ergo vel rhabarbarum offerendum est, vel potio, quæ Rasi aqua tamarindorum dicitur. Recipit autem pruna Damascena 24. tamarindorum recentiorū drachmas decem, sacchari violati quart. semis. Cui ut efficacior reddatur, aliquid diluti rhabarbari adici potest. Quod si exigua sit affectio, ne hæc quidā cholagoga medicamēta necessaria erunt, sed abundē fuerit, tunc acri clystere uti, ut Galeno visum. At in erysipelate phlegmonoso nō abs re feceris (modo nihil obstitit) si curationem à sanguinis missione auspica tus fueris. Tale autem sapius faciem apprehendit, unde & Paulus protinus ab initio venam in cubito præsertim humerale in eo incidi iubet. Sin autem hæc non appareat, eam quæ se conspectui magis obicit. Si quid verò sanguinis detractiōe impediat, purgatione ex medicamento, quod bili ducendæ dicarum est, vitandum præcipit. Non pugnat tamen Paulus cum Galeno. Nempe cum Paulus secandam esse venam præcepit in erysipelate, quod capiti seu faciei oboritur, de phlegmonoso erysipelate intellexit, q̃ sapius faciem apprehendit: Galenus verò de legitimo erysipelate locutus est, in quo sanguinem non mittit. At in cedematoso aut scirrhusoso erysipelate, purgatione vitandū est, quæ mixtas habeat facultates, hoc est, partim flauā bilē, partim verò pituitosum, aut melancholicū succū educat. Atque in

Chirurgus in iis quæ ad phlebotomiā & purgationem attinet

De Tumoribus præter naturam.

63

his quidem omnibus cõsulendus est doctus aliquis ac prudēs medicus, à cuius consilio & decretis ne transuersum quidē vngue discedere debet chirurgus. Sitq; hoc satis semel monuisse, quod chirurgus nihil vnguam in iis, quæ ad purgationem, & sanguinis missionem per phlebotomiam, attinent, attentare debet, citra periti alicuius medici consilium, nisi forsitan siquando vrgeat necessitas, & vbi nullus præstō adest medicus. Tertiã intentionem complent refrigerantia & reprimentia, in principio fluxionis, exceptis casibus in capite vniuersali commemoratis. Trãsa-

o cto verò principio, & stãta iam fluxione, quod mēbro inhefit, & impaetū est, digerentibus seu euaporantibus medicamentis extrinsecus admotis, vacuādum est, per occultam scilicet sensui trãspirationē. Omnium siquidē huiusmodi tumorum sic præter naturã consistentium, vacuatio duplex est Gal. 14. Therap. Vna quidem repellentium ad alias partes: altera foras digerentium, per eum qui sensum fugiat halitum. At quoniã erysipelas non quantitate modò affligit, sed etiam, ex vehemēti scilicet inflãmatione, qualitate ipsa cruciat, ampliorem refrigerationē, quam phlegmone requirit. Post totius igitur corporis (vt paulò antè dictū est) vacuationem, reprimentibus auxiliis vtēmur, afflictam particulã, seu ipsam quæ patitur cutē, vt decet, refrigerantes, præsertim cum sine manifesta aliqua occasione factū fuerit erysipelas. Est autē refrigerationis terminus, ipsa coloris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cū hoc quiescit. Quod non purum est, sed iam quodammodò phlegmonodes, si plussculum refrigeres, liuidam cutim præfert. Sin ne sic quidē quis desistat, nigricat, potissimum in senili corpore: sic vt quēdã ita refrigeratoriũ, ne digerentibus quidem postea medicamētis ad perfectionē possint sanari: sed scirrhusus quidem tumor in

o particula derelinquatur. Ergo satius est (inquit Gal.) vbi laborãtis particulæ alteratū colorem videris, à refrigerantibus retinendibusque ad contraria, id est, dissipantia seu digerētia & exiccantia, transire, priusquam vel liuida vel nigra prorsus fiat. Adhibenda autem semper cura est, vt quæ inhiuntur, perliquida sint atque humida, eaque sepius cõmutentur, ac per spõgias frigidus aliquo liquore imbutas, subinde quæ admota sunt, abluantur. Si quidē multus particulæ feruor celeriter in vaporē erumpens, hec desiccet. Ceterum inter ea quæ refrigerandi atque repellendi facultatē obinent, in hoc affectu conuenientē, laudar

40 imprimis Auicennas ex simplicibus, perfusionē aquæ frigide.

nihil attentare debet, citra periti alicuius medici consiliũ

Tertiã intentionem.

Hic Guido deprauatē citat Gale.

Quatenus refrigerandum in erysipelate.

Lib. 14. Therap.

Gale.

Materia re-
frigerantiū
ex Gal.
Adiecta ex
Paulo.

Ceratum.

Compositū
medicamen-
tum.

Evacuatio
coniuncta
materia, per
evaporatā.

ὡμὴ λύσις.

Galenus verò commendat succum solani, semperuii, portulacæ, psyllij, alterci, id est, hyoscyami, lactucæ, vmbilici Veneris (quæ herbula Græcis coryledon appellatur) intybi, id est, cichorii, & lenticulæ palustris, atque alia id genus, quæ ultra hæc à Paulo adduntur. Cuiusmodi est cucurbita, glaucium, apium (quod vulgi est petroselinum) & rhamni folia, per se, vel cum pane cataplasmatibus modò illita. Ceratum quoque ex aqua admodum frigida, quod recipiat quadruplum rosacei ad ceram albam. Sit autem rosaceum ex oleo omphacino, id est, immatu ro, sine sale confectio, quibus in pila emollitis aquæ frigidæ superfunditur, quantum potest recipi. Si verò aceti tenuis & peludici momentum admiscueris, præstantius, atque efficacius medicamentum reddideris. Porro hæc omnia actu frigida sunt admonenda, & subindè mutanda, priusquàm manifestè incalcant, aut arefcant. Conducit etiam plurimum ad rem præsentem, si pars erysipelate obfessa, illinatur cerusa sola, vel mixta cum aceto & lycio, vel terra cimolia, aut figulari cum solano, aut argenti spuma cum rosaceo, item acacia cum aceto. Ad idè confert plurimum & sequens compositio. Succu plantaginis vnciæ vna, rosacei, vnciæ tres, lithargyri nutriti, vnciæ vna, cerusæ lectæ drach. tres, lactis muliebris semuncia, miscentur omnia simul in mortario plumbeo, & fit linimentum. Teri debent primum lithargyrum & cerusa: deindè oleum & succus paulatim & sensim affundi debent, donec exactè misceantur. Quòd si ampliore refrigerationem desyderes, his & alijs prius enumeratis (ex Pauli sententia) admisceri potest, opij aliquid, vel cicuta, vel mandragoræ. Verùm ab ijs, & similibus, quæ stupefaciendi vim habent, abstinendum esse censeo, nisi maxima urgeat necessitas. Cæterum vbi inflammatio ægrotantis membri iam desistit, ac feruor erysipelatis sese remittit, Galenus humorem in particula receptum, quam coniunctam materiam vocant, prius quàm ex refrigeratione liuor appareat, discutit, hoc est, resoluunt, imposito cataplasmate, ex hordei farina, seu ex cruda polëta, ὡμὴ λύσις Græcè vocant, & alijs, in ratione phlegmones superius dictis. Quemadmodum enim signa erysipelatis sumebantur ex analogia signorum phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remediorum curationis phlegmones sumenda sunt. Porro talia medicamenta, quæ dissoluendi, seu euaporandi facultatem obtinent, in hoc affectu conuenientem plurimum tum simplicia, tum composita referuntur.

De Tumoribus præter naturam.

65

tur à Paulo Aegineta lib. 4. cap. 21. Item ab Aëtio libro de re medica decimoquarto. Satis autè fuerit, nunc vnũ ex multis recensere, quod omnium mihi præstantissimum visum est. Altheæ nouellæ foliorum pondo, id est, libra assumitur, concoquuntur in hydrelæo: cocta verò probe teruntur, adiectoq; rosacci triente, id est, vncijs quatuor, argenti spumæ, & cerusæ, singulorum vncijs duabus & semisse, id est, dimidia iterum læuigantur cum succo coriani, aut sēperuiui, aut solani: deindè micis panis adianctis, vt emplastri formam induat, illinitur. Quod si fortè liuor iam locum occuparit, incisa antè cute, cataplasma superponendum est, perfundendusq; locus, plurimũ quidem (vt Galenus præcipit) aqua calida. digerit enim, & plagas abluir: sed & aqua, & muria interim conducet locũ fouere, cũ scilicet crassior est. Hæc enim crassitudine incidunt, ac detergent. Quarta intentio curationis erysipelatis, quæ est accidennium correctio, perficitur, vt in curatione phlegmones dictum est, cũ agebatur de reditu materiæ, de induratione, & corruptione. Item de dolore & ardore. Hæc enim symptomata etiam erysipelati, vt & phlegmonæ accidere solent. Porro optimum doloris ac vehementis ardoris mitigatoriũ auxiliũ fit, ex folijs, & radicibus hyoscyami, inuolutis in stupis, & coctis sub prunis, deindè mixtis cũ vngueto, quod populeon vulgò appellatur, vel cũ arungia, vt superius dictũ est in curatione phlegmones. Si verò contingeret ipsum erysipelas exulcerari, curetur ad motionem vnguētĩ albi, aut vnguenti de lithargyro, quorum descriptiones ex antidotario requirẽdę sunt. Quod si illis adderetur aliquid scorix, hoc est, recrementi plumbi, optimum sanè atque efficacissimum foret remedium. Sed præstat vt totam curandi erysipelatis rationẽ, breuibus quibusdam sententijs in modum epilogi complectamur, vt quæ diffusius à nobis suprà dicta sunt, memorie tenacius hæreant.

Hydrelæũ est mistura ex aqua & oleo, seu oleum dilutum.

Si liuor iam locum occuparit.

Quarta intentio.

Doloris & ardoris mitigatorium.

Si erysipelas exulceretur

Septem de erysipelate aphorismi, totam ipsius curationem summam complectentes, ex Galeno.

IN exquisito seu legitimo erysipelate, sanguinẽ ne detrahito. 1
Si bile corpus abundet, & affectus magnus sit, ventrem medicamento cholagogo, id est, bilẽ exigẽte, per inferiora purgato. 2

Quod si exiguus morbus sit, & corpus bile vacuum, à medicamento flauam bilem per aluum ducente, abstinet, & acri cly 3

40 stere contentus esto.

c

Vniuerso.

- 4 Vniuerso, ut oportet, corpore purgato, partem affectam per initia moderatè reprimentibus medicamentis, & abundè refrigerantibus, vsq; ad coloris mutationè, perfundito, atq; illinito.
- 5 Vbi laborantis particular alteratum colorem videris, & feruorem erysipelatis iam remissum, ac inflammationem desisse, à refrigerantibus, astringentibusque, priusquam vel huida, vel nigra prorsus particula fiat, ad contraria, hoc est, digerentia seu discutientia, & exiccantia, transito.
- 6 Quæ ex vlcerebus, alijsque euidentibus causis fiunt erysipelata, primùm scarificato, deindè cataplasma ex hordeacea farina imponito.

7 Si erysipelas non exquisitū fuerit, sed phlegmonodes, id est, quodammodo ad inflammationis naturam vergens præsertim vbi sanguis in corpore exuberat, intrepidè sanguinem mirtito.

De tumoribus, qui cum erysi. societatem habent, hoc est, de herpete miliari, & exedente, quæ pustula cholerica recentioribus chirurgis dicuntur.

De Herpete

T Vmores illos præter naturam, qui cum suprâ comprehenso erysipelate societatem habent, atq; ad ipsum quodammodo pertinere ac referri videntur: ex bile autem non naturali, & secreta, id est, alijs humoribus, minimè permixta, generationem obtinèt, recentiores tum medici, tum chirurgi, pustulas malas cholicas appellant: Græci verò, (vt Hip. Gal. & Paulus) herpetas vocant. Quæ vox Latinis ferè sonat, malū quod serpit: ἑρπῶ enim idem quod serpo, vnde ἑρπῆς serpens dicitur. Herpes tamen non absolutè malum quod serpit, significat apud medicos, sed certū morbi genus, de quo nūc agitur. Itaq; malū quod serpit, latius patet q̄ herpes. Nam & phagedænæ serpentia etiā vlcera dicuntur. Huiusmodi autem vniuersas pustulas Auicenna formicas appellauit: Galenus verò eas inter inflammationes

Pustula mala & cholerica vulgò dicta.

Herpetes.

Formica Auicenna.

Herpes quādo fiat.

Herpetis species duæ.

ἑρπῆς ἐξιδόμενος, id est exedens, vel depascens,

adnumerauit, sed Celsus sub ignis sacri nomine has intellexisse videtur lib. 5. cap. 28. Fit igitur herpes, quando flaua bilis, non naturalis, sola & secreta, id est, nullo alio illi (saltè sensus iudicio) admixto humore, in particulam aliquam confluuit, decumbitve atq; ibidem consistit, quæ si cōsistentia sua crassior sit, acriorq; totam exulcerat cutem, vsq; ad carnem suppositam, vocaturq; tunc vitium huiusmodi Hippocrati & Græcis ἑρπῆς ἐξιδόμενος, Latinis verò herpes exedens, vel depascens: & decimoquarto Therap. Galeno absoluto nomine herpes. Si verò tenuior & minus acris, calidāq; fuerit bilis, pustulas exiguas per summam cutem,

tem, id est, in sola superficie cutis (hanc enim tantum veluti de-
 ſcribit) milio, hoc est, milij seminibus, similes excitat: ob quam simi-
 litudine affectus tunc Latinis miliaris herpes nominatur: Græ-
 cis verò quibusdam post Hippocratis ætatem *κνίχας* ob ean-
 dem rationem dictus est: *κνίχας* enim Græcis, milium nobis
 dicitur. Atq; hæc species Galeno autore lib. 2. ad Glauco-Hippo-
 crati generis sortitur appellationē, cum simpliciter, & sine ad-
 ditione illi herpes vocetur. Alibi tamen herpetis nomine, Gale-
 nus herpetem esthiomenū, id est, exedentem intelligit, vt paulò
 post dicitur. Hic autem non protinus vlcus facit, vt alter qui
 exedens dicitur, sed vt dictū est, admodum exiguas pustulas ad
 speciem milij, quæ & ipsæ interposito spacio, ac procedente tem-
 pore, cum disrumpuntur scilicet, in vlcus abeunt. Proinde non
 sine ratione Oribasio & quibusdam alijs visum est, in eiusmodi
 vitio, bili esse aliquid pituitæ tenuis admixtum, quæ pustulas il-
 las minutulas procreat. Vnde & nonnullis pustulosus herpes di-
 ctus est. Alter verò, qui esthiomenos appellatur non ita pituitæ
 cōmixtus est, sed ex acida, bilis, ac nullo alio humore infectæ, esse
 videtur: ideoque cum erosione accidit, affectu cutis continuata-
 temprehendente, vnde & nomen illi impositum est. Esthiome-
 nos enim idem est quod erodens vel exedens. Atq; hic affectus
 quidem eiusdem generis est cum pustuloso atq; exulcerato crysi-
 pelate: a quo tamen differt humoris ipsius biliosi (ex quo vinum
 vitrumque ortum habet) tenuitate. Id quod testatur Gal. his verbis:
 « Est enim (inquit) admodum tenuis humor qui herpetē excitat,
 « adeo profectò, vt non solum omnes interiores partes, quæ vtiq;
 « carnosæ substantiæ sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam ad sum-
 « mam vsque cuticulam (epidermidā Græci vocant) quam solam,
 « propterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit, quan-
 do si hanc quoque sudoris vice transiret, haudquaquam vlcus
 « excitaret. Quippe id, vicerum quæ ex mordente humore orian-
 « tur, quæ nimirum spontanea vocant, cōmune est, & humor qui
 « ea facit, sistitur in exitu, ac tardat. Hactenus Gal. vbi nomine
 herpetis simpliciter & sine additione, intelligit herpetē esthiome-
 num, vt ex ipso contextu, signis & curatione, facile est depre-
 hendere. Atq; ita illo in loco generis sortitur appellationē, cum
 simpliciter, & absolute herpes nominetur, quemadmodum & in
 libello, de tumoribus præter naturā, vbi de eo sic idem Gal. ad
 « verbum scribit: Depascitur quidem & herpes, vicina id est, ea
 quæ in circuitu sunt, erodens; verum solius cutis est exulceratio.

*Herpes mi-
 liaris, siue
 cenchria.*

*Lib. 14. The-
 rap.*

*Ex Paulo, et
 Gal.*

*Lib. de tum.
 præter nat.*

*Lib. 14. met.
 med. Humor
 biliosus qui
 herpetē exci-
 tat, admodū
 tenuis est.*

*Herpes solis
 cutis est ex-
 ulceratio.*

*Auicennas
myrmecias
cōfundit cū
herpetibus.*

*Guidonis
error maxis-
mus.*

*Herpetem
æthiomenū
et erysipelas
vulceratum
non omnino
idem esse.*

*Morbilli ex
herpetum
sunt genere.
Variola.*

*Papularum
eruptiones
Ecthymata
Exanthema-
ta.*

Cæterum utramque herpetis speciem, id est, tam miliarem, quam exedentem, sub nomine formicæ Barbari ferè omnes næoterci comprehendunt. Quibus ea in re, ut & in multis alijs erroris occasione primus præbuit Auicennas, qui in nominis similitudine deceptus, quoniam Græci myrmecias, id est, formicas, genus quoddam verrucarum vocant, eodem capite verrucas illas cum herpetibus errore fœdissimo cōmiscuit. Guido tamen discrimen ponit, inter herperem & formicam, confunditque nomē formicæ modò cū verrucis (quas myrmecias & acrochordonas Græci vocant) modò cum herpete exedente: qui (comedens in- 19 quam herpes) modò etiam illi herpestē, modò herpes absolute nominatur; putaturque; eidē aliud nihil esse, quā erysipelas pustulosum, & vlceratū. Cū tamē ille (ut ex Galeno adductū est) ab hoc differat humoris tenuitate. Tenuior est & bilis quæ herpera creat, quā quæ vlceratū erysipelas. Ad hoc erysipelas quod cum exulceratione incidit, non tantū cutem, sed cum ea etiam aliquid subiectę carnis occupat. Herpes verò, quo de hīc agitur, solam cutim apprehendit, exulceraturque. Itaque tametsi hæc eiusdem sint generis (ut Galeno visum est) non tamē omnino sunt idem. Porro pustulas illas, quæ Auicennæ interpreti, & impe- 20 ritæ medicorum turbæ, morbilli appellantur, sub herpete comprehendisse videtur Hippoc. lib. 3. Epidemiarum. Fiunt autem morbilli huiusmodi à tenuiore materia, quā pustulæ illę, quę vulgò variolæ dicuntur. Hæc enim (ut voluit Auicennas) ex sanguine, illi verò ex bilis sanguinisque fiunt mixtione. Si quis autē desyderat, quò nomine cuiusmodi pustulæ apud antiquiores dictæ sint, diximus Latine à Plinio vocari papularū, & interdum pituitæ eruptiones: Græcè verò Hippocrati ecthymata lib. 3. Epidemiarum: Galeno autem exanthemata. Cæterum utriusque herpetis notæ, iudicia, & causæ, ex præcedentibus satis innotescunt. Superest igitur, ut eorum curatiōnem subiiciamus. 39

Herpetis curatio.

*Herpetis cu-
ratio tres ha-
bet scopos si-
ue intentiones.
Primus sco-
pus.*

In curandis herpetibus, sicut & in alijs cuiusmodi spontaneis vlcenibus, quę ex mordenti & acri humore oriuntur, tres scopi communes sunt obseruandi. Primus est, ut humoris in partem affectam confluxio inhibeatur. Secundus, ut quicquid in laborantem particulam confluxit, & eidem inhæsit, vacuetur. Tertius, ut sanetur vlcus. Primum scopum, seu primam intentionem assequimur, totum corpus, medicamine, humorem vnde 40 vitium

virium enascitur, educente, expurgando. Mox repurgato corpore humorem influentem reprimendo, regerendoq;. Ergo in herpete exedente, medicamento vtendum est, quod flauam bilem per aluum exigit. Hunc enim purus, ac syncerus (vt diximus) biliosus procreat succus. Proinde fit, vt quantū ad totius corporis euacuationem attinet, comedentes herpetas similiter vt erysipelata curare oporteat. Itaq; quoniam tenuis humor est, qui id vitium creât, abundè est Galeno, etiam aluum leniter soluisse, vel vrinæ, per ea quæ id modicè efficiūt, cirasse. In altero

Herpes exedens medicamento vtendum est, quod flauam bilem per aluum exigit cholagogon.

10 verò herpetum genere, quem à similitudine quam habet cum milio, miliarem & cenchriam Græcè appellari diximus: medicamento opus est, quod mixtæ sit facultatis, hoc est, quod bilem simul & pituitam educat. Quibusdam enim non sine ratione (vt Galenus ait) visum est in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ admixtum. Porro vacuato, vt decet, eo qui in corpore reundat, ac vitium committit, humore: medicamentis vtendum est, quæ influentem humorem reprimât, regerantq;. Tumor nâque ac conuenientior tunc fuerit eorum vsus. Quandoquidem (inquit Gale.) si quis exiguū vitiosi humoris post ritè factâ purgationem adhuc in corpore remanens ad vlcera, & magnas ve-

Herpes miliaris medicamento de syderat, quod bilem simul & pituitam educat.

Reprimendū tempus.

Lib. 14. Therap.

20 nas retrudat: nullum profectò quod sensu percipiatur, malū committer. At si, inquit ille, eius non levis quantitas sit, in princeps aliquod membrū aliquando procumbit. Vbi scilicet prius naturæ viribus totum corpus expurgans, non sit, vel per deiectionem, vel vrinæ, vel cutim, quæ totū corpus includit, vacuans. Cæterū reprimunt quidè regeruntq; non solum ea quæ adstringunt, sed etiam quæ sine adstrictione refrigerant. Cuiusmodi sunt lactuca, polygoniō, ex stagnis lens, portulaca, seris, semperuiuum, & id genus alia, quæ erysipelatibus valde erant opportu-

Non esse reprimendum, si multus sit vitiosus succus.

Regerentiū materia.

30 na. Verum eiusmodi medicamenta, quæ scilicet præter id quod refrigerant, etiam humectare naturâ apta sunt, herpes præsertim depascentes, minimè desyderant, sed sola ea admittunt refrigerantia, quæ etiâ maximè possunt exiccare. Quæ enim refrigerandi, atq; vnâ exiccandi vim habent, sed mediocrè (cuiusmodi est solanū) non satis illis cōueniunt. Apponere igitur ipsis oportet ex Gale. cōsilio, ab initio quidè, ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & amoglosi. Post hæc verò & lenniculâ his adiungere oportet, & aliquado mel, & farinâ hordeaccâ. Itē cataplasma sine semperuiuo, quod ad phlegmonas, quæ ex fluxione eueniunt, inscribitur. Repellit enim quod influit, atque id

Quæ refrigerant pariter et humectant non conueniunt herpetibus exedentibus.

Reprimētia herpetibus exedentibus accommoda-

Hac com- quod in parte affecta continetur, exiccat. & membra corrobo
plem secun- *rat. Proinde transacto morbi principio efficax erit remedium.*
dam inten- *Itaque fiet huiusmodi cataplasma, ex corticibus malorū Puni-*
tionem. *corum in vino decoctis, & Rhu, siue Rhoë, id est, semine coria-*
Cataplas- *rij fruticis (quod posteriori medicinx Sumach appellatur) & fa-*
ma. *rina hordei. Cæterum hoc cataplasmate secundam intentio-*
Sumach. *nem, seu scopū curandi herpetis probè assequeris. Quippe cum*
ulceris cura *sufficienter digerere possit, quod iam in affectum locū conflu-*
zio in herpe *xerit. Constat autem, q̃ in generatione vlcis exuperare debe-*
re, quæ ter- *bunt quæ reprimendi facultatem habent: vbi verò non amplius*
rius est sco- *confluit in ægotantem particulam vitiosis humor quæ dige-*
pūs. *runt Quod ad tertium scopum attinet, qui vlcus sanandum*
Vlcus omne *proponit, summam hanc te cognoscere oportet. Nempe quod*
exiccati de- *omne vlcus siue sponte siue ex accidenti factum fuerit, exiccati*
fyderat. *desyderat medicamento (vt inquit Hippo.) non aspero, hoc est,*
Lib. 2. ad *non mordente, neq; vehementer irritante, præterquam vbi ma-*
Glaucanem *lignum, & cum putrilagine fuerit. Talia enim (inquit Galenus)*
Loca exulce- *actiora expectunt medicamina, & quæ ignis vires habeant: quale*
rata quibus *est mysi, & chalcitis, & arsenicum, & calx, & sandaracha, atq; id*
inuigenda. *genus alia, quæ non aliter, quam ignis adurunt. Loca igitur ex-*
Posca vel *ulcerata in herpete exedente, inungenda sunt pastillis, seu tro-*
Not. posca. *chiscis, in libris, qui pharmaceutici dicuntur, ad herpetas incri-*
Remedia ex *ptis. Qui, cum res exigit, vt illis vtatur, passio, vel vino aliquo*
Paulo sum- *dulci, vel si dulce non adfuerit, vino tenui & subaustero non ni-*
ptia. *mis veteri (hoc est, quod non aliquam in gustu ob antiquitatem*
contraixerit acritudinem) aut posca aquosa (quod oxycratū vo-
Paulus his vitit remedijs, ad herpetē, qui sub cute affligit. Re-
mentum plumbi, rutæ leuigatæ sacco excipitur, aut cerarum
myrtæum in vicem rutæ. Aliud, Lanæ veteris illotæ, circa tedam
combustæ, drachmæ duodecim & semissis, id est, dimidia, ceræ
drachmæ 25. recrementi plumbi drachma, seu caprilli curati lo-
tique ex aqua, drachmæ 25. myrtæ vnciæ 5. Ad herpetas verò
acutè seu acriter depascentes, hoc remedium iuber adinueri.
Corij mali Punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantun-
dem, lanæ illotæ, tedæ seu tedaceo ligno adherentis, & combu-
stæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ
octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, vino aut myr-
teo excipiuntur. Iam verò in longum tempus protrahis vlce-
ribus, ueque vino dulci, circuli parui, id est, trochisci, & huius-

De Tumoribus præter naturam.

71

modi alia medicamenta, quæ ad herpetas scribuntur, dilui debent: sed neq; pusca adhuc aquosa, quin potius vino satis austero, præcipuè verò nigro, & si id non affuerit, albo. Medicamēta autē in hoc tēpore, hoc est, inueteratis iam vlcetibus, efficacia, & maxime accōmoda sunt, pastilli seu trochisci Muse, & Andronis, & Polyidæ: quorū descriptiones in fine curationis carbūcu hī positæ sunt. Itē trochisci, qui calidicō & aldaron dicūtur Aui cennæ & recētioribus, quorū descriptiones ex antidotario requirēda sunt. Herpetas verò, qui tantū summā cutē exulcerant, ut sunt, quos miliares diximus, nullo horū medicamentorū superius cōmemoratorū (si saltē Galeno credimus) inūgere oportet. Vehemētia enim sunt ac validē exiccāt: verū istis iufficiunt quęcūq; vim glaucij, id est, memithæ habent, eaq; diluere oportet, maxime quidē aqua. Quod si hæc nihil profecerint, etiā acetū miscendū est. Quod si etiā solani succo intinxeris, aut arnoglōssi, magis adhuc iuueris. Hactenus de herpete. Cæterū quoniam de formicis nōnihil obiter in superioribus attigimus, quas turpiter (ut diximus) recētiores, & Arabes cū herpetibus confundūt, præfens locus expostulat, ut de ijs, & alijs in cute eminentibus
 20 excrecentijs, quas Latini verrucas vocant, pauca annotemus.

*Si pustula
miliares in
vltus abeūt
quid agendū.
Lib. 2. ad
Glauc.*

De formicis, & alijs verrucarum differentijs.

CAPVT IX.

T Vmores illos exiguos, seu humiles illas excrecentias, quæ instar monticulorū quorundā in cute eminentes conspiciuntur, Latini appositē verrucas appellant: verruca enim propriē editiorem montis partem significat. Vulgus autem porra nuncupat. Quia quandoque intra secula quædam continent porrorum radicibus non dissimilia.
 30 Græci nomen non habent, quo omnia eiusmodi verrucarum seu porrorum genera complectantur, sed quamque proprio nomine speciem nuncupant. Hæ autem ferè sunt, *μυρμηκία* *ἀγοχορδόν*, *ἄλος*, *θύμιον*. Itaque Myrmecia illis dicūtur verrucæ, quæ latiore sunt basi, & quasi sessiles, similē vellicantis, seu mordentis formicæ sensum, dum attrectantur, inducentes: unde & nomen illis factū est. Græci enim *μύρμηξ* formicam nomināt. Quare Latini eas (nomine quidem ad Græcum vocabulum sese accommodante) formicas, verrucas dixerunt. A figura verò & formatione, sessiles verrucas. Hæ nascuntur Celso,
 40 aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum: radices autem

Verruca.

Porra.

*Verrucarū
diuersa ge-
nera.*

Myrmecia.

*Sessiles ver-
ruca.
Lib. 5.*

6 4 altius

altius exigunt, ac humiliores sunt thymio durioresque, maioremque dolore mouent: sed minus sanguinis mittunt, vique vnquam magnitudine lupini modum excedunt. Acrochordon verò pensilis, & angustiore basi verruca est, hoc est, rotunda quædam in cute eminentia seu excresecientia, quæ basim, id est, partem imam ad cutem angustam habet: sic quidem dicta, quod chordæ nexu suspensa pendere videatur. Itaque hoc discrimine acrochordones à myrmecijs dirimuntur, quæ illi ima parte ad cutem angustiores sunt, supremâ verò latiores, myrmecicæ contrâ, basi sunt (vt dictum est) latiore, super autem tenues. 10

*Acrochordō.
Penſilis ver
ruca.*

*Myrmecia
& acrochor
dones qui
bus inuicem
diſſideant.*

Sed & hæ nonnunquam cum summa cute prorsus sunt æquales. Acrochordones verò semper à cute extant, vt libro decimo-quarto de morbis curandis Galenus scriptum reliquit. Adhæc acrochordones Celso ferè plures nascuntur, pueros maxime infestant, nonnunquam subito desinunt: quandoque verò medio crem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. Rarò autem fabæ magnitudinem excedunt: Auicennæ clauī dicuntur. Verum Latinis clauī appellantur verrucæ albæ, rotundæ, clauorum capiti similes. Hi in digitis, plantisque pedum maxime contingunt, vbi dolorem si non alias, tamen 20

Clauī.

*ἄλφι.
Almismar.
Thymion.*

ingredienti mouent. Hos Græci ἄλφι vocant: Auicenna verò almismar. Ex contuso sæpius nascuntur, interdum etiam aliter. At thymion vel thymon Celso & Græcis, verrucula est, super corpus eminens, infra seu ima parte ad cutem, & ipsa (vt acrochordon) tenuis, suprâ verò latior: subdura quoque, & in summo peraspera. Idque summum, colorem floris thymi representat, vnde ei nomen est, ibique facile finditur, & cruentatur. Nonnunquam & aliquantum sanguinis fundit, fereque circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, rarò maius, interdum perexiguum; modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel 30 in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus, hoc est, in plantis. Pessima tamen in obsecenis sunt, maximeque vbi sanguinem fundunt. Auicenna videtur huiusmodi verrucæ genus tusum, vel, vt alia habet lectio, rarscum nominasse. Ex verrucarum quoque genere sunt, vocata ab Auicenna cornua non alio à cæteris distantia, quam quod oblonga sunt, & instar cornuum recuruantur. A clauis non magnopere differunt calli, quos Græci vocant τύλλοι, nisi quod per se indolorosi sunt, eodem quo cutis colore, neque sponte, sed ex labore obdurata cute gignuntur.

*Thymij ma-
gnitudo.*

*Thymia in
obsecenis
pessima.
Cornua.*

Calli.

De Tumoribus præter naturam.

73

Verrucarum iudicia, & curatio.

- E**X his acrochordon & thymion sæpe etiã per se (vt retulit Celsus) finiuntur, & quo minora sunt, eo magis Myrmecia & clauī sine curatione vix vnuquã definunt. Acrochordon si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymo clauoque excisis, subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem, eaq; relicta idẽ rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaerent: ideoq;, ne excidi quidem sine vlceratione magna possunt. Clauum subindẽ
 20 deradere, commodissimum est, & aqua tepida perfundere. Nã sine nulla vi sic emollescit. Ac si sanguinis quoque aliquid emisum est, sæpe emoritur. Tollitur etiã, si quis eum circũpurgat, deindẽ imponat resinam, cui miscuit pulueris paulũ, quẽ ex lapide molari contrito fecit. Cætera verò genera, vt ab eodẽ Celso traditur, medicamentis adurẽda sunt. Alijsq; id quod ex fece vini: myrmecij, id quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimũ Paulus Aegineta, lib. 4. cap. 15. plurima enumerat, quæ verrucas huiusmodi, præsertim sessiles & peniles tollunt, exteruntque. Cuius generis sunt, elaterium (quod succus est fructus cu-
 20 cumenis agrestis) cum sale infricatum, thuris cortex cum aceto, grossi, id est, primitiuae ficus, quæ velut præcoces non mature-
 scunt, cum aceto, farina, & nitro. Idẽ quoq; illi præstat succus, seu liquor fici arboris illitus: tithymali, smaridis piscis caput sal-
 sum concrematum, ærugo cum sulphure viuo, hoc est, igne non
 experto combusta, ocymi folia cũ atramẽto furorio, quod Gre-
 ci chalcanthum vocant, sarmentorum adhuc viridium vitorum,
 quod distillat, fimus ouillus cum aceto, hircinũ fel illitũ, helio-
 tropij magni fructus per se illitus, vel cũ vino applicarus, rura
 cũ nitro & pipere, nitrũ cũ vrina pueri impubis & nondũm.
 30 Venerem expertũ, stercus bouis gregarij, seu armentarij, adhibi-
 tum in aceto. Cæterũ hæc quæ ad myrmecias & acrochordo-
 nas exterendas commemorata sunt, ferẽ omnia & ad clauos. &
 thymia etiã magnoperẽ cõducunt. Tradunt etiã lacertæ ca-
 put myrmecias, acrochordonas, & clauos tollere. Sunt qui deco-
 quant capita saliorum piscium in aqua illa, quæ distillat ex sar-
 mentis viridibus, dũ comburuntur: idq; præstantissimũ ad præ-
 dicta vitia remediũ esse prædicant. Alij ad eandẽ exterenda li-
 nimẽntũ conficiunt ex æruginẽ (quæ recentioribus viride æris,
 & flos æris dicitur) sulphure, & aqua, seu instillatione illa sarme-
 40 torum. Atq; hic vnus est curandi modus, quo vti solent ad ver-
 rucas

Acrochordõ.
Thymion.
Lib. 5.
Myrmecia.
Clauõ.

Myrmecia.

Verrucarũ
per medica-
mẽta cura-
tio ex Pau-
lo.

Aqua ex fer-
mẽtis distil-
lans.

Stercus bu-
bulum.

Lacerta
caput.

Ærugo
quid.

*Hoc Haly-
ab. & Gui-
do probant.*

*Alia curan-
di rationes.*

*Quomodo
vrenda sint
tuto verru-
ca.*

*Myrmecia-
rum cū sem-
ina cure a-
qualium cu-
ratio.*

*Myrmecia-
rum noua cu-
ratio ex Ga-
leno.*

*Alia cura-
tio myrme-
ciarum. 14.
meth.med.*

*Scolopoma-
cherion.*

*Alia cura-
tio per pin-
nam.*

rucas ē medio tollendas, per medicamenta scilicet erodentia, adurentiaq;. Id autem vnū summa cura obseruandū est, in cuius modi medicamentis administrandis, quod Celsus monet lib. 5. nempe q̃ ea quæ circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoq; exulcerentur. Alij ob eandē causam circuniacētes partes illinūt, vnguento ex bolo armenia, terra sigillata, aqua rosacea, & aceto. Porro acrochordonas, myrmecia, & thymia non solum præs-
criptis hisce adurentibus medicamentis abolemus: sed & ignis flāma, vel candente ferro, hoc est, cauterio (vt dicunt) actuali, il-
lis ritē admoto. Ea quoq; nonnunquā excidimus. Interdū verò 10
ligatura scitē illis coaptata (vt fit in vero ficu) vel primoribus
dentibus, vt quidā Romę Galeni tempore facere solebat, euellimus, ac radicis extirpamus. Cæterum si ignē aut candens ali-
quod ferrū verrucæ admoueris, lamina quēdam ferrea pertusa, vel simile quidpiam, ita verrucæ adurentæ coaptari debet, vt
foramen eam exactē cōprehendat, adeo vt nihil circūpositæ
cutis appareat. Facta verò adustione, crusta butyro vel aliquo
alio vinctuoso illito resoluenda est. Deinde vlcus similiter reli-
quis vlceribus curandum erit. Quo pacto autem myrmecie quæ
a cute non extant, sed illi prorsus sunt æquales, educi debeant, 20
atq; excidi, pulchrē docet Galenus lib. 14. meth. meden. vbi re-
fert quendam fuisse Romę suo tempore, qui nouam huiusmo-
di verrucarum curationē excogitauit. Nimirum has certā pri-
mū labiorū applicatione, ceu suctu ad se trahebat, atq; (quod
mirum videbatur) à radice euellebat. Deinde primoribus ap-
prehensis dentibus, totas simul eximebat. Acrochordonas verò,
vtpote à cute extantes statim mordices prehendebat, & ita pro-
tinus educebat. Harum quoq; & geminam aliam curandi ratio-
nem mox subiungit Galenus, inquiens: Sed & scalpro ad myrta 30
eci folijs speciem formato, & ferramento eo, quod scolopoma-
cherion Græci vocāt, quispiam manibus exercitatus, facili eas
excidat: cū proprijs lineamentis à circūposita cute circumscri-
ptæ discernantur. Aequē verò & valente aliqua pinna, circulo
myrmeciae imposita, ipsam educimus. Debebit porro pinnae fi-
sua esse myrmeciae crassitudini par, vt eam vndiq; prorsus cō-
stringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsā, ce-
leratimē ita myrmeciam etiam cū ipsa radice totam educet. Cō-
stat verò, & q̃ finis ipse pinnae, quæ eam circulo secabit, non
tenuis modo, sed etiam acutus & firmus esse debebit. Itaq; tum
galli veteris pinna, tum vel magis aquilæ, ad hunc vsū est ac- 40
commo-

De Tumoribus præter naturam.

75

« commoda. Abscindere verò ab his tantum radicē versus oportet, quatenus reliquæ partis fistula complecti myrmeciam possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modò scitè fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Hæc Galenus hæcenus. Vlcus verò quod relinquitur sic auulsa verruca, similiter reliquis vlceribus impleri debet, & ad cicatricem perducì.

Pinna scitè radicē versus abscondenda.

De ædemate, & tumoribus frigidis, pituitosis, & flatuosis.

CAPVT X.

10 **C**um de tumoribus, qui succis calidioribus procreantur, satis disputarum sit, de ijs quæ à materia frigida ortū habent, nunc tractare rursum instituiamus: principium quidem ab eo quod *oedema* Græcis dicitur, sumentes.

Quemadmodum enim ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituitosi humoris confluxu oedema excitatur. Est autem oedema (definitore Gal.) laxus quidam atque indolens tumor, seu rara quædam atque expers doloris moles, ex pituitoso humore in particulā aliquā influente exurgens. Ita quidè Galenus censuit lib. 14. Therap. de oedemate, quod morbus est, non symptoma.

Oedema quid.

20 Equidè scimus (inquit) aliter quoque [quàm ex pituitosi scilicet humoris fluxione] oedemata provenire. Nempe ex pituitoso humore aut spiritu vaporoso, ut in cruribus & pedibus eorū, qui aquæ subter curæ affectu laborant. Et phthoe, id est, corporis habitu cōtabescente: & cachexia, hoc est, malo habitu corporis. In illis quippe periculosis dispositionibus, oedema, affectus eius qui hominē premit, symptoma est, hoc est accidens necessariò consequens, nullam seorsum propriam, præcipuamque curationem postulans, ut in sequentibus dicitur. Oedema, uti & phlegmone atque erysipelas, in duas chirurgis finditur differentias, in verum scilicet oedema, & non verum, seu illegitimum. Verū oedema fit ex pituita naturali, quæ certè nihil aliud est, quàm sanguis crudus aut diminutè coctus: qui in massā quidem sanguinariā inuenitur, membris pituitosis enutriendis accommodus. Non verum, seu illegitimum oedema, fit ex pituita non naturali. Est autem pituita naturalis (ne quid obscurum relinquamus) humor frigidus & humidus substantiā crudus, colore vergēs ad quandā albedinem: sapore verò, & (si fas sit dicere) odore ad dulcedinē.

14. Ther. 2. ad Glauco. Oedema re symptoma est quibus maxime accidat.

Oedema duplex.

30 Non naturalis pituita, ea est, quæ à modo descripta degenerat, intra tamē suæ latitudinis terminos, quos si forsitan pertransierit, non iam amplius phlegma pituitaue, sed alius humor dici debet.

Verum.

Illegitimum Pituita quid.

Contin-

*Pituita quā
do & quo-
modo apro-
pria sua na-
tura degene-
rat.*

*Gal. duo tan-
tum pituita
genera po-
suit.*

*Octo diffe-
rentia tumor-
um præter
naturam ex
pituita.*

Contingit autem bifariam pituitam ipsam à propria sua natu-
ra degenerare: Vno quidē modo (vt loquuntur) in se, quando
scilicet in propria suipsius substantia citra alterius admixtio-
nem permutatur. Quod sanē multifariam accidit. Aut enim
in substantiā aquosam conuertitur, aut in flatuosam, aut in ad-
modū tenuem. Diciturque tunc phlegma aquosum, flatuosum,
aut tenue: aut crassius ac viscosius redditur idque tūc phlegma
crassum, & mucilaginosum efficitur, & per maiorem, seu (vt di-
citur) vltiorem indurationem, gypsū seu vitreū. Aut ipsum
putrescit & alteratur, efficiturque tunc falsum nitrosum, & cor-
rosiuum. Altero modo pituita efficitur non naturalis, per ad-
mixturem. Quando scilicet alius quispiam humor illi extrin-
secus accedit, verbi gratia, vel sanguis, vel bilis flaua, aut atra. Si
sanguis pituitæ permisceatur, hæc dulcis efficitur: si flaua bilis,
falsa: si melancholia, pontica, & acida. Sunt ergo octo species
phlegmatis non naturalis iuxta Auicennæ plac. ta. Halyabbas
tamen quatuor tantum constituit. Galenus autem (inquit Gui-
do) videtur, duo solum genera assignare, nempe falsum & aci-
dum. Tamen si libro secundo de differentiis febrium, & libro 2.
de locis affectis, atque in multis aliis locis, mentionem faciat de
vitreo, quod subindē sub acido (propter eam, quam cum eo ha-
bet affinitatem ac conuenientiam) reponit. Ex iis igitur colligi-
tur, quod ex pituita generantur octo species, seu differentiæ tu-
morum præter naturam. Primò enim ex pituita seu phlegmate
naturali, fit oedema verum, ac certum, seu legitimum. Secundò
ex pituita non naturali per admixturem generantur tres aliæ
differentiæ tumorum: quippe quod tres ali. humores cū ea pos-
sunt remisceri. Nominantur autē oedema phlegmonodes oede-
ma erysipelatodes, & oedema scirrholdes. Tertiò ex phlegmate
non naturali, per alterationem in propria substantia quatuor
aliæ exurgunt differentiæ. Primò namque ex flatuoso & vapo-
roso phlegmate fit tumor is, qui propriè Latinis inflatio, vulgò
autem medicorum apostema ventosum dicitur. Secundò, ex
aquoso, aquosum. Tertiò, ex erudo phlegmate, crasso, & muci-
laginoso, procreantur tumores illi, qui leues nodi quibusdam
dicuntur, & abscessus pituitosi, quos vulgò exituras phlemati-
cas appellant. Auicennæ verò interpreti dubelet frigida nomi-
nātur. Cuiusmodi sunt steatomata, atheromata, & melicerides.
Ganglia quoque (quæ Auicennæ glandulæ dicuntur) & id ge-
nus alia, quæ in sequentibus declarabuntur. Ex duro verò, seu
magis

magis indurato, & (vt sic dicatur) gypseo phlegmate, sunt non omnes duri, qui in iuncturis maxime reperiuntur, & strumæ, quæ vulgò scrofulæ nominantur. Quartò ex corrupta & putrefacta pituita generatur fistulæ, & vlcera, quæ scrofulosa vocant. Causæ cedematis, vt & aliorum tumorum præter naturam, sunt triplex. Primitiua, vt sunt casus ab alto, percussio, deprauata viuendi ratio, seu (vt dicunt) malum regimen. Antecedentes, vt exuberantia humoris pituitosi in partem aliquam decurrentis. Communis, ipsa pituita, in membro tumore ob-

10 fesso, iam infarta. & accumulata. Signa cedematis hæc sunt, tumor laxus & mollis, qui prementi digito cedit, & foueæ modo cauatur, nec amoro digito resilit, sed prementis vestigium retinet. Dolor aut exiguus, aut ferè nullus. Calor modicus. Color vergens ad albedinem, hoc est, subalbidus, seu (vt volunt alii) inter album & pallidum medius. Et alia id genus, quæ pituitæ dominium testantur. Oedema, vt & cæteri tumores, quatuor habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinatio-
nem. Hoc genus tumoris vt plurimum terminatur per resolutionem seu exhalationem, rarò per suppurationem, sæpius per

20 conuersionem, seu permutationem in nodos, & alias (vt vocant) excrecetas, quæ Græcis apostemata, Latinis verò abscessus dicuntur. Harum autem terminationum notæ, & agnitiones, superius in tractatu vniuersali dictæ sunt. Tumores hi cedematosi hyeme magis, quàm aliis temporibus, excitantur. Plurima enim tunc in corporibus colligitur pituita. Senes quoque & crapulæ deditos magis ac sæpius infestant.

Causa cedematis tres.

Signa cedematis.

Iudicia.

Oedematis, ex pituitoso humore in particulam aliquam confluentæ, curatio.

30 **Q**uoniam cedemata, ex humorum in aliquam partem fluxione, aliorum tumorum more suscitantur: duplex erit eorum curandi scopus erit, vt lib. 2. ad Glauc. Galenus annotauit. Alter, vt horum humorum qui iam partem occupat, substantia dissoluatur; alter, vt fluxio cogatur, restringaturque. Atque prout alter scopus alterum superat, remedia sunt miscenda, alterum quidem cum altero copiosius, aut parcius. Vbi igitur restringendi indicatio, eam quæ vacuandum seu digerendum esse suadet, superabit, augenda restringentium vis erit. Vbi verò plus vacuandum quàm restringendum erit, digerentium seu

40 discutientiũ ac exiccantiũ materia, & facultas prepollere in mixtione

Curandi cedematis scopus duplex cum adhuc signatur.

*Oedematis
in ueterati
curandi ra-
tio.*

*Oedematis
ut sympto-
ma est cura
tio.*

*Quatuor sco-
pi particula-
res in curan-
do legitimo
oedemate ob-
seruandi.*

*Prima intē-
tio.*

*Aër.
Potus.*

xtione debet. Porro maiore restringentiū vim miscendā esse ostēdit tū copiosior fluxio, tū parciore in affecta parte materia. Cōtra, exiccantiū ac digerentiū vberiore modū adhibere oportet, vbi copiosior materia locū obsidet, & fluxio minor est. In inueterato autē oedemate, & q̄ non adhuc in gignēdo est, nō amplius hac curandi ratione, mixtā facultatē quasi scopū habente, sed ad digerendā diffecandamque materiā declinante, vtendū erit. Quod & in omnibus ferē diuturnis affectibus obseruādū est. Cāterum oedema quod symptōma est periculosos affectus sequens, vt tabem, quam inter cutē, & vitiatū corporis habitū, 10 quē Græci cachexiam vocant, nullam seorsum (vt supra diximus) propriam, præcipuamque curationem desyderat. Curari enim, nisi affectū ex quo nascitur, profligato, non potest. Aliquid tamen ex eo remittēdum est, si quidem vires demoliat, aut primarium affectum augeat, aut curationem impediat. Satis ergo fuerit, si quidem curatione egebit, ipsum tumentem locum perfricare, aliās oxyrhodino, aliās oleo cum sale, aut etiā oxyrhodino sale habente. Eiusmodi enim frictio tumore remittit & dolore, si ex nimia distensione, (vt aliquando cōtingit) excutitur, demulcet. Oxyrhodinon fluxionem arceat, oleum 20 cum sale vim habet digerendi, & vacuandi quod impactū est: oxyrhodinon verò, cui sal admixtū est, partim digerit, & exiccet, partim restringit, & humorum affluxum prohibet. Sed præmissa hac vniuersali methodo, ad propriam ipsius legitimi oedematis, quod ex tenuis pituitæ influxu ortum habet, curandi rationem, sermonē cōuertamus. Hæc autē in rebus quatuor (sicuti de phlegmone & erysipelate dictū est) posterioris huius artatis chirurgis, consistit. Nēpe, in debita viuendi ratione, in pituitosi humoris præparatione, quā equationē vocāt, & eiusdē expurgatione: in fluxi & iam particulam occupantis humoris, re- 30 pressionē, dissolutionē, & exiccationē: & postremò in symptōmatum seu accidentium ipsum oedema consequentium congestione, & summotione. Hæc itaque sunt quatuor intēctiones particulares, quibus duas illas generales suprapositas indicationes assequimur. Prima igitur intentio perficitur, debita ac congrua sex rerū non naturalium administratione. Porro, ritē ac cōmodē res ipsæ nō naturales corpori laborantis adhibebūt, si ad caliditatem & siccitatem, cū quadā attenuatione, declinauerint vniuersē. Ergo tenuem & siccum aërem deligito, præparatoue. Vinū defecatum, pellucidum, album, vel subrubellum (quod 40 claretū

elaretur vocant) in suo genere optimum, & modicè aquâ dilutum, in potu assumito.

Panis probè coctus, & ritè præparatus esto.

Cibus.

Carnibus ouillis, aut ex montanis & campestribus amiculis lubens vescitor, iisque assis potius, quàm elixis.

Insculis, oleribus, & ossis parcè utitor.

Ab azyrnis, id est, non fermentatis, crudis quoque & præhumidis, abstineto.

Legumina, caseum, fructus præsertim horarios & immaturos, pices quoque (ni si forsân laxatiles, eosque vel assos, vel vino incoctos) ne gustato.

Assa in vniuersum meliora sunt elixis, & iisque pistoris industria præparantur. Parùm comedito ac minùs bibito.

Repletio.

Breuitè vitæ luxum, atque ingluuiem fugito.

Si alius non responderet, eam ficus & carthamo soluito.

Inaniti.

Ergo ficus aridas s. velfex numero accipito, easq; medulla seminis carthami impleto, & manè vel prima mēsa comedito.

Corpus moderatè exerceto, si tamen particula laboras, citra noxam id admiserit. Somnus brevis esto.

Motus.

20 Balneum atque omnia humectantia prorsus vitato.

Somnus.

Secunda intentio completur præparantibus seu æquantibus (quæ vulgò digestiua vocant) & vacuantibus materia illâ pituitosam, qua scater corpus laboratis. Ergo genus aliquod oxymelitis offerendum est, quod pituitam in corpore delitescētē possit incidere & detergere. Deinde præparata hoc modo expulsio ni antecedens materia, medicamento aliquo phlegmagogo, id est, pituitā expurgante, ex periti alicuius medici præscripto vacuanda est. Quod si (inquit Guido à Cauliaco) plethora adesser, tutò vena aperiri posset: non citra tamē periti alicuius etiā me-

Balneum.

Secunda intentio.

30 dici cōsiliū. At vix vnquā in corpore plethorico visuntur cedemata saltē legitima. Nam in eo nō magis pituita, q̄ cæteri humores abūdāt. Proindè vix sola, & nō aliis humoribus remixta in particulam aliquā corporis plethorici influere potest. Quare venæ sectio in cedemate saltē legitimo nequaquam ex vñ esse videtur. Tertia intentio perficitur in principio, ad motus re-percutiētibz: non iis quidem quæ natiua sua frigiditate vehementer stringendo repellunt, sed quæ non inualidè siccandi, & modicè digerendi vim habeant: ea aggregantia exiccationē & resolutionem vocant. In augmento verò discutientibus paulò
40 fortioribus. At in statu, circa eius finem præsertim, & statà iam fluxio

Tertia intentio.

*Auxilia in
principio œ-
dematis ad-
mouenda.*

*Posca aquo-
sa.*

*Emplastrū
Razū.*

*Remedia in
crementi tē-
pore admo-
uenda.*

*Lib. 14. The-
rap. & 2. ad
Glauc.*

fluxione, puris, iisque fortissimis digerentibus seu resoluenti-
bus. In declinatione autem absumentibus seu (vt dicunt) con-
sumptiuis & exiccantibus, si resolutione saltem terminari de-
beat. Si verò degeneret in abscessum, quem exiruram vocat, ma-
turantibus, & reliquiis quæ in curandis abscessibus proposita
sunt auxiliis, curabitur. Porro auxilia reprimentia, siccandi si-
mul & digerendi facultate prædita, quæ competūt initio œde-
matis ex pituitosi humoris influxu creati, tribus præsertim for-
mulis comprehenduntur. Prima est Gale. lib. 14. Therap. & se-
cundo ad Glauconem, vbi inquit, At si ex pituitoso humore in 10
particulam influente œdema constitit, abunde aliquando satif-
facit spongia, quæ ex aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit. »
Porro hæc ita attemperabuntur, vt vel bibi possint, vel vt non »
multum supra hoc aceti habeant. Deligare verò spongiam de- »
bebis, ab inferiore parte incipiens, ac iuprà finiens. Eito autem »
spongia modò conductura sit, omninò noua. Huius si occasio »
non est [hoc est, si nouæ copia non sit] hanc detergebis, expur- »
gabisque, exquisitè abluendo nitro, & aphronitro, & aqua lixi- »
uia. Auicennas iubet, vt loco spongiæ aliquandò admoueat »
pannus lineus duplex, aut quid simile. Secunda formula est 20
ipsius Auicennæ. Recipit autem aquæ decoctionis baurach, id
est, nitri vel spumæ nitri, & cinerum, & aceti, ana, quantum sa-
tis esse videbitur. Tertia formula est à Raze descripta ad hunc
modum: R. aloës, mirrhæ, licii, acaciæ, sief memithæ, id est, de
glauccio, cyperi, croci orientalis, boli armenici, singulorum par-
tes æquales: pulueriscentur, & cum succo caulium, hoc est, brassi-
carum, & aceto misceantur, & fiat emplastrum. Porro eadē nu-
per commemorata auxilia in huius œdematosi tumoris incre-
mento, etiam bene faciunt, adiecto saltem illis aceto copiosio-
re, vel modico alumine, in corporibus præsertim robustioribus 30
& eurem duram habentibus, atque vbi aquosior posca nō pro-
fuerit. Ergo si sub his paulò antè memoratis auxiliis œdema nō
subsīdat, quiescatue: vbi rursus deligabis, paulò plus aceti misce-
bis, vt posca valentior sit, vel pusillū aliquid aluminis conicies,
ac noua spōgiā admouebis. Hæc enim & copiosum medicamē-
tum excipit, diuque continet, & sua substantia affectam partē
exiccat. Si nouæ copia non sit, melius est, inquit Galenus. eo,
quod vulgus vocat clychnion, vtare. Id verò ante omnia molle
est: quod genus Tarficum est, cuius si facultas est, audacter vti
tor: vilius enim experire, quàm spōgiam. Madcat verò ex pu- 40
sca,

fra, quæ & aliquid habeat aluminis. Tum (vt præscriptum est) deligetur, ab inferiore sursum: hoc est, ligatura incipiat in imis partibus, & desinat in altioribus. Sit autem arctatio mediocris, velut in ossis fractura. Ac primæ quidem iniectiones fasciæ, quæ scilicet inferire incipiunt, magis arctandæ: quæ deinceps sunt, sensim remittendæ: cæterum non adeo, vt laxa sit aliqua delegationis pars. Remedia autem, quæ post vigorem status, vbi iam constitit fluxio, & in declinatione vniuersali ad mouenda sunt, si cedema tendat ad resolutionem, sub triplici etiam formula describi solent. Prima est Auicennæ: nempe spongia imbuta aqua lixiua, ex cinere fici, vitis, & ilicis, quæ species est quercus, & particulæ admota: siquidem huic magna vis inest exiccandi, ac detergendi. Secunda est Bruni, quam & vîsurpauit Theodoricus. Recipit autem aluminis, sulphuris, myrrhæ, & salis singulorum pares portiones: miscentur hæc omnia cum rosaceo, & aceto, & fit linimentum, quod præcedenti remedio potentius adhuc exiccat. Tertia rursus est Auicennæ, cuius descriptio est talis: stercoreis vaccini, lib. semis, olibani, styra-cis, vînæ, id est, musci arborum, qui Græcis bryon dicitur: câ-lami aromatici, spicæ, absynthij, singulorum semunciam: con-fice omnia cum aceto, & decocto caulium, siue brassicæ, & fiat emplastrum. Atq; hæc quidem ratio est curandi cedematis, quod resolutione terminatur. Si verò digestionem non cedat, sed ad suppuracionem spectet, vnguentum è succis diachylon nomi-natum, atque id maxime, quod à Rogerio compositum est, per-quàm vtiliter apponitur. Ad id etiam confert vel magnopere & sequens emplastrum, quod recipit maluam, brancam vrinam, (vel, si mauis dicere hircinam, quæ & achantus, & achanta dici-tur) radicem althææ, radicem lilij, cepas assas, limaces, fermentum, & semen lini: cocta, & subacta, & cum axungia vel butyro mi-xta, rediguntur in formam emplastri. Aliud ad idem summe effi-cax. Accipe succi ebuli, sambuci, oxylapathi, quod nostrates offi-cinæ lapathij acutum nominant: leuistici, seu ligustici, & ma-rathri: ex horum singulis quantum lubet, pari tamen pondere: deinde vt oportet coquito, vnâ cum dialthea, melle, oleo, & bu-tyro, atque ex ijs emplastrum conficito. Maturam apostemate, non expectetur, donec spontè aperiantur: quoniam tarde ad-modum, vel fortasse nunquam id contingeret: sed ferro san-dente, aut caustico aliquo medicamento fiat apertio, qua pus
Status et de
clinationis
remedia.
Spongia li-
xiua imbu-
ta.
Linimentum.
Emplastrum
Auicenn.
Vinea quid.
Concoquen-
tia seu ma-
turantis.
Hoc ad Theo-
doricum re-
fertur.
Apertio.

40 excernatur, iuxta modum & formam superius expressam. De-
f
inde

*Vnguentum
mundifica-
tium quod
ad Dinum
refertur.
Quarta in-
tentio.*

indè sordes detergeantur, vnguento vulgò Apostolorum di-
cto, vel mundificatio ex apio, & succo absynthij, vel vnguen-
to subscripto, quod pus crassioris substantiæ attrahit, & m un-
dificat. Accipit autem id galbani, ammoniaci, resinæ terebin-
thinæ, picis, sepi vaccini, olei antiqui, ana partes æquales: dis-
solvuntur gummi ex aceto, & liquefiunt ad ignem cum reliquis,
& fit vnguentum. Post hæc verò similiter reliquis vlceribus for-
didis curetur. Ceterum quartam intentionem assequimur, pro
ratione & natura accidentium superuenientium, vt si accidar
dolor, imprimis sedandus erit, admota (iuxta Auicennæ doctri- 10
nam) æsipo humida, vel vino cocto, vel cerato composito ex
oleo chamæmelino, oleo de absynthio, oleo de spica, & cera. Si
verò durities adfuerit dissoluenda, atque emollienda est, me-
dulla bubula, vel ceruina, vel quapiam alia simili, vt in sequenti-
bus dicitur. Galenus autem in diuturno oedemate partem

*Lib. 2. ad
Glaucō.
Oedemata
in ueterato.*

oleo liniens, spongiam ex lixiuo apponebat, atque stringens
arctius affectum perfectè curabat.

Capita curationis oedematis.

*Oedema
morbi acci-
dens.*

Oedemata quod symptoma est, hoc est, accidēs alijs morbis
superueniens, vt aquæ inter cutē, tabi, & cachexiæ medi-
camenta, quæ discutiant, & sine molestia desiccant, adhibeto.
Ergo tumētē locum oxymelite, vel oxyrhodino, aut oleo
cum sale, aut etiam oxyrhodino sale habente, perfricato. Hac
enim frictione & dolore (si quis ex distensione excitetur) mi-
tigabis, & tumorem remittes.

*Oedema
morbus.*

Oedemati verò ex tenuis pituitæ influxu excitato, si nondū
refutit fluxio, medicamēta quæ partim digerant, partim verò
cogant, restringantque, admovento.

Ergo spongiam nouam, vel aliam lixiuo ablutam, initio po-
sca dilutiore in mollioribus præsertim corporibus madentē al-
ligato, vinculaq; (si artus tumor occupet) ab inferiori parte ad
superiorem, vt in fracturis, ducito, & mediocriter constringito.

Quod si per hæc tumor non remittitur, subsideatve, poscæ,
id est, oxycrato, aluminis momentum adijcito.

*Oedema in-
ueteratum.* At si iam in vetustatem affectus inciderit, non amplius reme-
dia mistam hanc facultatem (digerentem scilicet & restringen-
tem) habentia, sed digerentia ac desiccantia potius adhibeto.

Igitur, partē oleo prius inuncta, spongiam qualem suprà di-
ximus, lixiua delibutam, imposito, ac fascias arctius deligato. 4

De Tumoribus præter naturam. 83

De tumoribus præter naturam, quæ inflationes dicuntur Latini, vulgò autem apostemata ventosa. CAP. XI.

Nunc tempestiuum est, ut de inflationibus disseramus, quibus diuersa ab œdematis curatio est. Illa nanque, ut Galenus ait li. 14. Therap. ex pituitoso succo ortù habent: proinde prementibus nobis cedunt, digitiq; admodum altè in ipsa descendunt. Inflationes verò, ex flatuoso spiritu collectò nascuntur, aliàs sub cute, aliàs sub membranis, quæ ossibus circumdantur, aut musculos, viscera uel ali-
 quod includunt. Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis: itemque in medio spacio horum, & peritonæi, ut in aqua, inquit Paulus, iubarercutem genere, cui nomen est tympanias. Differunt quoque hæc ab œdematis, quòd & pressa digiti non retinent vestigiū, & sonitum veluti tympanum reddunt: itemque quòd in cavitare sensibili subinde continentur, atque hac nonnunquam maxima. Causa huiusmodi inflationum Gal. lib. 6. de morb. & symptomatis, est caloris natui imbecillitas, in materia pituitosa, ad flatum excitandos disposita. Calor nanque eiusmodi suscitare quidem vaporem ex humida materia potest, sed non discutere, ut asserit Galenus his
 « verbis: Quemadmodum enim (inquit) in externis rebus videmus, ut frigidissima constitutio, maximè spirante Borea, Aerem
 « sereniorē reddit, ac calidissima per æstatem constitutio ambientem nos aerem purum efficit, mediæ verò constitutiones
 « nebulas parit: ita in animalibus accidit. Neque enim calor per extremam imbecillitatem, neque cum vehementes sunt ei
 « vires: sed cum medium inter has affectiones obinet, flatum genere potest. Retinetur autem flatu eiusmodi in loco quopiam
 « (ut dicit Auicennas) vel propter densitatem, seu (ut dicunt) spiritus
 « soliditatem membri, vel propter ipsius vaporis seu spiritus crassitatem. Quod & ijs verbis Paulus ex Galeni sententia testatur est. Membrorum (inquit) densitas, tum spiritus simul crassities efficiunt, ut idem spiritus non dissipetur.

*Inflationis
et œdematis
differentia.*

Lib. 4.

*Inflationū
causa.*

*Lib. 6. de
morbis &
symptom.*

Lib. 4.

De signis & iudicijs inflationum.

Signa inflationum sunt, tumor renitens tactui, cum lucido quodam splendore, sonum, ut vter, vel tympanū, dum percussitur, reddens. Ad hæc per sæpè sentitur flatu per totum corpus, modò huc, modò illuc discurrens, ac dolorem extensiuū pariens. Quod autè ad iudicia pertinet, flatulentis seu vaporosis

*Inflationū
nota.*

Inflationū prognostica. spiritus, qui non discutitur, multa parit incommoda. Halituo-
sus verò huc atque illuc per corpus discurrens, cum dolore & an-
xietatibus magnoperè verendus est. Quippe qui à materia ali-
qua venenosa attolli videatur.

De inflationum, seu flatulentorum tumorum curatione.

*Inflationū
curatio.*

Cum tria hæc, materia humida, caloris imbecillitas, & mea-
tum densitas, ad inflationis generationem (ut in præce-
dentibus ostensum est) concurrant: curationis ipsius scopus erit,
caloris substantiam roborare, vaporem seu flatulentam mate-
riam extenuare, & meatus corporum (in quibus vaporosus ille
spiritus collectus continetur) densitatem recludere. Porro poste-
riora duo, nempe densi corporis rarefactionem, & crassi spiritus
extenuationem, iisdem omnino auxilijs assequimur, medicamen-
tis scilicet tenuitate partium pollentibus, siue extenuantibus, &
cassacientibus, magis aut minus, pro partium inflatione afflicta
rum densitate, vel raritate, & vaporum quoque crassitudine, vel
tenuitate. Pro horum nanque differentia facultas medicamen-
torum quæ admouentur, intendi ac remitti debet. Itaque raræ
partes, & vapor seu spiritus non admodum crassus, minus dense-
iæ verò, & vapor multa crassitie præditus, magis extenuantibus
& calidis egent. Caloris autē substantia, si perijt, aut imminuta
est, pro ratione iacturæ eius, refarcienda erit. Si verò alterata fue-
rit, ad mediocritatem reducenda. Quod si vnà dolor excruciet,
ad anodyna transeundum erit. Non absurdè igitur, inflatio-
num (quas ventosa apostemata vocant) curationem tribus in-
tentationibus perfici dixerunt posterioris nostræ ætatis chirurgi:
prima in debita viuendi ratione, secunda in proba concoctio-
ne, & tertia in flatulenti spiritus, qui in particula collectus est,
discussione, seu (ut aiunt) in materiæ coniunctæ extirpatione 20

*Tres scopi
curandarū
inflationū.*

*Prima in-
tensio.*

Cibus.

Potus.

consistit. Itaque vitæ institutio talis erit. Abstinentium imprimis
ab omnibus crassis, viscosis, crudis, pituitosis, & flatuosis. Cuius-
modi sunt, dulcia, substantia leguminum, fructus, rapum, casta-
neæ, & alia id genus, quæ spiritum flatusosum procreant. Vten-
dum autē calidis & siccis; item attenuantibus, & flatū discuten-
tibus, ut est panis hordeaceus, qui aliquid salis & cumini recepe-
rit. Laborantis porus sit vinū album, vel subrubellū (quod clare-
tum vocant) aut vinum Græcum. Vtatur decocto cicerum alte-
rato cum cepis, apio hortensi, quod vulgò petroselinum appel-
latur, calamintha, ruta, & cumino. Carnes sint asæ potius, 49
quàm

De Tumoribus præter naturam. 85

quàm elixæ, & præferim ex volatilibus, vt in præcedenti capite dictum est. Vt autem secundam intentionem assequaris, roboranda tibi est virtus concoctrix bonis quibusdam speciebus aromaticis, & confectio nibus, atque (vt vocant) electuarijs ad hoc dicatis, vt sunt diacuminum, diacalaminthe, aromaticum rosatum, & sequens confectio, quam dragetâ appellant. anisi, marathri, carui, danci, cymini, baccarû lauri, tritorum, singulorum vnciam vnâ, glycyrrhizæ, quam liquiritiam vocant, galangæ, zingiberis albi, singulorum semunciam, charyophylorû, 30 cubebarum, piperis longi, seminis rutæ, singulorum drachmas duas, anisi saccharo incrustari, quadrantem, id est, vncias tres, sacchari selibram, id est, libram semis, fiat puluis. Extrinsecus verò inungatur ventriculus oleis de spica, de costo, & rutæ, vel fiat epi thema, quod ea recipiat, quæ & flatus discutiunt, & iuuandæ cōctioni dicata sunt, atq; hoc stomacho admoueat. Sed hæc ad medicinam magis, quàm chirurgiam pertinent. Tertia intentione compleretur medicamentum, cui mixta facultas sit, hoc est, quod simul concoquat, digerat, & modicè adstringat, nec dolorem augeat. Ad hæc autem consequenda instituuntur tres formulæ 30 auxiliorum, lib. 14. Therap. Prima ad hunc modum posita est a Galeno: In artubus (inquit) & musculis, qui sub cute aut etiâ membranis, quæ ossa vestiunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarû partium, cuiusmodi est lixiuium noua spongia exceptum, satisfecerit. Sin dolor quoque vrget, vngenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendique vim habeat. Incidunt porro ex percussionibus eiusmodi affectus, vbi vel musculus, vel membrana quæ os circuit, est contusa. Ac super membranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est spongia. Secunda formula ibidem ita descripta est. Ad musculos verò (nanque hi aliquando dolent) medicamentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quod fit, vt ad hos solo lixiuium non vtantur, sed immissa ei tum sapa, tum pauculo oleo. Satiùs autem fuerit in principio, non addidisse lixiuium, sed sapa cum vino & exiguo aceto vti, ac quod mediocre fit, olei adijcere. Vbi mixta sunt, modicè excalfacere, ac lanam non loram, quam succidam vocant, ipsi imburam imponere. Quod si eiusmodi lanæ facultas non sit, ipsius cespis miscellæ supradictæ est iniiciendus. Vbi verò cespis præstito non est, aliud quid cerati, quod ex cespice componitur, rectè admiscueris. Debent enim contusi musculi leni medicamento cui mixta

Secunda intentione.

Drageta cōctionem adiuvans.

Tertia intentione.

Ad inflationem ex contusione in artubus musculis & membranis; quæ ossa cōsequuntur.

Ad musculos cum inflatione dolentes ex contusione.
Sapa.
Lana succidam.
Oespis.
Ceratum ex cespice.

*Aceti, vini,
& lixiuij
collatio.*

*Pro lixiuijo
aphronitru.*

*Si inuetera-
uerit infla-
tio.*

*Si flatuosus
spiritus ve-
nenatus fue-
rit.*

facultas sit, quippe quæ simul concoquat, digerat, & modicè ad-
stringat. Quando si nihil habet adstrictionis, auget aliquando
phlegmonas, ac maximè in ijs corporibus, quæ sunt plethorica.
Ergo trium iam comprehensarum indicationum [concoquendi
scilicet, digerendi, & modicè adstringendi] in inflatis ex plaga
musculis memor, ubi dolor maior viget, mitigatina magis ra-
tione vteris: [plus olei & vini adiiciendo] ubi abest, maiore vi
instabis. Maiorem vim intelligo, cum breui via properatur ad
finem. Porro brevis via fit, per ea quæ valentes habent vires.
Hæ autem maximè in lixiuio & aceto habentur, post hæc in vi-
no. Quoties igitur de mitigando non laboras, horum [lixiuij
inquam & aceti] plus in mixturam coniicies. Rursus ubi repe-
lere studes, vini plus quàm horum immittes. Porro id optimum
in hunc usum fuerit, si nigrum austerumque sit. At si digerere
males, lixiuij plus indes. Acetum verò si his miscebis, ad ambo
utilis erit mixtura, propterea quod acetum mixtas habet faculta-
tes. Vbi verò musculus sine dolore est, licet sanè in lixiuij penu-
ria, pro ea aphronitrum immittere. Esio autem id minimè lapi-
dosum, sed magis spumosum. Tertia ferula est emplasticum,
quod fit ex strigmentis gymnasiarum, id est, sordibus, quæ à cor-
poribus lustrantium detergebantur, & calce viuæ ex aqua & vi-
no simul coctis. Gale, verba hæc sunt, lib. I. 4. Therapeu. Quæ ve-
rò huius generis inflationes neglectæ inueterarunt: primo qui-
dem loco his, ea quæ ex lixiuio componuntur (ut prædictum
est) adhibeas. Secundo loco emplasticum aliquod. Dicam autem
& horum exemplum. Strigmenta gymnasiarum seruescæta, per-
cola primùm, sic ut pura sint: deinde rursus in cacabum immis-
sis, calcem viuam in farinæ speciem tusam insperge, ad lunæ usque
crassitudinem. Salutare his est & medicamen, quod ex syco-
moro componitur, aliaque id genus. Cæterum si huiusmodi
flatuosus spiritus, qui inflationem committit, fumosus fuerit,
malus, corruptus, à materiaque venenosa excitatus, cum dolore
intolerabili, & vehementi calore, per membra discurrens, nul-
lum tutius ac melius consilium dari potest, quàm quod ubi in
parte quapiam substituerit, pars ipsa protinus infra supraque de-
ligetur, ac in medio nouacula, vel ferro candente tumor aperia-
tur, ita ut faciliè vapor ille venenosus egredi possit. Deinde
hians plaga, implenda erit aloë, & bolo armena, ex rosaceo &
aceto dissolutis. Transactis verò diebus tribus, aut quatuor,
vulnus carne opplendum erit, & ad cicatricem perducendum. 40

Porro

De Tumoribus præter naturam.

87

Porro in venenosis eiusmodi inflationibus, victus ratio tenuior esse debet, egetque corpus medicamento purgatorio. Quod si theriace sumenda daretur laboranti, rectè illi consul-
tum esset.

Victus ratio.
Theriaca.

Capita curaticus tumoris flatulenti.

Imbecillam caloris affectæ partis substantiâ roborato, deperditam in restaurato, alteratam ad mediocritatem reducito.

Vaporosum seu flatulentum spiritum crassio-
rem, unde tu-
mor eiusmodi suscitatus est, extenuato.

Densatos cutis, ac totius laborantis particulæ, meatus, medicamentis tenuitate partium pollentibus, recludito: deinde flatuosum spiritum discutito.

Pro locorum autem affectuum differentia, & vaporis ipsius flatuosi crassitudine vel tenuitate medicamentorum quæ admoventur, tum materiam, tum facultatem intendito, ac remittito.

Porro si cum dolore & inflammatione tumor eiusmodi flatulentus in ciderit (ut cõtingit in musculis ob cõtusionē flatu repletis) mitigatoria initio admovento: pcedete verò tẽpore, quæ discutiendi vi polleat, ecrũ copiã paulatim augẽdo, adhibeto.

Inflationes quæ ob negligentiam antiquatz fuerint, primò quidem lixiuio foueto, deinde emplastrum quodpiam ex his quæ molliunt, & discutiunt, admovento.

De tumore è serosa substantia creato, quod aquosum apostema nominant.

C A P. XII.

Plurimam, si per vniuersum corpus increuerit, ea species aquę intercutis, quã leucophlegmatia vocat, comitatur, ut Gale. annotauit lib. 6. de symptomatum causis. Cum verò in vna duntaxat parte pituitosa hæc substantia redundat, oedema enascitur: ita enim appellant tumore laxum, ac doloris expertem. Serosa autem excrementa si abundant, aquã intercutem (quã asciteum nominant) generare solent. Quæ si in vnã aliquam partem incubuerint, in ea phlyctænas, id est, pustulas excitant. Porro serosum eiusmodi recrementũ, recentiores aquosum phlegma nominare consueuerunt. Quemadmodũ etiam & pituitã illam, quæ reperitur in pedibus & cruribus eorum, quos aqua intercutem vexat, & in tabidis, & alijs qui malo habitu (Græci cachexia vocant) laborant. Adhuc, tumores ex eiusmodi aquoso phlegmate, aut seroso iã dicto recremento profectos, f 4

Leucophlegmatia.
Oedema.

Serosum recrementum.

Phlyctæna.

f 4 creatos,

creatos, illegitima ac non vera œdemata vocitant. Cæterum in periculosis illis dispositionibus seu affectibus, tabe inquam, hydrope, & cachexia: œdema (vt superius ex Galeni sententia dictum est) symptomatis, seu accidentis rationem obrinet, non morbi: nulla quidē propria præcipuaq; curatione indigens. Sola enim frictio ex oxyrhodino, aut nonnunquam ex sale & oleo, vel etiam ex sale & oxyrhodino, sistit ipsum, aliaq; huiusmodi multa. Horum autem tumorum causæ sunt, alteratrix facultas frigida intemperie vitata, & alimētorum prauitas, ad aquosita- tem declinans, vt ex lib. 6. de symptomatum causis facile est col- ligere. Signa & iudicia ferè eadem sunt, quæ & veri œdematis. Hoc tamen differunt, q̃ in istis aquosis tumoribus laxis magis tumor est, quàm in œdemate legitimo: atque idē non tantum renitur tactui, sonatq; non vt flatus ventrisve, sed vt aqua potius. Ad hæc aliquomodo splendere videtur, cum ad lucem quis ipsum intuetur. Quod verò ad huiuscemodi tumoris iudicia attinet, aquosus haud dubiè tumor à maiori enascitur frigiditate quàm flatusosus, vt Galenus autor est, commentario vndecimo lib. 4. aphorismorum, super hunc aphorismum: Quibus tormenta, & circa vmbilicum labores &c. Videtur autem (inquit) à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quem ascitem vocant: à minore verò tympanias, quæ ab Hippocrate aqua inter cutem sicca nominatur. Neque enim humida substantia in flatusosum aërem sine calore aliquo potest transmutari. Tumores præterea aquosi sæpius in pedibus, testiculis, scroto, capite, & iuncturis accidunt, quàm in alijs quibusvis corporis partibus: tum q̃ humor cuiusmodi in eas partes promptius irruat, tum q̃ caliditas in ipsis modica sit: quippe quæ procul à calidissimis absunt partibus, vt secundo Progn. ait Galenus. Quemadmodū etiam flatusosus spiritus rarò inuenitur absque humore aquoso, ita vix vnquàm aquosus siue serosus humor in particula aliqua concluditur absque flatu. Hactenus de generatione, causis, signis, & iudicijs aquosi tumoris, nunc de curatione.

Aquosi tumoris curatio.

Cum aquosi tumores, ex serosi (vti diximus) recrementi fluxione excitentur, non alia certè curandi via & ratione, saltem vniuersali, in illis profigandis vtendum est, quàm ea, quæ in alijs suprā memoratis tumoribus, qui ex humorum in partē aliquam influxu procreantur, persanandis, à nobis suprā expli-

Lib. 2. ad

Glauc. &

14. thesa.

Causæ tumo-

rum aquo-

forum.

Aquosorum

tumorū no-

tæ.

Iudicia.

Ascites à ma-

iore frigidi-

tate genera-

tur, quàm

tympanites.

Quas par-

tes maxime

prehendant

aquosi tumo-

res.

De Tumoribus præter naturam.

82

cata est. Duplex igitur curandi indicatio per initia in eiusmodi tumoribus erit: nempe vacuandi quod influxit, & fluxionem inhibendi. Quocirca & composita fuerit de talibus affectibus, veluti & de reliquis morbis omnibus, quicunque in generatione ne adhuc sunt, medentis sollicitudo, ex ea scilicet quæ curat, & ea quæ providet. Itaque prima indicatio ei medicinæ artis parti subijcitur, quæ morbos curat: secunda verò ei parti subiacet, quæ futurum morbum præcauet. Porro ut geminū hunc scopum vniuersalem assequamur, alijs quinque particularibus intentionibus est opus, à nostro Guidone à Cauliaco in curatione

Curandi a-
quosi tumo-
ris duplex
indicatio.

10 tumoris aquosi hoc ordine & modo qui sequitur expressis. Prima in probæ vitæ institutione atque observatione consistit. Secunda in concoctionis emendatione, seu (ut ait) rectificatione. Tertia, in aquosi humoris per aluum expurgatione. Quarta, in eiusdem serosi cremeti per urinarios meatus educatione. Quinta & vltima, in coniunctæ (ut loquuntur) seu contentæ in particula humiditatis aquosæ, euaporatione, atque exiccatione. Ceterum cum primæ quatuor intentiones magis ad medicum spectent, quàm ad chirurgum, quem hoc opere instituendum suscepimus, atque etiam ex ijs quæ in præcedentibus dicta sunt, satis innotescant: consilium fuit, tantum de postrema, quæ topica desiderat auxilia, hoc loco agere. Quinta igitur intentio perfitur cum exiccantibus & resoluentibus huiusmodi aquosas ac serosas humiditates, quæ in particula laborante continentur. Horum autem tres communiter formulæ statuuntur. Prima est Galeni lib. 2. ad Glauconem, & 14. methoden. nempe quæ constat oxyrhodino, & sale, ut superius dictum est. Secunda est eiusdem: spongia scilicet noua, lixiuo perfusa, & reliqua alia auxilia, quæ supra ad oedemata scripta sunt.

Quinq; par-
ticulares in-
tentiones cu-
radi aquosi
tumoris.

30 Quibus ut potentius exiccent, & discutiant, addenda sunt, aphonitrum, alumen, & sulphur. Tertia formula est cuiusdam emplastri, ab Auicenna descripti in curatione scrofularum, quod Galeno attribuit in libro de compositione medicamentorum 28. & 29. id est, secundum genera. Hoc autem (ut ille prædicat) intra hebdomadam vnā ad summum: plerumque verò intra triduum omnem duritiem resoluit. Porro tamen emplastrum hoc apud Galenum libro nuper citato non reperitur, eo tamen commodè uti possumus ad aquosiā & fluctuosam duritiem dissoluendam: eius autem descriptio talis est

Emplastrum
Auicenne
discutiens
aquosos tu-
mores.

40 Auicennæ: 27. seminis sinapis, semini vrticæ, sulphuris, spumæ maris,

maris, aristolochiæ [rotundæ] & bdellij ana vnciam vnā, ammoniaci, olei antiqui, & ceræ, ana vncias duas. Quod si hoc emplastro non discutitur, non aliud auxilium melius ac præsentius excogitari potest, quā vti ferro aperiatur, deinde detergeatur, & aliorum fordidorum vlcera more curetur.

Capita curationis aquosi tumoris.

- 1 **V** istum attenuantem, calfaſtorium, & deficcatorium laboranti inſtituito.
- 2 Vt corpus moderatè exerceat, parçè edat & bibat, non multum dormiat, ventremque & veſicam ſæpius ad excretionem exuſcitet, imperato.
- 3 Vt probè alimenta concoquat, & flatuſ minimè gignat, curato.
- 4 Seroſas humiditates, quibus laborantis corpus ſcateret vniuerſum, per aluum, & vrinarios meatus expurgato.
- 5 Seroſum illud recrementum, quod in affecta parte continetur, deficcato, & per halitum digerito.
- 6 Quod ſi diſcuti non poſſit, ſcalpellū, vel potius igni candens ferramentum, in tumorem, ſi artus occupet, adigito, atque eum parte procliuſiore (quò facilius inde humor emanet) reſerato.
- 7 Humore qui tumorem committebat, per emiſſarium vacuato, reliqua quæ ad fordidorum, & aliorum conſimilis naturæ vlcera, curationem pertinent, ſine mora perficito.

De glandulis, nodis, ſtrumis, & cæteris abſceſſibus, quas excreeſcentias phlegmaticas vocant.

CAPVT XIII.

Enumeratio abſceſſuum pituitorum.

C Racorum ganglia, choerades, id eſt, ſtrumæ, quas etiam ſcrofulas vocant, bronchocele, quod bocium, & herniam gutturis nominant, melicerides, ſteatomata, & atheromata: ad hæc teſtudo, talpa, & nata ſiue naſta, tumorum nomina à recentioribus medicis inuenta, & quā apud antiquos reperta: item fugille Auicennæ: nodi quoque & vulgaris bubo, aliæque id genus multa, quacunque corporis parte naſcantur, ſerè ex pituita generationem habent: atque ob id ad pituitoſos tumores merito referuntur. Cæterum tametſi nonnulli ex ijs nuper memoratis abſceſſibus in tophaceâ duritiem, & ſcirrhofos affectus aliquando degenerent: radix tamen & origo illorum parte maiore pituita exiit, vt voluit Auicenna.

De Tumoribus præter naturam.

91

Auicennas. Quamquam non imus inficias, quin & alius humor ipsi pituitæ, cuius eiusmodi abscessus propriè soboles sunt, interdum admisceatur: atque ita compositi & heterogenei nascantur abscessus. Verùm de simplicibus solum nobis hic sermo erit ex quorum analogia compositorum etiam cognitio faciliè habebitur. Hæc enim ad illa, veluti ad quosdam certos canones, semper adigenda sunt, ut alibi quoque diximus. Itaque prædicti omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum, seu (ut vulgare chirurgicorum more loquar) excrementiarum phlegmaticarum, reponuntur, habentque speciales quasdam inter se differentias, ut ex sequentibus patebit. Glandula enim (ut Guido præcauit) à glandis forma, quam præ se ferre videtur, non mendaturam accepit: estque (inquit) utcumque mollis, vnicamobilis, & separata à partibus circumiacentibus in emunctoriis plerumque nascens. Auicennæ autem glandulæ nascuntur vel in manu, vel in pede, vel in loco aliquo nervi & tendonibus coniuncto, & has quidem tum vetat extirpari, ne scilicet laborans in spasmus incidat. Eueniunt quoque, ait, summæ volæ manus, & frontis, vocatque easmodò apostematæ glandulosa, modo nodos. De his enim inconsideratè tractat in diuersis capitibus, vtpote in capite de nodis ad finem, & capite de glandulis. Itaque videntur glandulæ Auicennæ diuersæ esse à glandulis Guidonis, & Græcorum ganglia illis (Auicennæ inquam glandulis) eadem esse. Quod sequentia Pauli verba aperte testatur: « Ganglium nervorum cœcretio est, ex ictu aut lassitudine oboririens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipuè motui dicatis: nempe manu summa, & pedibus. Rarius cubitum & caput occupat Aetio, ac rarò eidem sponte prouenit. Et rursus idem Paul. lib. 6. cap. 39. quid sit gangliū, vnde nascatur, in quibus maxime partibus proueniat, quæ denique notæ ipsum comitètur, aperiens: id ipsum quod diximus, confirmat, inquit: Gangliū nervi est concremento, ex ictu, aut labore proficiscens, plerūque: verò in manus iunctura, quæ cū brachio comitatur, talo & articulo: Hæc abioluitur: quāquam in aliis quoque partibus proueniat. Hæc comites sunt notæ, tumor cœcolor, renitēs, indolensque. At si violenter premas, stuporis sensum exhibet, nō in alto, sed ipsa sub cuteradices agens, & ad latera ipse trans: sin autē vi adigas, tum ante, tū post, nequaquā id facit. Hactenus Paul. Aegineta de gangliis. Nunc ad reliquos pituitosos abscessus, seu (ut eorum more loquar) excrementias phlegmaticas, sermonem conuertamus.

Simplicia sunt regula compositorum

Glandula Guidonis.

Glandula Auicennæ, quæ eadem sunt cum gangliis Græcorum.

Glandula Guidonis distincta à glandula Auicennæ. Cap. 16. lib. 4. Ganglium quid?

Gangliū notum. Tumor etiam est in equalis Finlay. & Aetio.

Scro-

Scrofula.

Scrofula à vulgò vocata, nihil aliud sunt, quam indurati, & intra membranulam contenti adenes, id est, glandulae in collo, axillis, & inguinibus praecipue consistentes, ubi glandulae vasis substratae collocantur. Nonnunquam tamen, quamvis raro ex carne eorundem locorum fiunt, quae affinitate quadam ad strumarum naturam vertitur, & materiae adiectione adaugetur, ut visum est Leonidæ. Has Latini strumas vocarunt. A Græcis vero chcerades dicuntur, vel à charadibus quidem petris per marinas aquas transparentibus, vel à suisbus multiparis animalibus (numerosae enim sobolis existunt, ut fues) & eo morbo frequenter affectis. Scrofæ etenim, id est, fues, colla habent glandulosa,

*Chcerades Græcorum.**Struma Cor. uel. Celsi.*

& magna ex parte strumosa. Struma autem Celsio tumor est, in quo subter concreta quædam ex purè & sanguine quasi glandulae oriuntur. Nascuntur eidem maximè in ceruice, sed etiam in aliis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque scemi narum se reperisse chirurgus Megeas autor est. De iis etiam Paulus in eum modum: Oriuntur (inquit) strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut vtrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatoma

*Lib. 6.**Lupia.*

mata, atheromata, & melicerides. Lupia (inquit Guido) veluti lupulus, mollis, rotunda in locis duris & siccis suam sedem præcipue deligit, ut in palpebris, & locis nervosis: vulgus gallicum vocat *vneloupe*. Itaque si eius descriptio, atque etiam curatio, quæ in sequentibus habetur, cum ganglii Græcorum descriptione, & curatione cõferatur, affectus tibi videbuntur nõ admodum inter se dissimiles. Verum magno errore tenentur, qui eiusmodi lupiam eandem faciunt cum affectu, quem recentiores lupum appellant. Est enim lupus malignum vlcus, partes inferiores, sed præcipue crura infestans, celerrimè depascens, &

Lupus morbus.

quasi lupus (à quo nomen accepisse videtur) famelicus, proximas sibi carnes exedens: quod vitium dubio procul de genere est phagedænarum. Proinde affectus sunt longè inter se diuersi, quanquam in nomine quandam affinitatem habeant. Nodus tanquam funis nodus eidem Guidoni dicitur, rotundus durus, & eodem in loco permanens, circa loca nervosa maximè apprensus. Auicennas autem nodos definit alicubi dubelera frigida, facitque hoc nomen genus ad steatoma (quæ à nostris adiposi, & adipini nodi nominantur) ad meliceridas, id est, meliticos nodos, & atheromata, quæ materia constant, pulti (quam Græci atheram vocant) simili. Cæterum cum hæc tria absces-

*Nodus.**Nodi Auicennae.*

suum

suum genera. steatoma inquam, meliceris & atheroma, frequen-
 tissimè incidunt, ac locis valde multis Galenus eorum memine-
 rit: non abs re factum putauimus, si (nacta hoc loco de iis disse-
 rendi occasione) eorum naturam, notas quibus agnoscantur: in
 quibus item inuicem dissideant, & conspirent, latius aperueri-
 mus. Atheroma igitur, tumor est concolor & indolens, in mem-
 brana, seu nervosa tunica humorem lentum continens, atheræ,
 id est, pulsi similem, quæ ex farina decocta cõficitur. Interdum
 quoque in atheromatibus simul cum humore pultaceo, lapido-
 10 sa quædam, duræq; corpora, & alia tanquàm sulphuris ramenta
 inueniuntur, nonnunquàm veluti mausa gallinarum ossicu-
 la, sæpe etiam tanquàm pili complicati tactui occurrunt. Cæte-
 rum tumor atheromatis, specie & figurâ oblongus, & aliquan-
 tum subleuatus visitur: qui digitorum appressu ob humoris lento-
 rem & crassitudinem tardè retrocedit, & amotis digitis, tardè
 quoque regreditur. Meliceris autem tumor est, simili modo do-
 20 lore carens, sed rotundus, in quo nervosa etiam tunica, quæ cy-
 stum appellant, inclusus humor reperitur tenuis, & mellis substa-
 tiam representans: vnde & meli fauium Latine quibusdam di-
 citur. Itaque meliceris ab atheromate differt figurâ, & humo-
 ris substantiâ. Nam & figura rotundior est, & humoris substan-
 tia tenuior. Proinde meliceus hic tumor magis quàm atheroma
 extenditur, pressuque digitorum celerrimè cedit, & amotis di-
 gitis pari celeritate ad solum pristinum redit. Steatoma vero,
 tumor etiâ est præter naturâ, concolor, & tactu lenis in princi-
 pio quidem exiguus, sed temporis progressu augefcens, & am-
 pliior factus: in quo humor seuo. perfimilis, membranula simili-
 ter inclusus, subest. Hoc à melicende & atheromate distingui-
 tur, duritie. Nam plenum ac solidum est, tactuique tenetur,
 30 adeo, vt digitis prementibus minimè cedat. Sed reliqua nunc
 apostemata persequamur, quæ ferè ad hæc tria, de quibus mo-
 do egimus, reducuntur. Testudo ipsi Guidoni abscessus est ma-
 gnus, humoralis, mollis, latiore forma, in modum testudinis, vn-
 de nomen accepit. Quæ si in capite (inquit) nascatur, talpæ
 vel talpa dicitur: in colo, boeum: in testiculis, hernia: interdum
 autem cum pure, vel squammis vel fistulis reperitur. Cæterum
 testudines & talpæ, apud antiquos, neque proprium nomen, ne-
 que tractatum inuenerunt. Recentiores autem testudinem vo-
 cant tumorem mollem, vel non valde durû, satis autem magnû,
 40 in quo pinguis materia, tunica quædam obrecta, continetur quæ
 cal-

Atheroma.

Meliceris.

Steatoma.

Testudo.

- calvaria ita hæret (est enim cutis capitis affectus) ut ipsam plæ-
runque vitiet. Hanc non dubium est de numero esse abscessum,
& sub meliceride, vel atheromate contineri: videtur tamen ad
Talpa. meliceridem magis inclinare. Talpa verò cum albam materiã
contineat, ad atheromata potius, quam ad meliceridem refer-
tur. Guido tamẽ testudinis speciem: imò verò testudinẽ ipsam
esse affirmat, quemadmodum & herniam, & bocium, quod vo-
catur, sed varia hæc nomina sortiri, pro varietate locorum, in qui-
bus reperiuntur. Cæterum quod vulgus bocium, Græci pro-
priè inuento ab interiore parte nomine, bronchocelen appel-
lant, nostri verò herniam gutturis, & gutturosos, qui eo morbo
dehonestantur. Est autem colli tumor grandis, & rotundus in-
ter cutem, & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, mo-
dò humor aliquis, melli, adipi, pulti, aquæve similis, includitur.
Interdum etiam, ut ait Celsus, in eiusmodi tumore pili minutis
ossibus immixti reperiuntur. **Nata** (ut scribit Guido) excrecen-
tia est magna, carnosa, veluti caro natium, vel ancharum diuer-
sarum quidem formarum & magnitudinum: cuiusmodi sunt
melopepon & cucurbita. Itaque diuersa sortitur nomina, pro
formæ, & membri in quo est, varietate. Porro tumor hic qui na-
ta vel napa recentiorũ turbæ appellatur, dolore caret, nisi for-
tè adeò magnus existat, ut partes membri trahendo, soluta con-
tinuitate, aliquem dolorem circumstantibus inferat. Est autem
& de numero abscessuum, & ad atheromata (ut supra in enume-
ratione tumorum præter naturam diximus) ferè spectat. Bubo
**Nata vel na-
pia ad athero-
mata spe-
ctat.** Galeno autore, laxarum partium, seu glandularum (quas Græci
adenas vocant) est affectus, nempe simplex inflammatio. Qua-
re vel malè hic inter abscessus puritimos à Guidone annumera-
tur, vel aliud esse putat quàm Galenus. Porro bubones, qui pro
lapsu, aut aliis vlceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo
vacant. At qui in febribus pestilentialibus incidere consue-
runt, deterrimi sunt, siue fœmora, siue alas, aut cervicem inua-
serint. **Fugille.** Fugille (inquit interpretes Auicennæ) est de genere apo-
stematum glandulosoarum, & quasi hoc nomine (ait) appropria-
tur illud, quod fit post autem. Ex qua descriptione non levis est
coniectura, fugillẽ Auicennæ, cum tumorem esse, qui Græcis
parotis dicitur, affectus quidem glandularum sub ipsis auribus.
**Bubo quid
apud Guido-
nẽ, & alios
recentiores.** Quibusdam autẽ idem esse putatur fugillẽ, quod bubo: verum
tunc illis aliud erit bubo, quàm Galeno & Paulo: nempe excre-
scencia multum (ut dicunt) infiltrata, & radicata, ut plurimum sine

fine cysti, id est, folliculo, seu membrana eam inuolvente, dura in morem serofulari: & in eo significato (ut puto) sumitur verbo à Guidone, quando tubonem fugillum numerat inter abscessus pituitosos. Cæterum longè adhuc plura nomina pituitosorum huiusmodi abscessuum reperiuntur. Verum de nominibus ipsis non magna cura habenda est, modò id vnam de his cognoscamus, & intelligamus, quòd propter eiusmodi nomenclaturam diuersitatem, curationem & iudicium euariari contingit. Itaque eiusmodi abscessuum seu excrescentiarum phlegmaticarum, aliæ quidem peculiari quadam membrana seu tunica (quam cystin vocant) includuntur: aliæ verò in carne sunt vasculis implexæ & insertæ. Quædam basin, seu radicem habent gracilem: quædam verò latiore. Quædam item sunt resolubiles, quædam verò minimè. Quædam magnæ, quædam parvæ. Aliquæ ad suppurationem spectant, aliquæ non. Aliæ etiam sunt squamosæ, fistulosæ, & cancerosæ, aliæ verò nihil horum profus respiciunt: & ita de aliis.

*Differentia
abscessuum pi-
tuitosorum.*

De causis, signis, & iudicijs prædictorum abscessuum.

- 20 **C**ausæ huiusmodi abscessuum sunt triplices. Nempe primitiua, ut casus, percussio, vitæ luxur, siue intemperantia, ac deprauata viuendi ratio. Antecedentes, ut sunt humores non naturales, præsertim pituitosi, & vera cœdemata, quæ in abscessu degenerant. Et coniunctæ, quæ sunt variæ substantiæ, & propriæ cuiusque abscessus materiæ, in parte affecta contentæ. Continentur autem in huiusmodi abscessibus, quandoque quidam humores, vel serosi, cuiusmodi est vrina, vel putridi & corrupti, vel cœnosi, vel mucosi, seu (ut aiunt) mucilaginosi, vel mellis, pultri, aut adipi similes. Quandoque verò carnes phlegmaticæ, & spongiosæ, atque glandulosæ. Interdum quoque lapides, arene, ostraca, ligna, carbones, & id genus alia solida corpora. Frequentissima autem sunt (ut paulò antè diximus) horum abscessuum tria genera, quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita. Ea sunt, atheroma, steatoma, & meliceris, à similitudine contentorum in his corporum dicta. Est enim aliud eorum veluti seuum, aut pingue quiddam: aliud veluti mel: aliud pulicula tenui, quam atheram vocant, simile. Signa & iudicia eiusmodi abscessuum, quæ ad pituitam pertinent, ex eorundem descriptionibus, & differentiis suprà positis faciliè deprehenduntur. Indicium autem quòd velamento includatur, hoc est, cysti seu

Causa abscessuum quæ ad pituitam pertinent.

Materia pituitosorum abscessuum.

14. Therap.

Signa.

Note abscessus velamento inclusi.

40 pellicula, quam & antiqui tunicam nominabant, est mobilitas.

&

*Iudicia, ab-
cessuum pi-
uitosorum.*

*Arnaldus à
Villa noua.*

Auicennas.

*Que etates
naturæ, &
corporis con-
structiones,
strumæ ma-
gis sint ex-
positæ.
Celsus.*

*Magnitudo.
Naturæ...*

& cutis separatio. Quando verò fixæ sunt, id est, eodem in lo-
co permanentes, & carni adhærentes, nulla eas inuolui mēbra-
nula indicium est. Porro recentes & tractabiles, discuti, seu re-
solui possunt: duræ verò & iam inueteratæ nequaquam. Rubor
autem, dolor, & caloris incrementum, ostēdunt ipsos abcessus
terminandos, vel per suppurationem, vel per fistulas, vel per can-
crum. Numerosæ strumæ partes externas occupantes, & sede
subinde mutata, huc atque illuc per corpus vagantes, cum aduē-
titia quadam caliditate, planè restantur, ac indicant, easdē ger-
mina esse ac sobolem choradum internarū, vt Arnaldus à Vil-
la lingua quodam in loco annotauit. Proinde quæ forinsecus il-
lis adiuuentur auxilia, parū, aut nihil proficiunt. Hæ autem
vt putauit Auicennas, ex casu, & offensione, seu allusione ita in
nostris corporibus multiplicātur. Cōducunt verò vel magni-
operè strumosis ipsis, medicamenta purgantia, potiones diureti-
cæ, atque electuaria (vt vocant) resiccantia: item ætatis muta-
tio in paruulis. Caterū pueri ipsi propter voracitatem & gu-
læ intemperantiam ac corporis raritatem, strumis frequentius
corripuntur. Senes verò ob causas contrarias, rarius. Ad hæc
qui breui atque angusta sunt frōte, & compressa habent tempo-
ra, ac maxillas amplas, strumis sunt obnoxii. In talibus enim
materia promptè denuatur ad collum, vt ex recentioribus chi-
rurgis annotauit Henricus. Strumæ verò præcipuè (vt Celsus
ait) fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec vn-
quam faciliè maturescunt: & siue ferro, siue medicamentis curē-
tur, plerunquē iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq;
post, medicamento est opus. Quibus quoque accedit, quòd lon-
go spacio detinent. Incisio cuiusmodi abcessuum, itidem & cor-
rosio, magnoperè verenda est, circa ventrem, collum & com-
missuras, propter propinquitatem venarum, arteriarum, & ner-
uorum, ac internæ etiam capacitatis. In incisione quoque ma-
gnarum glandularum, summoperè vitare oportet venam, quæ
ad radicem earum sita est, & illis alimoniam defert. Sæpe enim
magnam hæmorrhagiam, id est, sanguinis profusionem, exci-
tat: vnde non mediocriter tandem sequitur periculum. Strumæ
inter se differunt, magnitudine, naturâ, loco, ortu, multitudine,
& vasorum complicatione, vt ex Leonida annotauit Aëtius.
Itaque parux strumæ maioribus facilius curantur, sicut mites
inflammari. Maleficæ sanari non possunt. Cū enim omnes
cuiusmodi strumæ cancerosæ, ac yasis refertæ sint, dūm curantur,
cruum-

etumpendi sanguinis periculum adferunt: præterquam quod cum plerumque penitiores inueniantur, minime abscindi possunt. Vasa enim nobilia, venas inquam iugulares, & arterias, quæ saracides appellantur: malefica struma ranguam radices habet.

Pro loci ratione, superficialiæ quidem strumæ profundis curari faciliores sunt, deinde quæ in collo eueniunt: vbi tamen vocales nervos diligenter vitari oportet. Multi enim strumas circa asperam cannam incidendo, vocalibus nervis simul excisis, reliquo deinceps vitæ tempore ægrum sine voce reddiderunt.

10. Nam præter eius nervi excisionem, vocalia instrumenta denudata, & inter curandū refrigerata, vocis functionem violant.

Pro multitudine strumarum, constar vnam pluribus facilius curari posse. Sicut, quantum ad ortus rationem attinet, longè citius sanescunt suspensæ, quam quæ insertæ fuerint. Hæc de strumis ex Leonida, memoriæ prodidit Aërius.

Curatio abscessuum ex materia pituitant referente creaturum, quas excrescentias phlegmaticas vocant.

20. **C**uratio cuiusmodi abscessuum, qui ex pituita ferè ortum habent, gemina est recentioribus chirurgis: Vniuersalis scilicet, atque omnibus ex æquo communis: & particularis, hoc est, singulis differentijs propria. Itaq; vniuersalis curandi ratio erit, talem, tamque accommodam laboranti vitam instituire, vt materia, quæ tales abscessus committit, in corpore minime coarctetur: & materia, vt vocant, antecedentè, & iam in ægroto corpore collecta modis omnibus auertere, ne tandem vniatur coniuncta, hoc est, ei quæ iam morbum creat. Porro priorem huius vniuersalis curationis intentione assequemur, si laborantes eam viuendi rationem diligenter obseruent, quæ in præcedentibus capitibus præscripta est: hoc vno dempto, quod paulò tenuiorem victum, & qui incidendis humoribus crassis magis sit accommodus, amplecti debent. Proinde si Auicennæ consilium sequantur, cibos omnes pachychymos, id est, crassioris succi vitabunt, frigide item portionem, nimiam sarictatem, immoderatamve repletionem, & quæ nauseam pariat. Toleranda autem illis est quam maxime fieri poterit, inedia. Bona coctio imprimis erit procuranda, vitanda habitatio humida, in vallibus sita, paludosa, & viridis aquis irrigata. Potus, sit vinum aliquod generosum atque optimum, vel aqua aluminosa, aut sulphurata.

40. **A**quæ enim cuiusmodi minerales, præsertim quæ vini feculam

Locus.

*Multitudo.
Ortus.*

*Duplex alio
abscessuum pi-
tuitosorum
curandi ra-
tio.
Vniuersalis.
Particularis.*

*Vita ratio
qualis esse
debeat in
abscessibus
pituitosis.*

*Aquæ alu-
minosa vi.*

*Vacuatio
materie an
recedentis.*

*Vacuatio
per aluum.
Pulvis tur-
bith.*

Razes.

Hiera picra

*Qua urina
ciant.*

*Potio Guido
m à Caulia
co, urinam
ciens in ab-
scissibus pi-
stiosis.*

*Que per ha-
litiu digerat.*

saporem repræsentant, non solum internos hosce stumosos, ac
pituitosos abscessus, sed externos quoq; & summa corporis oc-
cupantes, imminuunt, ac discutiunt: vt Arnaldus affirmauit. Cæ-
terum alteram partem prioris processus, nempe materiam ante-
cedentem auertere, ne tandem addatur coniuncta, quadruplici
genere euacuacionum assequimur, vtpote medicamento per
aluum puritatem expurgante, & quandoq; venæ sectione. Item
ijs, quæ urinam cient, & demum ijs, quæ collectum in alto cor-
pore humorem tum in halitum resoluunt, tum digerant. Ad va-
cuacionem, quæ fit per aluum, laudatur à valde multis pulvis tur-
bith, qui apud Auicennam recipit, turbith, zingiberis, & saccha-
ri, singulorum pares portiones. Ex eo autem exhibet drachmas
duas, asseritque, quod præter hoc, quod resoluit pituitam cras-
sam, nequaquam calfacit, neq; abradit intestina. Razes autem,
qui audacior fuit in purgantibus medicamentis exhibendis, hu-
iusmodi puluerem conficit, capite de doloribus ventris in nono
ad Almanitorem, ex viginti partibus turbith, decem zingiberis,
& triginta sacchari, offertque ex eo vice vna drachmas tres.
Benedicta quoque, & hiera picra in pillula ex agarico, & de
hermodactylis maiores appellata, eiusmodi affectibus magnopere
conueniunt. Ad ciendam urinam, vti consueuerat Guido
à Cauliaco sequenti potione, quam ex scriptis multorum se de-
cerptisse ait. Concipit autem, scrofulariæ partes tres, phylipen-
dulae partes duas, pinpinellæ, seu bipinellæ, pilosellæ, tana-
ceri, caulium rubrorum, qui nonnullis brasicæ marucina
creduntur, rubiæ maioris, singulorum partem vnâ: radicis
aristolochiæ, spathulæ fetidæ, radicis raphani, ana partem
dimidiam, conquassentur, & decoquantur in vino albo &
melle, vsque ad consumptionem medietatis, & fiat colatura: ex
qua tertio quoque die, hora matutina sumat eger quadrantem, 30
id est, uncias tres, & potio sit tepida. Cæterum pro omnibus his
auxilijs, sicuti & pro venæ sectione (si aliquando fieri debeat)
consulendus erit peritus aliquis medicus, qui & qualitatem, &
quantitatem, ac modum vsus eorum præscribat. Ad resoluen-
dum autem per halitum, & digerendum humorem, qui in alto
corpore collectus est, & internas glandulas (quæ externarum
sunt causæ) excitat, Gal. lib. 14. Therap. consulit theriacen, atha-
nassiam, ambrosiam, & medicamentum, quod ex Cretica ca-
laminthe est compositum. Græci diacalaminthen vocant. Cuius
compositio requirenda est ex lib. 4. de sanit. tuen. Multa alia
auxilia

auxilia ad huiusmodi affectus infertuntur : nempe potiones, electuaria, & etiam olea, quæ in aures injiciuntur. Empirica quoque permulta, à veteribus descripta & celebrata sunt, quorum vius mihi non probatur. Proinde non duxi illa nostris commentarijs esse inferenda. Hoc vnum tamen confidenter adfirmo, Christianissimo Francorum Regi, diuinitus peculiari dono esse indultum, vt quàm plurimos strumosos seu (vt vocant) scrofularios, solo manu tactu, integræ sanitati restituat. Rex etiam Eduardus (vt referunt hystorici) solebat, diuinitus solo tactu sanare strumocis. Quod immortale munus iure veluri hæreditario ad Reges posteriores manauit. Nam Reges Angliæ etiam nunc tactu, ac quibuscumque hymnis, non sine ceremonijs prius recitatis, strumosos sanat. Atque hæc quidem in omnibus supra dictis abscessibus communia sunt. Quæ verò sequuntur, particularem, ac propriam cuiusque differentiam curandi rationem concernunt. Hanc autem curandi rationem propriam ac particularem, in hisce abscessibus diuersam efficiunt, atque immutant, tum materiam, ex qua ortum habeat, substantiam: tum verò eorum quantitas, vel minutia, vel quæ in molem valde magnam excreuit. Adhæc, partis ipsius laborantis, atque etiam totius corporis natura. Temporis autem duratio licet non indicet curationem : indicat tamen nobis aliquando, atque infirmat, qualis sit ipsa dispositio, vt Gal. annotauit: lib. 4. de morbis curandis. Itaque tametsi à prædictis multæ summi possint curandi indicationes, ac intentiones: eas tamen, quantum ad rem præsentem attinet, ad sex reduximus, quas & ijs sex sequentibus veluti canonibus expressimus. Quorum primus ad hunc modum habet: Pituitosos abscessus, molles, & paruos, quæ lupia vulgò, & Arabicæ factionis principi Auicennæ, glæ dulæ appellantur, si in particulis firmioribus constiterint, & (quia nondum inueterauerunt) tenellam adhuc cystam, id est, membranam qua includuntur, habuerint, comprimito, & atterito, postea desiccato. Secundus: Maiores non multum duros, neque inueteratos, more tumorum cedematosorum (de quibus supra egimus) emolito, discuto, consumito. Tertius: Pituitosas eiusmodi excrecentias, saniosas, & apostematosas, hoc est, quæ in suppurationem spectant, maturato, aperito, detergito. Quartus: Strumas, quæ ex prædictis auxilijs curationem non recipiunt, & mobiles sunt, blandæ, morigeræ, ac tractabiles, incidito, atque extrahito. Quintus: Immobiles, infertas, irretitæ, seu (vt

*Galliarum
reges diuino
quodam munus
referuntur
curare.*

*Quæ parti-
culari pi-
tuitosorum
abscessuum cu-
ratione sua
runt.
Tempus quid
infirmat.*

*Compressio,
& attritio.
Lupia cura
tio.*

*Lamina
plumbea.*

*Vnguentum
Rogerij.*

*Ganglij cu-
ratio ex Plis
lagrio.*

loquuntur) infiltratas, hoc est, venis, & arterijs multam implica-
tas, ad radicem, & intrus, latas, corrodit, detergetoque. Sexrus:
Tenui ac gracili radice innixas, deligato, ac euellito. Primus
canon, iuxta Auicennæ sententiam absoluetur, si vbi moles, ac
minutos eiusmodi abscessus, quos Auicenna glandulas, & recen-
tiores lupias appellant, contriueris, ac vehementer compresseris,
laminam plumbeam tumori æqualem superponas, & ne hinc
inde labatur, arctis vinculis in medio constringas. Hæc enim
(vt ille ait) huiusmodi excrecentias digerit. Primum igitur lu-
pia tandiu manu molliter perfricetur, vsque dum aliquantulum
incalescat, & seipsa mollior quodammodo fiat: postea laborans
particula firmiter manibus apprehendatur, & fundo scutellæ,
aut re aliqua solida lignea, toties, ac tam vehementer percutia-
tur, vt dispareat, & interior eius cystis, id est, membrana qua in-
cluditur, dilaceretur, disrumpaturve, atque ita materia ibi con-
tenta dispergatur. Quo facto prorsus lamina plumbea supra
locum applicetur, & fascia duarum extremitatū, seu (vt dicunt)
duorum capitum arctissime deligetur, nec amoueaturs ante no-
uem aut decem dies. Lamina autem, ea sit magnitudine (vt mo-
do dicebatur) quæ proportionē respondeat lupiæ. Sunt tamen
qui ante laminæ eiusmodi plumbeæ applicationem, vnguentum
admovent ex plumbo vsto, fuligine sambuci, aut ficus arboris,
oleo, & aceto. Alij prius vuntur emplastro composito ex aloë,
acacia, myrrha, olibano, sarcocolla, adiecto aceto, vel oui can-
dido, quantum ad alia excipienda satis esse videbitur. Henricus
superponere solebat paruas (vt ipse, & alij eiusdem farinae chi-
rurgi loquuntur) plagellas, ex stupis confectas, oui candido li-
quore, sale, & alumine zucarino inspissato delibutas. Porro
Philagrius ratione non admodum dissimili, apud Actium gan-
glia (qui nerui, vt supra diximus, tumores sunt inæquales) curare
solebat: inquit enim ad hunc modum; A ganglijs chirurgicum
opus (id est, sectionem) faciemus, præsertim si in manibus, aut pe-
dibus euenerint: sed medicamentis tantum curabimus. Ammo-
niacum enim prope ignem, ad emplastri consistentiā emolli-
tum illinimus deinde laminam plumbeam tumori æqualem su-
perponimus, & ne hinc inde labatur, arctis vinculis in medio
constringimus. Iam vero diebus aliquot transactis, vbi prius gan-
glium emollitū nouerimus: nihil ægro præfati statim sublaris
vinculis, dum adhuc locus incalescit: pollicem dextræ manus
ganglio infigimus, ac reliquis quatuor digitis membra impiten-
tibus

De Tumoribus præter naturam.

101

et tibus vehementissimè comprimimus, & gangliū confestim dissoluitur. Hactenus Philagrius. Itaq; ex hac curandi ratione, facile est colligere, recentiorum lupiam, Auicennæ glandulam, & Græcorum ganglion, eundem omninò affectum esse: quod & præcedentes etiam eorum descriptiones aperte satis ostendunt. Archigenes in hoc vitio calcem, vnà cum adipe anserino, & terbinthina resina, apponi iussit. Idè verò & medicamine, quod lapidem achatem recipit, sæpius utebatur, vt refert Paulus. At Oribasius: eo frequenter vti est, quod recipit cerussæ, resinæ piceæ, olei veteris, singulorum vnciam vnā, ammoniaci thymiamatis, galbanis, singulorū parēmodum, ceræ vncias quatuor. Extat idem medicamentū apud Aëtium, sed in quibusdā pondera euariant: habet enim cerussæ, olei antiqui, & resinæ piceæ, singulorum libr. i. ceræ vncias duas, ammoniaci thymiamatis, chalbanc[is] id est, galbani singulorum vnc. i. Cerussam cum oleo decoquit, quousque inquinandi finem fecerit, deinde tritum ammoniacum, postea resinam piceam, & ceram, postremò galbanum præmollitum coniungit. Porro insignis illæ Græcæ familiaris medicus, Oribasius inquam, non laminam plumbeam vt Philagrius, Auicennas, & recentiores chirurgi, sed plumbeum orbiculū crassiorē, ad instar spondylorum, id est, verticillorum, quæ fufis mulierum appenduntur, ganglio ipso ampliorē imponebat, deligabatque. Siquidem (inquit) pondere suo longiori temporis spatio, ipsum dissoluit. Itaque satius est multò eiusmodi emollientibus & discutientibus medicamentis vt in ganglijs, seu (vt communiter loquuntur) lupijs curandis, quàm chirurgico opere, id est, excisione, præsertim cum in cruribus, aut brachijs, aut summis partibus oriuntur. Periculum enim est, si ea excindatur, ne particula murila reddatur. At quæ caput aut frontem occupat, manu tutò curari possunt, hoc est, præcidi, aut euelli. Ergo summam cutem scalpello diuidit, deinde si parua sunt, vulsella comprehensa ex basi, hoc est, à radice excindit: si maiora, hamis transfixa, & sublata, circumcirca diducit, excoariatoque, & extrahito: postremò futuris oras coniungit, medicamentoque vitæ, quod cruentis vulneribus adaptatur. Sed hæc ad quartum canonem pertinent. Secundus canon completur (vt interim taceam medicamenta pituitosis, hoc est, œdematosis tumoribus, dicata, quæ supra posuimus: ad hos etiam, de quibus nunc agimus, abicessis, & herniarum omne genus, adprimè, vnà cum sequentibus remedijs vtilia) admonitione cuiusdam

Lupiam & ganglion eundem esse affectum. Archigen. Lib. 4.

Oribasij medicamentū mollitorium ad ganglia.

Verticillum plumbeum.

Ganglion per chirurgiā curatio.

Discussio & digerentia medicamentis.

cuiusdam emplastri, quod à Galeno descriptum est lib. 6. de e. 8. positione medicamentorum x. 7. & y. 1. hoc enim ut ipse testatur, per halitum digerit, & pulegmonias propulsat, valet ad strumas, panos, parotidas. Confert etiam podagricis, & multis alijs vitijs benefacit. Recipit autem olei veteris denarium pondo

*Gal. hanc compositionē ac-
ceptā refert
Hera.*

centum, argenti spumæ denarium pondo quinquaginta, picis [siccæ] denarium pondo quinquaginta, ladanii denarium pondo viginti quinque, æruginis rasæ denarium pondo octo, galbani denarium pondo quatuor. Argenti spuma (quod lithargyrum vocant) ex oleo trita coquitur. Cum autem coeunt, id est, inspissata sunt, pix & ærugo immittuntur: deinde ladanum, galbanumq; atque sic in mortarium transfusa subiguntur & molliuntur, atque vsui reseruantur. Quidam, ut boni coloris sit, & fuscum, miscent etiam squammæ denarium pondo octo: nam alioqui fit nigerimum. Aliter inuenitur descriptum in Guido

Diachylon.

nis commentarijs: nempe sub hac forma. olei antiqui vnc. 12. viridis æris, siue æruginis, drach. 14. picis siccæ vnc. 6. ladanii vncias. 3. lithargyri vnc. 12. galbani vncias. 3. Ad idem benefacit diachylon commune & ireatum nominatum, quorum formulæ & compositiones in antidotario infra describentur. In diachyli autem ireati libra vna malaxanda est vncia. x. pulueris radicis ireos. Idem efficit diachylon magnum Mesues, cuius descriptio etiam infra habetur. Sunt qui consulant, ad digerendos eiusmodi abscessus antiquum stercus caprillum, cum melle & aceto supra ignem in vnitatem ad formam emplastri redactum, dolenti loco esse admouendum. Item emplastrum ex fenogrecæ, semine lini & brassicæ, cum viscillagine radicis althææ confectum. Hoc etiam si suppurationis spes adfuerit, pulchrè maturat.

*Halyab. em-
plastrum.*

Halyabbas quoque subsequens emplastrum ad eundem vsum plurimum commendat. farinæ fabarū, & hordei, ana drach. 3. 10. radicis glycyrrhizæ, radicis althææ & picis singulorū drach. 5. ceræ albæ, adipis anserini, cuiusque drach. 10. terantur, & in vnum redigantur ex oleo veteri, & vrina pueri nondum venerem experti, & supra moderatum ignem fiat emplastrum. Aliud

*Emplastrū
Auicennæ.*

Auicennæ, quo Guido vtitur: stercoris bubuli vnc. 2. radicis caulium, id est, brassicæ, radicis capparum, squillæ, sicuum pinguium, singulorum semunciam, lupinorum, bdellij, ana drach. 2. aceti, mellis, axungie suille, fecis olei antiqui, ana, quod satis est, fiat emplastrum. In omnibus duris tumoribus Brunus hoc sequens remedium approbavit, cuius sententiam securus est & 4

*Bruni &
Theodorici
emplastrum
ad strumas.*

Theo-

Theodoricus. Sume ammoniaci, bdellij, galbani, singulorum partes æquales: macerentur tri duo in aceto: quibus dissolutis, & igni iam appositis, addatur fursuris subtilis, quantum satis esse videbitur, & fiat emplastrum. Rogerij em-
 ad strumas, quas vulgò scrofulas appellant. Accipe radicis filicis, plastrum.
 asphodeli, & si vis ebullorum, ana quantum lubet, coquantur in vino optimo, & tundantur in mortario, addendo sulphuris viui momentum, & fiat emplastrum. Qui Guidoni contigit præceptor in Montepesulano, efficacissimum: sæpe expertus est
 10 emplastrum, quod constabat ex duodecim cochleis (quos & limaces vocant) vino incocti, aur lixiuij cinerum, digitorum vulgò clauelatorum, aut ex capitello, vt dicunt. Imò (quod valentius erat) quotidie cochleam vnā vel siccam, vel aliter præparatam, & (vt loquuntur) confectam, ipsis laborantibus per os sumendam offerebat. Probè etiam strumas discutit Paulo calx viuua, id est, aquā non extincta, melle, vel gymnasijs sordibus, seu balneorum strigmento excepta, vel oleo, vel adipe suillo. Idem præstat Aëtio sola palæstra sordes, à parietibus derasa, & probè subacta, super linteculo extensa, & emplastri modo applicata.
 20 Ad id etiam efficaciter auxiliatur, calcis, nitrique par modus, cardamomi, & scenugreci quadruplus cum melle, malagmaris modo impositus. Strumas quoque discutit, lupinorum amarorum farina ex oxymelite cocta & illita. Ad idem præclarè facit bubulum stercus aceto incoctum, & delinitum: id enim tumores scirrhosos omnes instar cataplasmatum appositum, mirificè dissipat. Grossi etiam præcipuè caprifici cum axungia appositi, omnem tumorem discutiunt. Hac igitur curandi ratione, strumis inchoantibus, & nondum inueteratis, medeberrimum in pueris, tum in his, qui maius opus refugiunt, medi
 30 camentis scilicet dissoluentibus, ac per halitum discutientibus. Verum primò mollire, deinde discutere oportet, vel vtrunque simul, medicamentis mixtam facultatem habentibus, efficere. Eius autem generis ferè sunt auxilia omnia superius descripta. Porro si digerentia medicamina, nihil à eiusmodi abscessibus profecerint, vel ad suppurationem ducendi erunt, vel exedendi, vel manu curandi, vt in sequentibus dicitur. Cæterum silentio præteriri non debet, quod à quibusdam memoriæ proditum est, nempe strumis laborantes, sicuti & elephantiasi, vipera-
 rum, ac serpentum vsu mirificè adiuuari. Item si laicem ad ci-
 40 ceris quantitatē singulis diebus ieiuni potauerint. Ergo serpen-

Emplastrū
preceptoris
Guidonis
limacibus

Vipera
ac serpentū
vsus, mirè
strumofas
innat.

rem extinctum in ollam conijcito, eamque gypso probe oblitam ac circumunitam in fornacem mittito, concretam cinere æquali focnugraci pondere misceto, & melle excepto vitior. Hoc enim strumosis eximie subuenit. Alium etiam facilem reddi, tenuemque victum adhiberi oportet strumis laborantibus, vomitumque assidue provocare, & per os pituitam ducere, caputque desiccare, ac cataplasmata in capiti applicare, quæ mediocres pustulas in cute excitare possint, veluti capparis radix cū polentra, ac reliqua huiusmodi, sinegmatisque eiusdem facultatis, & puluisculus vti. Tertij canonis intensionem communitur etiam assequimur, vsu auxiliorum præcedentium. Omnia enim mollientia, & resolutentia, si locum aut materiam immeniat resolutioni contumacem, ac repugnantem, materiam ipsam haud dubie maturant, & ad suppurationem perducunt præsertim si mitis ac benigna satis fuerit, aut sanguini permixta. Halyabbas autem ad maturandos huiusmodi abscessus, admovent emplastrum compositum ex farina hordei, pice, & olibano, ex pueri impuberis lotio, in vnum corpus redactis. Auicenna vero ad infrenandam caliditatis vehemētiam, consuluit decoctum coriandri præfatæ farinæ esse remiscendum. Quod si parum hæc proficiunt, & fortius, atque efficacius medicamentum desideres: accipe myrrhæ partem vnam, licij partes duas, & misce cum prædicto decocto. Strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit subscriptum medicamentum, à Paulo Aegineta lib. 4. relatū. Myrrhæ drach. decem, ammoniaci, thymiamatis drach. septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Cæterum ipsæ iam maturatis, & ad suppurationem perductis (quod ex notis ipsius puris facile deprehendes) aperiri debent, & detergeri. Deterfusio autem optimè fiet admoto vnguento Apostolorum vulgò nuncupato, quod ad Christianos (vt putant) relatum est. Hoc enim magnæ est efficacis in strumis malignis, & vlceratis. Ad idem multum efficacia sunt, vnguentum Aegyptiacum Rasis, emplastrum de succis diachylon nominant, & drapalma, quod Græcis *κοινικιον* appellatur, quorum descriptiones ex antidotario sunt requirendæ. Quod si huiusmodi abcessus locum aliquem occupauerint, in quo caries, & quædam corruptela ossium subsit, aut prauum ali quod symptoma illis accesserit, ea vlcera curandi ratione tractentur, cum quibus affinitatem, & commercium habent.

Quod ad quartum canonem attinet, blandas, morigeras, suffi-

Tertij canonis declaratio.

Suppurantia seu maturantia.

Pauli medicamentū ad strumas maturandas.

Deterfusio. Vnguentum Apostolorū. Vnguentum Aegyptiacū. Diachylon. Drapalma.

perficiarias, & sanabiles strumas. manuum artificio, & chirurgi- *Modus inci-*
co conatu, ita optimè, ac breuissimè tractabis. Acgrum impri- *dendi, et eu-*
mis prostratum, recumbere iubeto: sedens enim, animi deliquio *lendi stru-*
facillimè corripereetur. Vbi laborans sic decubuerit, cruribus in- *mas ex Al-*
ter se inuicem, & ad lecti fulcra innixis, caput à ministris firmi- *bucasti, &*
ter detineri imperato. Deinde cutim tumori adiacentem, recta, *Leonida.*
vel subobliqua sectione incidito. Quæ enim in collo per trans-

- uersum sit sectio, prorsus inutilis est. In eo siquidem vasa & ner-
ui recta porriguntur. Cæterum non assatim, neque vnico im-
petu, totam cutis crassitudinem fecabis: nihil enim violentè in
hoc opere fieri volumus. Atque in paruis quidè tumoribus, hoc
est, strumis minutionibus, simplicem sectionem facito, hoc est,
simplici linea cutem diuidito: in maioribus verò, cutim ad myr-
tei folij figuram abscindito: tum vasa, id est, venas, & arterias,
paulatim, & blandè denudata seponito. Post hæc verò sectio-
nis labra, seu oras cutis incisæ, vossellis, seu hamulis distendito,
ac dilataro, ac membranas digitis, & scalpri capulo, vel spatula,
excoriato, strumamque, vbi nudata & explicata membranis ap-
parebit, paulatim eximito. Cæterum si struma inserta, seu vas
20 implexa fuerit, summa attentione opus tractandum est, ne per
incuriam copiosa sanguinis profusio sequatur. Propterea in agē-
do, vnum duntaxat sectionis labium vultellâ protrahatur, & ita
sensim à connexis corporibus scalpelli acie separetur. Cumque
ab vno latere connexio diuulsa, ac soluta fuerit, in altero idem
penitus repetatur: deinde tota basis propter nervos, & subiecta
vasa excidatur. In strumis verò, quæ circa alas & inguina cōtin-
gunt, ob cutis reduplicationem, sectio transversa ducitur. Por-
rò in sectione, quæ sit in strumis collum occupantibus, summa
cura adhibenda est, ne vel arteriæ, quas carotidas vocant, vel re-
30 currentes nervi attingantur violenturque. Si autem vase aliquo
intersecandum diuiso, sanguinis profusio tuum opus remore-
tur, ac obrurbot, vas ipsum funiculo excipito, vel nisi magnum
admodum fuerit, penitus (vt Paulus consiliat) abscindito, vel
præsidia sistendo sanguini (si non magno impetu prorumpat) di-
cata, applicato. Deinde ad inceptum opus reuertitor. Itaque
vbi in arcum strumæ basis venerit, dextre ac penite ipsam præ-
cidito, immissoque indice, locum pertractato, ac diligenter scru-
tato, num & aliæ sint strumæ adiectæ, quas eodem quo su-
prà diximus modo, si quæ inuenire fuerint, extrahito. Porro mo-
40 dicum sanguinis fluorem facile compesces, admotis ijs, quæ
facul-

*Si vena fir-
ma sit an-
te, quid fa-
ciendum.*

facultatem habent exiccandi, vt stupis, spongia, aut linamentis ex xylo, id est, cotone factis in aquam frigidam, vel acerum, aut in miscellam ex utroque (quam oxyeraton vocant) infusis, & postea expressis. Sin sectio incurta persistuerit, thuris polline eam repleto, linamenta que imposito, ac pro linamentorum custodia, lanam vino madentem alligato. Quod si vena aliqua amplior, & effatu digna, cum radice seu fundo glandulae, vel fistulae, aut consimilis excrecentiae pituitosae, connexa sit, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere ac constringere conuenit, quod particulatim citra periculum sua sponte excidat. 10 Quo in casu per linamenta postmodum curatio adhibenda erit. Esto autem vinculum ex materia aliqua non facile putrescibili, cuiusmodi sunt fila, quae serica nuncupantur, aut graciles chordae testudinum, aut aliorum instrumentorum musicorum. Quae enim facile putrescunt, ea citò ab ijs quae exceperunt, decidunt. Ceterum si peracto opere, aliquid ex folliculo, seu membrana materiam praedictorum abscessuum obvoluerit, vel aliud extraneum quicquam remanserit, iubet Albucasis illud absumendum esse, implendo vulnus primis diebus xylo, id est, cotone, vel alio consimili, aqua salsa imbuto. Guido autem ut reliquias 20 illas absumeret, hiantem sinum implebat, primum quidem oui candido, alumine resperso, & inspissato. Postea vero vnguento Aegyptiaco, vel aliquo ex erodentibus, quae in antidotario describuntur. Porro in omnibus huiusmodi operationibus apponenda sunt, quae dolorem leniunt. Inter cetera autem communiter admoventur stupas oui candido liquore, & rosaceo imbutas.

*Corrosio &
mundifica-
tio.*

*Cauticum
ex calce &
sapone.*

Quinti canonis scopum ita assequeris: cutim caustico, id est, vrente aliquo medicamine pro ratione magnitudinis excrecentiae abrumpito. Verum dum id moliris, summa cura obseruandum est, ne partes alias circumiacentes medicamen adurens at 30 tingat. Perbellè autem opus hoc absolues, admoto caustico ex calce, aut sapone. Haec enim effectum suum intra duodecim horarum spatium feliciter adimplent. Quod si diutius permanserint, nihil inde tamen periculi aut incommodi sequetur. Itaque caustico iam abrupta cute, & inducta eo in loco eschara, id est, crusta, per medium ipsius crustae, abscessum recta linea in longum diuidito (incides autem versus profundum, ferè ad viuum usque) & infectionem, seu hians vulnus, linamentum, aliquo exedente medicamento (cuius generis est puluis asphodelorum) respersum, imposito. Porro tametsi platrique valde 40 multa

multa admoveant, quæ postea in antidotario recensentur: arsenicum tamen in hac re primum obtinet, modo quis no- Arsenicum.
uerit eo rectè uti: vsus autem ipsius certus modus describi non
potest, ut lib. 3. Therap. Galenus annotauit. Proinde non teme-
rè eo utendum est. Quandoquidem medicamentum est supra
modum vehemens ac violentum, febres excitans, & multa alia
praua symptomata inducens. Adde quòd minima etiam quan-
titate adhibitum, mirum, & ferè incredibilem effectum præ-
stat. Communis tamen eius modus seu quantitas est, medietas

20 grani vnius frumenti triticei, in corpore quidem robusto, &
particulis à principibus membris longè remotis: in debilibus
verò naturis, & locis iuxta principes partes sitis, minor quan-
titas admoenda erit. Ut autem in vniuersum pronuncietur, me-
lius, ac tutius est, parùm & sepius ex eo offerre, quàm semel &
vice vna quantitatem immodicam. Eius autem operatio, seu
effectus durat, tres dies integros. Quare toto eo tempore,
laborans victum febricitantium seruare debet. Membrum ve-
rò affectum, & partes circumiacentes, ad tuclam sui, & fluxio-
nem (quam immoderatus calor excitare possit) prohibendam,

20 vnguento quod populeon appellatur, aquâ quoque vel succo
solani, & aceto, aliisque id genus refrigerantibus illim, ac per-
folari debent. Quando autem certò tibi constabit, glandu-
lam iam corruptam esse, atque absumptam (quod ex duritie &
tumore crustæ inductæ deprehendes) tunc crusta à vino resol-
uenda erit, admoto scilicet butyro loto, & momento farinae
triticeæ inspissato, vel aliquo alio pingui, & vinctuoso non sa-
lito, ut arungia suilla: vbi verò crusta exciderit, si quicquam ad-
huc ex glandula, lupia, aut struma remanserit, id absumendum
erit erodente medicamento, ut puluere asphodelorum, aut vn-

30 guento Aegyptiaco. At si nihil amplius supersit, more aliorum vl-
cerum ad cicatricem perducetur. Ut sexti canonis scopum assequaris,
vinculo serico, aut crinibus equinis deligandi sunt huiusmodi
abscessus, qui bases seu radices habent in angustum venientes, atque
indies magis ac magis prioribus vinculis, aut nouis adhibitis,
stringendi, donec scilicet resicati appareant, & sponte sua (ut de in-
sertis, ac maioribus vasis implexis diximus) excidant. Adiun-
dum autem erit vinculum aliquo exedente medicamento & desiccante. De-
mulcedus quoque erit dolor oui cado liquore, rosaceo, vngue-
to populeo, aut quouis alio doloris mitigatorio. Vbi autem sponte
40 exciderint funiculi, modo quæ supra explicuimus, persanentur,
Atque

Quantitas
arsenici.

Quando crusta
a vino re-
soluenda.

Ligatura et
emulso.

Atque hæc in vniuersum de abscessibus toto genere præter naturam consistentibus, à pituita præsertim ortum ducentibus, dicta sufficiant. Post quæ, non abs re factum putauimus, si propriam ac peculiarem meliceridum, steatomatum, ac atheromatum curandi rationem subiecerimus, hæc enim & frequentissimè nostris corporibus incidunt, & aliàs quasdam sub se tumorum præter naturam species seu differentias, nouis quibusdam, atque apud veteres prorsus inauditis nominibus, à næoericis appellatas, complectuntur, vt talpam, testudinem, natam, & id genus alia, quæ in præcedentibus à nobis explicata sunt.

10

De curatione atheromatis, steatomatis, & meliceridis.

Quot, & quibus modis curentur prædicti abscessus.

Curatio per digerentia.
Lib. 4.

Lib. 15.

Curatio per exedentia.

IN iis tribus abscessuum generibus, quæ frequentissimè incidunt, steatmate inquam, athermate, & meliceride, vnum commune curationis consilium est, vt quod tunica illa, quæ cystum appellant, continet, discutatur, aut medicamentis totum vnà cum tunica ipsa exedatur, aut sectione auferatur. Quidam autem ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, id nimirum qui liquidiorum humorem continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum, vt atheroma, quod & sectione tollitur, & medicamentis exeditur. Steatoma verò nec discuti, nec exedi potest, sed solâ manus operâ, hoc est, sectione duntaxat, curatur. Porro medicamentorum, quæ discutiendi ac dissipandi vim habent in huiusmodi affectibus, materiam, inter hæc quæ de strumis supra edocimus, reperies. Priuatim verò, ac propriè meliceridas dissipat Paulo, quod continet vvas passas exemptis acinis viginti, squammæ drachmas quatuor, parte fomentis prius nutrita imponitur. Aliud emplastrum ad meliceridas, quod ad Leonidam retulit Aetius: accipit passularum detractis vinaceis, libram vnâ, cumini minutissimè triti, vncias sex, 30 nitri vncias tres: omnia simul in mortario subacta conficito, & alligato. Aliud eiusdem discussorium ad meliceridas: concipit salis ammoniaci, spumæ argenti, cerussæ singulorum lib. 1. ceræ, terebinthinæ, chalbani, opopanacis, singulorum vnciam vnâ: rubricæ sinopicæ vnc. 6. acetii heminam, [hoc est, vnc. 7. & semissem,] spumam argenti, cerussam, & sal ad exactum leuorem tritum, simul decoquito, deinde rubricâ prius ex aceto tritam iniucito, & cum vniueris liquabilia, postremò omnibus simul confectis, & refrigeratis, opopanacem & chalbani aceto soluta admisceto, & vttere. Cæterum si medicamentis exedenti- 40 bus,

bus, quæ Græci septica vocant, humorem in eiusmodi abscessibus absumere volueris, eos sicuti etiam & strumas medicamentis adurentibus cute superposita prius denudare expedire: è quorum numero (inquit Paulus) simplicius quidem est, quod consistat calce viua, id est aqua non extincta, sapone, & cinere lixiuæ stillaticio. Aliud varium magis, quodque rectè dicitur diu seruari potest: capit calcis viuæ drach. quatuor, sphecles, id est feculæ vini combustæ, nitri liquidi tostii, singulorum drach. duas, minii, seu rubricæ sinopicæ drach. vnam, cinere lixiui stillaticio teruntur: 10 vbi ad mellis liquidioris crassitudinem reducta fuerint, ter feruefacito, vt mediocrem consistentiam habeat, & pixide plumbea reponito, lixiuiam super distillans, ne citò nimis exarescat. Ergo circumsusam cutem eiusmodi medicamentis crustam inducentibus, primum abrumpito: postquam verò crusta deciderit, exedentia adhibeto. Erodit autem valide citra vellicatione & morsum, quod habet squammæ æris drachmas quatuor, sandarachæ [id est, arsenici rubri] drach. duas, hellebori nigri tantundem, cū rosaceo vititor. Aliud ad idem valde efficax: erynaceorum combustorum, restæ sepiæ, auripigmenti, singulorum æquale pondus, rosaceo miscetur. Sed quæ adiacent, atque in ambitu sunt partes omnes, prius cerussa cū oleo delinito. Verè enim, si tales abscessus chirurgico conatu, hoc est, sectione, curare voluerimus, in ea quidè curandi ratione, siue pulraceus, siue melleus, siue adiposus, siue cuiusdā alterius substantiæ humor, in eis contentus fuerit: vna nobis intentio perpetua est, vt scilicet tunicam qua humor concluditur, auferamus. Sed dum hoc molimur, impenso studio cauendū est, vt de strumis supra diximus, ne temerè membrana vulneretur, aut dilaceretur, vnde humor, qui in ea continebatur effusus, operationem impediat, & 10 portio ipsius relinquatur. Si enim dissecta tunica, ac humore profuso, tumor subsederit, difficulter admodum tunica excoriari curarique poterit. Si verò humoris aliquid relictum supericuli est, ne morbus reuiuiscat, & renascatur, quemadmodum & struma, cū portio ipsius relictæ est. Quod si tale quid incidit, melius est, nō cōsuere, & exedentibus medicamentis supra positis, aut cōsimilibus reliquiis absumere. Cæterū si fiteatoma latiore sit apice, basi verò angustissima, tenuissimaq; omnis reliquis aliis superuacaneis auxiliis, totū à radice ipsa amputandū est. Ita enim (inquit Aet.) chirurgicū opus expeditissimū erit, & vlcus 10 parvissimū, planūq; reddetur, & curatio breuissimè absoluetur.

Lib. 4.

Medicamentum valide exedens absque morsu.

Curatio per chirurgiā.

Lib. 17.

De

Diximus de tumoribus ex sanguine, flaua bile, & pituita excitatis, de verrucis quoque, & iis quos serofus humor, aut statulētus spiritus procreauit: ad hæc, de abscessibus qui ex pituitosa substantia maximè ortū habent, atque aliis toto genere præter naturam consistentibus. Proinde reliquum est, vt de iis tumoribus agamus, quibus atra bilis, seu melancholicus succus generationis materiam præstat, cuiusmodi sunt scirrhi, id est, indurati tumores, & cancerosi, 10

Scirrhus duplex.

Scirrhus legitimus.
Melancholia naturalis.

Scirrhus ille legitimus.

Melancholia non naturalis.

Non naturalis melancholia quæ differt a naturali.

Bilis atra exquisita.

Ex immodico affato sanguine melancholico, fieri bilis exquisita nigram.

Lib. 14. Therap. & lib. de atra bile.

quos caneros apostemoios vocant. Itaque scirrhi, sicuti & phlegmones, erysipelatis, & cedematis, gemina est recentioribus chirurgis differentia, vno scirrhi nomine comprehensa, nempe scirrhus verus seu legitimus, & non verus atque illegitimus. Porro verus scirrhus seu legitimus illis appellatur, qui ex melancholia naturali procreatur. Est autem melancholia naturalis, boni sanguinis fex, ac veluti limosa quedam superfluitas, hoc est, crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor verò acerbus, vel acidus, vt voementibus eum non raro innotescit in massa quidem sanguinaria (in qua humores vniuersi continentur) existens, alē 20
dis partibus melancholicis à natura factus. Scirrhus verò non legitimus, iuxta prætoricorū placita, is est, qui ex melancholia non naturali procreatur. Est autē melancholia non naturalis, quæ à modo descripta naturali degenerat, intra tamen limites suæ latitudinis permanens: quos si prætergrediatur, non iam amplius (inquiunt) melancholia, sed alius humor dicitur. Verū melancholia, si in vniuersum definiatur, humor est frigidus, & siccus, ex crassiore (vt ait Guido) ipsius chyli portione progenitus. Ceterū, non naturalis melancholice quatuor differentiæ cōmuniter statuuntur. Prima est, quādo humor ipse melancholicus, qui naturalis 30
dictus est, & quotidie gignitur in corpore dū animal sanitate finitur, in propria sua essentia torretur aduritūre, & putrescit, fitq; bilis atra exquisita. Talis enim (vt ait Galenus) ex humore atro supramodū adusto cōstat, habetq; splendidū aliquid veluti bitumen, & pix. Hæc autē (verè inquā atque exquisita atra bilis nominata) acida est, & in terram effusa velut acerrū feruet, & ipsam fermenti ritu eleuat, tum omni animanti iniucunda, adeo, vt ne mures quidem ipsi, aut muscæ eam gustauerint: non magis quidem, quā copiosum salem, in quo nullum animans vitam peragit, vt mare quod mortuum appellatur indicat. Por- 40

De Tumoribus præter naturam.

III

10 rō tūm gignitur huiusmodi nigra bilis, cū ille veluti sanguinis limus, (quam melācholiā naturalem diximus) diutius moratur in corpore, & neque per aliquem sensibilem effluxum, neque occultum excernitur: verū transmutatur, corrumpitur, & putrescit. Siquidē (inquit Galenus) hic humor vbi amplius incaluerit, aut propter putredinem, aut febrem inflammantem, nigram efficit bilem. Quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris non expers, quemadmodum & cinis, & acetum, apparetque dum per aluum (vt contingit aliquando dysenterici) excernitur, splēdi dior, ac nigrior ipso sanguine crassiore, & nigriore, quem humorem melancholicum appellamus. Splēdet enim veluti mortui maris bitumen, quod Iudaicum vocāt. Secunda species, seu differentia bilis atræ non naturalis est, quæ ex aduſtione aliorum humorum nascitur, vt illa quæ fit ex flaua bile vehementer vſta. Quæ etiamnum tantræ est malitiæ, vt & terram radat, & eam, morē bilis exquisitæ atræ, in altum attollat. Sed & muscæ ipsam, nō secus quā verē nigram bilem, refugiant. Si sanguis quoque aut pituita in corpore vehementer incaluerint, & exurantur, efficiuntur etiā melancholicus humor, non naturalis per aduſtionem dictus, vt voluit Auicēnas. Verū dux istæ postremæ species (quæ scilicet per sanguinis aut pituitæ aſtationem fiunt) Auicennæ mitiores sunt. Scribit autem Galenus illam bilis atræ speciem, quæ ex flaua bile vehementer aſtata generatur, deteriorem eſſe, quā ea quæ ex crassiore sanguine generationem habet: qui subſidenti in dolio vini feculæ aut amurcæ, hoc est, feci olei proportionē respōdet. Hæc enim minor est, sed potissimā, quoties nondū trahit in animali moram cum aliquo calore abundanti præter naturam. Verū priusquā in exactam atram bilem transmutetur, primō in vitellinam, secundō in porraceam, tertio in truginosam transit. Tertia species melancholiæ non naturalis est, quæ originem sortitur à lapidosa quadam concretionē, vt cū ab imperitis medicis vel chirurgis, eryſipelata, & inflammationes (quas Græci phlegmonas vocant) aut quicūq; alii tumores ex naturalibus humoribus procreati, ad motus extrinsecus præſidiis, nimis vehementer refrigerantur, astringunturque: vel cum iisdem tumoribus, ea quæ valenter nimis trahunt, digeruntque medicamenta, adplicantur. Tunc enim toto, quod in eis subtilissimum erat, dissipato, id quod reliquum est (nempe crassius) plus iusto deficit, catū, lapidis duritiē consequetur, atque in melācho-

Galen. 21.
 Lib. 4. aph.
 Lib. 14. Theorap.

Bilis atra
 ex aduſtione
 ne aliorum
 humorum.

Comen. 29.
 lib. 3. prædictionis Hip-
 poc.

Bilis atra
 per congelationem (vt
 vocant) &
 indurationem.

Bilis extra ex admixtione. cholicum humorem vertetur. Quarta melancholiæ non naturalis differentia exurgit, quando alius humor ipsi melancholiæ naturali permiscetur. Quod dum fit, dulcoratur, ac mitescit magis, nisi dum alterutra bilis adusta, huic commiscetur. Siquidem tunc vel accessit, vel amarescit, & erosionis non modicæ particeps efficitur. Ex precedentibus igitur colligere licet, quatuor tu-

Quatuor tumorum differentias fieri ex melancholia.

Verus scirrhus non exquisitus.

morū præter naturā differentias nasci ex melancholia, seu atribulario humore. Primò namq; ex melancholia naturali (quā quotidianè gigni in sanis diximus) fit verus, ac legitimus scirrhus, apud Arabes icphiros nominatus, Græcis verò σκίρρῶς, & σκληρός & ακελεύς, hoc est, scirrhus non exactus, seu non exquisitus, qui tumor quidem est prædurus, & doloris expers, non omninò tamen insensibilis. Avicennæ impurus appellatur. Galenus tamen libro decimoquarto metho. med. tumorem ex humore melancholico conflatum, tunc propriè scirrhum, his qui de nominibus contendunt, condonat esse appellandum, cum omninò sensus est expers. Cum verò nondum omninò factus est insensibilis, scirrhosum potius tumorem, quàm scirrhum (si velint) nominari.

Scirrhus phlegmonodes.

Oedemato-

des.

Erysipelatodes.

Scirrhus exquisitus.

Scirrhus cancerosus.

Scirrhus propriè dictus quid.

Secundò ex melancholia non naturali dicta per admixtionem, tres aliæ tumorū differentia enascuntur: nempe scirrhus phlegmonodes, oedematodes, & erysipelatodes, quæ pro vna tantum differentia, hic numerantur. Tertiò ex melancholia non naturali facta per lapidosam quandam concretionem, generatur σκληρός ακελεύς, id est, scirrhus exquisitus vel exactus, durus quidem, & omninò sensus, atque doloris expers. Ab Avicenna purus nominatus, qui curationem non admittit. Quartò ex melancholia non naturali per deusionem omnes cancerorum species procreantur, tam ulcerati scilicet quàm non ulcerati, de quorum genere est scirrhus cancerosus nominatus. Itaque scirrhus propriè dictus, tumor est durus, & indolens: non tamen omninò sine sensu, ab humore melancholico naturali, & minime corrupto procreatus, ut recentiores definiunt chirurgi.

De causis, signis, & iudicijs, scirrhī legitimi.

Causa scirrhī legitimi.

CAUSÆ scirrhī, ut & aliorum tumorum præter naturam, triplices sunt. Primitiva scilicet, ut est prava viuendi ratio, crassum, & melancholicum sanguinem generans, coacervansque. Antecedens, ut succus melancholicus in corpore collectus, à liene (cuius officium est hepar à crasso illo, & luto-
so sanguine expurgare) malè attractus, & extra corpus minime, 4

ut debebat, expulsus. Coniunctæ, humor ipse melancholicus in laborante particula impactus. Signa ipsius scirrhi præsentis, Guidoni sunt, tumor durus, & valenter renitens, color inter rubrum, & nigrum medius, cuiusmodi color fuscus est. Hunc cum in corporis partibus sæpe incidat, plerique medicorum (ut Galenus inquit) pelidnon, hoc est, liuidum vocant. Adhæc, si venas euidentiores membrum laborans habet, exaltatas eas à crasso, & nigriore quodammodo sanguine, cuiusmodi per aluum aliquando non paucis hepaticorum excernitur, videre licebit. Sed

Nota scirrhi

*14. metho.
med.*

10 iam scirrhus impurus, & cancerosus erit. Hæ enim notæ, quas hic ad scirrhum accommodat Guido, cancri propriæ sunt notæ apud Galenum lib. 14. meth. Non ineptè tamen scirrhus adaptari possunt, hoc vno dempto, quod venas tumentes, & exaltatas non habet scirrhus, ut cancer, nisi scirrhus fuerit (ut diximus) cancerosus. Quippe non raro scirrhus in cancrum degenerat, cum ab eadem fiant materiâ, succo scilicet melancholico. Propriæ igitur scirrhi legitimi notæ sunt, tumor durus, pertinaxq; ac tactui resistens, in quo & hebes sensus adest. Adde, quod & aliæ notæ apparent, quæ melancholicum humorem in corpore subesse testantur. Tumores verè scirrhosi ab initio, & dum adhuc prima rudimenta concipiunt, magna ex parte exigui apparere solent: procedente verò tempore, paulatim augentur, & maiores sunt. Ex ijs quidam vnum duntaxat membrum occupant. Alij verò eo membro, quod prius infestabant, relicto, ad aliud postea transferuntur. Quod dum fit, nominatur tunc vitium ferinos Auicennæ. Præterea huiusmodi tumores melancholici, ut plurimum si ritè tractentur, resolutione terminantur, nonnunquam indurata manent, & non raro in cancrum (quod pessimum est) degenerant, ac transmutantur.

*Guido notas
cancri tribuit
scirrhus.*

Iudicia scirrhi.

Ferinos.

30 *Veri ac legitimi scirrhi, non tamè exquisiti, & in tophaceam duritiem omnino insensilem concreti, curatio.*

Ceterum absolutam induratorum huiusmodi tumorum præter naturam, qui veri scirrhi, non tamen exquisiti nominantur, curationem tribus intentionibus assequemur. Prima conuenientem viuendi normam præscribit. Secunda materiam antecedentem, seu præcedentem, (id est, quæ parata est, statim morbum efficere) tollendam monet. Tertia coniunctæ (ut vocant) materiæ, & morbum iam committentis vacationem mor-

Tres intentiones in curatione scirrhi legitimi obseruanda.

40 liendam esse nobis insinuat. Itaque (ut in vniuersum dicatur) vi-

h

tam

Viuenti ratio. tam eorum qui scirrhus laborant, sobriam, & moderatam, & que ad calidum, & humidum declinet, in rebus seu (vt dicunt) non naturalibus insinuito. Ergo alimenta euchyma, id est, boni succi, & probum sanguinem generantia exhibeto. Panem igitur triticum, probe subactum, & moderato igne in furno coctum, qui et fermenti aliquid habeat, & salis quod satis est, prescribito. Vinum substantiam tenue, & odoratum deligito: crassum vero, nigrumque vitato. Oua forbilia, pullos, capos, gallinas & eorum iura præbeto. Perdices, phasiani, coturnices, capreoli iuvenes, vituli lactantes, & anniculi verueces, laboranti in delictis sunt. Ex oleribus, id quod Arabes aspanar, nos vero nomine paulum mutato, spinacium diximus, lactucas item, lupulum, boraginem, & buglossum, atque id genus alia, quæ sanguinem expurgant, & puriorem reddunt, ne aspernator. In summa, ea omnia, quæ sanguinem melancholicum suapte natura pariunt, fugito. Ea autem Galeno libro tertio de locis affectis capite sexto ferè sunt, caprina, bubulaque caro, magisque hircina, & taurina. Sed maxime asinorum, chamelorumque carnes: item vulpinæ, caninæque. Leporum quoque, sed multo magis aprorum. Præterea limaces, si frequens sit eorum usus: atque omnes terrestrium animalium carnes sale conditæ. Aquatilium quoque carnes, vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola huiusmodi sanguinem gignere consuevit. Quemadmodum & arborum germina, vbi vel muria, vel oxalime conduntur, præcipue lentisci, terebinthi, rubi, & rubi canini, qui Græcis cynobatos appellatur. Leguminum vero omnium maxime lentes inter melancholicos cibos numerantur. Mox panis futuraceus & qui ex typha, atque vitatis seminibus factus est, quorum apud quasdam nationes usus, loco frumenti habetur. Præterea vna crassa, nigraque aptissima sunt, vt ex ipsis melancholicus humor fiat: præsertim, si quis abundè ipsa ingerens, oblata occasione in multo calore corpus contineat. Verus denique caseus, vbi fortè fortunâ in corpore fuerit supercalefactus, facillè huiusmodi parit humorem. Hæc ex Galeno hæc tenus. Cauendum insuper est, à retorridis, assis quoque, & frixis vehementer exsiccatis. Item salitis, acidis, & acribus (veluti sunt allia, cepe, piper, sinapi) & alijs id genus omnibus, quæ sanguinem adurunt. Virare etiam oportet iram, mœsticiam, vigilias, sollicitudines, atque immoderatas exercitationes. Animi tranquill-

De Tumoribus præter naturam.

II.

equilibras, ac lætitia magnoperè est experenda: summaque ope
nitendum, vt quotidie venter deiciat. Hactenus de primo
scopo. Vt autem quod secundus scopus nobis proponit, conse-
quatur, præcipit Auicennas, corpus vniuersum vacuandum
esse, tum venæ sectione, si sanguis niger admodum, & crassus
apparuerit: tum medicamento purgante, quod bilem attram
exigar: cuiusmodi sunt Mesue, epithymum, senna, polypodium,
fumus terræ (qui Græcis capnos vel capnios, & fumaria Latinis
appellatur) lupulus, volubilis. Item caisia fistula, myrobalani
indi, lapis lazuli, qui Græcis cyaneus, Romanis cæruleus dici-
tur. Diasene, diacatholicum, hiera Ruffi. Hæc enim omnia
humores melancholicos per aluum expurgant. Sed hæc, quæ ad
pharmaceuticam & diateticam artinent, chirurgi metas exce-
dunt. His igitur medicæ artis professoribus relictis, ad tertium
scopum properabimus, quem sanè nos assequemur, si quod præ-
ter naturam in particula est, totum vacuetur. Quæ communis
quidem, ac prima indicatio est omnium, qui præter naturam
consistunt tumorum: in quibus vtiq; adhuc non sunt geniti po-
ri. Modus autem vacationis eius proprius est, circa quem cir-
cumspiciendum, & maximè attentum esse curantem oportet. Siqui-
dem materia eiusmodi tumorum naturæ tam maligna est, vt in
duritiem veluti lapideam abeat, si temerè resoluitur. Si verò
plus quam par est, eam emollias, periculum sanè imminet, ne ip-
sa corrumpatur, & scirrhus in cancerum degeneret. Sequendum
igitur in hac re Galeni ac Pauli (qui de hac re ante Auicennam
scripserunt) consilium est. Nempe vt scirrhosis ipsis affecti-
bus, nullum vehementer excalfaciens ficcansque medicamen-
tum adplicetur. Nullum item quod duntaxat emolliendi, at-
que humectandi vim obtineat. Quod enim (inquit Galenus
libro secundo ad Glauconem) superfluum humorem habet ni-
hil omnino dissoluit: quod verò minimum, plus quam oportet,
exiccat. Hinc non omnino absurdè præcipiebat Auicennas, al-
terpatis vicibus ad hos induratos tumores, modò emollientibus,
modò digerentibus per halitum, vtendum esse. Verum quoniam
id & tardiosum, & factu, vt oportet, perdifficile est, citius ac tu-
tius Galeno visum est, medicamentis mixtam facultatem ha-
bentibus, ad horum curationem vtendum esse. Eodem enim tem-
pore, quod induratum est molliemus, & sensum per halitum di-
geremus. Illis tamen ab initio, aliquid quod modicè reprimat,
erit admiscendum. Porro ad hanc intentionem Auicennas

*Exercitatio
Inanitis.*

*Vacuatio
materie an
tecedentis.*

*Vacuatio
materie com-
mune.*

*Materia scir-
rhorum causa
tractanda.*

Galenus.

*Medicamen-
ta scirrhis
accommoda.*

Rasis medi-
camentū ad
scirrhus emol-
liēdos et dis-
cutiendos.

Galenī ca-
raplasma
14. Therap.

Si scirrhus
ad suppurati-
onē spectet

quamplurimas remediorum formulas instituit: verum quoniam
ea magis dicata sunt scirrhis ex phlegmone, aut erysipelate im-
pendio refrigeratis (ut in sequenti capite ostendemus) pro-
creatis, illis relictis, assume medicamentum à Rase libro septi-
mo ad Almanforem descriptū : facta tamen prius ab initio ali-
quali influentium humorum (domesticis quibusdam repellenti-
bus admotis) repressio. Rasis autem medicamentū ad hunc
modum habet: Accipe bdellij, ammoniaci, galbani, singulorum »
partes æquales, terantur in mortario, cum oleo de ben (quod »
Græci balanum myrepiscen, Latini glandem vnguentariam vo-
cant) aut de lilio. Deinde sume mucilaginum fornigræci, semi-
nis lini, & ficuum, pondus omnium prædictorum: terantur om-
nia simul, donec in vnum coëant, & fiat emplastrum. Galenus »
ad eam rem magnoperè commendat corticem radicis althææ
(quam, inquit, vulgus anadendromalachen, quasi dicas, arbore-
scentem maluam vocat) anserino, vel gallinaco adipe liqua-
tam, & cum eo contrusam, atq; in caraplasmaris formam reda-
tam. Quod si tumor ad suppurationem spectet, summoperè
cauendum est, ne particula laborans caloris fœcis auxilijs, aut quo-
uis alio modo irretetur. Ita enim facilè cancer accerferetur. Si 20
verò aperiatur tumor, materia iam in pus conuersa, ab vñ vn-
guenti, quod diachylon nominatur, minimè tibi discedendum
fuerit. At si in lapideam duritiem degenerauerit, ad ea auxilia,
quæ sequenti capite describentur, erit recurrendum.

*De scirrhus illegitimo non exquisito, ex vehemēti refrigera-
tione, aut exiccatione originem sortito.*

Scirrhus ille
gitimus quo
modo gene-
retur.

Duritiē
in particulis
causa.

QVando medicorum imperitia, inflammationes (quas
Græci phlegmonas appellant) aut erysipelata impendio
refrigerantur, & adstringuntur, aut admotis medica- 30
mentis, vehementer trahentibus, & per halitū digerentibus, te-
merè resoluuntur, tunc totum id quod in eis tenue magi, ac
subtile erat dissolvitur, dissipaturque: quod verò reliquum est,
velut cōgelatur, atq; impensius resiccatum, lapideam duritiem
assequitur, fitque tandem affectus, qui Græcis scirrhus voca-
tur. Cæterum contingit quandoque particulam aliquam in-
durari propter tensionē, quam sustinet ex flatibus, aut humore
quopiam aquoso, ut supra dictū est, dum de tumoribus flatus-
osis & aquosis ageretur. Nonnunquam & rophacea durities in
particulis quibusdā oboritur, propter priuationē humiditatis, 40

& nimiam desiccationem, ut in duritiâ iuncturarum, & p̄oris in articularijs morbis, ac doloribus, procreatis. Verùm enim uerò hîc duntaxat agemus de scirrhis, seu induratis tumoribus, qui ex phlegmone, aut erysipellate, paulò antè commemorato, ortum traxerunt, aut etiam ex cedemate impendio refrigerato, & adstricto. Atque eos non absurdè scirrhos ex coincidentia procreatos nominauerimus.

De signis & iudicijs scirrhi non legitimi, ac non prorsus exquisiti, ex coincidentia creati.

10

Scirrhi non veri seu illegitimi, & non omninò exacti, non sunt, tumor durus, vix sensibilis, id est, quasi sensus, & doloris expertus, corporis colorem ad vnguem repræsentans, ex melancholia non naturali ortum ducens. Hic nec prorsus incurabilis est, nec facilem sanè curationem admittit. Siquidem humor, unde huiusmodi vinum contrahitur, lentus seu glutinosus, crassusque est, aut (ut Galenus ait) vtriusque rationis particeps, qui particulis induratis infartus, solui contumaciter repugnat. Vbi præsertim resoluta ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum est, exiccatum lapidosumque efficitur. Scirrhus verò exquisitus, & qui omninò sensu vacat, curationem non recipit. Si tamen aliquo modo iuuari possit, humectandi ratione id præstari debet. Durities quoque ex nimia exiccatione, & marasmo, hoc est, consummata prorsus siccitate, insanabilis est: satis enim est prohibere, ne ultra siccitas procedat. Sed & scirrhi in quibus pili nascuntur, quique magni sunt, ac vehementer duri, & corporis colorem referunt: nec sanantur, nec vnquam permurantur, ut scriptum reliquit Auicennas.

Scirrhi illegitimi, & non exquisiti nota. Iudicia.

Scirrhus exquisitus curationem non admittit. Scirrhi incurabiles.

Curatio scirrhi illegitimi, & non exquisiti.

10

Curandi verò eius communis indicatio est, ut quod præter naturam in particula est, totum vacuetur. Modus tamen vacationis eius proprius est, ut libr. 14. meth. Galenus annotauit. Nā detergere (inquit) id quod contumaciter inhæret, oportet. Quòd si quis ijs quæ vehementer trahunt, digeruntque, medicamentis vacuare tenter, nec ijs quæ exalfaciant, & humectent, molliat, ac liquet: huic paucis primis diebus egregiè processisse curatio videbitur. Scirrhus enim manifestò decreuisse apparebit. Cæterum quod de affectu restabit, id insanabile erit: siquidem toto, quod in eo tenuium partium erat, digesto dissol-

Summa curationum scirrhorum.

Medulle.

Seua.

Adipes.

Gal. 14. met.
med.Anadendro-
malache.Strigmenta
gymnastioru.Oleum rici-
ninum.14. metho.
medendi.De aceti usu
in varijsscirrhis
partibus.aceti usu
in scirrhisde aceto
dura dms est

Lib. 2. ad

Glaucnem.

vitijs galeni

Oleum sibi

num. 11. 12.

4. 12. tenuissimum

patove, quod reliquum est, veluti lapidosa concretio linquitur. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum vehementer excalfaciens, siccativum medicamentum idoneum est. Sed ea tantum, quæ cum molliendo, hoc est, præter quod molliant, digerere etiam commodè possunt. Cuiusmodi sunt, tum ceruina medulla, tum vitulina, tum seuum hirsinum, taurinum, pardale, & leoninum. Ex adipibus volucrum commendatur imprimis anserina, quæ proximè sequitur gallinacea, & phasianica. Ad hæc, ammoniacum thymiama, id est, suffimen, galbanum, & bdellium utrunque, magisque Scythicum, quanto videlicet est humen-¹⁰ tius. Stryrax quoque qui humentior est, & pinguis. Radix etiam althææ, quam vulgi more anadendromalachen, id est, arbore-
scentem, siue arboream maluam, (quod alitè à terra erigatur, & in hortis confita, arboreseat) Galenus appellavit: & sylvestris maluæ, quæ passim nascitur, folia, modicè antè decocta, cum anserino adipe, aut gallinaceo, vel si horum facultas non sit, suillo contusa, ad hanc intentionem apprimè sunt idonea. Prohibeat autem Avicennas axungias salitas: & prædictis addit mastichen, ladanum, æsopum humidam, strigmenta gymnastiorum, quæ sordities balneorum appellant, stercus asininum, & feces²⁰ oleorum de litho, de alchanna, quod cyprinum vocant, & de cherua, quod Græcis *χέρυρα*, Latinis verò ricininum dicitur. Cæterum curatio quæ per acrum administratur, utilis est huic vitio, hoc est, scirrhus iam adulto, & cum præparata iam sub mollientibus pars fuerit, ut etiam Galenus annotavit. Siquidem (inquit) aceti vis, modò ea quis modicè & debito tempore utatur, salutaris eiusmodi affectibus est, seu crassos humores dissecans, ac resoluens. Sin vel immoderatus, vel in tempore non³⁰ modico, tenuiores partes violenter absument, id quod reliquum est, lapidescere finit. Sed & si quis eo diutius utatur, substantiam ipsam nervorum delibaverit. Ob id igitur nec sæpe ac inter-
mitia, nec longo tempore, medicamentis quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones est utendum. Eam ob rem Galenus Cercilij puerum, cui ex erysipellate nimis infrigidato, & vehementer adstricto, tumor durus, ac scirrhosus in toto femore relictus fuerat, ita curabat. Imprimis femur perfudit oleo sabino, quod omnium est tenuissimum: cuius loco hodie utuntur oleo sambacino, quod vulgus iasminum vocat. Postquam verò partem sic fouisset, ammoniacum thymiama, hoc est, suffi-⁴⁰ mentum, quod pingue, & non verustum esset, prædictis medullis, &

& adipibus remixtum adhibuit. Post hæc ammoniaco pingui-
 simo, aceto acerrimo dissoluto, circumleuit totum femur, ius-
 sitque puerum altero crure salire, quò plus in id alimenti ferre-
 tur. Itaque relaxantibus, quæ molliorem tumorem reddebant,
 & digerentibus, seu resoluentibus ita vicissim, ac moderatè utè-
 do, puerum curauit. Verùm in tendonibus, & ligamentis scir-
 rho obductis, aceto ex Galeni consilio ad hunc modum uten-
 dum est. Lapis igni candens, aceto acerrimo extinguendus est:
 & si quidem haberi potest, pyrites: sin eius copia non est, mola-
 10 ris, quem Græci mylitem vocant. Deinde ascendente post infu-
 sum lapidi acetum vapore calido, in hoc pars affecta commoue-
 ri debet, ut vaporem ascendentem recipiat, à quo scirrhus dis-
 soluatur: atque exinde rursus medicamen quod emolliat, impo-
 nendum. Oleo ramen, non aqua quotidie ab initio omninò la-
 borans particula perfundenda est. Esto autem id oleum haud-
 quaquam adstringens, sed planè tenuium partium, cuiusmodi
 sabinum est. Interdum autem incoquenda oleo est, althææ radix,
 ac syluestris cucumeris, & si qua est eius generis alia. Sanè plu-
 rimi hac curationis ratione pauco tēpore perfecte sanati sunt,
 20 adeò ut multis ferè (inquit Galenus) magicum opus videretur.
 Ex his igitur constat, curationi quæ per mollientia fit, tum in
 tendonibus, tum in ligamentis, cum scirrhus fuerint, aliquid
 incidentiū debere admisceri. Ex quorum numero vel imprimis
 acetum est. De medicamentis autem, quæ vim molliendi durities
 obtinent, diffusius alibi tractabimus.

*Tendonum
 & ligamē-
 torum scir-
 rho foris cu-
 ratio ex Ga-
 len. & Pau-
 Lib. 14. The-
 rap. & 2. ad
 Glau-
 Pyrites la-
 pis.
 Lapis myli-
 tes.*

2. ad Glau-

Lib. 6.

Capita curationis scirrhorum tumorum.

30 **S**cirrhum, qui resoluta, atque absumpta humiditate, in to-
 sphaceam duritiem concreuit, sensuque omninò caret, cuius-
 modi est, quem exquisitum Galenus vocat, tanquam immedica-
 bilem curare ne aggreditor.

Scirrhus non exquisitus (qui non sine sensu quidem omninò
 est, sed ægrè admodum sentit) medicamenta, quæ tepido calo-
 re, ac mediocri humore prædita sunt, hoc est, quæ emolliendo
 moderatè digerant, adhibeto.

Vehementer digerentia, atque immodicè exiccantia parti-
 bus scirrhi laborantibus, ne vnquam admoventur, ipsi enim subti-
 lior humiditas resoluitur, quod verò reliquum est, exiccatum
 lapidosumque efficitur.

40 In duris ac densis partibus scirrhus obsessis, cuiusmodi
 h 4 sunt 4

sunt tendones, atq; alijs etiā in locis, si affectus iam inueteratus est, medicamēta quæ dissecant, atq; incidant, cuius generis est acetum, emollientibus, & moderatè digerentibus misceto.

- 5 Scirrhosam quoq; partem hanc, duram ac densam, & quāuis aliam diuturno scirrho affectam, super vaporem calidum, quē molaris lapis, id est, quo frumentū molimus, igni candens, acerrimo aceto perfusus, emittit collocari, subindeq; versari iubeto.
- 6 Quotidie etiam oleo aliquo tenuium partium, in quo cucumeris sylvestris, aut altheæ radix, aut anethum viride, & recens, aut id genus aliud incoctum fuerit, affectam partē perfundito. 10
- 7 Eiusmodi desiccantia, incidentia, ac crassos humores resoluentia, modicè, id est, nō sepe, nec longo tempore, atque opportunè, hoc est, non inter morbi initia, & interposito remollientium vsu, prædictis scirrhis partibus admoueto.
- 8 In summa, scirrhos omnes, qui nondum callum contraxerūt, medicamentis, quæ commodè digerendo emolliunt, curato.
- 9 Scirrhi lienis, atque etiam iecinoris curationem, medicorum prudentiæ committito.

De cancroso tumore, quem vulgò cancerum apostematofum vocant.

CAP.

XV.

20

Canceri nomen ad duo morborum genera extēditur.

Cancer ex quo humore morbo significatur.

Cancer sine vlcere.

Cancer cū vlcere.

Cancrofitu mori descripio.

CAnceri nomē medicis, & chirurgis æquiucum est, eius enim significatio ad duo morborum genera extenditur. Nempe ad cancrosum tumorem (quem vulgò cancerū apostematofum vocant) tam euidentem, hoc est, in summa corporis parte hærentem, quā absconditum, hoc est, in penitioribus, & latentibus corporis partibus, vt in fede, palato, aut sinu muliebri conditum, & ad cancerum vlceratum. Porro vterque affectus gignitur ex atra bile, seu melancholico humore, hoc est, eiusmodi naturæ succo, cuiusmodi est fex in 30 vino, & amurca in oleo, vt 14. Therapeutices, & libello de tumoribus præter naturam, Galenus testatur reliquit. Vbi autem mitior fuerit humor huiusmodi melancholicus, latentem, seu occultum vt appellant, cancerum, sine vlcere progignit. Si verò acrior maligniorque contingat, cutim erodit, & cancerum facit cum vlcere, de quo in sequentibus dicemus, quando scilicet de vlcere agemus. Hic autem solum sermonem faciemus de cancro non abdito, id est, in extimis partibus constituto, & nondū exulcerato, qui & ipse quandoque occultus Galeno dicitur. Est igitur cancer quo de hic agitur, tumor durus, inæqualis, rotun- 40 dus,

De Tumoribus præter naturam.

121

dus, venosus, id est, venas habens in circuitu turgidas, & exalta-
 tas, liuescens, siue fuscus, & (vt Paulus ait) colore magis, quàm
 inflammationes, nigricans: calidus, sed non adeò, vt inflamma-
 tiones: subito accrescens, ægros maximè fatigans, & perpetuo
 ferè dolore affligens, Græcè καρκίνος & καρκίνωμα dicitur. *correspondet*
 Hanc autem appellationem huic morbo indiderunt tam Græ- *Quare can-*
 ci, quàm Latini, à cancro aquatico animali, quoniam circa huc *cri nomen*
 implentur & inciduntur venæ, cancerorum pedibus, à glome- *hoc vitium*
 re illo corporis descendenti bus, persimiles. Nonnulli verò inde *sibi adopta-*
 sic nuncuparunt, quod difficillimè ab his partibus, quas obsede- *rit.*
 rit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animans. Hic
 enim loco, quem semel apprehenderit, pertinaciter hæret. Ad-
 de quòd & hic tumor cancri animalis colorem repræsentat,
 nempe subnigrum. Cæterum prima cancri istiusmodi rudimen- *Cancris nota*
 ta, tam confusa interdum exiguaque sunt, vt vulgus ipsam la- *per initia co-*
 tere possint: vix enim dum adhuc incipit, ciceris, aut fabæ ma- *fejæ atque*
 gnitudinem æquat. Quare nihil miri est (inquit Galenus) si *obscura.*
 vulgus tunc lateat, non secus profectò quàm furpes, quæ è ter- *Lib. 14. The-*
 raziâ exeunt: quando hæ quoque peritis tantum agricolis, *ræme.*
 agnoscuntur. Postea verò in tantam molem attollitur, tamque
 vehementia, & magna, & cunctis euidentia adfert symptomata-
 ta, vt ne puerum quidem clam sint. Itaque tunc nemo de appel-
 latione ambigit, sed nominant vno assensu omnes eiusmodi af-
 fectum, cancerum: quoniam (vt diximus) venæ in hoc morbo ex
 vtraque parte intumescunt, distendunturque, ac figuram omni-
 nò similem cancro repræsentant.

Signa & iudicia cancri euidentis, & non vlcerati.

30 **C**ancrosus tumor (vt superius dictum est) duritiâ habet, & *Nota cancri*
 inæqualitatem, quæ tactu facillè deprehenditur. Colorem *euidentis nò*
 præ se fert liuidum, siue fuscum, qui inter rubrû, & nigrum me- *vlcerati,*
 dius est, Græci pelidnon vocant. Circa locum cancro affectum, *color vitæ*
 aliqua quasi puncta sentiuntur: interdum etiâ torpet Celsò. Ven-
 nas ostendit in circuitu tumentes, & exaltatas, cancri animâs
 pedû modo. Nonnunquam etiam in quibusdâ delitescunt. Ta-
 ctusque is locus, alijs dolore adfert, in alijs cum non habet. Re-
 nixus quoque huic tumori valens est Galeno 14. Therapeuti. Ad- *Iudicia.*
 hæc, extraneam quandam caliditatem habet. Cancer, seu carci-
 noma à toto genere morbus est grauis, & perniciosus. Vix enim
 40 vnquam propter succi crassitiem confanescit, vtpote quòd nec
 repelli,

noscenda

Lib. 5.

Galenus.
lib. 2. ad
Glauc.

Elephantia
non lepra
habetur

repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat. Sed & tanta eius vitij est malignitas, vt mitiora planè contēnat remedia illisque (vt dici solet) medium vnguē porrigat: vehē mentionibus verò, veluti crabro irriteretur, exardefeatq; atque efferetur. Id vitium in qualibet corporis parte oriri consuevit, sed maximè (vt Celsus ait) in partibus superioribus circa faciē, nares, aures, labra, & mammas foeminarum, atque earum, præci-
puè, quæ à natura purgationem menstruorum non habent. Sed & viris plarumque accedunt cancri, quibus assuetæ per mari-
scas purgationes suppressæ sunt: per has enim turbidus, ac cras-
sior sanguis (vnde prima vitium hoc rudimenta accipit) expur-
gari à natura consuevit. Porro cū humor ipse melancholicus
faci vinaræ proportionē respondens, in particulam aliquam
desiuit, ibique impactus manet: interdū varices facit, aliquan-
do verò cancerum, vtpote cū ipse deferbuerit. Cū verò ad
cutim vniuersam expellitur, fit is morbus, quem elephantem
nominant, vt lib. 2. ad Glauconem Galenus annotauit. Est ita-
que cancer particularis quædam elephantiasis, quam vulgus ma-
lè lepram appellat. Quantò autem sanguis ex quo ortum ha-
bet cancer, crassior fuerit, ac nigrior, tanto (inquit Galenus) de-
terior passio erit. Cancer autem iam confirmatus (vt dicitur) at-
que inueteratus, curationem non admittit, nisi radicitus extir-
petur, aut per sectionem scilicet, aut per vstionem: verū qui
in penitionibus corporis partibus constituti sunt cancri, talem
curationem non desyderant, vt sequente aphorismo nos edo-
cuit senior ille, medicorum facile princeps Hippocrates, in quib;:
Cancros occultos omnes melius est non curare: curati enim ci-
tius pereunt: non curati verò, longius tempus perdurant. Expe-
rientia namque (vt in commentario huius aphorismi Galenus
testatur) compertum est, omnes qui huiusmodi cancos sectio-
ne, aut vstione curare tentarunt, illos magis irritasse, & breui
homines interemisse. Soli itaque cancri illi curationem huius-
modi admittunt Galeno, qui in summa corporis parte hærent,
quique exulcerati sunt, & adeò laborantes fatigant, vt ipsi vl-
tro chirurgi manum efflagitent: & simul in talibus partibus cō-
sistant, quas rescicare, & exurere vnā cum radicibus possis. Vo-
co autem radices cancri cum Galeno eas, quæ plenæ sunt san-
guine melancholico, venas, & vndique versum ad loca circun-
stantia extenduntur. Cæterum ex cancro non vlcerato, non ra-
rò fit vlceratus, putrescente scilicet spacio temporis humore, in 4c

valis

Qui cancri
radicitus tol-
li debeant,
& qui non.
Radices can-
cri.

vasis delitescente, vel irritato à medicamentis inconsultè admo-
tis, affectu. Hunc autem exulceratum cancerum pessimum esse,
iudicant omnes, & veræ curationi (quæ omnia molitur, & agit,
vñ laborans particula ad sanitatem perducatur) prorsus ineptū.
Hic enim ad perfectam atque absolutam sui curationem, mor-
dientia, aspera, ac vehementia desideraret medicamenta. Atqui
(vt diximus) talibus magis irritatur, efferturque, tantum abest,
vt sub ijs vel mitescat, vel consanescat. Proinde satis fuerit, si
cancros non ulceratos, etiamnum summa corporis occupantes,

*Cancer ex-
ulceratus
pessimus af-
fectus.*

- 10 præsertim maiores, & iam inueteratos, prohibeamus augeri, à
perfecta quidem curatione manum subtrahentes. Quod & su-
periore aphorismo nos cōmonuit Hippocrates. Cancros enim
eos, qui sine exulceratione fatigant, etiam (Galeno autore) oc-
cultos nominauit. In quibus sanè exulcerationem minantur, ve-
hemens caliditas, & pulsatio.

*Quæ nota
in cæcro fa-
turam exul-
cerationem
portendant.*

*Curatio canceri non exulcerati adhuc incipientis, & non-
dum inueterati, summa corporis occupantis.*

- 20 **C**uratio canceri non exulcerati, & adhuc recentis, tres ha-
bet scopos præcipuos. Primus est, humoris melancholici
generationem prohibere. Secundus est, succum melancholicum
per totum corpus dispersum vacuare. Tertius, humorem, qui lo-
cum affectum occupat, vel regerendum, vel digerendum omni-
nò: adhuc, particulæ laboranti robur adferendum esse insinuat.

*Triplex cu-
ratio cancro
scopus pro-
ponitur.*

Primus scopus, seu prima intentio, quæ est, prohibere, si fieri
potest, ne de cætero succus melancholicus in venis colligatur,
perficitur ea viuendi ratione ad vngue obseruata, quæ iuprà
in capite de scirrho legitimo nominato præscripta est. Id autem
inter cætera maximè ac præcipuè obseruandū est, vt ijs qui hoc

*Primus sco-
pus.*

- 30 affectu laborant, ea alimenta offerantur, quæ refrigerandi, atq;
humectandi vim sortita sunt: quæque probum ac tenuem suc-
cum in corpus ingesta, generant. Cuiusmodi sunt cremor hor-
dei, pisces saxatiles, omnis generis aues, præterquā palustres: ouo-
rum, sed maximè sorbiliun (quæ Græci *σώματα* vocant) lucæ,
& quæ eius generis sunt alia. Quòd si caliditas effatu digna, ci-
tra febrem tamen in particula laborante adfuerit, lac bubulum,
à quo buryrū fuerit extractū, vel ferū lactis turō offerri potest.
Sed & olera, quæ refrigerantis, atque humectantis nature sunt,
veluti malua, attrplex, blitum, & quando tempus tulerit, cu-
40 curbita, item citrulli, & borago, illis in cibum permittuntur.

*Victus ratio
tenuis sit, bo-
niq; succi.*

Secun-

Secundus scopus.

Humoris melancholici euacuatio. Epithymū.

Sensim ac blandè nō se mel, atque affatim purgandum in cancro.

Hiera Ruffi Hiera Auicennæ.

Sanguinis missio.

Lib. I4. metho. med.

Tertius scopus.

Secundus scopus qui est, totum corpus ab humore melancholico, unde vitium hoc originem traxit, repurgare, completur purgantibus medicamentis vacuandæ atræ bili accommodis, in capite de scirrho superius enumeratis. Inter quæ (quod ad rem præsentem attinet) principatū obtinet epithymum (quod Romani inuolucrum vocant) pondo drachmarum quatuor, in ferro lactis mulsæue exhibitum, vt Galenus præcepit libro decimo quarto methodi medendi. Ea autem quâtitas epithymi, vel paulo maior, tertio quoque die offerenda est, vt scilicet melancholicus humor, qui in venis collectus est, & cancro generatio-
nem dedit, sic sensim atque ex interuallo vacuetur. Quâdoquidem vniuersum simul euacuare vix datur. Sed nec semper prohibere possumus, ne deinceps eiusmodi succus in corpore generetur, & in venis colligatur. Itaque materiæ eiusmodi antecedentis purgatio, sic per initia quidem simplicium aliquo, per vices molienda est. Deindè (si res ita expostulet, & simplicium exhibitione parum proficitur) compositorum aliquo, cuiusmodi est Galeni medicamentum atræ bilis vacuandæ dicatum, quod ex duobus & triginta simplicibus est compositū, vel hiera Ruffi, & Auicennæ, quæ nigrum veratrum recipit. Nec ab iis quidem
ita repetitis purgationibus prius desistendum est, quàm totus ille succus melâcholicus in venis collectus eductus fuerit, & pars tumore eiusmodi cancroso obfessa ad naturalem statum omnino sit reducta. Quod si nihil obfiterit, hoc est si ætas, & vires permiserint, non inutile etiam fuerit in canceris ipsis sanguinē mittere, demum (vt dictum est) purgare: & si fuerint mulieres, menstrua euocare, siquidem nōdum quinquagesimum annum attigerint, vt libro secundo ad Glauconem Galenus nos admonuit. Hæc secunda indicatio omnium prima est Galeno, quæ vero primo loco posita est, secundum ordinē sibi iure vëdicat. Cō-
munis namque (inquit) indicatio curationis in cancro est, humorem, unde vitium est natum, illico vacuare. mox verò prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eiusmodi succus melancholicus in venis colligatur. Sin id fieri nequit, saltē eum omnino ex interuallis vacuare, & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantia ad eam confluat. Tertia igitur indicatio (quæ omnibus eiusmodi affectibus ex fluxione creatis, communis est) nobis insinuat humorem, qui in particulam affectam procubuit, vel regerendum esse, vel digerendum omnino: adhæc particulam firmandam esse, ne quid humorum
redun-

redundantiæ, ad eam confluat. Porro repellendi quod influ-
 xit tēpus accommodum erit, in principio quidem, tam in ipso *Quid in principio, & simul ipso*
 purgationis tempore, quàm antè. Vbi verò iam totum corpus *purgationis*
 exquisitè purgaueris, tunc digerendi dabitur occasio. Verùm si *tēpore agen-*
 mediocri tantum purgatio præcessit, mixtam habere faculta-
 tem quod applicabitur medicamentum conueniet, reprimen-
 dum.
 tem scilicet, & digerentem. Sanè, vt has intentiones ritè assequa-
 ris, deligenda tibi erunt medicamenta, quæ viribus quidè sunt *Quod aptū medicamen-*
 mediocria, qualitate verò minimè mordentia. Talia enim hu-
 iusmodi affectibus solum sunt idonea. Nam quæ imbecillas vi-
 res habent (vt Galenus ait) nullum operæ precium efficiunt, sed *Lib. 14. The-*
 vincuntur. Quæ verò valentiore iunt facultate, vehemèter qui-
 dem tenuiores, quæ in venis sunt, sanguinis partes, vel digerūt,
 vel retrudunt: crassas verò & melancholicas, quas faci prius assi-
 milauimus, nec euocant, nec reprimunt: quin potius eas ad sol-
 uendum ac discutiendum contumaces reddunt. Ad sanandos
 igitur incipientes caneros, mediocrium virium medicamentis
 est opus, quæ scilicet nec propter imbecillitatem vincantur, nec
 propter effectus vehementiam, valenter sanguinem incrassare
 20 valeant. Adhæc item (vt dictum est) quæ omnino haud mor-
 deant. Quandoquidem vitii malignitas ab iis quæ mordent, ir-
 ritatur, ac (vt dici solet) effertur. Cæterum cū materia ex
 qua ortum habent cancri, magna ex parte crassa sit, repulsiōni,
 ac etiam resolutioni contumax, siue inobediens, multæ quæ ma-
 lignitatis particeps, sat fecerimus (vbi saltem periculum ex chi-
 rurgia timuerimus, nec curari affectus aliter possit) si vñ præ-
 cedentium medicamentorum, ex vñtis elotisque metallicis (vt
 Galenus consulit) acceptorum, ipsos augeri prohibeamus, &
 præsertim si maiores fuerint: aut iuxta Auicennæ sententiam,
 30 eos ab ylcératione vindicemus. Ad quas intentiones libro secū-
 do ad Glauconem succum solani, & medicamen ex pompho-
 lyge constans, aut quod ex chalcite fit (diapalma vulgò appella-
 tur) magnoperè Gal. commendauit. Proindè & Theodoricus
 ad eam rem vnguentum instituit diapompholygos nominatū,
 quod eidem recipit olei rosarum, ceræ albæ ana vncias quinq;
 succi granorum rubrorū, solani quatuor, ceruissæ lotæ,
 vncias duas, plumabi vñti, & loti, pompholygos (quæ ruthia vul-
 gò dicitur) ana vnciam vnam, thuris vnciam semis. Refert quo-
 que Galenus libro primo, *ἡ συνθεσις τῆς φαρμακῆς κατὰ*
 40 *τόπους*, id est, de compositione pharmacorum secundū loca, qui
 mya-

succus solani.
Diapompl. o lygos.
Diaphenici- ne seu dis- palma.
Vnguentum Diapompholygos Theodo- rici.

Appollonii
medicamen-
tum.

Hemina ca-

pit vicius

7. & semis-

sem.

Plumbi vis

mirabilis in

lancrois tu-

moribus.

Paulus libr.

4. ex Archi-

gine.

Chirurgia

in cancro te-

merè nō ad-

libenda.

non curant

myamir veteri interpreti inscriptus est, vnguentum quoddam ex Appollonio, ad manantia capitis vlcera, quæ Græci achoras vocant, institutum: quod ad eiusmodi cancrōsos tumores adprimè vtile esse adfirmat. Recipit autem olei [vel: rosacei, vel] omphacini, id est immaturi] heminam, quæ Græcis cotyle dicitur, quod in pilam plumbeam infusum tantisper [sub sole] co- chleario etiam plumbeo agitari debet, aut pistillo plumbeo teri, donec crassescat, nigrescatque, adeò, vt plumbi colorem referat. Deinde seorsum conterito, lithargyri libram vnā, cerusā tantundem, & cum oleo commiscero, ac fiat vnguentum. Por- rō quantum valeat facultas plumbi, præsertim combustī, & elo- ti in omnibus cancrōsis dispositionibus, satis superque nou- runt omnes, qui de hac re periculum aliquando fecerunt, & qui attentè legerunt, quæ scribit Galenus de plumbō: (quod mo- lybdeos Græce eidem dicitur) libro nono de simplicium medi- camentorum facultatibus. Ad eandem morbosā disposi- tionem laudarunt Paulus & Auicennas emplastrum ex cancris flu- uiatilibus, præsertim si parem modum cadmiæ receperit. Can- crorum igitur fluuiatilium crematorū, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis vnā cum ce- rato inspergitur. Sed & idem Auicennas iubet minutos cancrōs, in quibus locis apprehendi possunt, radicatus esse extirpandos, excidendos: facta vero excisione, huiusmodi crassiorē san- guinem circumquaque exprimendum esse, deinde cauterio lo- cum esse adurendum. Hoc enim reliquias materiæ dissipat, & absumit, membrum roborat, & hæmorrhagiam prohibet. Galenus etiam ante Auicennam cancrōs interdum per chirur- giam extirpandos esse permittit, libro decimequarto methodi medendi, vt de cancro ulcerato postea dicemus. Verū enim- uerò, tamet si curationem hanc, quæ per chirurgiam fit, Gale- nus & Auicennas permittunt: ad vitandum tamen hæmorrhag- iæ, & vlcerationis, imò verò & vitæ egrotantis periculum, ea omiſsa, curandi rationem præscriptam, quæ solis leuibus, & quasi adblandientibus medicamentis fit, tanquam tutiorem, & minus calumniam oppositam amplecti, atque ea sola contenti esse debemus. Quandoquidem, si eiusmodi tumor cancrōsus, qui iam in molem insignem creuit, qua sanis partibus coniun- gitur, totus circūcidatur, statim immodicæ profusionis sangui- nis, propter vasorum magnitudinem, maximeque arteriarum periculum imminet. Quas si laqueis (inquit Galepus) interci- 4

pias,

pias, confortii iure aliæ partes afficientur, & ingenti dolore cruciabitur. Adde, quod excisa carcinomata (vt Celsus ait) etiam post inductam cicatricem tamen reuerterunt, & causam mortis attulerunt. Sin eius mali radices exurere velis, neque hoc quidem sine graui iactura vicinarum partium fiet, præsertim si iuxta principes partes exustio fiat. Itaque cancri maiores, & qui iam inueterauerint, neque ferro temerè adurendi sunt, neque scalpello excidendi, sed blandè potius, ac leuiter (vzi diximus) tractandi. Plærique enim nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum leuia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quo minus ad vltimam senectam perueniant, non prohibentur. Reliqua quæ ad huius operis complementum, seu absolutam de cancro tractationem attinet, ex tractatu de vlcerebus, capite de cancro vlcerato requirèda sunt.

Capita curationis cancri non vlcerati, adhuc incipientis, summa corporis occupantis.

IN cancro incipiente, & qui ex humore non admodum crasso constat, nec venas valde tumentes exerit, humorem melancholicum, vnde hoc genus vitii nascitur, à toto corpore imprimis vacuato.

Ergo, si artas, & vires ferant, scètâ in cubito venâ, sanguinè primum, quantum res ipsa efflagitat, mitto.

Deinde medicamentâ bilem atram per aluum exigentia, initio quidem blanda, & mitiora: postea verò vehementiora, paulatim vim eorum augendo, laboranti exhibeto.

Si mēstruæ purgationes in mulieribus ante quinquagesimū annū, aut menses tum in eis, tū in viris, ex interuallis sanguinè fundentes, suppressæ sint, illas modis omnibus prouocato.

Interim tenuem victus rationem, & quæ probum succum ac minimè melancholicum generet, instituito.

Si prohibere non possis, quò minus succus crassus & melancholicus in venis colligatur, eum ex interuallo, tū simplicibus, tum compositis medicamentis vacuato.

Præcedentes aphorismi ad medicum spectant: qui verò sequuntur, ad chirurgum pertinent.

Remedia affectæ parti ante purgationem, & in ipso purgationis tempore, repellentia: vbi verò corpus integrè repurgatum est, digerētia: viribus mediocria, & qualitate minime mordentia, adhibeto.

Ergo

8 Ergo solani succum, vel medicamentum ex pompholyge, aut quod ex chalcite constat (diapalma vulgò appellatur) atque id genus alia, dolenti loco admovento.

9 Quòd si per chirurgiam cancrum sanare audebis, melàcholico humore, prius medici consilio repurgato, quod vitiatum est, prius excindito, & sanguinem satis multum effluere finito, crassioresque ex vicinis partibus exprimito, atque affectum tandem similiter reliquis vlcibus sanato.

FINIS PRIMI LIBRI.

10

Generalis diuifio Vul-

NERVM, IN LIBRVM

SECUNDVM CHIRVRGICARVM

INSTITVTIONVM IOAN. TA-

GAULTII MEDICI.

V Nionis solutæ nomina ac differentia Gale²⁰
no lib. 4. metho. meden. sunt:

Trauma,
Helcos,
Catagma,
Spasma,
Apospasma,
Rhegma,
Thlasma,

id est,

Solutio quadã ex vulnerando in car-
nosa parte relicta.
Vlcus, etiam in carne.
Fractura, in osse.
Conuulsio, siue distensio, in nervo.
Anulsio, in ligamento.
Ruptio, in musculus.
Collisio, vel confusio, in vasis propriæ.

30

Soluunt etiam continuum.

Ecchymosis, siue
Ecchymoma,

Dicitur quasi inhumoratio, qua fit, cum
sanguis subter cutem effunditur, & coit:
affectus plurimum vnacum contusione ru-
ptioneque incidens,

Anastomosis, id est, Oris vasorum apertio.

Diapedesis,

id est, Transcolatio, subsultus, aut exilitio. Fit tu-
nica ipsa vasorum sanguinis rarefacta, aut gra-
cilium vasorum ore ad aperto, & sanguine re-
nuato. Ad anastomosisin ferè reducitur.

40

Ana-

Anabrosis, seu { *id est, erosio. Venit aut arterijs intrinsecus accidit, ex succo aliquo, cui mordens natura insit.*
Diabrosis,

Species solutionis continui apud Auicennam, fen. 2. libri primi, sunt:

Excoriatio, &

Scarificatio,

Vulnus, siue Plaga

Vlcus,

Punctura,

Incisio,

Apertio,

Scissura,

Contusio,

Attritio,

Ruptura,

Fractura,

Et quedam alie.

in

Cute.
Carne, recens & cruenta.
Carne cum pure.
Neruo.
Osse, secundum latum.
Venis & arterijs.
Osse, secundum longum.
Osse, numerosa continui solutio.
Extremo musculi.
Panniculis, & diaphragmate.
Ossibus.

Nihil refert
si specie, vel
differentiam
hic dixeris.

VVENERVM DIFFERENTIAE.

Plagarum, seu cruentorum adhuc vulnerum, differentia Guidoni, & aliis nostrae aetatis chirurgis, a tribus potissimum sumuntur: Nempe,

- 1 A natura particularum, in quibus consistunt.
- 2 Ab essentia ipsius solutionis continuitatis.
- 3 A proprijs differentijs ipsius solutionis vnitatis, ex vulnere excitatae.

1 Vulnerum differentia, a natura particularum sumpta.

Vulnus in parte similari.

Vulnus in parte instrumentaria.

Vulnus in parte similari.

Molli.

Dura.

Mediocri.

Vulnus in parte similari molli.

Vulnus in carne.

Vulnus in pinguedine.

Vulnus
differentia a
parte simi-
lari affecta.

Vulnus

Vulnus in parte similari dura.

Vulnus in offe.
Vulnus in iunctura.

Vulnus in parte confimili mediocri.

Vulnus in nervo.
Vulnus in tendone.
Vulnus in ligamento.
Vulnus in arteria.
Vulnus in vena.

*Vulnerum
differentia à
parte organica affecta*

Vulnus in parte organica, seu instrumentaria.

Vulnus in parte principe.
Vulnus in parte principi seruiente.
Vulnus in parte principi non subministrante.

Vulnus in parte principe.

Vulnus in corde.
Vulnus in cerebro.
Vulnus in iecinore.

Vulnus in parte principi parti ministrante.

Vulnus in aspera arteria.
Vulnus in oesophago, siue gula.
Vulnus in vesica, &c.

Vulnus in parte principi alicui membrum non subseruiente,

Vulnus in naso.
Vulnus in aure.
Vulnus in oculis.
Vulnus in manu.
Vulnus in pede, &c.

vide fo. 264 **Vulnerum differentia, sumptæ ab essentia ipsius solutionis continuitatis.**

*Has et sequentes differentias la-
tus prosequemur, ut tractatu sequenti de
ulceribus.*

Vulnus simplex, { id est, Cum nullo alio affectu complicatum.

Vulnus compositum, { id est, Cum alio quopiam vno, multisve affectibus consistens.

*Vide quidem fo. 25. Vulnerum
de causis vulnorum & fo.
264. //*

3 Vulnerum simplicium differentie sumptæ à proprijs differentijs ipsius solutionis yniouis, seu diuortij continui.

Vulnus magnum.
Vulnus paruum.

Vulnus breue,

Vulnus longum.

Vulnus latum.

Vulnus angustum.

Spatium, quantitas, seu magnitudo dimissionis.

Vulnus in superficie.

Vulnus profundum.

Vulnus æquale,

Vulnus inæquale.

Vulnus rectum,

Vulnus obliquum.

Figura.

Vulnus retortum,

Vulnus vncum.

Sunt & aliæ adhuc differentie vulnerum, sed extrinsecus accedentes Galeno, sumptæ

1 A generationis ratione.

2 A situ, seu loco in eadem parte affecta.

1 Differentie vulnerum, à generationis ratione.

Vulnus diruptum.

Vulnus incisum.

Vulnus partim incisum, partim diruptum.

Punctio nerui.

Præcisio nerui.

Præcisio venæ.

Præcisio arteriæ.

2 Vulnerum differentie à situ, seu loco in eadem parte affecta.

Vulnus secundum longitudinem.

Vulnus

Vulnus secundum tranſuerſum.

Vulnus in principio muſculi.

Vulnus in fine muſculi.

Vulnus in medio muſculi.

His accedunt & alia differentia, ſed improprie dicta, à complexu vulneris.

1 Cum ſymptomate.

2 Cum morbo.

1 Vulneris differentia à complexu cum ſymptomate.

Vulnus crucians, ſeu doloroſum.

Vulnus dolore vacans.

Vulnus pruriens, id eſt, cum pruritu affligens.

Vulnus cum delirio.

Vulnus cum impotentia membri.

Vulnus cum ſyncope.

Vulnus cum ſanguinis profuſione.

2 Vulneris differentia à complexu cum morbo. 2c

Vulnus cum intemperie.

Vulnus cum phlegmone.

Vulnus cum eryſipelate.

Vulnus cum carne ſupercrescente, &c. Reliqua ex di-
viſione de vulnibus ſunt requirenda.

Institutionum Chirur

GICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER SECVN-

DVS,

10

In quo generatim de Plagis, seu Cruentis vul-
neribus, tractatur.

Quid vulnus, quæ sint species solute unitatis, quot vulnorum
differentiæ, & à quibus sumantur. CAP. I.



30

Vulnus (vt recentiores definiunt chirurgi) solutio est continuitatis recens, cruenta, sine pure, seu putrefactione, in particulis mollioribus extrinsecus incidens. Hanc vnionis, continuitatisve solutionem non modo Auicennæ interpres, sed & omnes cõmuniter plagam etiã appellans. Ceterum in hac definitione solutio continui-

Vulneris
diffinitio.

Definitionis
vulneris ex
aminatio.

Genus.

Gal. lib. 1. de
morb. &
sympt.

Auer. 2. &
3. cal.

Differentiæ.

30

tatis (quæ & unitatis diuortium, ac diuisio appellatur) generis locum sibi vendicat: quippe quæ communis morbus utrum simplicibus (quas & similes vocamus) tum compositis, seu organicis particulis. Primo tamen ac magis propriè similibus particulis conuenit, atque attribuitur, quàm compositis. Reliqua quæ in diffinitione subneuntur, differentiæ rationem habent: nempe, recens, cruenta, siue sanguinolenta, sine pure seu putrefactione, quæ omnia ad differentiam vlcæris posita sunt: quod quidem iuxta recentiorum placita, iam antiqua est unitatis solutio siue diuisio, cum puri quadam humorum collumie, seu putrefactione, & absque sanguinis profusione. Postrema diffinitionis particula, videlicet, in particulis mollioribus facta, siue incidens, adiecta est propter fracturam, quæ induritis partibus, cuiusmodi sunt ossa, contingunt. Porro iuxta hanc generalem particularum corporis humani diuisio-

40

i 3

nem

nem, quidam chirurgiam bimembrem fecerunt. Alia enim est antiquior, quæ in carne, alia quæ in ossibus operationes exercet. Carnis enim nomine mûsculos, neruos, venas, & arterias etiam intelligunt. Quæ omnia sub mollibus & mediocribus particulis alijs comprehendunt. Dictionem, extrinsecus, in fine definitionis adiecimus, ad differentiam solutionis vnitatis, quæ sit à causa interna. Cæterum solutionis continuitatis multæ sunt species, in secunda sen. primi canonis Auicennæ enumeratæ. Vulnus, inquam, vlcus, apertio, scissura, excisio, punctura, incisio, fractura, confusio, & id genus alia. Quorum descriptio-
 nes & differentia suis locis adduntur. Nomina autem solutionis vnitatis apud Galenum sunt, ἑλκῶς, id est, vlcus quod in carne est: κάταγμα, id est, fractura; in osse: αἰσῶμα, id est, conuulsio, siue distensio, in nervo: ἀπόσπασμα, id est, auulsio, vel diuulsio, in ligamento: ῥήγμα, id est, ruptio, in mûsculis: θλάσμα, id est, collisio, vel confusio in vasis propriè. Soluunt etiam continuum ἑχύμωσις, siue ἑχύμωμα, id est, sanguinis subtercutem effusio, & coitus, plurimum vnâ cum confusione ruptio-
 neque incidens, de qua latius in sequentibus dicemus: ἀνέσ-
 φηξις, id est, oris vasorum apertio, quatenus facit ecchymosin: ἀνέσφαισις, id est, transcolatio, subcûctus, aut exilitio, quæ ad anastomosis reducitur: ἀνάβρωσις, id est, erosio, quæ & ἀνέ-
 βρωσις dicitur. Porro non adeo magna, atque anxiosa cura ipsorum nominum habenda est, modo res ipsa de qua agitur, intelli-
 gatur. Itaque sæpius nomen vnum pro altero ponitur. Vul-
 nus enim & vlcus apud eos, qui Græcorum libros in Latinum sermonem conuerterunt, idem omninè significant, modoque
 vnum, modo alterum pro re eadem vsurpatur. Apud eos verò,
 qui Arabica, Latina fecerunt, vulnus & vlcus aliquid inter se
 discriminis habent. Hi namque vulnus vel plagam appellant, vbi
 nondum est pus: vlcus verò, vbi iam pus adest. Et scire qui
 Græcos sequuti sunt, rectius quàm qui Arabes sunt imitati, cen-
 suerunt. Vulnerum, siue vlcus, dux sunt duntaxat primæ ac
 maximæ differentia Galeni; in quarto libro Therapeutices.
 Omne namque vlcus siue vulnus, vel absente causa, quæ ipsum
 excitauit, consistit, vel efficientem ipsam causam secum anno-
 xam habet. Solutionis autem huiusmodi continuitatis species,
 sed præsertim vulneris, potissimas ac præcipuas suas differen-
 tias à tribus Guidoni, ac illius ætatis chirurgis defumuntur.
 Primo à natura particularum, siue à locis affectis, in quibus

*Soluta vni-
 tatis varia
 species apud
 Auicem.*

*Nomina so-
 luta vnitatis.*

*Gale. lib. 4
 metho. med.*

*Vulnus &
 vlcus pro
 eodem.*

*Vulnerum
 due differen-
 tia prima.
 Differentia
 vulneris à
 tribus pos-
 simum sumi-
 tur.*

*À natura
 partium.*

30
 30
 40
 consi-

De Plagis, seu cruentis vulneribus.

135

consistunt. Quædam enim (vt libro tertio artis paræ refert *Diuisio parua* Galenus) fiant in partibus consimilibus siue homiomeris: quædam verò in organicis, siue instrumentarijs. Aliæ item in molli-
libus particulis, aliæ in duris, aliæ verò in mediocribus, id est in ijs quæ inter duras & molles ambigunt. Quæ in particulis molli-
bus contingunt: aliæ quidem sunt in carne, aliæ in adipe siue pinguedine. Ex ijs verò, quæ in duris fiunt partibus, aliæ ossium substantiam occupant, aliæ iuncturas ipsas. Denique quæ in mediocribus particulis incidit, quædam in nervis, ten-
donibus, & syndesmis, id est, nervicis ligamentis, siue copulis: quædam in venis, & arterijs consistunt. Quæ autem organi-
cas partes inuadunt, aliæ in principalibus membris fiunt, vt in corde, cerebro, & hepate: aliæ verò in ijs, quæ principibus
ipsis particulis subministrant, vt in aspera arteria, œsophago siue gula, & vesica: aliæ item in non subseruientibus ipsis
principijs seu principalibus membris, vt in auriculis, pedibus, manibus, oculis, naso, & id genus alijs. Differunt quoque vul-
nera, siue plagæ, pro telorum ac rerum à quibus inferuntur diffe-
rentia, vt in sequentibus dicitur. Secundo sumuntur diffe-
rentiæ solutionis continuitatis, sed præsertim vulnorum, ab
ipsius morbi essentia, vt Galenus docuit libro tertio metho-
di medendi. Quædam enim solutio vnitatis simplex est, quæ-
dam verò composita. Ac simplex quidem appellatur, si nec mor-
bus vllus, nec symptoma simul adsit cum ipsa. Composita
verò, quando duos vel plures affectus secum adiunctos habet,
vt à Galeno scriptum est, libro quarto Therapeutices: quod &
in sequenti capite, ac rursus in tractatu de vicenibus, dicitur.
Scribit autem ad hunc modum Galenus loco nuper citato:
« Omne vlcus [siue vulnus] aut solum est, ipsamque per se, nul-
lo nec cum eo simul inuadente, nec ipsum præcedente, aut se-
quente alio affectu, aut cum alio quopiam vno, multive con-
sistit. Quorum alij non modò statim ab initio vlcus excitantur,
sed etiam nunc maius efficiunt: alij eius sine quo nò, vt adcur-
di opus rationem obtinent. Tertio desumuntur, vulnèrū dif-
ferentiæ, à proprijs differentijs ipsius solutionis vnitatis ex
vulnere excitatæ. Carterum propriæ eiusmodi differentiæ
sumuntur rursus ab ipsa vulnèris natura, vt Galenus nobis indi-
cauit libro tertio methodi medendi. Nempe à spacio seu quanti-
tate diuisionis, vt à magnitudine & paruitate, à qualitate & ine-
qualitate, profunditate, & superficialitate, breuitate, & longitudine.

Ab essentia morbi.

Differentiæ sumptæ à natura vulnèris.

*Galenus.**3. Therapen.**Indicatio q̄
à morbo su-
mitur, prin-
cipiū tantū
est methodi,
quæ de me-
dico insitui-
tur.**Cognitio q̄
habetur per
ipsius rei na-
turam quæ
perpendat.**Morborum
verus cura-
tor quis.**Primi artis
opus esse, vt
cognoscas
an sperari
possit quod
destinas.**Lib. 3. meth.
meden.*

Item à figura, vt à rectitudine, & obliquitate. Adhæc à genera-
tionis ratione, vt quia totum sit incisum, vel totum disruptum,
vel pars incisa, pars disrupta. Et ab id genus alijs, quæ fufius in tra-
ctatu de vlcerebus qui hunc proxime sequitur, explicabuntur.
Porro ab huiusmodi differetijs, iudicia, curandi indicationes,
auxilia, quoq; & modus curationis, omninò defumuntur, vt ex
sequentijs manifestum euadet. Itaq; non satis est primas illas
indicationes, quæ ex affectibus defumuntur, nouisse. Hæc namque
principiū tantum sunt, & (vt sic dicatur) carcer, vnde modèdī ra-
tio promouet. Nulla autē prorsus ipsius medicinæ artis portio, 10
aut certè nec magna, nec propria, aut ratione digna, sed quæ
etiā (vt tertio Therape. ait Galenus) plebeis sit cōmunitis, & no-
ta. Nō ergo satis est nosse, quid ex prima indicatione agendum
sit, sed & particulares indicationes diligenter cōsiderandæ sunt:
cuiusq; scilicet particulæ substantiā æstimando, tū actionē, tū
vsum, situmq;: A quibus procedēs, nō solum quod sanari non
potest, præuidebis: sed etiā quod recipere sanitatē potest, de in-
ueniendis ei remedijs facile deliberabis. Solus igitur is meritò
morborum est curator, cui facultas est illa remedia inueniendi,
ex quibus perfici possit, quod à prima indicatione suggeritur. 20
Eritque hoc ipsum primum artis opus, vt intelligas, sperarēne
id quò tendis debeas, an secus. Eius autem rei duplex cognitio
est Galeno, nec potest addi ratio tertia. Altera per experiētiā,
cui longo vsu est opus. Altera per ipsius rei naturam, quam ra-
tione quadam, & methodo disquirimus, perpendendo scilicet
non modò corporis vniuersi, sed etiam afflictæ particulæ tem-
peramentum, & reliqua quæ modò diximus.

De causis, signis, & indicijs vulnerum.

CAP. II.

*Solutæ con-
iunctiuitatis
cause vni-
uersales.**Halyab.*

T Ametfi Galenus lib. 2. de morbis & symptomatis, om- 30
nes solutæ viuitatis (qui morbus est omnibus partibus
cōmunitis) causas summarim in duas reuocat: (aut enim
inquit, extrinsecus irruunt, aut ex ipso corpore oriun-
tur:) recentium tamen vulnerum, prout huiusmodi, id est, qua-
tenus recentes ac eruentæ plagæ sunt, causæ censentur, quæcū-
que extrinsecus aduenientia vulnerare, perforare, incidere, ab-
rumpere, contundere, ac distendere possunt. Has autem vulne-
rum causas speciatim expressit Halyabbas sermone quarto re-
galis dispositionis, dum ait: Vulnera fiunt, vel à corpore inani- 40
mato, vt ense, baculo, lapide, aut alio quouis simili: aut ab ani-
mato,

6. **in**ato, ut venenatorum animalium punctura, aut ferarum morfu. Ex quibus alia rursus sumuntur vulnerum differentia. Quandoquidem alia incisiones, alia contusiones, alia verò morfuræ dicuntur. A quibus etiam curandi indicationes nobis suggeruntur, per accedens tamen. Demonstratum namque est à Galeno lib. 4. meth. med. nullam externarum, vel (ut nunc loquuntur) primitiarum causarum, curationis indicatricem esse, sed huius indicatione ab ipso affectu initium habere. A nullo enim, inquit, eorum quæ adhuc non permanet, indicatio sumi eius quod ex usu sit, potest. Verum quomodo ad eum affectum noscendum, qui omnino tum ratione, tum sensum lateat, sæpe cogimur de externa causa inquirere: opinatur vulgus hanc quoque sanationis ratione indicare: quod plane secus est. Nam quod adhuc non est (ut causa externa) curatione non desiderat. Quippe rei præsentis tantum est curatio, ut eius quod futurum est providentia. Quod si id, quod amplius non est, curatione non postulet, neque sane ab eo vlla sumi potest curandi indicatio. Siquidem absurdum sit (ut Galenus ait) aliud esse quod curandi rationem præsentat, aliud quod curetur, & econtra. Nihil igitur ad curationis indicationem conducit, externa causa
10. **cognita**, sicuti nec tempus ipsum, sed ad præsentis duntaxat affectus (qui nostram fugit notitiam) cognitionem. Quare dicere indicationem curationis ab externa causa, quæ vulnus excitavit, desumi, omni modo est absurdum. Quod enim nec nunc lædit, nec læsurum timetur, id ab utroque artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod providet, excessit. Itaque (ut breviter dicam) ubi præsentis affectus nihil latet, nulla iam externæ causæ, sicuti nec temporis, est utilitas.

*Externa
causa cura-
tionem non
inducit, sed
affectum.*

*Rei præsen-
tis est cura-
tio non ab-
sentis.
3. mea. scilicet
ab initio.*

De signis, & iudiciis vulnerum.

CAP. III.

30. **N**onnulla vulnerum non aliunde petendæ sunt, quam ex iudicio sensus, sed visus maxime. Iudicia verò seu signa prognostica ipsorum, sicuti etiam & omnis solutionis continuitatis, desumuntur ex subitanea, visu, atque actione affectæ cuiusque, particulæ. Et præterea, ex propria ipsius dispositionis siue affectus essentia. Item ex symptomatibus, quæ vulneribus ipsis accedunt, ut ex sequentibus patebit. Itaque iudicat Gale. lib. 4. Therapeutices, quod magna & gravia vulnera non medicare adferunt periculum. Triteriam autem vulnera ipsa, ut & reliqua omnia vitia, graviora magna que redduntur. Nempe vel propter affectæ partis præstantiam siue præ-

*Nota. Quod iu-
diciis à vulne-
rum vnde
petantur.*

*Vulnera tri-
fariorum ma-
gna & gra-
via reddunt.*

cellen-

Vulnera in articulo Cacoëthe esse. Lib. 14. Therapen.

Vulnera q̄ futuris indigent, periculo nō vacare.

Præstantia partiu. 18. Lib. 6.

Aph. 65. Lib. 5

Tumores de repente de tumescētes, malum portendunt.

Aph. 66. Lib. 5

Præua vulneru.

Nomine periculi quid significatur.

cellentiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propter q̄ sunt cacoëthe, id est, maligna, contumacia, ac rebellia. Hinc vulnera quæ in capite accepta sunt, aut intra thoracem, intrâve etiam peritonæum penetrauerunt, non paruum periculū aducunt, potissimum si quid interiorū vnâ sit vulneratum. Quinetiam cacoëthe esse, quęcunq; in articulis accepta vulnera sunt, id quoque (vt Galenus insit) omnes ferē sciunt: empirici quidē ex sola ipsa experientia. Qui verò corporis naturæ scientiam comparare studuerūt, ex ipsa vulneratarum partiū natura. Vbi enim tendones, & nerui, & carne vacua, atq; ossæ loca sunt, hic doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij periculum instat. Ad hæc vulnera, quæ adeò magna sunt, vt futuris indigant, aut si non his, certē deligatura, periculo non vacant. Cuiusmodi sunt ea, quæ principales musculos per transuersum penitus diuidunt, magnasq; venas, neruos, & arterias, atque etiam medullas ipsas discindunt, ac cōrundunt. Primum (nempe partis læsæ præstantiam) hoc aphorismo nobis expressit Hippocrates. Vena descissa [id est magno atque profundo vulnere diuisa] aut cerebro, aut corde, aut septo transuerso, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut iecore, lethale est. Tertij verò, vt pote cacoëthia, mentionem fecit ille idem ἀρχαίος alijs in aphorismis: vbi tradit eos, quibus tumores in vlceribus apparēt, non admodum conuelli, neque insanire: verum his de repente euanescentibus, quibusdam conuulsionēs, & distensionēs fieri: quando scilicet vulnera à tergo intestāt: quibusdam verò insaniam, vel lateris dolorem acutum, vel suppurationem, cum scilicet in partibus anterioribus, quę venosæ sunt, atque arteriosæ, vulnera contigerint: vel intestinorum difficultatem (quam sanguineam nominant) si tumores sunt rubicundi, id est, sanguinei. Idem mox subiungit, quod si in vulneribus præualidis, tunc fortibus & prauis, tumor non appareat, malum est ingens, hoc est, noxa est magna. Etenim in his suspicari licet materiam, quæ vulneribus decumbere assolet, auerti, ac transmutari in sedem aliquam principem. Vulnera autem praua hīc appellari ab Hippocrate (vt Galenus ait in commentario) existimandum est, quæ sunt in capitibus, aut finibus musculorum, & maxime neruorum. Nam in capitibus musculorum, musculis nerui adnascuntur, ex finibus autem tendones oriuntur. Caterum nomine periculi in præcedentibus, intelligitur mors, vel totius corporis, vel particularis membri, quæ quidem vitæ est prima-

præiatio: aut (vt dicunt) maleficium, aut læse partis impotentia perpetua, & inexpugnabilis, hoc est, priuario sensus, ac motus, ac propriæ actionis ipsius: adeo, vt non amplius membrum aut particula corporis propriè nuncupetur, sed denominatiue (vt aiunt) & æquiuocè, veluti lapideus oculus, aut æreus: vt voluit Aristot. libro secundo de anima, & quarto Methæo.

Porro iudicij huiusmodi vulnerum cognitio, apprimè necessaria est cuiuscunque chirurgo, sed ei maximè, qui ex decreto magistratus, super acceptis vulneribus in prohibito conflictu, ac illicita pugna, iudicium rectum, ac æquum ferre compellitur. Itaque ante omnia scire debet chirurgus, quæ vulnera lethalia sint, ac insanabilia: quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis (vt rectè nos

*Utilitas ac
necessitas do-
ctrine pro-
gnostica vul-
nerum.*

admonet Celsus) primum cum qui feruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius, vt occisi, quem fors ipsius percussit. Deinde vbi grauis metus, sine certa tamen desperatione, est, indicare necessarijs [id est, familiaribus, & amicis periclitantis] in difficili rem esse: ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed vt hæc (inquit) prudenti

Lib. 5.

viro conueniunt: sic rursus histronis est, paruam rem attolere, quò plus præstitisse videatur. Cæterum (vt ad propositum reuertamur) scire oportet ex mente Galeni in commentatio aphorismi paulò antè citati, vesica distincta, &c. vulnerrum quædam esse valde, & ex necessitate lethalia: quædam verò non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse: contra verò quædam omninò sanabilia, quædam vt plurimum.

Lethalia sunt ex necessitate, ac insanabilia, quæ cordis substantiam penetrant. Hæc enim protinus hominem è vita tollunt. Quandoquidem corde sic percusso, totus sanguis, ita imperante natura, affertim ad ipsam veluti ad præcipuum vi-

*Vulnera ex
necessitate
lethalia.
Cordis vul-
nus cur len-
tile.*

tar arcem, confugit, ac ex omnibus corporis partibus, vt læse parti ferat suppennas, transmittitur: vnde maxima sitim sit sanguinis profusio, quam & spirituum resolutio mox consequitur; vel in percusso viscere tumor præter naturam, maximè ætem phlegmone, excitatur: vel, tanta sit sanguinis collectio, obstructio quæram insignis, vt vitalis spiritus in corpus vniuersum, vt oportebat, amplius diffundi non possit. Quò fit, vt venis & arterijs languescentibus, pallidente vultu, & frigido, malique odoris oborto sudore, extremisque partibus

40 frigidis apparentibus, matura mors sequatur. Cor enim neque solu-

2. primi. c. 5. solutionem continui diu, neque (vt inquit Auicennas) aposte-
Cerebri vul- ma vita permamente, perferre potest. Sed & mortem etiā ad se
nera. runt ineuitabilem magna, ac profunda vulnera substantiæ ce-
 rebri, iecinoris, diaphragmatis, stomachi seu oesophagi, ventri-
 culi, asperæ arteriæ, pulmonis, lienis, cystis fellis: renum quoque,
 & tenuium intestinorum, præsertim eius quod ieiunum appel-
 latur, atque id genus aliorum membrorum principalium, aut
 ipsis principalibus membris seruietium, ministerio quidem, ceu
 ad vitam necessario. Ideo autem vulnera eiusmodi lethalia ex
 necessitate dicuntur, quoniam nullus ex eis seruetur vnquam, 10
 mortemque concinnant inexcusabilem, vt in sequentibus de-
 monstrabitur. Seruari etiam non possunt Celso, quibus in spi-
 na medulla percussa est, & quibus circa fauces grandes venæ-
Vulnera ma- vel arteriæ præcisæ sunt. Vulnera verò ea non ex necessitate,
gna ex par- sed secundum plurimum mortalia dicuntur, quæ ad regionem
te lethalia. prædictarum partium perucniunt, vel eas leuiter, ac superficie
 tenus duntaxat attingunt, non autem præaltè adiguntur, nec
 effatū digna sunt. Ad hæc quæ in capite musculorum accepta
 fuerunt. Ob id autem mortalia vt plurimum, at non ex neces-
 sitate dicuntur, quoniam vulneratis, nisi ritè tractentur, prorsus 20
 ex eis commoriendum sit. Siverò in nullo peccatum sit, illos in-
 terdum sanari contingit. Hinc Guido se quendam vidisse afir-
Guido. mat, qui in parte postica capitis vulnus acceperat, ex quo par-
 ua quædam portio substantiæ cerebri exierat (vt ex memoriæ
 læsione cognitum est) & tamen is a tali vulnere conualuit, resti-
 tutaque est illi ex integro post curationem vulneris, memoria,
 Non tamen asserit illum superstitem permanere potuisse, si to-
 ta vna cellula, seu totus vnus ventriculus, per vulnus exiisset:
Cam. 18. lib. vt de quodam Cellario refert Theodoricus. Sed nec Galenus
6. aph. etiam adfirmat, in illo adolescente, quem vulneratū vidit Smyr-
 na in Ionia, vinete adhuc præceptore suo Pelope, aliquid sub-
 stantiæ cerebri ademptum fuisse, sed duntaxat eum vulnus effa-
 tu dignum accepisse, in altero anteriorum ventriculorum cere-
 bri: quos ob id geminos natura condidit, vt si alter ipsorum læ-
 sus fuerit, reliquus adhuc subseruiat. Sed & hoc tanquam admi-
 rabile, ac stupendum quoddam, incredibileque spectaculum,
Adolescens ex seg naturæ miraculum narrat idem Galen. libro octauo de vñ
vulnere ce- partium corporis humani: ipsumque adolescentem tandem sa-
rebri conua- natum fuisse refert. Veri potius, vt credebatur voluntate, quàm
luit. arte. Quod (si inquit) ambo ventriculi simul fuissent vulnera- 40
 ti, ne

- ti, ne temporis quidem momentum is viuere potuisset. Vnde colligit ibidem gemitatis (vt sic dicam) quorundam organorum necessitatem. Cerebrum itaque insigniter, & ad ventriculos vsque vulneratum sanari, rarissimum est, & pene incredibile, vt in commentario aphorismi superius citati, Galenus adfuerat: vbi verum esse scribit, quod magna vulnera, quae consue-
 18. lib. 6.
 uit Hippocrates nominare discisiones, & praecisiones, in praenominatis particulis mortem adferunt ineuitabilem: fatentique omnes, quod vulnera, quae vsque ad aliquem ventriculorum
 10 cerebri penetrant, procul dubio internecant, mortemque adferunt praeproperam. Porro vulnera cerebri, & membranarum ipsum obuoluentium (quas Graeci *μνινίας* vocant) ideo lethalia sunt, quoniam ad laesionem ipsius cerebri, & membranarum ipsum continentium, sequitur laesio, & interdum abolitio actionis musculorum thoracis, & aliorum membrorum respirationi subseruientium. Horum autem actione deperdita, perire simul respirationem necesse est. Vnde cordis quoque temperamentum soluitur. Quo fit tandem, vt etiam animalis ipsius
 20 necessario sequatur interitus, vt libro quinto de locis affectis, scribit Galenus. Cerebro igitur laeso insigniter, aut meningibus ipsum continentibus discissis, homini, atque omni animalibus ipsius commoriendum est. Guido a Cauliaco asserit hepatis vulnera, etiam circa fibras ipsius, non admodum tamen
 Hepatis vulnera.
 profunda, nec cum ablatione alicuius portionis substantiae ipsius, glutinari, & prorsus sanari. Qua in re Galenum sequutus est, qui in commentario decimo octauo libri sexti aphorismum haudquaquam veritati consentanea eos dixisse refert, qui non solum vulnera, quae in summa iecinoris parte consistunt, sanari posse adfirmabant, sed & profunda quoque in fibris eius facta, imo
 30 & fibras ipsas abscissas. Causa autem ob quam vulnera iecinoris magna ex parte lethalia sunt, est, quia propter defectum nutritionis cor languet, ac emoritur, atque ita tandem deperit animans, sed non illico. Quandoquidem ob virium hepatis imbecillitatem, sine alimento permanens, diutius etiam sufficere potest, vt Galenus est auctor libro quinto de locis affectis, sic in-
 « quiens: Vbi iecur affectum est, tum ob inedia iam moriuntur animalia, verum per longa temporum spacia, in huiusmodi affectibus vitam protelare possunt. Sed de intemperiae & morbis in compositione hoc loco potius agit Galenus, quam de vulnere.
 40 Si autem vulnera hepatis magna, ac profunda sunt, yenaque porta,

Vulnera diaphragmatis quando insanabilia.

Nervosa substantia, & indurata, agglutinatio- nem impediunt.
Lib. 5. meth. med.

Pulmonis vulnera.

Tracheæ arteriæ vulnera.

Oesophagi vulnera.

Lib. 6. meth.

Venarum inguinarum vulnera.

porta dicta iecinis cauo commissa, vel concaua ab ipsius gibbo prodicens, dissecta fuerit, larga sanguinis profusione moritur, qui ita sunt vulnerati, priusquam vulnera agglutinentur. Vulnera quoque diaphragmatis, prorsus incurabilia sunt, maxime si in parte eius nervosa sint. Hac enim parte exangue est: adhuc, in continuo est motu. Quæ duo sanè prohibent, ne labra vulneris agglutinentur, coalescantque. Nervosa namque corpora semel diuisa, nunquam coeunt, ea præsertim, quæ in iugi, seu perpetuo sunt motu, cuiusmodi est septum transversum. Quippe tametsi dici solet, quod vulnera quæ sananda sunt, utique quietem requirunt, non solus tamen motus diaphragmatis, etiam si perpetuus, vulneris agglutinationem impedit, sed & nervosa quoque cum ipso substantia. Quod abundè testatur Gale. his verbis: Transuersi septi vulnera, in carnosiss quidem partibus subindè coalescere sunt visa, eius motu non obstante. Quæ verò in nervosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanè difficilis, grauisque curatio est etiam eorum, quæ in carnosiss sunt partibus, si has iam phlegmone occupauit. Accidit autem hæc curandi difficultas ob eam rem, quod in ea vulnera sanies defluat, quæ impedimento est, ne labra solæ vnitate coalescant. Vulnera autem, quæ pulmonibus incidunt, idèò curatu sunt difficillima, imò magna ex parte insanabilia: quoniam promptissime phlegmonem excitant, quæ si semel occupauerit, exigua (inquit Galenus) vulneris glutinandi spes est. Adde quod ea quæ sanandis vlceribus idonea sunt medicamenta, contingere illa integris saltem viribus non possunt. Accedit præterea & illis sanandi difficultas, quod respirando mouentur, & tussiendo lacerantur. Cæterum vulnera tracheæ, id est, asperæ arteriæ effatu digna, & maxime quæ cartilagineam eiusdem substantiam occupant, raro etiam ad sanitatem perducuntur. Particula enim hæc dura est, & exanguis, assiduaque per vulnus fit respiratio, quæ sanè impedimento est, quominus labra coalescant. Magna quoque oesophagi vulnera, inter exitialia atque insanabilia numerari solent, tum ob cibum ac potum per eum transirum, qui sanè agglutinationem prohibet: tum quod eiusmodi vulnera duntaxat (ut Galenus ait) contractu medicamentorum in transitu fruuntur, sicuti & quæ in ore, seu orificio ventriculi consistunt. Verum his quæ ori ipsius ventriculi insident, sensus quoque acumen sanationi obstat. Inguulares venæ (quas & organicas vocant) grandi vulne-

re per-

re percussa, ægrè & rarò curationi cedunt: tum quòd larga sanguinis profusione, hominem vitali spiritu exhauriant: tum quòd ligaturam stringendo ac sistendo, sanguini necessariam, propter imminens suffocationis periculum, sustinere non possint. Ventriculi discissiones, & tenuium quoque intestinorum, sed omnium maximè ieiuni, matricis, renum, vesicæ, & folliculi fellis, modo quo suprà diximus, ob id lethales sunt, quòd hæ omnes particule nervosæ sint & exangues, per easque vitiosarum ac superuacanearum humiditarum transitus fiat. Adde quòd earum vñs perpetuò vitæ conservandæ est necessarius, nedum utilis. Adhæc medicamenta his locis penitioribus non possunt commodè admoueri. Porro per verbum discissiones, magna (vñ superius diximus) ac profunda vulnera intelligimus, & ad sinum vsque interiorum longè lateque penetrantia, qualia esse cernuntur in ijs, quæ penitus sunt excisa. Hac autem distinctione ex industria vñsumus, ne quis putet vulnus quodcumque in prænominatis partibus exitiale esse atque insanabile. Ventriculus nanque & tenuiora intestina, quia non parùm participant carnosæ substantiæ, si in summa parte duntaxat vulnerata sint, sæpenu-
 10 rò agglutinantur, & velut collato fœdere in robur substantiæ corpulentæ concordî concretionem coalescunt. Sic & vesicæ ceruicem siue collum quotidie sanari videmus, cum ex ea lapis extrahitur, quoniam ea parte carnosæ est. Idem & de alijs partibus iure credi potest, si per summa corporis seu substantiæ earum vulnus duntaxat acceperint. Verumenimvero ieiunum intestinum vulneratum omnium maximè inter tenuia incurabile esse omninò à Galeno, & Paulo prædicatur, tum propter vasorum, quæ in eo sunt, magnitudinem multitudinem-
 30 quærum quòd tunica prætenuis, nervosæque existat. Adde quòd & bilem sinceram hoc intestinum ex cholagogis poris recipit vniuersam, & omniùm maximè iecori vicinum habetur. Lienis vulnera, cum munus habeat toti corpori apprimè vile, ac propè necessarium, sitque (vt nonnulli dixerunt) veluti alterum hepar, periculosa sunt, non adeò tamen, vt aliarum modò dictarum particularum. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus vsque ad cavitatem membrorum intus conditorum vulnera perueniunt. Hæc enim vt plurimum lethalia sunt, tum quia aër externus, & nos ambiens, per ea non alteratus ingre-
 40 diens, internas partes non parùm offendit: tum quia per eadè

Ventricul

vulnera.

Ieiuni.

Matricis.

Renum.

Vesicæ.

Cystis fellis.

Gal. comm.

18. lioro 6.

aphorism.

Ieiuni vuln

nus cur in

sanabile.

Lib. 6. the.

Lib. 6.

cap. 42.

Gal. lib. 5.

de vsu part.

Lienis vultu

nera.

Vulnera pe

netrantia.

internus exhalat spiritus, quo sic expirante & euanescente, virtutis robur insigniter offenditur, & dissoluitur, multoque imbecillius redditur. Accedit huc, quod huiusmodi vulnera haud cōmodè detergeri possunt: quodque ea tandem degenerant in fistulas, & empyemata, id est, purulentas collectiones excitant: vnde & mors ipsis vulneratis demùm accidit. Signa autem, quibus prædictarum partium internarum vulnera deprehēdi possint, rædiosæ prolixitatis vitandæ gratiâ, in hac vulnerum vniuersali methodo, consulo prætermisimus. Cæterùm vulnera, & puncturæ, quæ in capite musculorum sunt, vbi nervi, tendones, & ligamenta ferè carne nudantur: item quæ tribus digitis à iunctura distant, & quæ prope tempora accepta sunt, magna ex parte lethalia existūt. Nervus verò, & tendonis pūctura, propter sensus vehementiam, & quoniam hæc pars principio, id est, cerebro continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam: ac tum præsertim, cū nihil extorrisum expirat, obcæcato cutis vulnere: vt Galenus annotauit in opusculo cui titulum fecit *μικροτὶ γυν*. Proinde huiusmodi punctio mortem accersit. Noxa enim quæ cerebro illata est, statim communicatur organis respirationi seruientibus, vt iam suprà dictum est. Quocirca quinto libro aphorismorum scripsit Hippocrates, Conuulsio ex vulnere lethalis est. Non quidem (vt Galenus ait in commenta.) ex necessitate, sed admodum crebro: lethalis enim nomine hic, vt & in plerisque aliis aphorismis, vsus est Hippocrates pro periculosa, & ad mortem sæpius perducen-

Vulnera in capite musculorum.

Nervi & tendonis punctura.

in capite musculorum punctura

Spasmus ex vulnere lethalis, id est valde periculosus.

Spasmi ex vulnere causati.

Vulnera membrorum particularium quando ipsis mortalia.

Vulnera quæ membris impotentiam adferunt.

te. Fiunt autem ex vulneribus conuulsioncs, siue spasmi, ratione subsequētis ea inflammationis, vbi nervosas partes attigerit. Et primū quidem videntur conuelli quæ è directo sunt partium inflammatione laborantium: deinde sic postquā & principium attigerit passio, ad totum extenditur corpus. Membra autem particularia ex accepto vulnere iudicantur emortua, quando principes ac maiores venæ, arteriæ quoque & ossa, à quibus vitam, nutritionem, & fulcimentum accipiebant, penitus excisa sunt & destructa: incipiuntque liuescere aut nigrescere, mortis habitum inducere, ac cadaueris formam repræsentare, non secus quā in gangræna & sphacelo, vt videre est in excisione brachiorum & tibiarum. Iudicantur itidem membra ad vsum à natura institutum fore inepta, & perpetuò impotentia, quando nervi, tendones, & ligamenta (quos Græci syndesmos vocant) penitus sunt abscissa & destructa: suamque

suamque protinus actionem perdunt, ac resiccati, & tabescere incipiunt. Vulnera ea omnium tuitissima sunt, & omnino (vt dicunt) sanabilia, quæ in euchymis, id est, boni succi corporibus, & in locis carnosiss accepta sunt, vbi & nervi pauci, & venæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Adhæc, quæ diuisionis magnitudinem non habent, hoc est, longitudinē, latitudinem, aut profunditatem non multam. Periculum enim facit vulnus, quodcūq; magnum est. Ratio autem ob quam hæc vulnera tutiorem habent curationem, omniumq; minimè formidanda sunt, est, quo-

Vulnera tutiorem curationem habentia.

10 niam ea nec febris, nec praua aliqua symptomata sequi contineuerunt, modò saltem rectè, & vt res exposulat, tractentur. Quòcircà rectè ac prudenter feceris, si in tuis assertionibus, seu (vt dicunt) depositionibus hoc præfatus fueris, atq; etiam addideris: dummodò nihil aliud superuenerit, quod nec impræsentiarum apparet, nec in talibus accidere solet. Vulnera autem, quæ vt plurimum sanabilia dicuntur, mediamq; inter duo dicta extrema (nempe omnino sanabilia, & ex necessitate lethalia) naturā sortiuntur, ea sunt, quæ in capite musculorum carnosorum longè à iuncturis & temporibus: item quæ in caluaria, quam Græci

Cor. Cel.

Vulnera vt plurimū sanabilia.

20 *κρανίου* nominant, thorace & ventre incidunt. Hæc enim si ritè, atque ex arte tractentur, adhibeaturq; diligens cura, & laborans obedientem se præstiterit, in nullo propiè indulgens voluprati, exterioraq; omnia ritè adsint apparatus, curationem indubiè recipere possunt. Si verò in ijs peccatum sit, eorum curationem intercepti contingit, hominemq; tandem ad interitū deduci. Proinde cū de illis ferre iudicium volueris, huius rei mentionem (vt nomini tuo consulas) te facere oportet. Ceterum si coactus fueris à magistratu, super aliquo vulnere sententiam ferre, eiusq; euentum, quantum ars permittit, prædicere,

Formula ferendi iudicium de vulneratis ex scripto.

30 imprimis annotandum tibi est, in schedis tuo chirographo obfignandis, quòd ex mandato ipsius magistratus, vulneratum inuiseris, & vulnus seu vulnera omnia, si plura fuerint, diligenter & accuratè inspexeris. Deindè vulnus aut vulnera nomine expresse ac proprio, vnà cum affecto, loco exprimere debes. Postremò tuæ censuræ causam, ac iudicij per te lati, rationem te subijcere oportet. At verò interim te admonitum velim, ne iudicium tuum in hac re præcípites, sed maturè, prudenter, ac circumspectè omnia definias. Quandoquidem (vt ait ille) omne in præccepti vitium stetit. Et vt a seniore illo Hippocrate bona-

40 rum artium primario autore scriptum est, iudicium est difficile.

Aphorif. 1.

Itaque tamen terminus ultimus vulnorum fit quadragesimus dies: primus vero intra septem dies consistat, & medius (iuxta formam & naturam acutorum morborum) ad decimum quartum protendatur, in suspectis nihilominus ac dubijs vulneribus, expectandus est dies septimus, priusquam aliquid de illis decernas, aut iudices. Solent enim ut plurimum intra id tempus apparere accidentia, tum bona tum mala, quæ post accepta talia vulnera superuenire consueverunt: febris inquam, syncope, mentis alienatio, ac perturbatio, spasmus, & id genus alia. Sed & interim diligenter considerandæ sunt virtutum actiones ex pulsu, lotio, vomitionibus, & alijs id genus, quæ foras excernuntur. Contemplari etiam oportet laborantis appetentiam, tolerantiam, vultum siue faciem, & consimilia. Ex ijs itaque, & consimilibus presagijs, quæ ab Hippocrate & Galeno memorie prodita sunt, diligenter perpensis & examinatis, robur virtutis, morbi magnitudini cõferes. Deinde tacitus apud te omnia recolliges, ut presagire possis, ac iudicium ferre, num moriturus sit eger ex accepto vulnere, an tandem conualiturus. Quæ in re cautè ac prudenter te geres. Nec est quod dicas, si non fuisset vulneratus, nunquam interisset, quantumvis in victus ratione peccasset. Sed nec satis fuerit, si dixeris, vulneratum mortem nunquam oppetisse, si sibi consulisset, ac omnia effecisset secundum rationem: scriptumque esse ab Hippocrate, quod non solum medicum prestare se oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentem, &c. Quandoquidem non solum famæ tuæ consulere, & te ab obloquentium calumnia vindicare debes: sed nihil etiam vel dicere coram magistratu, vel scripto annotare, quod cedat in damnum vel detrimentum laborantis, & consanguineorû, aut liberorum eius, culpam omnem sic in eum reiiciendo. Forum nanque quæ fortuito contingunt, tamen si nulla sit ars preservatrix, est tamen ars aliqua curatrix. Siquidem ut varijs periculis nostra corpora exposita sunt, ita & modis plurimis, ubi in ea inciderint, seruari possunt. Itaque, ut scribit Auicenna lib. 4. de extractione sagittarum, licet vulnera quædam suâ naturâ lethalia sint, non tamen ob id relinquendus est vulneratus absque auxilijs: quin omnia aggredi ac tentare debet chirurgus, quæ ex arte, & secundum rationem fieri possunt, dummodo saltem ab assidentibus amicis & consanguineis ipsius ægrotantis obnixè rogatus fuerit, ac de futuro rei exitu coram eis antequam vulneratum attingat, presaguerit, ut se ab indoctorum & ob-

Aphorism. I.

Auicennas.

*Vulnerati
non sunt re-
linquendi si-
ne auxilio.*

locu-

Iocundiorum calumnia & maledicentia vindicet. Plurique enim præter spem medicorum modo quodam mirabili, ac stupendo, mortem interdum euadunt, ac sanitati restituuntur. Igitur cum sæpe etiam præter expectationem quædam eueniant, curatio aggrediunda est. Quod si vulneratum ipsum omni auxilio destitutum relinqueremus, & inde mors sequeretur, impij, ac inhumani merito & diceremur, & haberemur. Sed ijs omisis, reliqua vulnere iudicia persequamur. Igitur præter hæc te

10 tinui diuortium perpeffis, est impossibilis, vt Galenus adferit libro artis medicinalis cap. nonagesimo. Cuius assertonis ratio est, quia abscisis omnino poris, seu mearibus, venis in quâ, nervis, & arterijs, per quos veluti per canales quosdam, alimentum, sensus, & vita, in ipsum membrum organicum diffundebatur, promptissimè expirant, exhalantur, tum spiritus, tum virtutes, ob substantiæ scilicet quam habent tenuitatem: (quod non contingit in animalibus ijs quæ imperfecta vocantur, atq; etiam in plantis ipsis) non autem propter impotentiam, aut repugnantiam medicamentorum, vt rectè adstruebat Haly in commen-

20 tario loci nuper ex Galeno citati. Adhæc vnio in parte carnosâ possibilis est, etiam iuxta primam intentionem, vt dicunt. In osse verò ex secunda duntaxat intentione. Vocatur autem hæc prima intentio, quando partes diuise, atque inuicem distantes, rursus vniuntur, & coalescunt, vt prius vnitæ erant, idq; absq; medio aliquo heterogeneo, sed ratione quadam ac beneficio nutrimenti, facta scilicet modica quadam conuersione ipsius alimentij in carnem omnino vniiformem, & consimilem priori. Secunda verò intentio hæc intelligitur, quâdo ea quæ diuisa sunt, & vnionis diuortij perpeffa, alia quapiâ interueniente substan-

30 tia, seu glutino quodam alligantur, atq; inuicem coniunguntur. Porro huiusmodi mediũ, cuius interuerti partes ossis fracti, seu diuisi adalligantur, adglutinantur, & Latine callus, Græcè verò perus sarcoides nominatur. Qui quidem ex succo paulò crassiore fit, quàm is ex quo os concreuit. Causa autem propter quam fractum os nequeat coalescere: prima saltem intentione, est ipsius ossis durities: cum mollium tantum corporum (vt Galenus ait) in vnum coeundi sitabilitas: vt tum in externis videre licet, nullo nec lapide cum lapide, nec testa cū testâ coeunt: tum verò in nobis ipsis. Altera causa est, imbecillitas facultatis alteratricis, quæ alrix nuncupatur (ossa enim particule

Plurima in morbis præter expectationem contingunt.

Vnio in partibus organicis semel diuisis est impossibilis.

Prima intentio
Secunda ut!

Callus.

Purus sarcoides.

Quare os fractum non coalescat.

*Nervi, vena
& arteria
interdum di-
uisa coeunt.*

sunt exangues ac frigide non autem inopia materiae seminalis, seu spermaticae, ut quidam putauerunt. Ossa namque praesens semper habent alimentum spermaticum, quod quidem alterant, & in suam conuertunt substantiam, ac sibi assimilant. Nervi autem, venae, & arteriae, inquit Auicennas, Galeni autoritate fretus in quinto Therapeutices, mediam sortiuntur naturam inter carnem & ossa. Neque enim tam facile coeunt ut caro, neque tam difficile conglutinantur ut ossa. Siquidem eorum natura mediocritatem obtinet inter molliem & duritiem. Proinde de vnienda eorum sectione, utique, desperandum non est, ubi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus natura molle: si verò sectio magna fuerit, & in duro corpore, nulla prorsus eius glutinandae spes est. Unde Galenus loco nuper citato ad hunc modum ait: Videtur autem ex-

*Arteriam
incisam ali-
quando vni*

perientia quoque ipsa rationi subscribere. Cum & in pueris & in mulieribus, propter corporum humiditatem, & molliam, eam [arteriam intelligit] viderim glutinari, & in vno iuuenae aggressi, cui exiguae erat incisa. Qui autem eam inciderat, inquit ille, medicus admodum iuuenis erat, et operum artis parum peritus, venamque se incidisse putabat. Cum enim brachium hominis, venam incisurus, deligasset, contigit attolli veluti in gibbum arteriam, atque ita hanc pro vena diuisit. Hanc autem incisionem Galenus curiose coniunxit, conglutinavit, & persanavit. Verum brevis sanè (ut dictum est) incisio erat. Quod si utique magna, atque effatu digna fuisset, nulla certè ratione persanari potuisset. Quod

Aphorif. 19.

Hippocratis testimonio confirmatur sexto aphorismorum sic inquentis: Cum discissum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genae particula tenuis, vel præputium, neque augetur, neque coalescit: hoc est, neque talis aliqua regignitur substantia, qualis abscessa est, neque vnquam discissi corporis labra agglutinantur. In hoc autem aphorismo, vox discissum, diuisionis magnitudinem significat. Discissa namque (ut Galenus ait in comment.) diuisionem habent visque ad finem peruenientem. Ceterum nihil aduersus praedicta pugnat obiectio, quae de ossibus puerorum adferri posset, quod scilicet coalescere possunt, ut libro artis medicinalis Gal. adserit: quia molliam habent, & virtutis robur, ob propinquitatem suae naturae. Sed nec prius asserta infirmat, quod de dentibus obijci solet, quod scilicet renascantur, non solum in pueritia, sed etiam in alijs aetatibus. Quoniam

*Discissa quae
dicantur.*

*Ossa puero-
rum fracta
coalescunt.*

non generantur (inquit Albertus) ex materia ordinata, sed ex superfluitate, non quidem à virtute prima conformatrice, sed

*Albertus Bo-
noniensis.*

nutrito

nutritoria inducente actū generatiuæ. Postremo iudicat Hipp. 2
 6. lib. aphorif. quod d vulnera in corpore eorum, quæ aqua inter
cutem laborant, non facile sanantur. Non prius enim curantur
 vulnera aut vlcera, quàm ad cicatricem perducantur. Non pos-
 sunt autē ad cicatricē perducī, nisi sufficienter exsiccantur: quod
 non factū est facile in ijs, quos aqua inter cutem malè habet, ob
 humiditatis immoderantiam, vt docuit Hippocrates in libro de
 « vlceribus: & Auicennas his verbis: Solutio continui, & vlcera- *Auicenn.*
 « tio, & id genus alia, facile ac citò curationem recipiunt, cum in
 10 particulis sūt, quæ bona præditæ sunt réperatura. Contrà verò,
 « si membra cacochyma occupauerint, plurimum renituntur cu-
 « rationi, nec nisi tempore longo possunt ad sanitatem perducī.
 « Sed multo adhuc difficilius curantur, quando corporibus eo-
 « rum incidunt, qui vel hydropē laborāt, vel lepra [id est, elephan-
 « tiasis] aut aliqua alia praua temperatura. Præterea in 5. aphorif.
 « Hippoc. sic ait: Vlceribus frigidum quidem mordax cutim ob-
 « durat, dolorem insuppurabilem facit, liuorem obducit, rigores
 « febiles, conuulsiones, distensiones. Adhæc iudicatur, quod in-
 « signes continui solutiones malè curare, præsertim circa iunctu-
 20 ram, maciem inducunt sequenti particulæ. Et hoc quidem, pro-
 pter obstructiōem, & virtutis debilitatem, vt iam semel dictū
 est, & infra adhuc dicitur. Plurima adhuc alia præter supradic-
 ta, iudicia diligenti animaduersione obseruanda sunt, quæ in
 sequentibus, & in tractatu de vlceribus (quod tam his quàm
 vulneribus sint communia) recensentur. Itaque finem his de
 vulneribus iudicijs imponemus, si quæ de ijs dōctè, breuiter, at-
 que ornate scripsit Celsus, subiecerimus. Hæc enim vice anace-
 phaleosis & compendij erunt eorum serè omnium, quæ de iu-
 dicijs vulnerū hæcenus dicta sunt: verba autem illius sunt hæc:
 30 Seruari inquit, non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui tho-
 « machus, cui iecinoris portæ, cui in spina medulla percussa est:
 « cuique aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum,
 « aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt: cuiue circa fauces gran-
 « des venæ, vel arteriæ præcisæ sunt. Vix autem ad sanita-
 « tem perueniunt, quibus vlla parte pulmo, aut iecinoris crassum
 « [quod Græci *παχύχυμα* vocant] aut membrana, quæ conti-
 « net cerebrum, aut lienis, aut vluæ, aut vesicæ, aut vllum intes-
 « tum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in
 « præcipiti sunt, in quibus vsque ad grandes, intrusque conditas
 40 venas in alis, vel poplitibus mucro desedit. Periculosa etiam
 vulnera

Lib. 5.

Que vulne-
 ra insanabi-
 lia sunt Cels.

Que vulne-
 ra difficilè
 curationem
 habeant.

Periculosa
 vulnera.

*Malum vul-
nus.*

*Quæ vulne-
ra tutiorem
habeant cu-
rationem.*

vulnera sunt, vbi cunque venæ maiores sunt: quoniam exhauri-
re hominem profusione sanguinis possunt. Idque euenit, non in
alis tantum, atq; poplitis: sed etiam in his venis, quæ ad anum
testiculosque perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quod
cunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis,
vel inter digitos est: item quodcunque musculum, aut neruum,
aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit. Tu-
tissimum omnium quod in carne est: & hæc quidem loco vel
peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculum facit, quodcun-
que magnum est. Hactenus de iudicijs vulnrum. 10

De curatione vulnrum in vniuersum.

CAP. II. III.

*Communis
soluta vni-
tatis curandi
indicatio.*

Omnium solutionū continuïtatis, nedum vulneris, com-
munis quidem curandi indicatio, seu (vt dicunt) inten-
tio, est vniū, vt Gal. ait lib. artis medicin. cap. 50. Et ea
quidem est prima indicatio omnibus nota, ab essentia
ipsius affectus desumpta, quæ præcipit, atq; insinuat, contrariū
per suum contrarium propellendum esse. Hæc autem prima ac
generalis indicatio, perficitur à duobus, nempe à natura, tanquā
a præcipuo agente, & causa effectrice, adiuta suis virtutibus, &
alimento conuenienti: & à medico tanquā ipsius nature mini-
stro, quatuor intentiones sibi inuicem (quod aiunt) subalterna-
tas in animo habente, dum opus suum exercet, vt curationis fi-
nem propositum tandem assequatur. Prima iubet extrinsecus
incidentia (si qua forsan labris vlceris intercidant) amouenda
esse. Secunda præcipit applicanda esse extrema distantium
partium. Tertia docet ea in vnum iam commissa & coacta, ita
conseruare. Quarta suadet ipsam partis læsæ substantiā tueri,
ac salubrē seruare. His & quinta non absurdè superaddi potest,
quæ docet accidētia, vulnribus succedere consueta, corrigere,
ac propulsare. Primam intentionē assequemur dilatando vul-
nus, si non satis dehiscat, aut si eius labris aliquid intercidat ex-
traneum, vtputa vel ossis particula aliqua pungens, & aspera:
aut telum aliquod infixum, vt sagitta: vel mucro, vel aliquod
aliud extrinsecus incidens; cuiusmodi sit spina, vel harundo.
Atq; vbi satis diducta fuerint labra vulneris, digitis, aut voluella,
vel forcipe, aut alio id genus instrumento à te, vt res expo-
stulat, excogitato, quod infixum est, aut labris vlceris intercidit,
apprehendi debet, & leuiter, ac (si fieri possit) citra dolorem
euelli, vt in sequentibus docebitur. 20


*Intentiones
in curandis
vulnribus
obseruanda.*

*Prima in-
tentio.*

. De Plagis, seu cruentis vulnerib. 151

*De sagittis, plumbeis glandibus, & globis ferreis,
ac quibuscunque alijs telis, è corpore extrahendis.*

Corpus multifariam vulneratum.



Quomodo plumbea glans, aut globus, à ferentarijs, & levis armaturæ militibus emissus, extrahatur.



De sagittis, & quibuscumque alijs telis è corpore extrahendis.

VT sagittas, aut quævis alia tela in corpus defixa, secundum rationem, & ex arte possis eximere, inueniendum tibi primum est, quo instrumento id queas efficere. Modus autem inueniendi instrumenta, habetur ex contemplatione naturæ, ac diuersitatis tum læsarum particularum, tum rerum defixarum. Itaque ex horum duorum, partis scilicet læsæ, & rerum infixarum, accurata consideratione & cognitione, tertium statim se offert: nempe modus euellendi tela in corpus infixæ, qui certè varius & multiplex est, vt ex sequentibus patebit. Cæterum ramet si discrimina, seu differentiæ telorum ac rerum infixarum, propemodum sint infinitæ, nec scriptis facile mandari possint (proinde & formæ proicctorum ab hostibus, diligenter à chirurgo perquirendæ sunt) Auicennas tamen conatur eas omnes differentias ad octo reducere. Has autem senario numero placuit nunc complecti. Itaque differunt tela, quæ nostris corporibus infiguntur, materia, figura, magnitudine, numero, habitu, viribus. Materia quidem, quatenus ea quæ imponuntur, & hastilia vocantur, aut lignea sunt, aut arundinea. Ipsa verò tela, aut ferrea sunt, aut erea, aut stannea, aut plumbea, vel cornea, vitrea quandoque, aut ossea: quinetiam arundinea, aut lignea conspiciuntur. Figuræ autem euariant, quatenus alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe triangula. Alia fulcata, alia trifidula, hoc est, tribus ex partibus acie prædita. Nonnulla item sunt spiculata, seu spiculis cincta, quæ vulgò barbulata vocant: nonnulla spiculis carènt. Atque ex spicularis, hæc posteriora spectantibus, seu retrò vergentibus spiculis munita sunt, vt dum extrahuntur, contrà defigantur. Illa in anteriora vergentia habent spicula, vt propulsata idem faciant, hoc est, infigantur, & lanient. Sunt etiam quædam, quibus vtroque versum, fulminis instar, spicula extant, vt & dum extrahuntur, & dum intruduntur, propellanturque, corpus dilanient, & in obiecta infigantur. Sunt item quibus ferum quibusdam cardinibus seu verticulis ita mouetur, vt spicula in impulsione contracta, in extractione explicentur, atque ita telum extrahi prohibent. Magnitudine quoque variant tela, quatenus alia magna sunt, vt trium digitorum longitudinem explant; alia parua, vt vnum digitem æquant: alia verò medium inter hæc locum occupant. Numerus etiam in his diuersitatem adfert, quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla

*Instrumento
rum inuētio
Modus inue
niēdi instru
menta.
Modus ex
trahendi.*

*Sex telorum
differentiæ.
A materia
sumpta dif
ferentia.
Differentia
sumpta à fi
gura.*

*Spiculatorū
discrimina.*

*Telorum di
scrimina
sumpta à
magnitudi
ne.
Numerus.*

Habitus.**Vires.**

**Instrumenta telis atq;
infixis alijs
rebus extra-
hendis acco-
moda.**

**Modus ex-
trahendi te-
la infixa
duplex.**

nulla cōposita. Tenuia siquidem quædam ferramenta, siue ferrea frustula ipsis imponuntur, ac sic innexa sunt, vt in teli euulsione facile lateant, & in imo relinquuntur. Habitu differunt tela, quatenus alia ferrum acutum ligno seu hastilibus habent infixum, alia concauum, ita vt hastile in ferri tabulum insertū habeant: atque hoc alia firmiter, alia negligentius, vt dum euelluntur, relictum intus remaneat. Viribus demum & facultate differunt, quatenus veneno quædam sunt oblita, hoc est, venenata: alia verò minimè. Atque hæc quidem sunt telorum differentia. Nunc de instrumentis, quibus tela, & res extraneæ nostris corporibus infixæ extrahuntur, dicendum est. Nam de sedibus, in quas tela ipsa penetrarunt, postea agemus, dum scilicet de modo euellendi tela alia infixa, sumpta à sede affecta indicatio ne, commentabimur. Itaque instrumenta, quæ à telorum aliorumque infixorum differentijs, & à particularum in quas penetrarunt varietate, excogitantur, inueniunturq; licet valde multa sint, octo tamen apud Guidonem, & recentiores chirurgos sunt magis communia. Primum, sunt forcipes, seu (vt vulgò loquuntur) tenaculæ Auicennæ, quæ denticulatæ sunt, & capita habent ad instar limæ. 4. fen. lib. 4. Secundum, sunt forci-
pes Albucasis, in modum rostri auis, etiam denticulatæ. Tertium, sunt forcipes in modum cannæ siue arundinis, aut scriptorii calami concavæ, quas vulgò tenaculas cannulatas vocitant, ad sagittas spiculis cinctas (quas barbulatas nominant) extrahendas accommodatæ. Quartum, est terebellum inuersum, quod in ferri infixi tubulum (quam doliam appellant) imponitur: vbi autem sic tubulo immissum, ferrum apprehenderit: leuiter ferro sequaci educitur. Quintum instrumentum, est terebra in longum porrecta, dilatandis ossibus (quibus tela firmiter inheret) apprimè idonea. Sextum, est excisorius culter, ad amplexandam carnem vulnera, quò facilius infixa eximantur. Septimum, est propulsorium instrumentum, quod geminum est, nempe cauum, & solidum siue surdum: illud fœminam, hoc marem appellant. Iis tela protrudimus, donec ab altera parte apprehendi, & extrahi possint. Octauum, est in modum arcus illius, quem vulgò balistam vocant. Hoc autem, iustum telum excutitur, aut vt in sequentibus dicemus, extrahitur. Horum autem aliquos formulas in sequentibus depictas inuenies. Cæterum extrahendorum telorum, quæ illata corporibus intus hæserunt, modus est duplex, per attractionem vnus, alter per protrusionem, seu impul-
sionem.

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

155

tionem. Attractio fit ab ea parte maximè, qua venit telum, sed interdum etiam & ab ea in quam tetendit. Protrusio autem, seu propulsiatus fit in partem oppositam ei, ex qua venit, infixumque est. Horum autem modorum indicationes desumendæ sunt, tum ab ipsis telorum generibus, quæ supra commemorauimus, tum ex illis sedibus, in quas illa penetrarunt. De quibus mox dicam, si communia quædam præmiserò in extrahendis telis sedulo obseruanda. Si itaque telum in conspectu sit, sic, ut se habet, protinus extrahendum est: sin occultatum est, ita faciendum Hippocrates præcipit: Corpus vulnerari, (si tamen ipse poterit) in ea figura constitui debet, in qua erat eo tempore, quo vulnus accepit, atque ita quò tetenderit telum, specillo explorandum est. Si æger id non potest, iacens saltem ita debet collocari, ut quàmproximè fieri potest, ad eam figuram accedat. Si telum aliquod defixum primis conatibus commodè ac salubriter euelli non possit, sic consueque dimittere debes, donec circumposita caro emarcescat, putrescatque. Deinde intermissum opus aggredere, telum ipsum quod infixum est, modò huc, modò illuc agitando, ac manibus vel forcipibus leniter ipsum contorquendo, ita enim leuius multo ac facilius telum extrahes, ut rectè præceperunt Auicennas, Brunus, & Albucasis. Quanquàm aliter visum sit Henrico. Hic enim voluit statim ac sine mora, tela quocunque modo fixa extrahi. Si armatus homo telo ictus fuerit, nec possit leniter, ac faciliè telum manibus euelli vulneratum protinus suis armis exui iubeto: & ritè apparatis omnibus, quæ ad opus eiusmodi conducere videbuntur, emissioque ac præfatio (ut supra dictum est) præfatio, forcipe communi apprehensum telum (præsertim si sagitta est) ipsum leniter contorque do extrahito. Quod si communi hac forcipe nihil promoueris, fortiores assumto. Si telum carni infixum retrò, hoc est, ea parte qua venit, recipiendum sit, nec aliter educi possit, amplificanda scalpello, aut nouaculâ plaga est, quò facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quæ maior quidem fit, si ab illo ipso telo dum redit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quàm ut telo postea transiente amplificetur. Summa autem vtraque parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quod si horum aliquid detestum fuerit, excipendum hamo reueto est, abducendumque est scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendum est: tum quoque eodem modo, & eadem cura habitæ

*Attractio.
Propulsio.*

*Communia
quædam in
extrahendis
telis sedulo
obseruanda.*

*Consilium
Celsi.*

habita, ne sub eo, quod eximetur, aliquid prædictorum lædatur. Si autem telum ita firmiter ossi inhæsit, ut nulla vi extrahi possit, terebelio (ut vocant) directo diuisionem amplificabimus, ac modo infra scripto telum liberabimus. Telo à corpore euulso, non alia est vulneris medicina, quam quæ esset, si corpore

eximendi modus

ictu nihil inhæsisset. Ergo vulnus ipsum, ut & cætera alia vulnera, tractari ac curari debet, hoc vno addito, quod qui ab inhiro telo alteratus est sanguis, exprimi, ac educi debet, ut vulnus ipsum à putrilagine vindicetur. Ac perfundi quidem debet oleo calente, maxime si doloris adest suspitio. Si inflammatione ex-

perniatur, ad eam tollendam insuccatis lanis, fomentis, cataplasmatibus, & cõsimilibus utemur. Si verò inflammatione vacauerit, futuris (si opus fuerit) adhibitis, impositoq; medicamento, quod cruentis statim vulnerebus injici solet, curandum est. Cæterum his communibus prælatis, tempestiuum est, propria quædã de telorum extrahitione subiiciamus: & quando, ac quomodo attractione, vel propulsione, sit utendum, sumpta primum (ut propositum est) indicatione ab ipsorum telorum generibus seu differentiis, dein ab ipsis sedibus affectis. Itaq; tela, quæ iaci ac vibrari solent, magna ex parte sunt vel oblonga, & angusta, cuius-

*Methodus
eximendi te-
la, sumpta
indicatione
ab ipsorum
differentiis.
Sagitta sæ-
pius antror-
sum educen-
da.*

modi sunt sagittæ: vel lata, vel rotunda, aut angulosa, ut plumbea glans: vel ferrea, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrum intus infedit. Telum si oblongum est & angustum, cuiusmodi sagitta est, & facile in corpus conditur, & altius in se infidit. Sæpius itaque alia parte, quam qua venit, sagitta educenda est: præcipueque, quia ferè spiculis cingitur, quæ magis laniant si retrò, quam si contrà trahuntur. Sed inde aperta viâ, caro diduci debet, ferramento ad similitudinem facto Græcæ literæ J. Deinde ubi apparuerit, si mucroni arundo inhæret, propellenda est sagitta, donec ex altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa, arundo inquam, seu hastile decidit, solumque intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Porro eximetur ferrum vel terebra inuersa, in tubulum (quam doliam vocant) immisso, vel forcipe, qua dentes atque eorum radices euelluntur: vel ferramento, quod à telo extrahendo beluleû Græci vocant: aut alio quopiam instrumento ad id accommodo. Nonnunquam etiã car-

nem

- nem prius incidentes, si vulnus instrumentum nō recipit. Quōd si spicula apparuerunt, eaque breuia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi. At si ea maiora valentioraque sunt, fixis scriptorijs calamis, vt consulit Celsus, contegenda sunt, ac ne quid lacerent, sic euellenda. Alij spicula ipsa forcipibus seu tenaculis (vt vocant) cannularis apprehendunt, atque ita telum eximunt. Quōd si telum spiculis vtroque versum spectantibus cinctum in neutram partem sequatur, iuxta ipsum alia incisione patefaciendus locus est, nisi vena aut
- tale aliquid impediatur: atque inde ferrum vndiquaque explicatū modeste, ac sine vlla vulsione tollendum est. Quidam etiam spicula eiusmodi fixis calamis, seu exiguis arūdinibus, prius contegunt, ne quid lacerent, deinde ita euellunt, ea scilicet parte, quæ educationi magis congruere videbitur. Latius verò telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere, ipsi quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum ergo est, genere quodam ferramenti, quod Diocleum eraphiscum Græci vocant, quoniam autorem Dioclem habet: quem inter priuscos, maximosque medicos fuisse memoriæ proditum est, vt
- 10 Cornelius Celsus annotauit libro septimo, capite quinto. Tertium quoddam genus telorum est rotundum, vt diximus, aut angulosum, vt lapis, plumbea glans, aut simile aliquid, quod ex funda aut tormentis bellicis mittitur, & perrupta cute integrum in corpus defigitur, ac latet. Tela autem eiusmodi intus condita esse his notis deprehendes. Moles aspera, atque inæqualis, (si contrectetur) subesse sentitur. Plaga seu diuissio non omnino in rectum tendit, sed & maior etiam ac amplior apparet: caro item confusa luidaque cernitur. Dolor præterea cum grauitate quadam infestat. In omnibus his, latius vulnus aperiendum, idque quod inest ea qua venit, aut vncis, aduersave scalpelli parte, aut vulnerario specillo recipiendum est, aut dentatula forcipe, si fieri potest, & eam vulnus admisit, extrahendum. Quōd si telum infixum sic intus lateat, vt nullo modo reperiri possit, aut non satis commodè extrahi, tanisper dimittendum est, donec natura ipsum protrudat, aut manifestet.
- Interdum verò tela infixa integra, intus cicatrice obducto vulnere citra noxam aliquam diu delinærant. Deinde longiore temporis spacio partem eam abscessu occupante ac disrupto exiliere: quo facto, vulnera mox ad sanitatem perducta sunt.
- 40 e a illis curatione adhibita, quæ alijs debetur vulneribus. Quod multis

*Si sagitta
spiculis cincta
est.*

*Latius telum
ab ea parte
qua venit,
extrahendum.*

*Rotundum
telum aut angulosum.*

*Tertium genus
telorum
ea parte
qua venit,
extrahendum.
Tela inter-
dum diu in
corpore de-
linærant, per-
senatio vul-
nere.*

*Methodus
extrahendi
tela infixa,
sumpta à se
de affecta in
dicatione. &
si telum in
summa carne
infixum est.*

*Si telū aliē
in carne in-
fixit.*

*Si telum in
opposita pro-
cesserit.*

multis contigisse vidit Albucasis, vt refert parte secunda suæ
chirurgiæ. Hactenus de telorum extractione, sumpta ab ipso-
rum differentijs indicatione: nunc de re eadem dicemus, sum-
pta ab ipsius affectis sedibus indicatione. Itaque sedes in quas
tela penetrarunt, vel caro sunt, vel ossa, vel articulus. Atque in ijs.
quidem partibus, vel altè telum infedit, vel in summo duntaxat,
aut saltem nō admodum altè, & citra medium infixum est.
Adhæc vel membrum vnum duntaxat telo iectum est, vel parti-
culæ plures simul cōfixæ sunt. ita vt particula vna telo traiecta,
alteri affigatur. Igitur si in summa carne telum impactum est, 10.
aut certè magnas venas, & loca nervosa non transijt, nihil me-
lius est, quàm qua venit, id euellere. Similiter etiam quod altè
inhæsit, obiectæ verò partes, id est, quæ ex diuerso respondēt,
si conuulserentur, vel ex sanguinis profusione, vel ex aliorum
membrorum consensu, & consortij lege periculum inuehant,
euulsione qua parte infixum est, eximi debet. Illud autem di-
gitis, vel ipsius telī arundine, seu hastilli (quod plerumque li-
gneum est) in ferri tubulum immisso, extrahemus. In quibus
verò altè telum in carne infixum est, & plus est, hoc est, longius
spacium, per quod telo reuertendum, quàm quod perumpen- 20.
dum est, iamque venas nervosque id pertransiuit: breuiter cum
parum admodum integræ carnis ex aduersa parte superest:
neque aliquid obstat, quominus contra mucronem incisio com-
modè fieri possit, melius est aperire quod superest, eaque pro-
pulsatu telum educere. Nam & propius petitur, & tutius euel-
litur, & in maiore membro, si medium mucro transijt, faci-
lius sanescit quod peruium est, quia vtrinque medicamento fo-
uetur. Protrudi autem debet, vel hastilli ipso, si inhæreat: vel
si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidem, vel solido
(quod & surdum quidam vocant) prout res exigat. Porro si 30.
telum acumen (quod *ὀψαχον* vocant) habeat, (hoc autem spe-
cillo deprehendimus) propulsorij instrumenti sceminam: si ve-
rò tubulum seu concauitatem habuerit, marem demittemus,
atque ita ferrum inserto instrumento protrudemus, quoad edu-
ci facillimè possit. At si etiam in opposita, seu vltimus telum
processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infixum est,
diuisis ijs, quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euel-
lentes, vt dictum est, vel per eam partem in quam tetendit, vt
modò diximus, propellentes, summa cura (vti monuimus) sem-
per habita, ne vel neruum, vel tēdonem, vel maiorem venā, aut 40
arteriam

- arteriam incidamus. Turpe siquidem est, dum telum extrahimus, maiorem noxam inferre, quàm telum ipsum effecerit. Si telum ossi inhæsit, non nisi attrahendo ipsum eximere tutum est. Eò autem usque mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est. Quæ ratio in dentibus quoque eijciendis est: & vix, vnquam ita telum nõ sequitur: sed si morabitur, excuti quoque ictrum aliquo ferramento poterit. Quidam tenaculis (vt vocant) seu forcipibus alligant arcum, quem vulgò balistam nominant, & laborante bene stabilito, intentum ipsius instrumenti neruum, seu chordam remittunt, & ita telum extrahunt. Quod si telum altius in osse defederit (quod cognoscimus, si firmiter id infixum, nulla vi moueatur, aut labet) excisorio cultro, osse quod iuxta est, exempto, aut etiam terebra (si crassum sit) prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine terebra facto ad speciem literæ 4. contra telum os excidunt, sic vt liner, quæ diducuntur, ad telum spectent, quo facto, id necesse est, labet, & facile auferatur. Quod remedium vltimum est. Alij terebra in rectum ac longum porrecta, quæ illis directâ vocatur, ossis percussæ rimas coniucentes, & telum infixum mordicus prehendentes, diducunt, atque ita facile quod infixum est extrahunt. Inter duo verò ossa, si per ipsum articulum telum pertruperit, circa vulnus duo membra fascijs haberijsve deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt tendones, ligamenta, & nervos distendant. Quibus extentis, laxius inter ossa spaciū est, vt sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quoque videndum est, sicut in alijs locis seu particulis supra monui, ne quis neruus, aut vena, aut arteria à telo laedatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si particulae plures confixæ fuerint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur, verbi causa, brachium thoraci, aut cubitus alicui alteri corporis particulae, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrunque membrum penetret sagitta aut hasta, eam ab exteriori parte, perindè atque in vno fieri consuevit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambæ partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte serra rescata, eas ligni partes quàm facillimo fieri poterit modo, sigillatim euellemus. Porro si venenato quoque telo plaga facta est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno,

*Si telū ossi
inhæsit.*

*Si telum al-
tius in osse
demersū sit.*

*Si telū in ar-
ticulo se in-
ter duo ossa
demersit.*

*Si particula
piures confixæ
fuerint.*

*Si venenato
telo quis in-
citus est.*

*Venena non
gustu, sed in
vulnere no-
cent.*




*Emplastrū
Auicenna,
infixa sta-
tum extra-
hens.
Hoc idē &
Paul. Aegi.
testatur.*

no, vel à serpente, aut quouis alio venenato animante iſtis adhi-
beri ſolet. Cæterum quod ad chirurgiã attinet, totã carnem, quę
veneno iam mutata eſt, ſi quidẽ fieri poteſt, præcidemus. Agno-
ſces autem eam, quod à ſana carne multum diuerſa ſit. Pallida
enim ſupra modum, ſubluida, & veluti mortua apparet. Sin car-
nem totam à veneno immutatam circuncidere non poſſis, nõ
alienum erit circa vulnus ſcalpello incidere, hoc eſt, ſcarificare,
quò plus vitii iam ſanguinis extrahatur. Dein venenũ admo-
ta vulnere cucurbitula, extrahendum eſt. Si cucurbitula non eſt,
tum quodlibet ſimile vas, quod idem poſſit. Si ne id quidem eſt
(quod tamen vix incidere poteſt) homo vilis aliquis adhibendus
eſt, qui vulnus exugat. Sed illud ne intereat, antè debet attendere,
qui vulnus exuxerit, ne quod in gingiuis, palatõe, aliã ne
parte oris vlcus habeat: hoc pacto enim & ipſe tutus erit, & tutũ
hominem vulneratũ præſtabit. Siquidem venena (vt Celfus ait)
non guſtu, ſed in vulnere nocent. Verum priuſquã hæc aggre-
diamur, telũ ipſum vti docuimus, eximendũ erit. Atq; hæcenus
tradita eſt methodus de telis è corpore extrahendis. Cæterum
Nicodemũ incantamẽta, & inſuffurationes, quas & cõiurationes
vocãt, quæ à Theodorico, & Gilberto referũtur, ne piſi qui
dem facio, vt quæ meræ nugæ ſint, & Chriſtianũ hominem nõ
deceant. Medicamẽta autem ea, quæ extrahendis infixis dicata
ſunt, ſubindẽ Guido uſurpare ſolet in ſpinis, piſciũ ofſiculis, la-
pidibus, vitri fragmentis, ſurculis, & ofſium fruſtulis eximendis:
aitque frequenti experimento ſe edoctum medicamentum ab
Auicenna deſcriptum, inter cætera præſantiſſimum eſſe, & effi-
cacifſimum. Recipit autẽ fermenti, mellis optimi, aut alucariũ
fordicici (quæ Græcè propolis dicitur) ſingulorum librã ſemis,
viſci quercini quart. vnum, ammoniaci quart. ſemis, olei quart.
vnu: ex quibus omnibus conficitur emplaſtrũ, quod loco, cui fi-
xum intus in hæret, ſuperponitur. Rogerius adſcribit multiplici
experimento comprobatũ, quod radix arundinis contuſa cum
melle, & appoſita infixæ ſine dolore extrahit. Plæraq; alia ſunt
in antidotario deſcripta, quæ vim habent attrahendi, & infixæ
euellendi, cuiuſmodi ſunt, diſtammum, thapſia, ſagapenum,
ammoniacum, ariſtolochia, ranæ combuſtæ, & id genus alia.

*Sequuntur formulæ aliquot inſtrumentorum,
quæ telis extrahendis idonea ſunt.*

*Forcipes denticulatae, ad euellendum spinas, osficula
aspera & pungentia, aculeos quoque, & mu-
crones infixos, aliaque id ge-
nus acuta,*


*Forcipes
Albucasis,
sub hac du-
plici formu-
la depictae
reperiuntur,
in variis exē-
plaribus hæ
autem sunt
secundum
Guidonis in-
strumentum,*



*Hoc genus for-
cipes, rostrum
coruinum qui-
busdam appel-
latur, alijs ser-
pentinū instru-
mentum; quod
ad secundum
Guido. instru-
mentum perti-
nere videtur.*


*Aliud forcipis genus, ad
globos educendos, & tela
spiculis cincta, obuersas-
que cuspides habentia.
vulgares chirurgi barba-
tula vocant.*

*Alia forma forcipis den-
ticulata, ad eosdem vsus
utilis, et apprimè idonea:
ad quos & duæ aliæ præ-
cedentes forcipum diffe-
rentiæ.*



Instrumentum, ad extrahendum ferrum infixū, tubulum habens arundine seu hastili vacuum. hoc vti possumus loco quarti instrumenti Guid. quod terebram inuersam appellat.

Terebra directa, quod quintum est Guidonis instrumentum, ad amplianda ossa, quibus tela inhaerent.




Formula forficis excisoriae, ad amplianda vulnera in carne accepta, quo facilius infixæ eximantur. Hoc sextum est Guidonis instrumentum.

Formula impellentis cavi, quod & propulsoriū foemina dicitur. Hoc septimum est Guid. instrumentum.



Formula impellentis surdi, quod & propulsoriū mas appellatur. hoc etiā ad septimū Guid. instrumentum refertur.



De secunda intentione curationis vulnerum.

- S**ecundam intentionem in curandis vulneribus (quæ est commissio disidentium, seu distantium partiû coniunctio) assequimur per orarum adductionem, seu labiorum vulneris iniicem distantium attractionem, & applicationem membrum ipsum læsum quàm fieri poterit lenissimè tractando. Disidentium namque coniunctionem seu agglutinationem (vt Galenus ait) præcedit necessariò orarû adductio. Quæ autem diducta sunt, in idè adducuntur, aut vinculo ex duobus initijs circumdato, aut futura, aut fibulis (quas Græci ἀγκυρᾶς vocant) impositis, aut horum quibusdam, aut omnibus. Quòd si vulnus (vt proposuimus) simplex sit, hoc est, solum continui in carne diuortium, cû quo neque affectus vllus, neque symptoma vllum adsit, nec valde magnum sit, sola fascia orbicularim circumdata, diductæ partes committendæ sunt. Ita enim vulnus procul dubiò coibit, & citra aliquam aliam extrinsecus adhibitam curam coalescet. Huius autem conditionis & coalescentiæ effectrix causa, sola certè est natura. At si magnum vulnus sit, adeò vt diductæ partes in totum, atque exactè prædicta deligatura committi nequeat, futuris ipsæ adducuntur: deindè vbi sic deligatæ, aut futuris adductæ fuerint, glutinatorijs præfidijs vtetur, quæ collectâ humorû sublimiem desiccare, & consumere queant: aliam verò ne influat, prohibere. Plaga autem ea sui potissimû debet, quæ in molli parte accepta est, maximeq; si discissa auris ima est, vt Cel sus ait, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrû vel circa guttur cutis, vel venter: vix enim ijs partibus deligaturâ vulnus admittit. Si verò in carne vulnus est, hiatq; neque in vnâ oræ faciliè attrahuntur, futura quidem aliena est, imponendæ verò fibulæ sunt (ἀγκυρᾶς Græci nominant) quæ oras paulum tamen contrahunt, quò minus lata postea cicatrix sit: ferè autem fibulæ latius vulnus esse pariuntur.

De tertia intentione.

- T**ertius scopus, qui in curando simplici vulnere chirurgo proponitur, est, vt diductorum oræ, ita vt in vnum per adductionem coniunctæ sunt, conferuentur, & mancant. Conferuabuntur autem optimè huiusmodi extrema, quæ in vnum coacta sunt, iisdem ferè auxilijs, quibus & in idè adducta sunt: nempe, decenti ligatione, appposito membri situ, & futuris, si necessariæ videbuntur. Porro bifariam simul manent, & agglutinantur.

Disidentium
coniunctio.Lib. 3. The.
Trisariam
distantes ora
vulneris in
idem addu-
cuntur.
Vulnus sim-
plex ex sola
parium co-
missione ad-
glutinari po-
test.Deligatura.
Sutura.

Fibula.

Commissuram
conseruatio.

Duplicitèr

*omnino ma-
uere quæ cõ-
mistiuntur.*

tinantur quæ commissa sunt : alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt ac manent. Per se quidem, quæcunque secum concre-
scunt, ac coalescunt: aliorum ope, ut ea quæ colligantur, & quæ
glutino aliquo tenentur: ac quæ concrecant, coalescantve, om-
ninò mollia naturaliter sint oportet. Talis sanè est (inquit Ga-
lenus) tum caro ipsa, tum quæcunque carnea, ex ipsa constitu-
tione sunt. Quæcunque verò dura siccaque sunt, eorum diuisæ
partes coire simul nequeunt, alienum enim terminum nequa-
quàm aduertiunt: sed glutinum aliquod vinculumve, quo com-
missa maneat, requirunt. Et talium quidem sanatio in sequen-
tibus præcipitur. Nunc de ijs quæ per se vniri possunt, ince-
ptum sermonem peragamus, & quomodo vulnus ligari conue-
niat, primum dicamus.

Quomodo vulnus ligari conueniat.

*Triplex ge-
nus deliga-
tura.*

*Incarnati-
ua seu adglu-
tinatoria
deligatura.*

D Eligaturæ modi seu differentiæ tres sunt apud Anicen-
sen quarta lib. quarti. Nempe incarnatiua, expulsua, & re-
tentiuasita enim eius interpres, & recentiores chirurgi eas nomi-
nant. Incarnatiua, quæ magis propriè adglutinatoria dicere-
tur, recentibus tum vulneribus, tum fracturis accommodatur. 20
Debet autem fascia in hoc genere deligaturæ, à duobus inijs
versus medium eiusdem circumuolui, & principium deligaturæ
fieri ex parte aduersa loci vulnerati, ducendo, atque iniiciendo
alterum fasciæ principium versus partem superiorem membri,
alterum versus inferiorem. Ea verò latitudine esse debet fascia
ipsa, ut semel iniecta, non vulnus tantum, sed vsque ad aliquem
vtrinq; etiã oras eius comprehendat, quantum videlicet videbitur
necessarium. Si ab altera parte caro magis recessit, ea melius at-
trahitur. Si æquè ab vtrâq; transversa comprehendere oras debet:
aut si id vulneris ratio non patitur media primò iniicienda est, 30
& tum in vtrâq; partem ducatur. Ceterum arctior esse debet liga-
tura super locum lesum, quàm in partibus adiacentibus. Cauendū
tamen semper est, ne vel nimis arcta, vel nimis laxa sit. Quãdo-
quidem quæ laxior est, non continet: quod autem non contine-
tur, elabitur. At verò quod vehementius est adstrictū, dolorem
premendo excitat, & proinde fluxionem proritat, & phlegmonem
accersit, quandoq; etiam gangrenam. Danda igitur opera est,
ut vitato ambarum incommodo, vtriusq; fruamur cõmodo. Id
fit (ut Galenus ait) si quod nimium est, declinabimus. Ergo nec
adeo arctare deligaturam debetis, ut iam comprimat: nec adeo 40
remit

*Lib. 6. meth.
sic deligan-*

- remittere, vt laxa fit. Et, vt summatim dicam, deligaturæ terminus, fit bona laborantis tolerantia. Cæterum extrema fasciæ acui affuenda sunt. Nam nodus (inquit Celsus) vlcus lædit, nisi tamen longè est. Et si necessitas desideret, plures fasciæ injiciantur, & modo qui suprà dictus est, reuoluatur. Itaque hoc deligandi modo vulneris labra adamussim committuntur, & quominus circa vulnus excitetur phlegmone, (cuius rei curam imprimis habere oportet) prohibetur: vt lib. 6. methodi Galen. annotauit. Sunt qui pânium lineum duplicatum adaptant vulneri, & stringendo acui desuper affiunt. Hæc de prima ligaturæ differentia. Secunda deligaturæ differentia, quæ expulso-
 10 *ria* dicitur, antiquis vlcibus & sinibus (quos cauernosa vlcera vocant) propriè dicata est, hoc enim commodi præstat in illis, quòd à fundo ad os collectam humorum colluuiem extrudit, & ne quid amplius in locum affectum confluat, validè prohibet. Hæc autem fit fascia ab altero tantum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri laborantis, vbi artior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione, eam paulatim soluendo, dispensatur: si saltè os
 20 *per* quod sanies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Voco autem hinc partem superiorem cum Galeno, quæ versus cor, aut hepar vasorum radices spectat. Rursus radicem vasis appellamus, priorem eius partem, quæ iecini ori propior est, vel etiam cordi. Porro huiusmodi ligatura adaptari solet membris inæqualibus, id est, quæ non sunt æqualis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibiæ, sciindendo fasciam ipsam, singulo quoque palmi intervallo: & eam validè acui affuendo, ab ea parte maximè, quæ gibba est, seu, vt dicunt, arcuata: laxè verò à parte altera dorsali. Hoc
 30 *autem* genus ligaturæ vtilissimum est in antiquis vlcibus, varicibus, & tibiæ inflationibus. Deligatura quæ retinet medicamenta, accommodatur membris, in quibus non potest fieri strictio, seu strictura, neque alia deligatura, vt in collo, & ventre, atque omnibus abscessibus, & dispositionibus dolorificis. Hæc autem perficitur, linteolo, seu fasciâ vnicum finem, seu (vt dicunt) caput habente: vel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigat. Atque eius deligaturæ principium, super locum affectum injicietur, & in parte opposita, vel nodus, vel potius sutura fiet. Talis autem
 40 *deligatura* leniter, & citra dolorem, cum apporet tempus, solui debet.

*da est fascia
vt & conti-
neat, neque
adstringat.*

*Expulsoria
deligatura*

*Deligatura
expulsoria
fit inferne
sursum.
Lib. 5. meth.
meden.*

*Deligatura
retinens.*

*Quæ fascia
vulncri de-
ligando a-
ptissima.*

debet, Quòd si lintheola nimis adhæreant, ea tantisper vino ma-
defacito, donec facile separari possint : fascia verò ad vulnus
deligandum, linthea aptissima est Galeno lib. 6. Therap. quæ nec
nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod enim molle nimium
est, & algæ ritu fragile, non tutò continet. Quod verè durum
nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex panno veteri, non ta-
men nimis detrito, suavi, leni, & munda: eaq; latitudine, & lon-
gitudine, quam natura partis desiderat. Vt si humerus tibi deli-
gandus sit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat, assu-
mes: at si femur, quinque: si tibia, quatuor: si brachium, triu digito-
rum. Si verò digitus ligari debeat, vnius digiti latitudine fascia
assumenda erit. Eius verò longitudo sit, pro ratione numeri in-
iunctionum, hoc est, pro necessitate reuolutionum. Hoc igitur,
vt & multa alia, quæ scriptis mandari non possunt, medici, ac
chirurgi ingenio, quod (vt Damascenus ait) tum artem, tum na-
turam operantem magnoperè adiuuat, committitur. Sed & ad
hoc non parum confert, cognitio conformationis ipsius parti-
culæ laborantis: vt 4. Therapeu. Gale. his verbis expressit: Deli-
gare (inquit) còmodè ægram particulam non possis, nisi prius
vel ex figura, vel positura, vel vtriusq; indicationem sumpseris: 20
Hactenus de modo deligendi. Nunc de qualitate, & modo suædi.

De futura in vulneribus faciendâ.

*Sutura tri-
plex.*

*Vfus suturæ
agglutina-
toriæ.*

*Modi quin-
que suturæ
agglutina-
toriæ.*

TRiplex sutura communiter fieri solet in vulneribus, ag-
glutinatoria, quam incarnatiuam vocant: suppressoria
sanguinis, & labiorum in vnum adductorum, ad tempus confer-
uatrix. Sutura incarnatiua omnibus his plagis seu vulneribus in
molli parte acceptis, competit, quorum labra sic inuicem dissi-
dent, vt solâ ligaturâ in vnum adduci non possint, & quibus ni-
hil iam extraneum inter ipsas oras intercipitur. Sed & recennia 30
esse debent vulnera, quibus hoc genus suturæ accommodatur:
vel saltem si vetera fuerint, ac dura, callosa quæ labra habuerint,
per scarificationem, aut cutis ablationem, sanguine emisso reno-
uata. Hæc autem fit quinque modis. Primò, filo forti, æquali, &
leni, cuiusmodi est sericum in communibus saltem vulneribus,
primum punctum faciendò in medio diuisionis vulneris, dein-
dè alterum in medio spacio vtriusque lateris, & ita deinceps
procedendo, vt inter duo quæcunque puncta, punctum interce-
dat, donec vulneris labra ritè còmissa fuerint. Itaque neq; nimis
rara, neque nimis crebra futura esse debet. Si enim nimis rara 40
est,

est, non continet: Si nimis crebra est, vehementer afficit. Quia quò sapius acus corpus transiit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo maiores inflammationes (inquit Celsus) oriuntur. Sic igitur futura oras iungat, ut ne ipsæ quidem inter se ex toto contingant. Quòd scilicet, si quid intus humoris concreuerit, sit quâ emanare, ac effluere possit. Solent autem communiter vnius digiti transversalis spatium inter injecta vincula relinquere. Porro acus longa, ac lævis esto, cuspidē triangulāri, caudā verò excauata, ut in ea filum recondatur, & transiūm

Lib. 5.

Acus qualis esse debeat.

10 acus non remoretur. Ita enim minus corpori insidit. Cæterum cannula habeatur fenestrata, cui incumbat, ac innitatur altera pars labij vulneris, ne scilicet huc atque illuc euagetur, dū acus intromittitur: & ut per fenestellam videri possit, quando acus pertransierit. Atque ubi iam acus traiecta fuerit, vnâ cum filo trahatur: sed interim vulneris labrum, quod prope filum est, specillo huic parti applicato, veluti fulcimento, & adminiculo innitatur, ne dum filum extrahitur, labrum etiam consequatur. Ligetur autem primò duabus inuolutionibus, secundo vna duntaxat, deinde filum scindatur, aliquantulū remotè à nodo.

20 Secundo modo fit futura incarnatiua, seu agglutinatoria, acubus, aut pinna cum acu introducta. hac autem utimur in magis vulneribus, & profundis in quibus labra plurimum inter se distant. Atque tot numero acus imponendæ sunt, cum filo in eas intromisso, quot necessariæ videbuntur. Filum autem circa eas reuoluendum est, eo modo quo mulierculæ facere solēt, dum suas acus super manicas aut capitia asseruant: atque hoc modo relinquuntur vsque ad vulneris consolidationem. Tercio modo fit futura hæc agglutinatoria dicta, veruculis æqualibus ex stupis vehementer contortis, & gracilibus, ad modum

Secundus modus futura agglutinatoria.

Tertius modus futura incarnatiua.

30 scriptorij calami, vel festucæ, longitudine ferè mediij digiti. Quòd si velimus futuram longo tempore perdurare, pinna, seu scriptorius calamus, loco stuparum, assumi debet: fit autem ad hunc modum. Vtraque vulneris ora traijci debet, acu filum ducente. Deinde factò per idem foramen reculsa, ex ea parte qua venerat, recipienda est: sic quidem, ut ansa vna remaneat, ea parte, qua remeauit. In qua alterum veruculi extremum imponendum erit. Postea fines amborum filorum, cunctis inquam & redeuntis, constringito, & super alterum veruculi caput ligaturam facito, ibique fila rescindito, & veruculum hoc pacto

Ansa.

40 vsque ad perfectam vulneris coitionem relinquito. Quarto, cuiusmodi

Quartus modus

*das suturae
agglutina-
toria.*

*Quintus mo-
dus suturae
incarnati-
uae.*

*Sutura san-
guinem sup-
primens.*

*Modus suta-
ra tertius.*

ciusmodi sutura fit, fibulis (quas Graeci ἀκτῆρας nominant) disunctas, atque hiantes vulneris oras committendo. Sunto autē fibulae ipsae vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulneratae: ab utraque verò parte recuruae, figuraturque hamus vnus in altero vulneris labro, & versus alterum ducatur, in quo & alter hamus infigatur, vt facere solent qui pannos tundendo apparant. Hae autem (fibulae inquam) quibus hiantis plagae oras sic contrahimus, nullam vim desiderant, sed eatenus viles sunt, quatenus cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Quinto modo diductae vulneris orae committuntur, panis vtrinque admotis, qui figuram triangularem referant, & ea sint magnitudine, quae membro laeso congruere videatur. Qui suturae modus, in ijs maximè locis conuenit, in quibus volumus cicatrices, facta vulneris agglutinatione, non apparere, vt in facie. Panni autem eiusmodi, viscoso linimento, ac pertinaciter adhærente oblini debent, quod recipiat puluerem sanguinis draconis, thuris, & mastiches, sarcocollam, picem, & pollinem, id est, farinam volatilem molendinariam. Quae omnia cum oui candido liquore subigi debent, & in vnitatem redigi. Atque vbi linimenti formam ea iam induerint, supra dictos pannos extendi debent qui vtrinque postea ad latera vulneris, ad pollicis vnus distantiam supra vulneratam partem agglutinandi sunt. Vbi autem hae panni frustula sic linimento oblita, deficcata fuerint, ingeniose, & vt oportet, consui debent. Quo facto, vulneris labra coibunt, & agglutinabuntur. Sutura sanguinem suppressens, fit acu filum trahente, traiectis oris vulneris vtriusque, per modum reuolutionis, vti pelles consui solent. Ea autem vtimur, quando alia non datur vti, propter magnum ruentis sanguinis impetum, accepto in venis vulnere. Sed & haec utilis est ad transfundenda intestina, cum faucibus sunt: ad panniculos quoque vulneratos, & loca carne destituta. Verum non admodum tutus est hic consuevendi modus. Quandoquidem disrupto puncto vno, cetera relaxantur. Sutura quae labiorum in vnum attractorum est conservatrix, fit vt & reliquae aliae: verum non aequè arcta esse debet. Eo enim duntaxat nomine fit, vt simul maneant, quae commissa sunt, tantisper dum vulnus coalescit. Competit autem huiusmodi sutura vulneribus in carne, aut molli parte acceptis, in quibus magna facta est dilaceratio, & carnis deperditio. Hac enim facto vnionis diuortio, seiuictae partes in vnum adducuntur, quò citius coalescant. His etiam vulne-
ribus

ribus rectè accommodatur, è quibus in posterum aliquid extra-
hendum est. Illud autem de futuris ac fibulis in vniuersum di-
ligenter obseruandum est, vt illis nunquam vtamur, antequàm
vulnus intus purgatum sit (nisi cum magna sanguinis profusio
supprimenda est) ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur.
id enim & in pus vertitur, & inflammationem mouet, & gluti-
nari vulnus prohibet. Sed ne linimentum quidem, quod suppri-
mendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est: nam
id quoque inflamat. Comprehendi verò futura vel fibula, non
20 cutem tantùm, sed aliquid etià ex carne (vbi suberit hæc) oport-
tebit, quò valentius inhæreat, neque cutem abrumpat. Vtra-
que optima est (vt voluit Celsus) ex acia molli, non nimis torta,
quò mitius corpori insidat. Sed neque rara nimis, neque nimis
crebra (ob superius adductas rationes) futura aut fibula inijcienda
est. Neutra etià vim vllam desiderat, sed eatenus utilis est,
qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Cæterù tunc
appetit tempus remouendæ futuræ, cum ea, quem desideramus
effectum præstiterit. Modus autem remouendi talis est: Specilli
caudam, id est, angustum mucronem, filo supposito, filumque
20 ipsum mox abscindito. Postea latum ipsius specilli mucronem,
labro vulneris per quod filum educitur, superponito. Ita enim
pulchrè vitabis, ne quid filum euellendo laceretur.

Lib. 5.

Tempus, &
modus repo-
nendæ futu-
ræ.

De modo conficiendi puluillos, & eorum vsu.

TEmpestiuum autem est, de puluillis (qui vulgaribus chirur-
gis plumaceoli nuncupantur) aliquid obiter dicamus: hi
enim ad multa utiles sunt. Quandoquidem dissolutas ac didu-
ctas partes fulciunt, & comprimunt: membri, quod suæ vni-
onis diuortium patitur, genuinum calorem fouent, & conser-
30 uant. Denique à graui molestoque vinculorum ac fasciarum
pondere, vulneratam particulam tuentur. Fieri autem quon-
dam solebant ex pluma inter duos pannos candidos, & mun-
dos confuta, vnde & nomen illi à veteribus inditum est. Ve-
rùm quoniam eos subindè mutare, & innouare (quod valde re-
diosum erat) cogebat necessitas, magis postea placuit ciuismo-
di puluillos ex stupis canabinis conficere, præsertim diligenter
ac studiose pexis, emundatisque. Fiunt etià interdum ex lana
vel xylo, quod coronem appellant. Plurique autem hodiè lo-
co puluillorum, panniculos admovent leues, id est, non asperos,
40 duplicatos, aut triplicatos: alij verò spongiam adaptant. Por-
rò

Vsus puluill-
lorum.Ratio nomi-
nis.
Materis
puluillorum.

- Numerus.** rō duo, vel tres, pluresve, prout res exposulat, apponuntur. Quandoque, quidem sicci, ac nullo madentes liquore: nonnunquam vero imbuti oui candido, vel vino, vel posca, id est, oxycrato: aliquoties etiā oleo, iuxta ipsius dispositionis exigentiam. Inueniuntur autem huiusmodi puluilli ex triplici differentia, quod ad figuram attinet. Alij enim triangularem, alij rotundam, alij verò quadratam, habent. Qui figura constant triangulari, glutinandis vulneribus (vt placuit Auicennæ) sunt dicati. Ita autem disponi debent: vnus ex vtroque latere orarum, seu labrorum vulneris, cōstituaturs ita, vt super plagam, inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci alijs superponuntur, natiui caloris particulæ læsæ conseruandi gratia, & vt saniosam proluuiem, ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideò apponuntur, vt partem læsam à fasciarum & vinculorum iniurijs vindicent.
- Figura.**
- Triangulares.**
- Rotundi.**
- Quadrati.**

De penicillis siue turundis (quas tentas vulgò appellant) & linamentis formandis, deq; eorum vsu multiplici.

*In quibus
vulneribus
vidē turundis, & linamentis.*

Turundas seu penicilla, & linamenta (quæ & lichinia vocant) maximo esse vñ in curandis vulneribus, & præcedentia luce clarius ostendunt, & omnibus in aperto est. Proinde quando, quomodo, & ad quos fines illis sit vtendum, chirurgus haudquaquàm est ignorandum. Adhæc, ex qua materia, & qua figura formari debeant. Itaque illis vtimur, in octo præsertim casibus. Primo, cum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel cum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: vt in profundis vulneribus, in quibus necessum est alibi vnus aperire, vt ex fundo, & sinu ipsius, ichores, id est, saniosa colluuiæ, inibi collecti vacuentur. Secundo, illis cogimur vt, in cauis vulneribus, in quibus necessaria est carnis deperditæ regeneratio. Tertio, in vulneribus alteratis ab aëre, & sordidis, quæ detersione egēt. Quarto, in vulneribus contusis. Quinto, prædictorum vsus vtilis est, in vulneribus, quæ cum phlegmone, aut quouis alio tumore præter naturam fatigant. Sexto, in vulneribus, quæ per morsus fiunt. Talia nanque vulnera nō sunt festinanter agglutinanda, & ad cicatricem perducēda. Quin potius longo tempore aperta & hiantia manere debēt. Quandoquidē morsus ferē omnis (vt Celsus ait) quoddam virus habet, quod foras semper euocandum est, non intrò repellendum, nec occluso vulnere intus relinquendum. Sed de his fusius in sequentibus dicetur.

*Lib. I.
Omnis ferē
morsus habet quoddā
virus.*

De Plagis, seu cruentis vulnerib. 173

dicetur. Septimo, turundis, & linamentis vimur, in vulneribus, in quibus per sanandis circa ossa manus admonēda est. Octauo, in vulneribus, quæ iam vetustate in vlcera defluxionibus scarificata degenerauerunt. Porro in omnibus alijs reliquis vulneribus, inducendæ cicatrici studemus, absque eiusmodi turundis, & linamentis. Aduertendum autem est, in ijs diuersitatem non paruam esse, pro ratione finis, cuius gratiâ fiunt, & admoventur: fiunt autem interdum, vt diximus, ad detergendas fordes vulnerum, atque tum ex panni non asperi, & præsertim veteris, lacinijs, vel floccis euulsis, formantur. Nonnunquam vero ideo fiunt, & in vulnus immittuntur, vt ipsum hians, & apertum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene pexis, & à fordibus ritè emundatis, vel ex prædicti panni frustulis, efformantur: vel etiam ex xylo (quem cotonem vocant) vt Razes facere solebat. Sed & ex canna ænea, vel argentea perforata fiunt penicilli ad eundem finem: vt verbi gratiâ, in nanibus, ad aeris inspirationem, & in altis vulneribus, vt sanies, & purulenta colluuiò, per hanc velut emissarium feratur, & foras egrediatur, non autem intus retineatur. Quandoque etiam hæc, linamenta inquam, & penicilla, plagæ inseruntur, vt ipsius os magis dehiscat, & amplietur, fiuntque tunc aut ex spongiolis vehementer compressis, & intortis, aut ex radice gentianæ. hæc enim dum multum humorem, quo scæret vulnus, combiberint, turgescunt, & ita magis hiantem plagam reddunt. Cæterum forma linamentorum æqualis esse debet, turundarum vero inæqualis, in modum clauiculi lignei, quem Latini impagem vocant, ne scilicet intro labantur. Hæc autem aliquoties quidem sicca, quandoque vero quoque delibuta vnguento admoventur, prout res ipsa exigat. Reliqua quæ ad eiusmodi operationes spectant, medentis 30 consilio, & solertiæ committuntur.

Vfus, & materia turundarum & linamentorum.

Tente canule.

Impages, cheuille.

De quarta intentione curandorum vulnecum.

Quartæ intentio in curandis recenter acceptis vulneribus est, particule læsæ substantiam conseruare, ac prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptmate (quod vulneribus ipsis accidere solet) infestetur. Hunc autem scopum assequimur, admotis emplastris, & linimentis, ex oui candido, & alijs huiusmodi refrigerantibus, vt rectè docuit Razes, primis saltem diebus. Postea vero vino styptico 40 particula perfundenda, & figura aptissima collocanda est. Apertio

Substantia partis conseruatio.

uo

*Gal. libr. 6.
meth.*

tio quoque eaque interdum ex aduerso in vulnerata parte mori-
lienda est. Neccessaria etiam est nonnunquam sanguinis missio, iré
& purgatio: ut mox docebitur. Sed & proba videtur ratio (quam
statim præferibemus) imprimis est obseruanda, si quantum hunc
scopum cupis assequi. Porro nihil aduersus hæc, quæ commen-
tamur, pugnat, quod plerique obijciunt, vulnera scilicet in qua-
tum vulnera, ijs tam varijs, tamque multiplicibus auxilijs non in-
digere. Hoc enim dictum solum locum habet in paruis occasio-
nibus, & eucratis, id est, bono habitu præditis corporibus. In ma-
gnis verò occasionibus, & in plethoricis corporibus, vel vitio- 10
so succo refertis, neccessum est ad prauorum symptomatum (quæ
recentibus vulneribus superuenire consueuerunt) præcautionē,
prædictis uti auxilijs. Quod Galenus innuere videtur libro se-
xto methodi medendi, his ferè verbis: Fingamus quempiam »
ad nos venire, cui tantum cutis acu sit puncta, hunc hominem, »
si is sit cui facilè [ob bonam corporis habitudinem] vlcera sane- »
scant, etiam si citra medicamentum, nudoque mēbro, ad opera »
consueta dimittas, nihil sentiet mali. Sin ex eorum numero sit, »
qui difficulter sanentur (quia scilicet vel plethoricus sit, vel vitio- 20
sis succis prematur, vel acris sit sensus, vel horum quibusdā, omni-
busne prematur) primum quidem dolebit, post etiā tum pulsu »
particula infestabitur, tum phlegmone. Porro in omni membro »
carnoso, quod suæ viationis solutionem patitur, nerui, venæ, &
arteriæ reperiuntur, quæ praua quædā accidentia inducere pos-
sunt. Nempe dolorem, phlegmonem, sanguinis profusionē, cō-
uulsionem, & id genus alia. Quibus summa diligentia medentē
occurrere oportet. Occurret autem facilè, si ea præsentierit, &
præcognouerit, ut primo libro præfagiorum testatus est Hip-
pocrates, ad hunc modum scribens, Nihil perindē medio cō-
ducibile est, quàm ut futura præsentiat: ita enim (ut Galenus lo- 30
cum hunc interpretans ait) de longinquo obuiam it malis.

De sanguinis detrachione in vulneribus.

*Lib. 4. met.
ex Hipp.*

*In vulneri-
bus prauali-
dis sanguine
mittendū esse.*

Omnis recens factio vulneri (nisi in ventre sit) expedit (in-
quit Galenus) ex seipso statim sanguinem plus, minusve »
effluere. Quippe hoc modo phlegmone minus tentabitur, tum »
vlcus ipsum, tum quæ circumposita loca sunt. Itaque si medicū
imitatorem esse oporteat, non naturæ tantum (ut subinde nos
monet Hippocrates) sed etiam eorum, quæ cum sua sponte ve-
niant, conferunt. In recentioribus autem acceptis vulneribus præscr- 40
tim

tim magnis, & præualidis, expedit (vt diximus) sanguinē effluere: hic certē si minimē, vel minus quā par sit, effluxit, quod deest, ipsi adicias oportet, sanguinem scilicet ex vena detrahendo. Porro trifuriam vulnera, vt & reliqua omnia alia vitia magna grauique redduntur, vt Galenus ait libro quarto methodi medendi: nempe vel propter afflitzæ partis præstantiam, vel propter affectus vim, seu magnitudinem, vel propterea quod sunt cacoëthe, id est, maligna. Cuiusmodi sunt quæcunque in articulis accepta vulnera sunt. Hæc enim doloris, vigiliarum, 10 conuulsionis, & delirij periculum adferunt. Quod scilicet ibi tendones, & nerui, & carne vacua, atque ossa loca sunt. Vulneris igitur magnitudo, vnā cum virium robore, mittendum sanguinem indicat: quanquā qui vulneratus est, prorsus redundantiæ sanguinis sit expers. Quo fit, vt in artis operibus errent, qui in sola sanguinis abundantia, ipsius detractionem consulunt.

Porro nos sanguinem detrahimus, in recentibus, & nuper acceptis vulneribus, non solum ne pars læsa, aut circumposita loca (vt superius dictum est) phlegmone tententur, sed vt impetū quoque ruētis sanguinis cohibeamus, & nimium profluium impediamus. Hi enim sunt præcipui scopi mittendi sanguinis in recentibus illatis vulneribus. Cæterum si perpetuum est, quod ab Hippocrate (vt Galenus ait) didicimus, incipientē (inquam) fluxionem ad contraria trahendam, & reuellendam esse, fixam verò iam in laborante particula, vacuandam esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur, vel à maximè vicina. In promptu nobis, & de sanguinis detractione colligere nunc est, quod in principio hæc est longinquitas, postea ab ipsis exulceratis partibus sit emollienda. Modum verò, seu quantitatem vacationis: tum ex redundantie modo, tum ex copia sanguinis, qui è vulnere effluxit inuenies. Ad 20 hæc ex ætate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine, & ante hæc, ex ipsa laborantis virtute. Venæ autem secandæ electio ex laborate particula indicatur. Vt si vulnus in capite, collo, aut facie acceptum sit, humeralis in cubito, vel manu, secanda est. Si ea non cernitur, media, quæ ex ea deriuata est. Interiorem verò (quā basilicam vocant) incidere vtile est in ijs, quibus inferiores collo partes visque ad renes & vmbilicū vulneratæ sunt. Hæc non comparète, certè media, quæ ab ipsa diducta

in iuncturæ apparet flexura, diuidenda est. Vbi enim vena (vt Galenus ait libro de phlebotomia) quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad mediarum aliquam aperiendam accedis: licet trallianus loquens de Metastasis curatione omnino

Vulnera trifuriam magnam reddunt.

Quæ sanguinem mittendum indicet in vulneribus.

Sanguis cur in recentibus acceptis vulneribus mittatur.

Lib. 4. met. med.

Si fluxio valeret irruat, ad contraria reuellendum.

Modus vacationis ex quibus indicetur.

Vena secanda electio, ex parte vulnerata indicatur.

licet trallianus loquens de Metastasis curatione omnino
dicat. in illis igitur mingi iurabis, ex quacunque parte sanguine detrahit, quæ etiam via simul vacuent: quemadmodum Didag. Hipp. ait. et

*Vene popli-
tis & mal-
leoli, quan-
do secanda.
Semper è di-
recto secan-
da vena.
Aversio à
manu, et ab
altero crure
Si renes, aut
partes cir-
cūpositæ vul-
nus accepe-
runt.*

omnino tibi conandum est, vt eam quæ à propria diducitur, po-
tius incidas. Est verò, & quæ inferiores sunt cubiti iunctura, eas
scilicet quæ in vlna existunt, nihil secare prohibeat, vbi nimirū
quæ in cubito sunt, non appareāt. Sed eas certè, quæ in rectum
sunt, id est, è directo sitæ, & à venis quas in cubito si apparui-
sent, alioqui secassemus, diductæ. Porro quemadmodum prædi-
ctæ omnes partes, vbi sic vulneratæ fuerint, vt sanguinis, ob cau-
sas superius adductas, egeant detractione, in cubito secata vena
iuuatur, vti dictum est: sic quæ renibus inferiores sunt, illis quæ
per poplites, & malleolos decurrunt. Ac perpetuò quidem in
omnibus, dum sic reuellere studes, aut vacuare, & phlegmonem
prohibere, vena quæ è directo est, secanda venit. Manu tamen
vulnerata vti & eadem, incipiente phlegmone, laborante san-
guine valenter, ac nimis copiosè in eā irruente, crus quod è di-
recto est, reuulsionis gratia, tibi scarificadum erit. Altero verò
crurum sic ex vulnere malè habète, reliquū crus scarificabis, aut
in eo poplitis, aut malleoli venam secabis, vel certè potius (vt
consultit Aëtius) ex brachio quod è directo est, sanguinè detra-
hes. Si autem renes, vel partes illis adiacètes, recēs vulnus acce-
perint, quod sanguinis emissionem desideret, vel propter ipsius
affectus magnitudinem, vel ne phlegmone tententur, vena in
cubito interior incidi debet, tamen si renes ipsi ambigāt, quibus
partibus, superioribusne, an inferioribus adscribi debeāt, vt Ga-
lenus annotauit, libro de curandi ratione per sanguinis missio-
nem. Verisimile enim est, plus sanguinis ad ipsos ex superiori-
bus partibus, quàm ex inferioribus confluere. Non negauerim
tamē, quin & ex cruribus sanguis commodè detrahi possit. Cē-
terum in hac re tam ardua, tamque magni in arte medēdi mo-
menti, nihil vnquam moliri debet chirurgus, citra periti alicuius
medici cōsiliū, vt iam alibi semel, atq; iterum monuimus.

De purgatione in vulneribus molienda,

*Alius quan-
do ducenda
in vulneri-
bus.
Purgatio
quando in
vulneribus
necessaria.*

SI vulneratus aluo fuerit adstricta, ea indita glande, aut cly-
steri iniecto subducenda est: vel cassia, aut manna, aut ali-
quo eiusmodi leniente medicamento per os accepto, citanda.
Porro si vitiosi succi in vulnerato corpore subsit abundantia,
vel vulnus præualidum sit, puro etiamnum existente corpore,
& citra cacochymiam, ijs lenibus modò dictis auxilijs nequa-
quàm contentus eris, si saltē Hippocratem ducem sequutus
fueris, & eius interpretem Galenum: sed fortioribus pharma-
cis,

cis, purgationem per aluum molieris. Scribit namq; Hippocrates, & post eum Galenus (qui nec casiam, nec mannâ nouerant) purgationem per aluum his vulneribus valde vtilem esse, quæ in capite sunt accepta: item quæ in ventre & articulis. Præterea in ijs quæ sunt, aut deligantur, id est quæ adeo magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, certe deligatura. Sic autem ad verbum scribit Hippocrates: Purgatio per aluum plærisque vlcærum prodest: præterea vulneribus quæ in capite sunt accepta: item quæ in ventre, tum inferiore, tum superiore (qui sub thorace est) & articulis. Adhæc ijs in quibus ossi caries impendet. Præterea quæ sunt, & exeduntur, & quæ serpunt, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt, per aluum purganda sunt. His itaque verbis (ut Galenus ait, locum hunc Hippocratis exponens) clarè docuit Hippocrates, vlcæribus omnibus, & vulneribus, quoties præualida sunt purgationem esse vtilem. Atqui purgantia medicamenta, quæ Galeno & Hippocrati in vû erant, multo sunt vehementia (ut ex eorum scriptis constat) quàm vel casia, aut manna, vel etiam rhabarbarum, quæ priscorum seculo ignota fuerunt.

Hipp. lib. de viceribus.

Morbi magnitudinem indicat: esse purgatione adhibenda, in vlcæribus.

20 Si ergo illos imitari voluerimus, fortioribus medicamentis corpora non modò in diuturnis vlcæribus, sed in recentibus quoque vulneribus repurgabimus. Quinquàm ea non probentur recentioribus medicis, ob eas causas, quas mox subiungemus. Meminit autem eo loci Hippocrates seorsum, eorum omnium, propter quæ, non modò vulnera ac vlcera, sed etiam reliqua alia omnia vicia, graviora magnaue redduntur. Nempe præstantiæ partis, cacoethiæ, & magnitudinis affectus.

Purgationis igitur in vlcæribus adhibendæ, duæ positiones sunt, veluti & missionis sanguinis, indicationes. Nempe morbi magnitudo (quam omnium primus adinuenit Hippocrates) & vitiosi succi abundantia, quod Galenus quarto methodi medendi ijs verbis expressit: Purgatio non in sola vitiosi succi abundantia conuenienter suscipitur: sed sicut vitio sanguinis, vel propter ipsius abundantiam, vel propter morbi magnitudinem, ita purgatio, & propter abundantiam alterius cuiusquam succi, & propter vim morbi adhibetur. Igitur cum in vulnerato corpore vincit sanguis, eius redundantiam venæ sectione statim vacuabis. Cum verò succorum vitium abundat, pharmaci adhibebis, quod ad flauam bilem, vel

Duæ purgationis in vlcæribus adhibendæ, indicationes.

Vim morbi,

Succorum abundantia

Vomitum in

40 atram, vel pituitam educendam vim habet. Sed & per vomitum

*vulneribus
utilis.
Lib. 4. Ther.*

*Scopus alius
purgationis
in vulneri-
bus.
Antispasis.*

tum quandoque vacuationem molimur in ipsis vulneribus, si
saltem Galeno assentimus. Si enim (inquit) fluxio valèter irruat,
reuellere, ad contraria studebimus, utiq; si in superioribus vul-
nus consistat, per inferna purgantes. Sin autem in inferioribus
sit, superiorem ventrem vacuantes. At si iam fluxio restitit, atq;
in membro inhaerit, denuare per vicina magis expedit. Quibus
verbis nos docet Galenus, purgationem interdum adhiberi in
recentibus vulneribus reuulsionis ad contrarium (quam Græci
antispasin vocant) gratia. Quæ etiam conuenienter, suscipitur,
tametsi nulla in corpore subit viniolæ succi abundantia, quam ro
vacuare intendamus.

De potionibus, quæ vulneratis exhiberi consueverunt.

*Valètia me-
dicamenta
purgantia in
vulnerib. re-
centibus su-
specta esse.*

Q Vanquàm autè Galenus, & Hippocrates, purgationem
in vulneribus, per valida etiam medicamenta quæ suis
temporibus in vñ erant, adhibendam esse præcipiant:
Nos tamen eiusmodi valentibus medicamentis, in recentibus
vulneribus nec vti consueuimus, nec cuiquam vtendū esse con-
sulimus. Sicuti neque alijs potionibus, quas nonnulli recens vul-
neratis propinant. Quandoquidem purgantia istiusmodi medi- 20
camenta, & pocula (vt sic dicam) vulneraria, quæ communiter
offeruntur, facultate calida sunt, & aperientia. Proinde & san-
guinem commouent, & hæmorrhagiam concitant, vulnusque
ad inflammationem atque abcessus disponunt. In diuturnis tam-
en vlceribus, fistulosis, & cancerosis, illis audent vtiri. Ad hæc,
cum sanguis in interaneis in grumos concreuit, & cum pu-
rulentæ colluuiæ, in pectore collecta est. In glandulis quo-
que interioribus, strumis, ac hernijs, seu (vt dicunt) crepaturis,
vt suis locis dicitur, quandoque purgationem concedimus. Qui
tamen Guidonem præcesserunt chirurgi, vt Rogerius, & qua- 30
tuor illi famati magistri, in omnibus indiscriminatim vulneri-
bus, iridem & in fracturis omnibus potiones offerebant, conse-
cras ex rubia, seu erythrodano, quam vulgò rubeam maiorem
vocant (ex qua plus quàm ex cæteris assumunt) tanacetæ, seu
athanasia, cannabæ, brassica rubra, myrrhidæ (quæ species est ge-
ranij, vulgò herba Roberti nuncupata) geranio altero, qui no-
stris herbarijs pes columbiris appellatur, symphyto, quâ aperta
significatione (licet non satis concinnè) posteriores Latini con-
solidam vocant: plantagine, cyneglossæ, hoc est, lingua canis,
pinpinella, elatine, quæ pilosella vulgò nominatur, caryophylla- 40
ta, &

*Potio in vul-
neribus, &
fracturis à
quibusdam
exhiberi so-
lita.
Herba Ro-
bertina.*

ta, & consumilibus. Ex quibus quidem succum exprimebant, vel ea in aqua, vino, & melle, decoquebant. Et vnoquoque die, ex succo aut decocto ipsorum, quantitatem sescuncie, id est, vnciae vnius & semis, manè ieiunis offerebant. Super vulnus verò manè etiam, & vesperè, folium brassicæ rubentis inuersum apponebant, & facta decenti ligatura, manè rursum, & vesperè ipsum commutando, ita relinquebant. Asserunt autem eiusmodi Empinci vnum, quod ego planè ridiculum iudico. Nempe quòd si potio assumpta, vomitione rejiciatur, sinistrum quid portendi. Si verò eam ventriculus continuerit, & talis per plagam egrediatur, qualis per os assumpta est, faustum, ac bonum quoddam omen portendi. Sed hæc, si dijs placet, vera sunt. Cæterum in maiore adhuc errore versantur, Theodoricus, & Henricus, qui receter vulneratis, præsertim in capite, & pectore, fortissima quædam & calidissima pigmèta (ita enim vocant potiones quædam ex melle, vino, & puluere res multas vehementer calidas recipiente, compositas) cum quibusdam exorcismis, seu adiurationibus propinabant, aut ex ijsdem rebus veluti puliculam conficiebant, quam in modum emplastri super lintecolum 10 extensam, vulneri apponebant.

Modus & tempus potionis exhibende.

Fabulosum.

Error Theodo. & Henr. Vide Theod. lib. 2. sue chirurg. ca. 3

De ratione victus in vulneribus, & continui salutis, obseruanda, à medico prescribenda.

Vulneratis primis septem diebus (intra quos vt plurimum securi esse solèt à febre & inflammatione) victum tenuem, & parcum, frigidum quoque, & humidum, præsertim si iuuenes, & plethorici fuerint, atque ambiens calidus, instituito.

Vinum omnibus, dum febris, dum inflàmatio est, interdicito.

Vinum.

A carnibus duris, & valentibus, piscibus magnis, & prauum succum generantibus, pane non fermentato (quem azymum vocant) malè subactò, & improbè cocto, eos arceto.

Carnes.

Caseum, præsertim salsum, & veterem, fructus ferè omnes, allia, cepas, sinapi, salita omnia, & acria, nec non species omnes aromaticas, ne gustent, admoneto.

Cusens. Fructus, etc.

Perdices autem, pullos, atque auiculas, quæ in dumeris versari solent aqua rosarum alteratas, prissanam hordeaceam, quam vulgò hordeatum, & hordeum mundatum appellant: item iac amygdalinum, & quod auenatum vocant: iura quoq; carniū simplicia, aut cum ouis præparata, illis in cibum permittito.

Auicule. Prissana hordeacea.

40 Ex clementibus, lactucam, portulacā, boraginem, (quæ buglossum

Olera.

est hortulanum (præterea olus, quod Arabes aspanar, nos verò nomine parum mutato, spinacium, & spinargium dicimus, & alia id genus, illis concedito.

*Aqua pro
potu.*

Aqua cocta illis potus esto: sed in qua cibariorum panis, qui Græcis syncomistos appellatur, vel plurimum furfuris habens, sordidus dictus, maceratus fuerit. Vel eius aquæ simplicis loco, cremor ptisanæ, aqua hordei, vel (si debiles, aut senes fuerint) vinum aliquod stypticum, id est, austerum, quod crassæ sit substantiæ, plurimam aquam dilutum: aut si tenue concedatur, illud sit oligophoron, id est, parum aquæ sustinens. 10

*Cena.
Frictio.*

Breuiem, ac frugalem illis cenam imperato.

Leuem frictionem, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere, adhibeto.

*Quies.
Motus.*

Vt quiescant, iubeto. Optimum enim illis (inquit Celsus) medicamentum quies est. Moueri autem, & ambulare alienum est, sed ijs præsertim, qui in inferioribus partibus vulnerati sunt.

Vt venerem summopere deuitent, submoneto.

*Venus.
Affectus ani
mi.*

Item iram, cōtentionem, & omnes vehementes, animi motus. Cæterum ubi vulneratus à phlegmone, & abscessu fuerit affectus, plenioris victu tutò uti potest, & ad pristinam consuetudinem paulatim redire. 21

*Victus paulo
plenior,
quando vul-
neris con-
cedendus.*

Vtatur igitur tunc vino aliquo generoso, & carnis probum sanguinem generantibus, ac naturam, hoc est, vires refocillantibus. Cuiusmodi sunt carnes gallinarum, caporum, & veruecum, seu castratorum arietum, & quæ eius generis sunt. Quod autem talis victus ratio utilis sit, & accommodata vulneratis, ex eo comprobatur, quoniam virtutè fulcit, & corroborat, neque febrem commouet. Sed nec phlegmonas, nec hæmorrhagiâ concitat, ac præter hæc, alimonium utile & cōueniens sumministrat. Proinde hanc summopere cōmendant, in recens

*Vulnerati à
vino per in-
iuria absti-
neant.*

acceptis vulneribus, tum celebres medici, ut Galenus, Haly, Razes, Auicenna: tum etiam recentiores chirurgi, Brunus inquam, Guilhelmus à Salliceto, & Lanfrancus, à quorum sententia, & opinione desciuerunt, Theodoricus, & Henricus, qui ab initio diæ-

*Vires in mor-
bis non esse
augendas,
sed dun-
taxat souen-
das, & ser-
uandas.*

ram vinosam, & calidissimam vulneratis præter rationem impe-
rabant. Aiebant enim vulneratorum imbecillam virtutem pro-
tinus firmandam, ac roborandam esse, idque vini potione com-
modè præstari. Quorum nimirum sententiæ in totum aduersatur Gal. lib. I. Aphor. com. 4. sic inquit, In ægrotantibus raro
accidit, ut robor corporis maius reddere, quam acceperimus, stu-
deamus. Magna verò ex parte properamus in longis quidē mor-
bis,

- α bis, fouere vires: in acutis verò parùm debilitatas cōseruare. Et
 α subdit: Nam si eas tales, quales accepimus, properemus in istis
 α seruare, vel etiam augere, semper addemus ad morbum. Quibus
 verbis apertè docet Galenus, non semper vires in ægris augen-
 das esse, aut roborandas, sed satis esse interdum, si eas cōserue-
 mus, & fulciamus. Nisi forsàn adeò imbecillæ, ac prostratæ fue-
 rint, vt quæ ab illis sumitur indicatio, cæteris alijs indicationi-
 bus sit præferenda. Quod sanè in omnibus vulneribus non
 contingit. Adde quòd vbi contrariæ, & ex aduerso pugnantes
 10 inter se sunt indicationes, committendū non est, vt dum alteri
 nimium sis intentus, alterius omninò obliuiscaris, sed vtriusque
 memor, quoad licebit, miscere eas oportet, vt libro septimo me-
 thodi medendi Galenus nos edocuit. Quod præceptum (in-
 quit) vbique memoriâ teneri velim. Vnde & circa finem octau
 prædictæ methodi sic insit. Ergo tum exercitatum in omnibus,
 tum naturâ prudentem esse medicum conueniet: quò cuiusque
 indicationis potestate diligenter considerata, omnibus inter se
 collatis vnâ idonei victus summâ, quæ laboranti sit commo-
 da, comparet. Itaque, vt semel dicam, vulneratis per initia, vsq;
 20 ad diem septimum (intra quod tempus ferè solet phlegmone in
 locis vulnere affectis excitari) vini vsus interdici debet. Nisi ta-
 men ex largo sanguinis profluuiò, viribus destituti, intermo-
 rientes appareant. Tunc enim ante vllam curationem (vt Cel-
 sus ait) vino reficiendi sunt, quod alioqui inimicissimum vul-
 neri est. Transacto verò die septimo, illis (si nihil aliud probi-
 bear) innocuè vinum modicum, & aqua multa dilutum, exhibe-
 ri potest. Nam si ad hunc vsque diem nec phlegmone tentetur,
 nec dolore afficiatur, in posterum tutus erit. Atq; hæc de quar-
 ta intentione, quæ læsæ particulæ substantiam cōseruandam
 30 esse indicabat, dicta sufficiant.

Therap. 7.

Gal. 8. meth.

Vini vsus in
terdicendus
vulneratis
vsq; ad diem
septimum.

De quinta intentione, qua medico chirurgico proponitur in
curandis vulneribus, qua est symptomatum correctio.

- Q Vintam intentionem, quæ est accidentiū superuenien-
 tium correctio, & profligatio, assequimur, remedia cui-
 que propria, prout res desiderat, adinouendo. Symptoma-
 mata autem seu accidentia, quæ consueuerunt euenire post
 accepta vulnera, & solutam vñionem, hæc ferè sunt: Do-
 lor, phlegmone, dyscrasia seu intemperies, febris, pruritus,
 40 conuulsio; paralysis, syncope, mentis alienatio seu delirium,

Symptomata
tū correctio.

Symptoma-
ta, quæ vul-
neratis acci-
dunt.

Symptomata interdum curationem peruertunt.

durities, atque impotentia membri vulnerati. Itaque vulnera nunquam ad integram curationem perducere possunt, nisi eiusmodi symptomata prius abigantur. Symptomata enim quæ magnitudine superant suas causas, ordinem curationis sæpè peruertunt, immutant, atque interpellant: vt lib. I. ad Glauconem, & 12. metho. med. Gale. annotauit. Itaque opera præcium duximus, de horum singulis, ordine, & continuata serie pertractare, à dolore sumentes initium.

De sedando dolore in vulneribus.

10

Dolor phlegmas et fluxiones concitat.

Dolorem sedentia in vulneribus.

Dolor omnis, præsertim vehemens, etiam si purum ab excrementis totum corpus fuerit, fluxionis causa est. Particula namque quæ dolore affligitur, succum, atque in vulnere sanguinem maxime ad se trahit, copiosiores scilicet, quam sit illi ex usu: unde & phlegmone in ea frequenter excitatur. Proinde summa cura protinus adhibenda est, vt dolor demulceatur, ac in totum, si fieri potest, sedetur. Dolorem autem commodè sedamus in vulneribus, aut saltem mitigamus, facto ad particulam læsam fotu, vel ex rosaceo, si præitò adfuerit, vel si eius copia non sit, ex oleo communi, quod modicè incaluerit. ²⁰ Quibus si oui candidum, vel potius luteum (vbi magna non fuerit inflammatio, seu vehemens caliditas) adijciatur, præstantius adhuc auxilium efficies, neque ita vulnus inquinabis. Quod si tam vehemens dolor extiterit, vt necessitate coactus fueris, aliquantulum vulneratam, ac dolentem particulam stupefacere, oleum papauerinum adinoueabis. Et si maior cogat necessitas, opij momentum, vel mandragoræ (vt quidam rectè consuluerunt) adijcies. Quatuor illi celebres magistri ad eum finem laudant radicem solani, tritam, & axungia porci exceptam. Theodoricus plurimum commendabat emplastrum ex folijs ³⁰ maluæ coctis, & in mortario contritis, cumque fursuris cribratura commixtis. Quod si rosacei momentum prædictis adieceris, melius adhuc medicamentum reddideris. Medulla etiam panis triticeæ in aqua feruente macerata, ad sedandos dolores (vt suprà diximus) efficacissima est. Porro si dolor admodum vehemens est, nec vlis, quantumuis generosis, auxilijs mitigetur, neruum tunc læsum esse significatur. Proinde tunc ad ea quæ postea ad vulnera neruorum scribuntur, tibi recurrendum erit. Sed de ijs, quæ dolorem leniunt, iterum ac multo fusius libro sexto agemus.

Emplastrum Theodor.

Rosaceum.

Medulla panis.

Curatio

40

Curatio aduersus vulnerum inflammationes, & abscessus.

Inflammatio in vulneribus tum maximè timenda est, cū vel os, vel neruus, vel cartilago, vel musculus, læsionem accepit, aut vbi parū sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit: adeo, vt si parū fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat: vtiq; (inquit Celsus) si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. Nam percussus punctusve, præsertim in eius capite, mortiferus est: præcisus verò per transversum, sanitatem recipit, hoc est, ab inflammatione, & conuulsione vindicatur. Aliquis tamen ex particulæ moribus vitabitur. Verum melior est (vt Galenus ait) læsio, quàm mors. Sic & neruum punctum sæpe cogimur transversum præcidere, quoties scilicet vel conuulsiones, vel deliria, vel ambo magna ægreque sanabilia superuenire vulnerationi cernimus. Porro si iam inflammatio, aut tumor aliquis præter naturam, in vulneribus concitatus fuerit, curari debet iuxta methodum superiore libro à nobis traditam, in quo de tumoribus præter naturam abudè disseruimus. Cæterum tametsi pro locorum differentia (vt libro primo de locis affectis Galenus ait) curationem quoque variari contingat, Auicennas tamen omnibus indiscriminatim partibus à capite ad pedes, emplastrum mirè ab eo commendatum admonet, quod constar malo Punico dulci, incocto in vino styptico, & postea in mortario subacto, atque in emplastri formam redacto. Cæterum si enatus tumor nec reprimenti bus, nec per halitum digerenti bus medicamentis cesserit: pus mouētia seu maturantia, admouenda erunt. Cuiusmodi ea sunt, quæ ad maturanda apostemata supra retulimus. Huius rei gratiā iubet Rogerius fieri forum ex maluis, absinthio, arthemisia, & farina triticea, vino incoctis, quibus & mellis momentum adijciendum est, axungia verò quod satis esse videbitur. Quod si pus per vulnus non vacuetur, aliud loco commodiore: illi molliendum erit emissarium.

Inflamatio quibus maxime vulneribus accedit.

Lib. 5.

3. metho.

Melior est læsio quam mors.

Emplastrū Auicennæ, ex malo Punico dulci.

De tollenda in vulneribus intemperie, quam discrasiam vocant.

Si calida adsit intemperies.

Si flammea quædam citra humorum affluxum dispositio, quam discrasiam calidā vocat, vulnus occupauerit (quod ex

*Si frigida in
temperies
vulnus ob-
federit.*

*Horū vng.
descrip. ex
lib. 6. requi-
renda sunt.*

*Si febris vul-
nerato acci-
derit.*

Lib. 5.

rubore & vesicatione facile deprehendes) affectum locum in-
frigidare oportet, non hyoscyamo quidem, aut mandragora,
quoniam plus iusto refrigerant: sed rosis potius, & plantagine,
atque vnguento albo, quæ præter id quod deficcant, moderatè
etiam refrigerant. Si autem frigida intemperies locum obse-
derit (quam mollicies, & cutis liuidus color ostendunt) ipsum ex-
calfacies, non resina, vel pice, aut asphalto, quod dæmonis ster-
cus appellant: sed vino, & vnguento nigro, aut fusco, vel eo, quod
basilicon vocant. Quod si eiusmodi symptomata vulnus, seu
plagam degenerare faciant in vlcus, recurrèdum erit ad ea, quæ
de vlcibus sequente libro traduntur. Porro si humida vel sic-
ca adfuerit intemperies, suo quoque cōtrario profiganda erit.
Et ita de compositis intemperiebus ages, vt suo loco postea di-
cetur. Quod si febris vulneratum apprehendat, victu refrige-
rante, qualem in calidis præter naturā tumoribus descripsimus,
laborans vti debet. Sed acceriscendus erit huius rei gratiā peri-
tus aliquis medicus, qui & congruam illi victus rationem præ-
scribat, & reliqua ad febrem auxilia ex arte instituat, habita ra-
tione ætatis, temperaturæ, regionis, temporis, consuetudinis, &
id genus aliorū. Cæterum ne febris quidem ipsa terrere debet,
si in magno vulnere, dum inflātio est, permanet. Illa verò per-
niciosa est Celso, quæ vel leui vulnere superuenit, vel ultra tēpus
inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorum ri-
gor, aut distentio, quæ ex vulnere orta est, eam non finit.

De spasmo, id est, conuulsione vulnere accedente.

*ut cons. p. 4 ex
jac. probe, pro
ratio q. 3. 1. 2. 3.*

*Spasmus quo
modo fiat
Galeno.*

*Spasmus
quid.*

Spasmos Græcè, conuulsio Latinè est, vbi nerui, atque mu-
sculi præter voluntatem conuelluntur, in eamque dispositio-
nem veniunt, quam etiam in motibus secundum arbitrium fa-
ctis assumpserunt. Per hunc enim affectū, actio nequaquā abla-
ta est, vt est in paralyfi, sed solum immutata, ac vitiata, vt abun-
dè testatur Gale. lib. 5. de symptomatum causis, ad hunc modū
scribens, si Græca saltem Latina feceris: Conuulsio neruos, »
musculosq; ad eundem cogit affectum, in quē ab animali facul-
tate cum naturalem habitum seruant, ducebantur. Vt igitur »
voluntarius motus interim intentis versus principium, id est, ce-
rebrum, musculis, interim ab irruēte spiritu impletis perficitur, »
ira conuulsio quoque accidere solet. Nam & spiritus inflare po-
tens, in ipsis generatur, & complures etiam affectus, qui illos »
intendere queant, quemadmodum phlegmone. Itaque spasmus 41
fiue

sue conuulsio, motus est deprauatus, voluntariæ facultati motrici accidens, à solo morbo (vt ibidem ait Galenus) seu morbo-
sa dispositione proueniens. Proinde & nervosa est ægritudo,
qua mouentur lacerti, id est, muscoli, ad suum principium, & ex-
tensionem sunt inobedientes: vt tertio canonum annotatur ab
Auicenna. Neque enim ad syndesmos, id est, copulas, seu liga-
menta, conuulsio, sicuti neque paralytis, propriè refertur: sed vt
Galenus ait tertio de locis affectis: eorum neruorum qui volun-
tatis imperio obediunt, affectio est. Auerrois spasmodum defini-
uit, cum membra sic contracta & rigida facta sunt, vt neque fle-
cti, neque extendi quouis modo possint. Porro omnes conuulsio-
nis causæ, seu affectus omnes, qui conuulsionem pariunt, Gale-
nus, & Hippocrates in duo capita reuocarunt: nempe in ple-
nitudinem, & inanitionem, corporum videlicet neruorum, à

*Conuulsio so-
lius morbi
est opus.*

*Fen. 2. tertij.
cap. proprio.*

*Libr. 5. de
symp. caus.*

*Et 3. de locis
affectis.*

*Dua in vni-
uersam con-
uulsionem cau-*

sa.

*Galen. &
Hippo.*

- quibus secundum electionem motus perficiuntur. Itaque phleg-
mone, id est, inflammationes, plenitudinem pariunt: ardentissi-
mæ, & aridissime, febres, inanitionem. Sed nervosa corpora om-
nia (inquit Galenus) tendi posse, siue oppleta sunt, siue inanita,
declariant musica instrumenta. Etenim rumpuntur chordæ, siue
in humidum, vaporibusque scatens, siue in aridum squalensque
cubiculum, intensis etiam dum chordis, instrumeta collocaueris.
Proinde huius rei haud ignari artifices, eas priusquam repo-
nuntur, laxare solent. Sed quomodo affecto aëre tenduntur chor-
dæ, vt rumpantur, si vel nimis aridus, vel admodum humidus
sit: Nempe humor madefacit ipsas, vt in tumorem præter natu-
ram attollantur, qui mox eas extendit. Ac veluti sol tergora are-
faciens ipsa contrahit, ita siccitas chordas, & trahit, & extendit.
Sic lora quoque cum ad ignem exsiccantur, contrahi, tendique
videntur. Tertium caput seu tertiam causam addit Auicen-

*Tertio de
locis affectis.*

*Ita patet p.
nota 1. con-
suetudine fiat p.*

- nas, quæ tametsi materiæ haudquaquam, saltem per initium,
proportione respondeat, noxam tamen (inquit) contristantem
cerebrum inducit. Proinde nerui, hanc ceu molestum quidpiã
refugientes, contrahuntur, & ad suam recurrunt originem, ad-
nitunturque inter turbantem causam ipsam expellere. Qui Bar-
barum sectantur medicinam, spasmodum non proportionatum ad
materiam nominant: quia scilicet non accidat ob materiã, quæ
implere, aut inanire partes nervosas possit, sed praua potius ali-
qua qualitate. Tribus igitur modis fit conuulsio, inanitione, re-
pletione seu plenitudine, & compatiendi societate, hoc est,

*Tertia cau-
sa conuulsio-
nis, addita
ab auic.*

*Conuulsio
tribus mo-
dis accidit.*

- cerebro lege commertij patiente, & alteratis per continuatio-
nem

nem partibus, ut contingit in conuulsione, quæ sit ab ictu feræ cuiusdam venenatæ. Primus modus, qui scilicet fit propter euacuationem seu inanitionem, accidit in superfuiis purgationibus, & in copiosis, atque immoderatis sanguinis profusionibus: quem conuulsionis modum (si quidem accepto vulnere acciderit) malum ac periculosum esse testatur Hippocrates, hoc Aphorismo: Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens, malum. Crebrò enim mortem adferunt. In magis quoque, ac vehementissimis ardoribus, & adurentibus (ut dictum est) febribus, ac colliquante putrilagine, hic conuulsionis modus, euenire consuevit, malum sanè maximum, & penè insanabile, ut Galenus annotauit in cōmentario illius aphorismi Hippocratis, Febrem conuulsioni superuenire, melius est, quàm febre conuulsionem. Secundus conuulsionis modus fit propter inflammationem, & alios tumores præter naturam (quos omnes *οἰδηµατα* vocat Hippocrates) in vulneribus de repente disparentes seu euanescentes, ut in fine quinti Aphorismorum hac sententia testatus est idem Hippocrates: Quibus tumores in vulneribus apparent, non conuelluntur maximè (id est, non admodum, seu non valde spasmo corripuntur) neque insaniunt. Verù his delectis, atq; euanescentibus, de repente qui busdā à tergo, siue retrò, cōuulsiones & distensiones sunt: quoties scilicet (ut in cōmentario ait Galen.) vulnera ponè, id est, à tergo infestant. Immoderata quoque frigiditas neruosis partibus adueniens, hoc conuulsionis genus inuehit, neruos enim in vnum cogit, supat, cohibet, atque implet. Quod & hoc aphorismo expressit Hippocrates. Frigidum, conuulsiones, distensiones, liuores, rigores febiles [inducit, supple, vel adfert.] Sicut enim nequaquàm conuenit, neruos ipsos, seu ipsorum neruorum substantiam, ab immodico calore dissolui, sic neque plus iusto, & ultra modum conuenientem, refrigerari, subfringi, & in vnum cogi, ac supari. Tertius conuulsionis modus dolore excitatur, cuius communis causa est, autore Platone in Timæo, pathos præter naturam, violenter, & asfatim incidens. Ab his enim (inquit Hippocrates Platone vetustior) quæ naturam mutant, ac corrumpunt, dolores excitantur. Hac quidem vocula (corrumpunt) & celeritatem, & vehementiam transmutationis indicans. Porro vehementes eueniunt in tactu, (qui inter reliquos sensus dolore maximè afficitur) & naturali habitu transmutationes, ob violentiam.

Aph. 3. li. 5.

Secundus conuulsionis modus ex repletionem.

Frigus conuulsionis causa.

Aph. 17. li. 5.

Tertius conuulsionis modus ex compatiendi societate.

Doloris causa.

violentum calidi, frigidiq̃ue occursum, atque ob eas res, quæ contundere, secare, pun gere, extendere, aut erodere possunt. Quippe res huiusmodi dolorum causæ reputantur. Nervosarum igitur partium punctura, acres quoque, & mordaces humores, aut venenosa aliqua qualitate præditi, in vulneribus modum hunc tertium convulsionis substantiam diuellendo excitant. Quod de punctura diximus, testatur Galenus libro ar-

Cause convulsionis ex consensu cerebri factæ.

«tis medicinalis cap. nonagesimo secundo, sic inquit: Nervi ve
«rò & chordæ punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam
«hæc pars principio, hoc est, cerebro continuatur, prom-
«pta est ad nervorum convulsionem excitandam. Ac tum præ-
«sertim, cum nihil extrorsum expirat, obsecrato cutis vul-
«nere. Hætenus Galenus. Acres autem, æruginosos, & ve-
«nenosos succos per consensum, & velut quadam partium con-
«spiratione convulsionem inducere, ostendit Galenus in com-
«mentario huius aphorismi Hippocratis, Convulsio ex elleboro
«lethalis est. Verum convulsionem istam, quæ accidit ijs, qui ab
«elleboro albo (hunc enim simpliciter elleborum nominare con-
«suevit Hippocrates) purgati sunt, non absurdè ad secundum ge-
«nus convulsionis (quod fit ex inanitione) quispiam adduxerit.
«Quandoquidem humores ipsi acres, & mordaces, vim habent
«exiccandi, atque inaniendi. Contingit autem & propter ipsam
«euacuationem, citra mordentes succos, ijs, qui supra modum per-
«purgantur, convulsionem aduenire. Fit enim ob pharmaci, seu
«purgantis medicamenti functionem, vim, atque efficaciam, ut
«ex nervis humiditates attrahantur, & ita resiccata violentius
«ipsorum nervorum substantia, convulsio enascatur. Sed & per
«vomitiones, quas veratrum eorum concitat, accidit, morius
«ratione, convulsiones fieri, ex consensu videlicet, communi-

*Convulsio ex elleboro a-
pho. 1. lib. 5.*

«ratuque, & velut quadam partium conspiratione: nempe per-
«pessis, ac distentis nervis, qui ventriculi hostiolo, seu orificio
«cõsentiant. Sic quoque in vulneribus consortij lege contingit
«subinde convulsionem fieri, excitato in nervosis corporibus
«(a quibus motus secundum electionem perficitur) dolore. Sunt
«autem nervosæ partes, motui voluntario, ac secundum electio-
«nem & desiderium factæ serviientes, nervi, ligamenta, muscu-
«li, & tendones. Hæ igitur, & potissimum nervi, ubi ingenti ali-
«quo dolore afficiuntur, cerebrum ipsum (quod est nervorum
«omnium communis origo, ut in arbore caudex, ramorum) hu-

*Purgans me-
dicamentum
interiù con-
vulsionem in-
ducit.*

*Partes mo-
tui voluntæ-
rio familiæ-
res.*

«ius noxæ consors statim efficitur, sique (ut dixi) propter

com-

Cōuulsio duplex.
Vniuersalis. compariendi societatem conuulsio, quam non debemus existimare fuisse ab Hippocrate prætermittam. Etenim conuulsionē quæ infestet primaria ratione explicuit, dum fieri conuulsionē vacuatione seu inanitione, repletionēque sanxit. Ceterū ex præfatis conuulsionibus, quædam sunt vniuersales, quædam vero particulares. Vniuersalis conuulsio dicitur, quando noxa cerebro communicatur, & ad ipsum peruenit. Vbi autem noxam illam senserit, tanquam molestum aliquid, vehementi conatu eam nititur expellere. In quo quidem conatu nervos ipsos, & alia nervosa corpora contrahit, & conuellit. Particularis verò ¹⁰ conuulsio fit, quando noxa non peruenit ad cerebrum, sed in particula affecta remanet, ipsam contrahens, atque incuruans.

Particularis. Ideo autem conuulsiones vniuersales dicuntur, quia maiorem partem membrorum occupant. Quod quidem dictum est ad differentiam epilepsię, quam comitalem morbum vocamus. Hæc enim partes omnes apprehendit, atque ideo conuulsio totius corporis, seu omnium corporis partium merito dicitur, non iugis tamen ac perpetua, (vt in emprosthotono, & opisthotono, atque tetano, id est, nervorum rigore videre est) sed quæ ex temporum accidit intervallis, hoc est, quæ interpellata est, atque intermissa, cum mentis ac sensuum oblatione, in quo & iam dictis conuulsionū generibus discriminatur. Accidit namque, vt is qui comitiali morbo conciderit, neque videat, neque audiat, neque vllō sensu quicquam percipiat, ac ne cōsequi quidem possit, quid factum sit. Siquidem cum memoriæ viribus, ratio quoque læditur, vt libro tertio de locis affectis Galenus annotauit. Hæc autem in spasmo de quo nunc agitur, minimè solent accidere. Ceterū accuratius atque exquisitius conuulsionis differentias, causas, & generationis ipsius rationem ac modum perquirere, alterius est speculationis. Proinde ad præsens ea cō- ²⁰ sultè omitemus. Satis enim chirurgus nunc fuerit, si quæ de conuulsione diximus, probè intellexerit: si & tum communia, tum particularia differentiarum ipsius signa cognouerit, ac periculo so huic symptomati (ne accepto vulnere aliquando eueniat) prospicere atque occurrere possit, & iam præsens remedijs topicis, accommodis, & ex arte institutis profigare.

Quo differat spasmus ab epilepsia.

De signis spasmi.

Communes nota conuulsionu.

Communes conuulsionis notæ, sunt ægra seu difficilis membrorum dimotio, colli tensio, labiorum contractio, ac si ⁴⁰ vellent

29. rous

vellet ridere: maxillarum, dētrium, & gutturis adstrictio siue stri-
ctura: oculorum, & totius faciei (vt dicunt) tortura seu peruer-
sio. Si conuulsio ex inanitione apprehenderit, non repente, *Signa con-*
sed paulatim, ac post morbos corpus extenuantes, omnemque *uulsionis ex*
eius humiditatem absumētes, accidere solet. Vt exempli gratiā, *inanitione.*
post largos sudores, aut vomitiones immoderatas, aut alui deic-
tiones copiosas, aut immodicas sanguinis profusiones. Itē post
famen, vigilias, sollicitudines, motus tum multos, tum vehemē-
tes, aridas aestuantesque febres. Cū enim hæc, & alia (si quæ
10 sunt) id genus, conuulsio subsequitur, causam eius esse aridita-
tem, ex inanitione rectē putaueris, vt Galenus annotauit libro
tertio de locorum affectuum notitia. Si verò ex sanis alicui re-
pentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse
est: & maximē quidem, si id vitij euenire sic repente consue-
ris, temulento cuiquam, ac omnino pleno homini, qui videlicet
in ocio degit. Item si post tumores aliquos præter naturā subi-
tò deletos, atque (vt paulò antè dictū est) euanescentes, vel post
frigiditates condensantes, atque in vnum nervos cogentes, ta-
mum alicui sic repente conuelli contingerit: equidem nerui re-
20 plentur à frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiam nu-
triantur, vnde conuulsionem patiuntur. Itaque his præcogni-
tis, ac diligenter perpenſis, haud difficile inuenta fuerit, vtrum
ab ariditate, quæ est humidæ essentia defectus, & vacuatione,
seu inanitione: an ab humoris plenitudine, quæ egestati, seu ino-
pia, & inanitioni aduersatur, & ab Hippocrate repletio nomi-
nata est, affectus ipse prodierit. Spasmi autem, qui pro- *Spasmi ex*
pter compatiendi societatem, hoc est cerebro consortij le- *consensu cere-*
ge, seu (vt dicitur) per consensum affecto, nascitur in *bris notæ.*
vulneribus, ijs notis deprehendes. A causis externis excita-
30 tur, cum dolore, morſu, & molestia affligit, ac crudeliter la-
borantem excruciat.

Spasmi iudicia, seu presagia.

SI conuulsionis noxa, membris spiritalibus, ac respiratori
subseruientibus communicerur, tum scire licet, ægri salu-
tem esse deploratam, ac subitam mortem futuram. Spasmi
absolutus, seu (vt dicunt) confirmatus, præsertim si ex inani-
tione est, & nervorum siccitate, prorsus incurabilis est. Absolu-
ta enim siccitas, & prorsus consummata, insanabilis est Galeno
40 libro methodi medendi septimo. Quod si ex siccitate non
prorsus

*Presagia.**Conuulsio ex
consummata
siccitate.*

Conuulsio ex siccitate nō prorsus absoluta. prorsus adhuc consummata, conuulsio enascatur, interdum (sed vix, ac non facile) curationem admittit. Longum enim tempus (vt in commentario sequentis aphorismi Galenus ait) exigitur ad siccitatem remouendam. Atqui morbi acuties ac vchemētia tempus non expectat, quin citò vires dissoluit, & subito exitum adfert. Quæ verò ex repletionē fit

Conuulsio ex repletionē.

Aph. 26. li. 2.

Conuulsio ex febribus adurentib.

conuulsio, sanabilis est, per euacuationem. Repletioni enim contraria est euacuatio. Quod & sequenti aphorismo innuebat Hippocrates, Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm febris conuulsionem. Febbris enim conuulsioni ex repletionē superueniens, humores frigidos, & glutinosos, ex quibus orta est ipsa conuulsio: solita est magna ex parte excalfacere, attenuare, atque dissoluere. Si verò ex febribus adurentibus totum corpus exiccetur, & nervis deindē ex siccitate conuulsio accidat: hoc maximum (inquit Galenus) est malum, & penē insanabile.

Curande conuulsionis methodus.

Observanda in omni conuuls. curanda.

Curatio conuulsionis ex inanitione.

Fetus.

Balnea ex oleo, & hydreleo.

Humectantia & lenientia.

Vnctiones.

Postquam de differentijs, causis, signis, & iudicijs conuulsionis, abundē satis tractatum est, par est, deinceps eius curationem exequamur. Esto igitur illud primum ac commune præceptum in omni conuulsione obseruandum. Partes quæ contrahuntur, conuellunturue, valenter continendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus. Oleo in hunc vsum eas perficere oportet ex lilijs confecto, vel si eius copia non sit, oleo communi, tum aquam mulsam assumere. Eos verò qui ex inanitione citra febrem conuelluntur, hoc pacto curabis. Oleo, aut certē hydrelæo calido, partes conuulsas primū foueto. Deindē, si nihil prohibet, etiam ad lauacrum deducito, temperatoque solio vitior, cum oleo, & frictione lenissima. Iunat quoque in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam dulcem, in qua humectantia quædam, & lenientia decocta sint. Vt sunt capita, & extremitates agnorum, hœdorum, vitulorum, & arietum pinguium: item maluarum, ac violarum folia, althææ radices, semen cydoniorū, & id genus alia, adiecta olei parte tertia. Sunt qui ad eundem vsum iubent laborātes sæpius in labrum lacte caprillo, aut bubulo plenū descendere, atq; vbi caldarium seu lauacrum egressi fuerint, oleis humectantibus, vt oleo violaceo, & amygdalarum dulcium: si ea non adsint, oleo cōmuni optimo, si ne id quidem est, adipe non vetustissi-

ma, gallinæ præsertim, hœdi aut vituli, cernicem, & scapulas, & spinam, iuncturas quoque, & musculorum capita, perficiant. Quidam autem infra scripto linimento totam spinam, iuncturasque omnes magna utilitate illinere consueverunt. Olei violarum vncias quatuor, olei amygd. dulcium, pinguedinis gallinæ, medullæ crurium vituli, ana drach. sex, pinguedinis vituli, & hœdi ana drachmas decem. Bulliant omnia simul in decoctione maluarum, radicum althææ & seminis cydoniorum, usque ad consumptionem ipsius decoctionis, deinde colentur, & fiat linimentum. Porro frictio cum omnibus in homine vertebribus utilis sit, tum ijs præcipue, quæ in collo sunt, cum manus, & brachia, convulsio maxime inuadit. Quod si febris adfit, non humectantia modò, sed refrigerantia quoque in hydrelixo, id est, miscellanæ ex aqua, & oleo, decoquenda crunt. Cuiusmodi sunt folia salicis, hordeum contritum, violæ, nymphaea (quod nenuphar appellant) aut eius farinæ quopiam aliquo. Ergo die nocteque (est enim gravis, admodum importunus, acutusque morbus convulsio) interpositis tamen quibusdam breuius interuallis, ijs remedijs, hoc est, fortibus, balneis, & vntionibus, vtendum est. Dum ea intermittuntur, imponendū malagma, aut cataplasma aliquod est, ex cuiusmodi humectantibus, & lenientibus, utidem (si res ex postulet) & refrigerantibus, contra quàm in convulsione, quæ ex plenitudine ortum habet. Hæc enim vacuantia, ac digerentia, calefacientia quoque, & (cum ex humore procreata sit) siccantia desiderat, vt mox dicemus. Cæterum qui ex siccitate (quæ inanitionis est comes) conuelliuntur, nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro, & alicâ: si hæc non adfuerint, ex lacte, aut hordearo, aut à pullis molibus, vel agniculis, vel hœdis tenerioribus, iure aliquo assumptis, pro, itemque onis sorbilibus. Vinū quoque tenue, & aquosum, quod faciliè per omnia corporis membra distribuitur, illis exhibebimus, aut saltem cū suis iusculis, vt ea promptius permeent, remiscebimus: nisi tamen febris accesserit. Tunc enim prisanae cremor magis offerendus est, somnusque accersendus. Hic enim præterquam quòd vires omnes reparat, plurimum etiam humectat. Vigiliæ verò cum ex ijs sint, quæ maxime euacuant, & exsiccant, convulsionem ex siccitate accersunt, & augent. Indendi etiam sunt clysteres ex lacte, & ex eodem conficienda gargarisata. Itaque (vt semel finiam) in hoc convulsivis generis, curandi methodus, vnicum habet scopum, nepe humectationem.

*Linimentum**Si febr. ad-
sit spasmo.**Alimenta in
convulsione
ex siccitate
facta, idonea.**Somnus con-
ciendus.*

Ex 7. metho
di med.

tionem. Quem certè (ob superius adductam rationem) non facile est assequi. Aegrius nanque curantur, quæ in humido siccoque habentur alterationes, quàm quæ ex calido & frigido consistunt. Hæ enim maximè actiuis qualitatibus corriguntur. Illarum verò curatio imbecillis, & (vt sic dicam) magis materialibus, & passiuis qualitatibus, perficitur, potissimumque cum hu-
mectandum esse requiritur, vt libro septimo suæ methodi Galenus nos edocuit. Si tamè vlla spes curationis est, in suprâ memoratis remedijs consistit. Itaque tamen si malû hoc fere fit im-
medicabile: cum tamen sæpe etiam præter expectatione quæ-
dam eueniant, curatio venit aggredienda. 10

Curatio conuulsionis ex plenitudine.

Vacuatio à
toto corpore
Sanguis in
quibus mit-
ti debeat.

Quæ in mit-
tendo sangui-
ne obseruan-
da.

Purgatio
quando ad-
hibenda.

I Am verò spasmus ex humiditate, & plenitudine curabis per euacuantiâ. Vacuare autem oportet, & à toto corpore, & ab ea parte quæ conuellitur. Porro à toto corpore plenitudinem vacuamus, duobus potissimum auxilijs, nempe sanguinis mis-
sione, & purgatione. Sanguinè mittimus maximè, in quibus vel multus sanguis abundat, vel phlegmone conuulsionem excitauit, etiam si laboras, prorsus redundantia sanguinis sit expers, 20
modo nihil obstiterit eorum, quæ sanguinem mittendum dehortantur. Venæ autem secundæ electio, ex laborante phlegmone, ac conuulsione, particula, tibi indicabitur. Modû verò seu quantitatem vacuationis, inuenies, tum ex redundantia modo, tum ex reliquis, quæ in sectione venæ spectanda & æstimanda sunt: Nempe ex ætate, natura, tempore anni, consuetudine, regione, cæli statu, & ante hæc, ipsa laborantis virtute. Cæterum sic, vt oportet, facta per sanguinis detractionem, totius corporis vacuatione, & humorum influentiû auersione, mox phlegmones curationem aggredieris. Cuius (vt & omnium aliorum 30
tumorum, qui præter naturam consistunt) si iam facta est, caput seu scopus præcipuus est, infestantis humoris vacuatio. Cum enim phlegmone duplici ratione (vt Gal. ait) à natura recedat, & quòd pars ipsa multo sanguine sit referta, & quòd eadè sit calidior, vtique vacuationis indicatio, refrigerationis indicationem vincit. Quòd si adhuc in generatione est, in hac prior vacuatione est, confluentis ad affectum locum sanguinis inhibitio. Sed de hac alibi abundè dictum est. Vbi verò corpus vel flaua bile, vel atra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum fuerit (quem habitum Græci cacochymiam nominant) tum 40
purga-

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

193

purgatione, quæ cuiq; superanti succo fit accommoda, vacuationem moliemur. Verum enimvero, quoniam conuulsio ex humilitate seu plenitudine, qua sani etiam repente capiuntur, magna ex parte à pituitosis humoribus crassis, glutinosisque in ipsa nervosarum partium substantia infarctis, procreari solet, eius porisissimum, quæ ab hac causa ortum habet, curationem subiiciamus. Ergo quæ crudos, crassos, & viscosos humores potenter euacuant medicamenta (inter quæ primas obtinent, hiera picra,

Curatio conuulsionis à crassis, & viscosis humoribus.

10 ribus acribus eorum aluum subducito. Pessis, & fustibus, in mulieribus (si occasio deur) menses euocato. Gargarismatis, apophlegmatismis, & errhinis, seu sternutatorijs, acrioribus, pituitam per os, & nares educito. Abundè repurgato corpore, ceruicem, axillas & inguina, oleo liliorum, costino, spicato, laurino, & ex pulegio, addito castorei, & euphorbij momento, inungito: & lanam mollem, ac succidâ factò litu superimponito. Rogerus ad eiusmodi spasmus, sequens vnguentum instituit, quod & Theodoricus approbavit. *℞* olei muscellini vnc. vnam, petrolei semunciam, olei communis, & butyri ana uncias 4. ceræ

Vnguentum Rogery.

20 vnciam vnam, styracis calamithæ, styracis rubræ, singulorum drach. duas & semis, mastiches, olibani, gummi hæderæ, ana vnciam semis, ex ijs omnia quæ liquefcere possunt, igni admoveantur: alia verò trita, & in puluerem redacta, illis remisceantur: postremò addatur styrax, & fiat vnguentum, ex quo moderate calefacto, ceruix, & collum totum, ac vniuersa spina dorsæ, inungatur. Sunt qui habent eodem aut consimili vnguento, totum corpus, inter duos ignes, aut in hypocausto, nudum hominem constitutum, vel si æstas est, in sole inungi. Porro huic vnguento visus est alibi Theodoricus addidisse herbas, quæ

30 ingrediuntur compositionem vnguenti, quod aragon nominatur, & alterius, quod Agrippæ tribuitur, quorum descriptiones extant apud antidorarium Nicolai: & præter hæc, addit oleum de castoreo, & pinguedinem ex limacibus rubris assumptam. Vocabatque tunc eiusmodi vnguentum, alabastrum, quod sanè nervorum contractionibus apprimè est vtile, et accommodum.

Olea spasmus ex plenitudine conseruentia.

40 Conductunt etiam magnopere ad spasmus eiusmodi, oleum vulpinum, laurinum, rutaceum, sicyonium, chamæxlinum, de iunipero, de terebinthina. Item oleum benedictum, & oleum philosophorum. Ex ijs itaque, & consimilibus, frictio, omnibus

n

torum

Febris conuulsioni ex plenitudine superueniens bonum.

Metridatum Theriace.

Frigus conuulsis inimicum.

Vinum quando, & quare conuulsis interdiciendum.

totum hominem, in labrum illis calidis oleis plenum, descendere. Sed & hypocausta siue thermæ, & stufæ (vt vocant) sicce, quæ ex suffitu rerum desiccantium fiunt, aliæque id genus, quæ sudores euocant, & superuacancas corporis humiditates, resoluunt, atque absumunt, cerebroque, & nervis robur adferunt, circa finem & corpore iam vt oportet, repurgato, mirum in modum conferre creduntur. Quod si & febris huic ex plenitudine conuulsioni superuenerit (modò hæc fuerit ephamera) salubre admodum est: frigidus enim (vt supra diximus) & glutinosos humores, quibus nervi ipsi conuulsi replentur, calcacit, extenuat, atque dissoluit, quod curationis eius spatium caput est. Itaque si sua sponte febris in hoc genere conuulsionis non enascatur, eam ex industria quadam accersunt, & exuscitant: idque per exhibitionem confectionis anacardine, ad quantitatem nucis auehanæ. Alij ad eundem finem offerunt castoreum, & assam fetidem, vel opopanaxem, addita mellis portione dupla. Metridatum quoque, & theriace, in hoc affectu mirè proficiunt, Nervos enim roborant, & crudos succos concoquunt, absumuntque, eo scilicet nomine, quod excalfaciant. Cauendum vero præcipue frigus est: ideoque in eo cõclauit, quo cubabit æger, ignis continuus esse debet, maximeque tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Vinum per initia præsertim, gustandum non est: si quidem huius usus tum præcipue periculosus est, eo potissimum nomine, quod fluxionem proritat. Vini loco aqua mulsa exhibenda erit, in qua decocta sit saluia, & radix acori cum momento nucis muscare. Viæ tenuis, primis saltem diebus, conuulsis à plenitudine instituat, idemque calfaciens, & exiccans. Hactenus de curatione conuulsionis ex plenitudine.

Curatio conuulsionis ex compatiendi societate.

Curatio conuulsionis, ex compatiendi societate.

Dolor.

Morsus, vel ictus venenatorum.

Ceterum conuulsio, quæ fit propter consensum, & velut quadam partium conspiratione, seu compatiendi societate: si ex dolore excitata est, per anodyna, & dolorem sedantia curationem recipiet, vt in sequentibus dicetur, cum de vulneratis nervis ageretur. Si vero ex morfu ictuue alicuius venenosi animantis, conuulsio oborta sit, theriaca parti affectæ superimponenda erit, & cucurbitula defigenda, vel cornua quædam, quibus nonnulli cucurbitularum vice vtuntur. His enim (quæ citra calefactionem, ex alto vehementius extrahuntur) totam eius quod infestat,

infestat, & dolorem creat, substantiam vacuabis. Sunt autem & qui ore suo virus extrahunt, agræ videlicet particule (vt superius dictum est) ad moti, ipsamq; labijs complexi. Si autē accidat convulsio, ob morsum oris ventriculi (quod propriè stomachus appellatur) ab acri aliquo, mordaci, & erodente humore excitatum, vomitus statim concitandus est, post quem ventriculus roborandus erit, tum ijs, quæ extrinsecus admonentur, tum ijs quæ intrò assumuntur, iuxta periti alicuius medici consilium. Porro in omni convulsione à quacunque causa ortum habeat cerebrum imprimis roborandum est. Caput igitur abrafis crinibus oleo liliorum fouendum erit. Iuuat & eodem oleo, ceruicem, totamque dorsalem spinam, axillas quoque, & inguina inungere. Hoc enim spasmo, præsertim humido, est dicatissimum. Hora paroxysmi bonum est, laborans contineat inter dentes baculū salicis, ne os ex actè claudatur & lingua à dentibus dilaceretur. Vltimum est, si nihil aliud fieri possit, neruum, aut muscū ex quo convulsio orta est, transversum præcidere, vt Galenus & Razes consulerunt: præstat namq; vnius particule actionem amittere, quàm totius corporis. Meliorque est (vt Galenus ait) læsio quàm mors. Itaque hoc pacto convulsionem quidem sanaueris, aliquem tamen ex particule motibus vitaueris. Vt autem ei quod vrget, & vnde primum maximeque homini imminet periculum, succurramus, cogimur sic nonnunquàm alium insanabilem affectum relinquere.

De paralyſi ex vulnere.

Paralyſis, id est, neruorum resolutio, laſus vnum aut alterum, vel partem quampiam, non autem corpus totum infestans: interdum etiam vulnera, & contusiones insequitur, sed capitis maxime, & totius spinæ dorsi, vt multis exemplis Galenus aperuit libro de locis affectis tertio. Porro an paralyſis ipsa, quæ ex vulnere accidit, partes quæ à regione vulneris sunt, vel potius oppositas infestet, ad præsens dicere omitemus. Est autem paralyſis neruorum relaxatio, seu mollificatio, cum priuatione sensus, & motus, non quidem totius (vt dictum est) sed vel lateris vnius distaxat, vel priuatæ alicuius particule. Quo fit, vt affectus sit convulsioni contrarius: in hac enim durities adest cum motu deprauato, ac permutato: durities autem mollificationi ac relaxationi est contraria. Vnde Galenus libro tertio, interiorum affectuum locorum, sic inquit,

Morsus oris ventriculi convulsionē excitat.

Cerebrum in omni convulsione roborandum.

Muscū aut neruum interdū per transversum præcidēdus. Læſio quàm mors potius optanda.

Paralyſis ex quibus vulneribus exciuitur.

Paralyſis quid.

Paralyſis affectus est convulsioni contrarius.

Quum omnes pariter nervi, tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio nominatur. Vbi verò alteri laterum, aut dextro, aut sinistro, id accidit, paralyfis, id est, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus, interdum dextræ, interdum sinistræ. Quod si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem membri resolutio esse dicetur. Nam & tota manus, & totum crus interdum resoluitur, atque solus in crure pes, & quæ sub genu sunt. Sic etiam de tota manu, similiter proportionem dicendum est. Hactenus Galenus: ex cuius verbis colligere licet, paralyfin aliam esse vniuersalem, aliam verò particularem. Vniuersalis ea est, quæ alterum latus totum, aut dextrum, aut sinistrum occupat. Particularis verò, quæ priuatim alicui duntaxat particulæ accidit. Sic & de spasmō per analogiam dici potest: nempe quod alius sit vniuersalis, alius verò particularis.

*Paralyfis
vniuers.*

*Paralyfis
particul.*

De causis, & signis paralyfis.

Causæ paralyfis, atque eiusmodi ablationis sensus, & motus, gemine sunt: nempe internæ, & externæ, seu extrinsecus aduenientes. Externæ causæ resolutionis nervorum sunt, causa ab alto percussio, incisio, sectio, compressio, vel constrictio, frigiditas violenta, & vehemens, vicinæ partis phlegmone, vel scirrhus, & id genus alia, quæ extrinsecus euenientia, vel continuum soluunt, separantve, vel spirituum vias occludunt, & facultatis animalis delationem impediunt. Internæ autem causæ sunt, humores crassi, & viscosi, nervos cerebri, aut spinalis vocatæ medullæ (quæ ipsius cerebri vicaria est) obstruentes. Nervorum enim corporibus ita obstructis, & crassioribus redditis, animalis facultatis (quæ sensum, & motum præstat) in membra delatio impeditur. Ceterum anxie disquirere, quo pacto per nervorum resolutionem, seu paralyfin, interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant, & alia multa ad rem propositam attinentia, nequaquam presentis sunt speculationis. Satis enim fuerit chirurgō, si præter ea, quæ iam de paralyfi dicta sunt, sedem primariū affectū, & à qua noxa orta est, simulque dispositionem eius cognouerit. Nisi enim hæc (inquit Galenus) accuratè cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus vel sensus, vel motus vitatus est, rectè curabimus. Porro ipsam affectam sedem ex anatome facile ipsis deprehendemus.

Nota cere-

Nam cum ex ea cognouerimus nervos, qui per faciei partes
sparsi

- sparsi sunt, à cerebro dimitti, si earū aliqua, simul cum toto cor- *bri prima -*
 pore, resoluta est, haudquaquā nos latere debet, resolutionis *rio affecti in*
 dispositionem in ipso cerebro consistere. Vbi verò partes, quæ *paraly, si ex*
 ad faciem attingunt, incolumes, ac illæ sæ permanserint: hæc au- *lib. 3. de loc.*
 tem, quæ sub ea sitæ sunt, vniuersæ resolutæ fuerint, spinæ *affect.*
 initium tunc affici, sciendum est. Ex ipsa enim anatome didi- *Nota para-*
 cimus, quòd omnes animantis partes sub ceruice positæ (quæ à *lysis initio*
 consilio, & voluntatis imperio moueri possunt) nervos habent, *spina affecto*
 qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata medulla. Quod
 10 & ijs verbis Galenus testatur est libro quarto de symptoma-
 « tum causis: Si spinæ principium lædatur, solæ partes capitis,
 « quoad vixerit animans, & sentire, & moueri possunt. Quòd
 « si cerebro quoque noxa acciderit, qui sic afficiuntur, ij omnium
 « partium, & motum, & sensum illicò deperdunt. Atque eadem
 quoque ratione, si toti corpori conuulsio acciderit, eundem
 spinæ locum, nempe initium, affectum esse declarat, faciei
 partibus omninò seruatis illæsis. Quòd si hæc quoque affi-
 ciantur, cerebro noxam iam illaram esse ostendunt. Adhæc
 nouimus ex corporum dissectione, nervos, qui pectus mo-
 20 uent, ex ea spinæ parte, quæ in ceruice est, ortum deduce- *Gal lib. 4.*
 re. Quocirca vox perit omnibus, quibus ea spinæ pars, quæ *de sym. cau.*
 in ceruice est, fuerit affecta. Ipsa verò ex transuerso incisa, *Ex lib. 3. de*
 si tota fuerit dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis par- *loc. affect.*
 tes, sensu motuq; priuari necesse est, utpote suscipiente spina à
 cerebro, vim tum sentiendi, tum mouendi pro arbitrio. Præter-
 eà in anatomia (inquit ille) vidimus, vbi per transuersas spinæ
 incisiones, ad medium vsq; duntaxat, secundum longitudinem,
 spina ipsa secaretur, non omnes suppositas corporis partes, sed
 eas duntaxat, quæ è regione sectionis erant, resolutas. Dextras
 30 quidem, dextra spinæ parte dissecta: sinistras verò, vbi reliqua
 pars esset incisa. Itaq; (subiungit Galenus) manifestum est, quòd
 circa primum spinæ processum, facta aliqua dispositione, per
 quam cerebri facultas, quominus ad ipsam perueniat, prohibe-
 tur, omnia inferiora membra, dempta facie, sensu, motuq; priua-
 buntur. Vbi verò media duntaxat eius processus pars fuerit af-
 fecta, non omnes inferiores partes resoluentur, sed vel sinistræ
 duntaxat, vel dextræ. At verò spina in inferiori loco affecta,
 nempe sub ea neruorum propagine, quibus thorax attollitur,
 idque vel ob luxatam aliquam vertebra, vel alio quouis mo-
 40 do [ut vulnere] si quidem ingens fuerit affectus, partes infe- *Ex lib. 4. de*
sym. cau.

*Si quinta
spina verte-
bra affici-
tur.*

*Si sexta ver-
tebra affe-
cta est, vel
septima.*

riores omnes, subito & sentiendi, & mouendi facultate priuantur. Si verò non ita vehemens fuerit affectus, stuporem inducet. Atque ij mortem effugiunt, quandoquidem spiratio in ipsis seruatur. At quibus quinta spinæ vertebra [vulnerata, aut quouis alio modo] affecta est, eorum mantus omnino, & sensum, & motum amittunt. Quibus verò sexta, ijs non in totum sentiendi mouendique facultas [in manibus] perit: quippe primæ brachij partes illæse seruantur. Id verò multo magis, si septima spinæ vertebra fuerit affecta. Oportet vertere affectus perquam exiguum: hac verò inferiorum nullam penitus noxam in manibus inducere possunt. Maximam verò noxam ex læsa hac vertebra sentiunt, thorax, & reliquæ partes inferiores. Itaque nisi hoc pacto ex anatomia, neruorum ad singulas partes venientium principia didiceris, perquam difficile earum vel sensum, vel motum deperditum curabis, restituere. Porro humorem peccantem, ac paralysem committentem, deprehendes ex proprijs cuiusque humoris notis. Causas verò externas, seu euidentes facile cognosces ex relatu, & iudicio laborantis.

Iudicia, seu præsentia paralyfis.

*Paralyfis af-
fectus est ægrè
sanabilis.*

*Senes vix
vnuquā à pa-
ralysi libe-
rantur.*

*Tremor &
febris si para-
lysi superue-
nerint, bonū.*

*Paralyfis
ab ictu, vel
casu.*

Paus. sophi-

PRæfagire, ac iudicare potes de paralyfi, à quacunque occasione ortum duxerit, de quæ omnibus neruorum affectibus, quod ægrè admodum sanabiles sunt. Nervi enim ipsi pauco admodum nativo calore participant, qui curationis membrorum opifex est, & causa effectrix potissima. Proinde verissimum etiam est, quod vulgo dici solet, nempe paralysem in senibus perquam difficile curari. hi enim nativo calore (qui robur est facultatis nos gubernantis) propemodum sunt destituti. Quod Hippocrates his verbis expressit: Senibus parum calidi innati inest. Quam sententiam veram esse testatur Galenus, siue quis ad qualitatem sermonem referat, siue ad substantiam. Tremor & febris si paralyfi superuenerint, bonum: namq; febres neruorum resolutionibus (vbi & conuulsionibus ex repletione) aduenientes, partim quidem superfluum dissolunt humiditatem, partim verò concoquunt frigiditatem, quæ duæ sunt medicis, in curanda paralyfi (vbi & spasmo ex plenitudine) remediorum intentiones. Ad hæc, paralyfis, quæ ab ictu, vel casu non vehementer neruos atterente, contundente, excitata est, curatione interdum recipit, vt contigit illi Pausaniæ Syro sophistæ, cuius meminit

- meminit Galenus in fine lib. 3. de affecto. loco. notitia. *Quum sit vehiculo*
 enim Romam aliquando venisset, dum per viam duceretur, *excidit, unde*
 vehiculo excidit, atque in dorsi initio læsus est: unde secundum *de paraly-*
 duos minores sinistra manus digitos, atque medij partem me- *sim in digi-*
 diam, sensum imprimis quidem difficilem habuit, postea malè *tis contraxit*
 curantibus medicis, sensum omninò amisit. Huic autem reme-
 dia, quæ illi imperiti medici digitis frustra adaptauerant, læsæ
 parti, hoc est, in fimo spinæ, Galenus ipse (vbi mali occasionem
 intellexit) statim adhibere iussit, atq; sic vir ille celeriter sanita-
 ti est restitutus. Quæ verò ab insigni, atq; effatu digna nervorū
 contusione vel diuisione, oritur particularū resolutio, prorsus
 insanabilis est. Soluta enim in illis continuïtas nunquàm (vt di-
 ctum est) perfectè curatur. Rectè quidem, & conformiter ad
 Galeni sententiam, Auenzoar adstruxisse visus est, subitæ mor-
 tis periculum imminere, si nervi anhelitus, hoc est, respirationi
 seruientes, aliquibus vulnerati, aut quouis alio modo insigniter
 affecti fuerint: in ipsis enim statim perit respiratio. Quo fit, vt
 præfocati repente moriãtur. Quomodo enim ablata respiratio
 ne (quæ actio est vitæ necessaria) diutius viuere possent? Si mem-
 brum resolutum non imminuatur, nec emarcescat, colorq; eius
 non immutetur, spes aliqua curationis subest. Si verò contabe-
 scar, & gracilescat insigniter, colorq; natiuus pereat, atque à se-
 ipso plurimum euariet, malum portendit.

*Paralysis ex
vehementi
nervorū con-
tusione, vel
diuisione.*

*Paralysis
nervorū re-
spirationis ser-
uientium.*

*Note paral-
curabilis,
aut incurabi-
lis.*

Paralysis ex vulnere curatio.

- I**N curanda neruorum resolutione (quæ paralysis dicitur) ex
 accepto vulnere, vel causa alia extrinsecus incidente oborta,
 præmissa totius corporis vacatione, vel per purgantia medica-
 menta, vel per sanguinis detractionem, vel per vtrumque, vti
 res exigit: factis item vt deest, humorum in partem resolutam
 influentium auersionibus, præscriptaque victus ratione con-
 grua (quæ omnia periti alicuius medici consilio fieri debent)
 topicis remedijs aduersus illam sedulo pugnare debet chirur-
 gus. Itaque cum duabus in hoc affectu profligando Thera-
 peutices, id est, curandi facultatis partibus, opus sit: nempe ea
 quæ victu, & quæ medicamentis, tum intro assumendis, tum
 foris admoendis medentur: eam hîc solam curationem exequemur,
 quæ medicamentis forinsecus admoendis perficitur: ne qui
 chirurgiam profitentur, diætetica, & pharmaceutica (quæ
 periculisimum, & rationalem medicum desiderant) turpiter,

*In curanda
paral-dia-
tetica, &
pharmaceu-
tica opus
esse.*

*De localib⁹
remedijs in
paralyfi ex
vulnere ad-
hibendu.*

*Liquoris
balsamitis
Mesue dotes.*

*Spina dorsi
vetui cari-
na nauis.*

& in magnam laborantis perniciem (vt plerique hodie assolēt) abutantur. Cæterum cum multa variaque præsidia, forinsecus in curanda paralyfi ex vulnere, aut alia quauis externa causa suscitata, admoueri soleant, vt emplastra, cataplasmata, vnguenta, illitus, fottus, cucurbitulæ, & alia id genus: Guido tamen vno liquore longè optimo, & ad affectum eiusmodi, siue symptoma profligandum, efficacissimo contentus erat: quod quidē ex Ioanne illo Mesue, viro in familia Arabum doctissimo, ac in re medica Euangelista à quibusdam nūcupato, desumpsit, eo loci, vbi de cordis passionibus agit. Eo autē liquore illinere solebat medicus ille Arabs ceruicem, totamq; spinam dorsi, atque etiam affectam ipsam particulam. Confert nanque hoc pacto mirificè roborandis membranis spinalem medullam obuoluentibus, substantiæ spiritali, qua viuimus, neruis quoq; & ossibus. Proinde paralyfi, omnibusque neruorum egritudinibus, cordis palpitatiōi, & tremori, atque etiā manifestæ lassitudini, mirè, ac supra humanam opinionē, proficit. Adde, qđ nullum medica mentum eo præstantius inueniri potest, vbi cor celeri, festinave eget refectione, ac refocillatione, si saltem ipsi Mesue credimus. Cæterum est quod cum ipso Mesue vehemēter admiremur, pri-
scos illos tum medicos, tum philosophos insignes: & rerum natu-
re peritissimos, nullam in suis scriptis, eiusmodi inunctionis spi-
næ, mentionem fecisse, cum vix aliud tam præstās auxilium in-
ueniri, aut excogitari possit, ad vitæ substantiā conseruandam. Nouisti nanq; satis (opinor) ex anatome, spinam dorsi in homi-
ne esse veluti carinam nauis, & fundamentum reliquorum os-
sium, imò verò & principium. Nosti præterea, sub hac, veluti so-
lido quodam propugnaculo, & muro tutissimo, dorsalem ipsam
medullam conditam esse, quæ cerebri quidem germē est, & ex-
plantatio, durorumque corporis neruorum principium: per quos
velut internuncios, corpus vniuersum transiit, primum qui-
dem, & maximè motum, cum hoc autem etiam & sensum. Ad-
de qđ in spondylis dorsi (qui spinam ipsam constituunt) mira
naturæ providentiā efformata sunt quædam subtilia forami-
na, per quæ vasa, spiritum, & sanguinem deferentia (venæ, in-
quam, & arteriæ) intrò quidem: forās verò, nerui ipsi, sensum,
& motum, in corpus vniuersum comportantes, feruntur. Quo
fit, vt spina ipsa sit veluti platea, seu via quædam publica, non
modo neruorum, sed & venarum, & articularum. Proinde & spi-
ritum, ac virtutum. Adhæc, non ignoras magnam ipsam ve-
nam

nam concavum dictam, itidem & arteriam aortam vulgò nuncupatam, iuxta spinam ipsam totam reptare, sed & partium spiritalium est veluti substerniculum, & (ut quispiam dixerit) veluti lectus aliquis. Atque (ut Mesue inquit) medullam continet veræ * humiditatis. Multas ergo easdemque bonas, atque effatu dignas intentiones cumulabis, ex inunctione ipsius dorsalis spinæ, quam veteres ipsi tum medici, tum philosophi, vel prorsus ignorantes, neglexerunt, vel eam nobis inviderunt, cum ne verbum quidem in eorum monumentis de ea scriptum inveniatur, ut Mesue testatur est. Porro liquoris illius tam eximij, atque ad tam multa utilis compositio, & conficiendi ratio apud præfatum autorem talis est: *myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, sanguinis draconis, thuris, mumiæ, apobalsami, bdellij, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, mastiches, gummi Arabici, styracis liquidæ* ana drach. duas: ladani electi, succi castorei, ana drachmas duas semis, muschi drach. semis, terebinthinæ optimæ ad pondus omnium: pulverisanda pulverisentur, & omnia miscantur cum terebinthina, reponanturque in furnibulo, seu distillatorio, quod alambicum vocant, & illa ingeniosè ac lento igne ut decet, distillantur: liquorem autem per distillationem sublimatum, vase vitreo forti excipe. Hic liquor proximè accedit ad verum succum balsami. Guido à Cauliaco quandoque huic præcioso liquori addebat herbas dicatas paralyti, & tum generosius, atque efficacius multò (ut ipse testatur) experiebatur auxilium.

* aliàs humanitatis.

Liquor balsamites.

Io. Me Longè optimus, & ad multa utilisimus.

* Alia exemplaria habet opopanzacum. † Alias 3. duas semis.


De syncope ex vulnere.

30 **S**yncope (definitore Galeno libro. 12. Therapeutices) est præceps virium lapsus, qui immoderatas evacuationes, ingentes dolores, vigilias, principiorum intemperiem, atque animi vehementes affectus, sequi consuevit. Ea autem syncope, quæ in vulneribus accidit, magna ex parte creatur, vel ex immodica sanguinis profusione, vel ex vehementi dolore. Hanc proximam esse cognosces, tum ex arteriarum pulsui elanguescente, ac deficiente, tum ex pallido vultus colore, tum ex motu totius corporis ignauo, ac difficili, sed præsertim palpebrarum, & partium extremarum, tanquam illis erigendis, aut attollendis non possit virtus motrix sufficere: sed & frigidi, circa collum maximè, & faciem, sudores, syn-

quid.

Syncope in vulneribus vnde.

Syncope proximè insuetu nota.



copen iam pulsare fores testantur, symptoma sanè minime negligendum. Quandoquidem celeriter interdum hominè rapit, estq; quasi via ad mortè, imò (vt vulgò dici solet) est veluti quedam parua mors. Proinde summa cura adnitendum est, ne in hoc tam periculosum symptoma vulneratus incidat. Ergo laborantem quibus poteris modis consolator. Hominū turbamne suo anhelitu conclane nimis excalfaciant, & laborantem sua præsentia deterreant, procul arceto. Sed & antequàm ea prematur qui vulneratus est, panis frustulum, vino optimo, aquæ rosæ cææ momento, diluto, illi fugendum exhibeto: atque etiam vt 10 ex vino ipso modicum quid bibat, ipse iubeto. Vinum nanque omnibus syncope vexatis vtile est, vt lib. 12. Therap. his verbis Galenus annotauit: Vinum tamen, quod & calidum naturâ sit, » & deductionem in corpus promoueat, omnibus quos syncope » male habet, offerre conueniet. Constat autem, ex vinis ea de- » ligenda esse, quæ & flauo sint colore, & substantia tenui, & » ætate, vetera. Talia nimirum & boni odoris continuò fuerint. » Cæteram amara præ vetustate, vina ne sunt. Porro si iam syncope, qui vulnus accepit, vexetur, eius faciem aqua rosacea, vel frigida, vel vtriusque mixtura, adiecto etiamnum aceti (si 20 placet) momento irrorabis, ac etiam ipsa validè in illam, laborantis faciem dico, proijcies: aut saltem naribus aquam rosæcam, & acetum admovebis, vt scilicet suauis eorum odore, animam illorum recrees. Filos, nasum, & aures vellito, extrema fricatio, alapis illorum genas cedito, & proprio nomine alta voce illos vocato, ac cætera facito, quæ in hoc symptomate medici fieri præcipiunt.

De desipientia, seu delirio accidente in vulneribus.

*Delirium
quid, & vnde
de nascatur.
Cano. 3.*

OMne delirium (vt Gale. ait lib. 5. de symptomatum causis) 30 deprauatus est principis facultatis motus, à prauis succis aut cerebri intemperie ortum habens. Interpreti Auicennæ aliepatio dicitur. Porro tametsi eiusmodi desipientiæ, seu mentis alienationes, symptomata sint modò primogenia, id est, primaria, ac proprio cerebri affectu euenientia, modò secūdaria, hoc est, cerebro compatiendi societate, seu (vt dici solet) per consensum laborante. Hic tamen nunc, de solo eo delirio, quod consensu lege, seu per consensum accidit in vulneribus, & percussionibus articulorum, sermonem faciemus. Talia nanque vulnera (vt superius diximus) deloris, vigiliarum, conuulsionis, & de- 40 lirij

Lib. 4. Ther.

linij periculū adferūt. Cæterū eiusmodi symptomaticis (delirij inquam in cacoëthis vulneribus euenientis) generatio permissis est ei, quæ per suffusiones oculorū accidit, à ventriculi dispositionibus ortum trahantes, vt Galeno visum est libro tertio de locis affectis. Quemadmodū enim vētriculus, cerebro suas affectiones cōpatiendi quadā societate transmittit, idque propter neruorū à cerebro, ad os ventriculi descendentiū magnitudinē: per quos etiā sensus huic particulæ, quā vili reliquarum corporis partiū acutior est. Ita quoque neruosis partibus inflam-

Causa delirij in vulneribus.

Neruosus partibus inflammatur delirium accidit.

Delirium ex siccitate fit.

20 matis, cerebro noxa prōptissimē communicatur, atque ex illis prōptius, quā, ex alijs quibusuis partibus deliriū superuenire solet, idque ascendente ad caput interdū per continuas partes, solo calore: interdū verò spiritu vaporoso, vel fumoso, aut fuliginoso. Hæc autem omnia, quæ sic deliriū, aut phrenitidem inducūt, siccandi pollent facultate Auicēnz: quippe, quæ multo, eodemque acri calore participēt. Quo fit, vt delirantes irrequieto ferē motu agitētur. Vnde Gal. lib. 13. Therap. ad hūc modū ait: Ergo cū humor qui in capite redūdat, frigidus est, ir-
 “ sensibilitas, immobilitasq; hominē opprimūt. Cū calidus est,
 20 perpetuus potius motus, vnā cū rationis noxa. Accidit enim (ve
 “ luti demonstratum in libris de his est) ex frigore, segnicia: ex calore, immodicus motus: ex humoris verò vitio, dementia.

Delirij ex vulnere curatio.

SI delirium, seu mentis perturbatio, post vulnus acceptum, hominem apprehendat, huius rei grāiā statim accersendus & consulendus erit peritus aliquis medicus, qui potu, frictionibus, & deligaturis partium extremarum, & maximē pedum, ac tibiarum, clysteribus quoque huic rei accommodis, fumos, ac
 30 vapores vitiosos, à capite deorsum protinus reuellere studeat, vt rectē præcepit Auicennas, iidem & cæteri, qui hac de re scripserunt. Quod autem ad chirurgum attinet, læsæ particulæ dolor ex toto (si fieri potest) sedandus est. Utile est etiam alapis genas laborantis percutere, vt ipse ad mentem, seu ratiocinandi facultatem redeat. Gale. libro decimotertio Therapeutices caput delirantium in principio perfundendum esse oxyrhodino, pulchrē nos admonuit. Vapores enim, & humores à capite tunc repellendi sunt. Cū verò in summo incremento sunt deliria, perfusiones ex papauergum capitibus (confilio eiusdem) applicabimus. Odorem quoque ex rebus frigidis

*Vapores à cerebro auer-
tendi.*

*Dolor sedan-
dus.*

Caput delirantium oxyrhodino perfundendum.

dis naribus obijciemus: ac nares ipsas intus, vel frontem ex finibus medicamentis illinemus. Quippe sopire (inquit) ac stupefacere principem facultatem oportet: cerebrum scilicet, quod sumpramodum incaluit, refrigerando. Sanitati magna ex parte restituantur Avicennæ, qui per dies aliquot, radicem bryoniæ, id est, vitis albæ, vel bibunt [ex liquore aliquo refrigerante, & humectante] vel cum cibo quopiam eius sapore obtundente comedunt. Cæterum de pruritu, duritie, atque impotentia læsæ partikulæ, quæ interdum vulneratis accidunt, suo loco alibi dicitur.

Radix bryoniæ.

De vulnere in carne accepto, & eius differentiis. C A P. V.

10

Vulnus qd Galeno.

Vuln⁹ quid apud recentiores chirurgos.

Divisio vulneris.

V Vulnus propriè Gale. lib. 3. meth. med. vnitatis est soluno, ex vulnerando in carnosa parte relicta, eademque (vt recentiores addiderunt) cruenta, & citra putrefactionem: hîc autem vulnus latius accipimus: nèpe pro recenti plaga non modò in carne, sed etiam in nervis, venis, arteriis, tendonibus, membranis, cartilagine, & ossibus facta. Itaque primum de eo vulnere, quod in carnosa substantia acceptum est, edifferemus. Cæterum eiusmodi vulnus aut simplex est, & citra substantiæ deperditionem, aut cum aliqua substantiæ amissione. Vulnus simplex, & quod sine deperditione sit substantiæ, aliud profundum, aliud summo tenus factum, seu in summo residens est: aliud verò vtriusque particeps, vt cum pars vna divisionis per longitudinem facta, altè descendit, altè ra in summo corpore hæret, quod inæquale Galeno dicitur: aliud item magnum, aliud paruum tum dicitur, tum verò est. Quæ omnes differentiæ à quantitate, seu spacio diuisionis sumptæ sunt. Vulnus quod cum deperditione est substantiæ, aut fit cum amissione cutis solius, aut cum ablatione cutis, & carnis subiectæ simul. Porro eiusmodi vulnera, vel simplicia sunt, & 30 sine vilo affectu, aut sympt⁹mate: vel accidentia habent, quæ rationem causæ non obtinent (tunc enim vlcerà dicerentur difficile sanabilia, de quibus in seq. dicitur) sed solum rationem habent sine quo non, vt superius annotauimus ex Gal. lib. 4. Therapeu. Cuiusmodi sunt intèperies, dolor, phlegmone, pruritus, & alia paulò antè commemorata. Non magnoperè autem curo, si prædictæ huiusmodi differentiæ, dispositiones aut affectus dicantur potius, quàm differentiæ, vel contrà. Quanquàm Galen. lib. 3. metho. meden. anxie satis disquisiuerit, quænam sint propriæ vlcerum, seu vulnerum differentiæ, & quæ alio- 40 rum

rum affectuum complexiones. Hoc enim parum nunc mihi cō
 «ferre videtur ad vulnerum curationem. Commoda namq; mor
 «borum curatio, non ex nominum, sed rerum recta opinione cō
 «tingit: vt scribitur primo methodi medendi. Ceterum de cau-
 sis, signis, & iudicijs vulnerū, quatenus vulnera sunt, abundē sa-
 tis in præcedentibus dictum est, in capite scilicet vniuersali.
 Proinde ijs prætermisiss, vulnerum in carne acceptorum cura-
 tionem iam aggrediemur.

*Curatio vulnerum simplicium, in carne summo-
 tenus acceptorum.*

Vulnerum eiusmodi curatio, præter iam dictas quatuor,
 aut quinq; intentiones communes, vnā specialem, præ-
 cipuamq; habet: nēpe sanguinis profusione cohibere. Quod
 sanē intelligendum est: nempe si nimis immoderatē, atque aīsa-
 «tim effundatur, vt rectē interpretatus est Auicēna: Sarius enim
 «est (inquit) ipsum fluentem ex vulnere sanguinem, nō omnino,
 «ac statim suppressimere, sed si nimis abundē prorumpat, eius dum
 «taxat impetum moderatē infrenare oportet. Moderata nan-
 «que sanguinis ex recenter accepto vulnere vacuatio, non parū
 «sæpe multis profuit. Quandoquidem & phlegmonas, & obstru-
 ctiones, & febrem subinde fieri prohibuit. Quæ quidem sym-
 ptomata, atque id genus alia, vulneribus (nisi diligenter proui-
 deris) superuenire, ipsiusq; solatæ vñionis consolidationem,
 & curationem magnoperē impedire, cōsueuerunt. Atque illud
 fuit Hippocratis præceptum, quod & à Galeno refertur, & ap-
 «probatur lib. 4. metho. med. Fit enim (inquit Hippo.) effluente
 «sanguine vulnus siccius: proinde & sanius. Nam siccum (vt idē
 «ait) sano vicinius est, humidum verò nō sano. Porrò si tantus
 30 fuerit ruentis sanguinis impetus, vt cum ijs, quæ sistendo, san-
 guini in vulneribus communiter admoueri solent, cohiberi nō
 possit, ijs remedijs suppressendus erit, quæ in capite de vulneri-
 bus venarum postea dicentur. Ceterum tamen in genere di-
 ctum sit, quomodò curandorū vulnerum intentiones perfici de-
 beant: modus tamen specialis, quò in carne perfici debeant, in
 sequentibus dicitur. Huius autem inuentio habetur ex differen-
 tijs vulnerum supra commemoratis, ad hunc modum. Vulnus
illud simplex dicitur Galeno, Hippocr. & alijs medicis, quod so-
lum consistit, hoc est, quod sine deperditione est subitane, nec
 40 illū aliū affectum, aut symptoma adiunctum habet. Vulnus
 igitur

*Specialis
 præcipua
 que intentio
 curandi vul-
 neris in car-
 ne accepti,
 vna est.*

Hippoc.

*Quid vuln.
 simplex, &
 quæ sit eius
 curandi ra-
 tio.*

Vulnus non simplex igitur simplex non erit, si quæ vulnerata est particula fluxione vexetur, si malo succo vitiosa sit, si omninò extra naturalem tēperiem fuerit, si vlla cavitās adfit, si aliqua cutis amissio facta fuerit. Itaque vbi simplex vulnus, quod quæ solū consistit in carnosa particula non ad eò saltem magnum, incidit, dissidentium labiorum commissiōem, seu coniunctiōem, quæ sola decenti sit ligatura, vinculo scilicet ex duobus initijs circundato, ex postulat Gal. lib. 3. Therap. Quæ enim (inquit de simplici vlcere loquens) dissident, atque inuicem distant, si in idem

Cal. adamussim componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescunt. Nempe sicuti in cauis vlceribus, vt caro

producat, ita in simplici vlcere, vt oræ ipsæ secum coalescāt, atque agglutinentur, sola certè natura causa est. Diductorum

igitur labiorum coniunctiōem, seu agglutinatiōem præcedit necessario, ipsorum coniunctiō, atque in idem adductiō. Idem omninò de hac re sentit Razes, quod & Galenus: vñs tamen communis obtinuit, vt recentibus huiusmodi vulneribus oui candidum (quod albumen vocant) aliquandiu agitatum, & leui

Oui candidum, quare vulneris admoveatur. stupra exceptum admoueat. Nec abs re profectò, cum & sanguinis proflauium supprimat, dolorem sedet, refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat, nò solū in oculis, sed & in omnibus locis exulceratis, vt Galenus est autor libro vñdecimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Ante omnia verò,

cauendum est, ne dolor incidat. Quandoquidem dolor (vt iam sæpe dictum est) & fluxionem proutat, & phlegmonem excitat. Quomodo autem dolorem sedare oporteat, in præcedenti bus satis est explicatum. Porro eiusmodi oui candidus liquor, ante tertium diem amoueri non debet. Nam vt Galenus ait, parua vulnera eiusmodi naturæ sunt, vt post orarum adductiōem, & commissiōem, seu coniunctiōem, vñus diei, aut duorum dierum spaciū adhuc requirant, quò proba fiat vñio, & agglutinatiō. Quòd si vulnus hoc pacto non agglutinetur, curādum erit, vt in sequentibus paulò post dicetur.

Lib. 3. The.

De vulnere magno, percussim diuiso, in summo residente, hoc est, superficiali, & minimè profundo, in quo non sola sufficit deligatura ad oras ipsius applicandas, & coniungendas.

SI vulnus in superficie corporis acceptum, ad tantam magnitudinem percussim, cæsimtē diuisum est, vt sola deligatura oræ ipsius nec adduci, nec committi possint: sutura aut fibulis (quas

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

207

(quas Græcè *ἀγάρραι* vocant) eas ipsas disiunctas oras, adducēdas, & coniungendas esse, præcepit Gale. lib. 3. meth. med. Atq; hac sola partium disidentium cōiunctione vulnus glutinatur. Apud recentiores tamen chirurgos ferè omnes inualuit consuetudo, vt his vulneribus apponatur pulvis ruber, quem incarnationum, & cōseruationum vocant. Recipit autē partes duas thuris, & sanguinis draconis partem vnā. Albucasis addit tres partes calcis viuæ. Cuius sententiæ suffragatur & Lanfrācus. Guido autem loco calcis viuæ, bolum Armeniam adijcit. Halyabas verò fantasios apposuit. Sunt qui puluerem hunc rubrum appellatum, laborum vulneris agglutinatium, & futuræ cōseruationum, hoc modo componunt. ℞. boli Armenij, terræ sigillatæ, singulorum drach. sex, thuris, masticis, sarcocollæ, singulorum drach. duas senis, myrrhæ, aloës, singulorum drachmam vnā, semis, tragacathæ pisti, sanguinis draconis, singulorū drachmam vnā, farinae hordei, farinae fabarum, singulorū drachmā senis. Sed interim summopere cauendum est, ne vel pilus, vel oleum, vel quidpiam aliud in medio adductorum laborum vulneris interuenierit. Nam tunc eiusmodi vulnus sola disidentium partium cōiunctione glutinari non potest. Hæc enim quæ sic interiacent, iam vnionem disperiunt, & earum quæ copulandæ sunt, partium coaltum impediūt. Ex prædictis autē singula, cum oui candido liquore agitari possunt, donec in corpus vnū coeant, quòd glutinis instar lentescat. Postea verò stupis leuibus excipiendum erit medicamentum, & ita vulnere admoendum: supra quod & alia stupa solo oui albo imbutæ, & intra pannum lineum eodem madefactum liquore, inuolutæ, apponendæ sunt. Sed & supra vulnus nulla alia intercedente materia, pannus aliquis tenuis, prædicto imbutus liquore, admoueri debet, ne scilicet, dum remouentur stupæ, saturæ iam factæ pūtra abrum pant, aut dilacerent. Quòd si loca circum vulnus adiacentia, rosæceo inungeretur, factū bene existimauerim. Hoc pacto enim læsam particulā à dolore, & inflammatione vindicabis. Qualis autē sutura, aut deligatura, quales itē puluilli ex eiusmodi stupis facti, hisce vulneribus percussim cæsumue in superficie acceptis, atq; in cōspectu apparētibus, conueniant, & quopactio fieri debeant, in præcedentibus abundè satis dictum est. Cæterum primus eiusmodi apparatus, vique in diem quartum mutari non debet, nisi fortè dolor aliquis vehemens superueniat, aut symptoma aliquod molestum incidere. Porro si post quartum

Medicamentum cruentis aptū necerious.

Cauendū ne quid labris vulneris intercidat.

Quæ cruento vulnere primum apposta sunt, ante diē tertium remoueri non debent.

*Quæ post
quartum di-
em fieri de-
beant.*

quartum diem transactum vulnus non coaluerit, vino aliquo styptico calente, abludendum erit. Deinde stupæ præ dicto vino imbutæ, & expressæ, supra vulnus ipsum apponendæ, & alligandæ erunt: quas & quotidie mutare oportebit. Intra enim dies paucos hoc modo vulnus agglutinabimus, & persanabimus, Galeno etiam nū attestante, lib. 4. Therap. vbi Thessalum arguit, qui vulnera in multos menses, & interdum in annum, aut etiam longius tempus protraherat, & incurere sinebat: quæ alioqui paucissimis diebus, vt sex, aut plurimum septē, curari poterat.

*Primus ap-
paratus.*

Iraque primus apparatus rectè decenterque fit, cum ouorum candido liquore, & puluere illo rubro, cuius paulò antè meminimus. Hic enim & sanguinis profuuium infrenat, atque inhibet, dolorem sedat, & phlegmonem creari verat. Secundus vero

*Secundus ap-
paratus.*

*Vinum opii
mum vlceri
medicamen-
tum.*

apparatus, optimè fit, cum vino, vt supra dictum est. Vinum nanque (vt Galenus ait lib. 3. meth. med.) omnis vlceris, quæ vlceris est, id est, quod citra aliam cum ea implexam dispositionem relictam consistit, optimum est medicamentum. Quod hac sequenti ratione conuincitur. Vulnus omne, quæ vulnus est, sic-
cari, atq; adstringi desiderat, præsertim si magnum extiterit. At qui vinū, quale supra est memoratū, nempe subausterum, hæc duo cōmoda præstat vulnere. Vinū igitur omnis vulneris, quæ vulnus est, optimum est medicamentum. Maior est Galeni, lib. 3. nuper citato, vbi ait: quod eo tempore, quo diuise vlceris, seu vulneris partes, ritè sunt cōiunctæ, medicamentum opus est, quod particulam siccet, & modicè adstringat, vt & si qua sanies iam subsit, hanc consumat, & si qua in vacuū locum fluxura est, hæc prohibeat. Proindè medicamentum glutinatorium plus siccet, oportet, quàm quod carnem producit: nempe ordine secundo. Minor verò ita deducitur. Vinum, vt Gal. est autor lib. 8. simpli. medica. ex secundo ordine est excalfaciendum: sed quod admodum vetus est, ex tertio, sicut mustum quod vocat, ex primo: ca-

*Vinum pro
atatis ratio-
ne, diuersa
poller facul-
tate.*

lidity autem eius, proportionem responderet siccitas. Proindè vinū ipsum pro naturarum, seu facultatum, quibus ratione et a-
tis poller, diuersitate, desiccet, & agglutinat. Non autem hume-
rat, & refrigerat (extrinsecus saltem admotū) vt Theodoricus falso existimabat. Atque id ipsum est, quod Galenus refert libro quarto Therapeutices, ex senioris Hippocratis sententia in-
quiens: Vlcera madefacere, id est, abluere, quæ cūque ea fuerint, nisi vino, non oportet. Tum causam subiiciens, ait: Nam sic cum sano vicino est, humidum verò, non sano. Hinc Arnal-

Hipp.

dus dicere solebat, quòd cruenta, & recentia vulnera, aqua ar-
 dente (quam & aquam vitæ nuncupant) abluta, celeritè ad sa-
 nitatem perducuntur: quippe quæ insigniter deficiet. Posthanc
 autem abluitionem, quidam infra scriptum puluerem (qui in
 hoc casu magnæ est efficaciz) vulnere inspergunt. *Aqua vita.*
 drachmas tres, aloës hepaticæ drach. quatuor, thuris drachmas
 duas, misce, & fiat pulvis. Sunt qui post amotionem primi appa-
 ratus, emplastra, & vnguenta adinouent, quæ in promptu ad
 hanc rem parata habent, ac statim stupas superponunt. Galenus
 10 autem in re proposita, plurimi facit emplastrum, quod nigrum
 appellauit: Auicennas verò vnguentum de lino, quod tamen ma-
 gis dicatum est carni regnende, quàm agglutinationi labori-
 vulneris. Guido à Cauliaco in hac re vti cõsueuerat vnguento,
 quod constar prædicto puluere rubro, remixto cum terebinthi-
 na losa. Quidam verò terebinthinam ipsam, cum prædicto pul-
 uere commixtam, & (vt dicunt) incorporatam, statim per initia
 cruentorũ vulnerrum, adinouent, atq; in diem quartũ relinquũt.
 Hæc enim oras vulneris coire facit, & futurã eo nomine conser-
 uat. Sed horum omniũ, atq; aliorum multorũ ad hanc rem per-
 20 tinentiũ formulæ, & cõpositiones, in antidotario describentur,

*Aqua vita.**Pulvis opti-
mus.**Emplastrũ
nigrum.*

*De vulnere profundo, & occulto, sine amissione sub-
 stantia, in carne accepto.*

Vltus in profundum penetrans, & reconditum, subindè
 futura, & decenti ligatura curationem recipit. Si autem
 hoc modo curari non possit, vel scilicet quia partes, quæ disun-
 ctæ sunt, exactè ad imum vsque (ob nimiam diuisionis profun-
 ditatem) sibi coniungi non possint, vel potius quia in fundo col-
 lecta sit sanies, aut pus, cui nullus patet effluxus, ipsum per efflu-
 30 xionem, Galeni cõsiliũ sequuti, curabimus. Ipsam verò efflu-
 xionem, tum ex eiusdem, tum ex contrarij loci diuisione, & situ,
 seu figura partis accommoda amolietur. Porro situm partis
 vulneratæ accommodum, seu congruam positionis figuram in-
 telligimus, quando plage hiatus, quem orificium vocant, semper
 deorsum spectat, fundum verò sursum, ita vt sanies ex ipso vul-
 nere prona, & libere effluat. Itaque si vulneris figura non ad su-
 periora extenditur, sed ad ima vergit, nec sutura, nec fibulis, nec
 deligatura, partes disiunctæ, omni ex parte, ad amussim commu-
 ti, ac sibi applicari possint, atque in profundo sistatur sanies: ni-
 40 si prius ad effluxum ipsius vitati humoris, feceris sectionem,

*Vulnus quã-
do per efflu-
xiones cu-
randum.**sectio in
parte oppo-
sita quando
facienda.*

*Sinus in fe-
more cura-
tus, citra vl-
lam ex ad-
uerso sectu-
nem.*

nihil unquam proficies, siue carnem generare, siue agglutinare
volueris. Vbi verò conuenientem positionis figuram vulnus in
parte laborante seruauerit, siue id ex natura vulneris, siue ex
industria contingat, sectione noua opus non est, vt libro secun-
do ad Glauconem Galenus nos edocuit. Itaq; refert eo loci, se
finum in coxa enatum, figura ad ima vergente, sine vlla ex ad-
uerso diuisione, curasse. Cum enim sinus ipse versus genu quidē
terminaretur, os verò altius, circa mediam scilicet femoris re-
gionē consisteret: insit molle cervical popliti laborantis subijci,
vt inferiorem situm haberet inguen, quam genu. Hac igitur cō-
ueniente positionis figura in lassa parte seruata, facile per os,
icheres, & purulenta colluies, elabebantur, & effluebant. Idem
quoq; & in brachio fieri potest. Quandoquidem si os vulneris
ad partem superiorem vergat, ita brachium collocandum erit,
vt ipsum orificium deorsum spectet. Atque tum sine alia facta
ex aduerso sectione, vulnus poterit ad sanitatem perducī. Non
secus quidem ac si os prope cubitum esset, vulnere in superiora
rendente. Quod si hac conuenienti sinus figura, particula lassa
collocari non possit, nec ex vulnere ipso sanies elabi: ex aduer-
so sectio molienda erit. Quod & hac sententiā iterum Galenus
confirmauit circa finem libri tertij meth. med. Si vulnus (inquit) 20
cavitatem altē reconditam, sub cute habet, considerare oportet,
vtrum ea in superiore parte sit, ita vt sanies ex ea prona effluat;
an in inferiore, sic vt illic sistatur. Eius igitur cui effluxus patet,
eadem quæ aliorum curatio est. Cui verò non est, huic ipsi mo-
liamur effluxū oportet. Eius autem [effluxus moliendi] duplex
ratio est, [vbi exprimente deligatura nihil promouemus] aliās
tota cavitare defecta, aliās in fundo tantum aperta. Quando ve-
rò harum alterutra sit ineunda, docebit tum locorum ipsorum
natura, tum verò vlcis magnitudo. Si nanque ea loca ipsa du-
biam [seu fallacem, ac periculosam] sectionem faciant, & vlcus
magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contra se
habeant, præscindere, seu diuidere præstat. Deligatio verò eius
incipiat quidem (vt dictum est) superne, finiatur infra: vbi scili-
cet patet effluxus. Hactenus Galenus. Ceterum in tali diuisione
quæ ex aduerso fit, Brunus syphunculos, hoc est, tubos, siue tu-
rundas concanas (quas cannularas vocant) ex vtraque parte im-
ponit. Guido verò dum hanc moliebat sectionem, sole-
bat vti setone (vt vocant) quia melius (inquit) sordes deter-
get, & totum pertransit spacium, minoremque infert dolorem. 40

Brunus.

Guido.

Ipsium

De Plagis, seu cruentis vulnerib. 211

Ipsū autem intromissorio ad formam acus factō immittebat, vel hastulam ligneam in cauum vulneris imponebat, & super eam tutius sectionem faciebat. Deinde sectione facta, mundificatum aliquod medicamentum leui stupa, aut panno exceptum, superponebat, quod bis in die mutabat.

*De cauo vulnere, cum amissione substantia cutis vtriusq; &
carnis subiecta tantum, non etiam ossis.* CAP. VI.

I N cauo vulnere non ipsa modo periit cuticula (quam Græci epidermida vocant) verum etiam reliquæ cutis suppositæ, natura vniuersa, & subiectæ carnis portio aliquando non exigua. Quo fit, vt geminus in eo curandi finis sit propositus, vnio scilicet & repletio: quoniam & affectus geminus est: nempe vlus siue vulnus, quod est vnitatis solutio, & cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contra facta. Itaq; continui diuortium vnitioem, cauitas repletionem desiderat. Verum enimvero quoniam in proposito vulnere vnire non possumus, quæ disident, nisi prius cauitatem impleuerimus, ordinem curationis, à cauitatis implectione ordini, necesse est. Omnis namque quæ præter naturam est cauitas, impleri postulat: quare & quæ in carnosa etiam accidit parte. Ipsa verò impletio inueniendorum remediorum finis, quo tenditur, est, quem vel idiota, vel priuatus quisque etiam nouit. At verò vt quæ impleant, inuenias, & multa ratione opus est, & multiplici particulatim indicatione, & methodo rationali exacta. Longè itaque à seopo aberrant, qui vnum id sibi ad cauum vlus sanandum satisfacere putant, si sciant quòd carne est implendum. Non enim in hoc curandi ratio consistit, imò in eo inueniendo quod carne sit impleturum. Cæterum particulares indicationes, ex quibus inuenire licet, quæ cauitatem vulneris impleant, sunt quatuor. Prima ex ipsius vulneris substantia sumitur. Secunda ex ipsius ægri temperamento, non corporis modò vniuersi, sed etiam afflictæ particulæ. Tertia ab ijs, quæ coniugata, & annexa dicuntur, cuiusmodi sunt particulæ laborantis intemperies, & circundantis nos aeris temperies. Quarta ex contrarietate indicationum, vt cum lesa particula contrario est temperamento, cum toto, hoc est, cum corpore vniuerso. Talis siquidem ordo indicationum statuitur à Galeno libro tertio methodi medendi, in curandis vulneribus omnibus, ne dum in cauo. Porro no-

Vera Hippocraticamq; methodus sanandi cauis vlcera. Dna indicationes vniuersales proponuntur, in curando cauo vulnere.

Lib. 3. Ther.

Quatuor indicationes particulares, in curando cauo vulnere proponuntur.

mine indicationis substantiæ vulneris, hoc loco inauduntur indicationes differentiarum maximè propriarum ipsius vulneris: de quibus abundè supra disceruimus, & in sequenti tractatu, qui de ulceribus inscribitur, locupletius adhuc disceremus. Itaque prima sanandi caui vulneris indicatio, nobis insinuat, carnem eadè specie cum ea quæ perijt, regignendam esse.

Prima indicatio.

Impleri enim non poterit, quod cauum est (vt primà curandi indicatio vniuersalis postulat) nisi substantia ompinò similis ei quæ perijt, regignatur. Atqui carnis gignendæ materia sanguis est opifex vero, seu effectrix causa, ipsa natura. Verum non satis

Sanguis bonus, materia est gignenda carnis.

est sanguinem dixit, nisi etiam & bonum (inquit Galenus) addiderimus. Erit autem sanguis qui influit, & ex quo regignenda caro primordium habet, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitiosus fuerit. Sed nec satis etiam hoc loco fuerit naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & vbi. Constat autem, quod subiectorum corporum, quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignendæ carnis opifex est. Porro rationem opificis habere non poterit natura subiectarum particularum, quibus deficiens caro restituenda est, nisi iustum, & minimè vitiatum calidi, frigidi, humidi, ac sicci temperamentum obtineat. Si quidè ex horù temperatura, cuiusq; corporis natura cõsistit.

Natura subiectarum particularum, opifex est carnis regnenda.

In omni cauo vulnere duo spectanda.

In omni igitur cauo vulnere, duo illa primù cõsideranda sunt: nempe quod subiectum est, iustanc temperie sit, id est, an secundum naturam se habeat. Et præterea sanguis qui influit, bonusne, an modicus sit. Fingamus igitur & sanam esse partem subiectam, arq; affictam, & sanguinis (qui gignendæ carnis materia est) confluxum citra vllum vel in quantitate, vel qualitate vitium. His sanè ita se habentibus, nihil est præterea quod obftet, quominus prima carnis generatio prosperè contingat, idque nullius externi medicamenti opè. Quippe causis ambabus vnde nascitur præsentibus, nulloque extrinsecus quod impediat, obstante, non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ carnis generatione duplex (vt Galenus ait) provenire excrementum necesse est; alterum quidem crassius, alterum verò tenuius. Quod & in omni qualitatibus alimentii mutatione contingere solet. Hoc autem (tenuis inquam) in ulceribus recentibus, quæ hîc vulnera appellamus, Lannis sanies, Græcis ichar nominatur. Illud verò (quod crassum est scilicet) nobis sordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vulnus humidum redditur, ex crasso

In carnis generatione, duplex provenire solet excrementum.

Sanies.

Sordes.

40
sordidum

sordidum. Eoque duplicibus medicamentis eget: utiq; ut humidum est, siccantibus: ut sordidum, expurgantibus. Ergo cum nullo unquam tempore natura cesset, certè nec tempus vllum erit, in quo non ambo hæc in cauo ulcere colligantur. Quare nec tempus vllum erit, in quo non vtrūque medicamenti genus defyderetur: utiq; & quod siccet, & quod expurget. Verum non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse medicamentum debeat, inuenisse: ut iam Hippocratica veraq; methodo, inuentū est. Sed & species aliqua inuenienda est, quæ eiusmodi vulneri sit accommoda, & statuto ordine gradū circumscripta, ut carnē producere possit. Non omne naque medicamentum, quod siccant, & detergendi pollet facultate, carni producendæ est aptum, sed quod modicè: nempe primo ordine tum siccare, tum detergere possit. Quippe quod super hunc fuerit, ita, ut non modò humoris qui insunt, redundantiā consumat: sed etiam affluentē sanguinem populetur, id refici carnem (ut Gale. inquit) ceu materię eius absumēs prohibebit. Itaq; præsentī negotio aptissima sunt, thuris lachryma, & hordeacea, & fabacea, & erui farina, & iris, & aristolochia, & cadmia, & panax, & pompholyx, quæ vulgò

20 tunia dicitur. Omnia verò hæc tum maioris, minorisque discrimine inter se disident: tum alia eorum simplices qualitates videntes habent, alia compositas. Siquidem aristolochia, & panax, tum cæteris plus siccant, tum natura magis calēt: hordeacea fabarumque farina, multo his minus siccant, nec vllum calorem obtinent. Thus modicè calet, minus tamen illis siccatur: adeo ut quasdam corporum naturas omninò non siccet. Erui farina, & iris, horum atque aristolochiæ, & panacis, medium locum tenent. Secunda indicatio curandi vulnere caui, quæ (ut suprà dictum est) tum ex corporis totius, tum ex particulæ laborantis temperamento sumitur, insinuat nobis medicamenta, vel calidiora, vel frigidiora, vel humidiora, vel sicciora, ipsi vulneri esse admonenda: nempe pro natura, ac temperamento, & totius, & afflicte particulæ. Scire namque licet (ut Galen. ait) duas esse primarum indicationum differentias, quarum una ab eo, quod secundum naturam se habet: altera verò ab eo, quod præter naturam est, sumitur. Porro quod secundum naturam se habet, sui custodiam indicat, & propterea quæ similia sunt, postulat. Quod verò præter naturam est, sui ablationem desiderat: proinde & contraria requirit. Perit enim quidque in

40 contrarium, & à contrario. Igitur vulnus quidem (quia præter

*Medicamen
tum carni
producenda
idoneum.*

destinat

Ex 3. meth.

*Secunda in-
dicatio curæ
di caui vul-
neris.*

*Duas esse pri-
marū indica-
tionum differe-
ntias.*

naturam est) quo est humidius, eo sanè medicamento, quod magis ficcet, indiget. Corporis vero natura (propterea quod secundum naturam est) quanto est humidior, tanto, quod minus ficcet medicamentum postulat. Proinde, si qua sunt in diuersis corporibus vulnera vlceraue, quibus par adit humiditas: quod in ficiore corporis temperamento consistit, vtiue magis ficcari postulat: quod in humidior, hoc sanè minus, quo natura (inquit Galenus) naturæ interest. Siquidem productam carnem, ei quæ præfuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina ficiore fuit, nouellam quoque ficiorem fieri conueniet. Quare vberius hæc ficcari postulat: quantoque magis ficca fuerit, tanto quod admouetur medicamentum, magis ficcam facultatem habere debet. At in humidior natura, tantorum ijs quæ minus ficcet, medicamentis est opus, quanto

Lib. 3. meth.
med.

Thus in qui
bus, tum na
turnis, tum
vulneribus
carnem pro
ducat.

Tertia indi
catio curan
di vulneris
caui.

caro ipsa minus est ficca. Quò fit, vt thus (quod cum temperatis, & medijs naturis consentit) in quibusdam, tum vlcibus, tum naturis, pus quidem mouet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. In humidior namque natura ficare, & producere carnem potest, in ficiore, non potest, imò humectat, ac superatur à natura, proinde & putrefacit. Præterea in modicè humidis vlcibus, tum recentibus (quæ hîc vulnera & plagas appellamus) tum diuturnis, & iam inueteratis, carnem efficere potest: quippe quòd moderatè deficcet. In ijs verò, quæ præhumida sunt (quod non satis deficcet) prorsus non potest. Tertia indicatio nobis insinuat inueniendum esse remediū, quod proportionē, & statuto quodam ordine gradūve, ijs affectibus, qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat, illosque ipsos affectus prius summouendos esse, quàm ipsum vulnus carne implere tentemus. Itaque si intemperies vulnere accesserit, atque exulcerata vulneraue caro, vel prius etiam ex quauis occasione, vel ipso vulnerationis tempore, iusto calidior, frigidiorve sit effecta: vtiue medelam exigit, quæ non modò moderatè ficcet, sed etiam intantum calfaciat, refrigeretve, in quantum subiecta caro à naturali suo habitu recessit. Fieri enim non potest, (inquit Galenus) vt in vlcere, vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio (quæ omnia naturæ sunt opera) rectè vnquā cedat, nisi subiecta caro pro naturali modò se habeat. Quocirca legitimi vlceraatarum, seu vulneratarum partium temperamenti maior tibi sollicitudo erit, quoties eas, vel carne implere, vel

Lib. 3. meth.

gluti.

De Plagis, seu cruentis vulneribus.

215

- glutinare, vel cicatrice inducere studeas. Itaque congruis, atque opportunis auxilijs, aduersus illos, qui cum vulnere incidunt affectus, pugnare oportet, priusquam vulneris ipsius curationem aggrediamur. Veluti igitur si phlegmone vnà cum vulnere esset, nemo vultus ipsum, vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere, attentare debet, priusquam illa discussa sit. Ad eundem arbitror modum etiam, si sine phlegmone sola subsit intemperies, nullum horum fore prius sperabimus, quam illa sit sanata. Quod si hæc ita, vt dictum est, se habent, inspicere etiam
- 10 conueniet circundantis nos aeris temperiem. Si quidem (vt 3. metho. Gale ait) veluti medicamentum quoddam, is quoque corporibus nostris forinsecus incidens, vbi immodicus calore, vel frigore est, sanationem remoratur. Danda igitur opera est, vt medicamenta excessui [ipsius ambientis] occurrant. Ideoq; Hippocrates. In calidioribus anni temporibus, ijs, quibus frigidior facultas sit, medicamentis vtitur, calidioribus per frigidiora.
- 20 Aded (inquit) perpetuo verum est illud theoremata: Quæ secum dum naturam sunt, similia sibi, indicatiua sunt: quæ præter naturam, contrariorum, si modò saltem illa seruari, hæc summoque
- 30 si desiderat. Porro ambientis nomine hoc loco, & præsentis ita tus, seu anni tempora, & etiã regiones, cū Gal. intelligimus. Quarta indicatio particularis in sanando cauo vulnere obseruanda, sumitur (vt superius dictum est) à contrarietate indicationum: non quidem earum, quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed earum, quæ in vno, eodemq; tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Vt exempli gratiã, si ægri temperamentum iusto sit humidius: particula verò ipsa quæ laborat, siccior: aut contra, quod hæc sit humidior, & totius temperamentum siccior. Partimodo in calore, & frigore, quod contrario temperamento sit
- 40 pars cum toto. Diuersa sanè in his est ea, quæ à patiente particula accipitur indicatio, ab ea, quæ ex ægri sumitur natura. Itaq; hæc particularis indicatio, quam quartam in ordine posuimus, insinuat nobis medicamenta, vel humidiora, vel sicciora, vel calidiora, vel frigidiora, aut prout res postulabit, media, ac temperata, deligenda esse, quæ ipsi vulneri admoucantur. Statuamus igitur clarioris doctrinæ gratiã, totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoq; medicamenta desiderare, quæ minus siccant: ipsam verò ægram particulam ex earum numero esse, quæ sicciores sint, qualia sunt ea, quæ minus
- 50 carnosa conspiciuntur: Cuius generis sunt, quæ circa digitos, &

Circundantis nos aeris temperie, in curandis vulnibus maxime spectanda esse.

Quæ nomine ambientis intelligatur.

Quarta indicatio curandi vulneris caui.

Hypothesis ex lib. 3. theo.

Institut. Chirurgicarum, Lib. II.

Si eque diff. 216

ea particula
subiecta in
temperam. tale
potendum medic
ff. quod oportet
ut si est par
cula lesa in m
temperam. si
si lesa par
a fuerit quon
montis subiec
tus humidi
is oportet ad
bece medicinas

articulos habentur: præterea, quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt: ac ut semel dicam, ubi crebræ cartilagines, & membranulæ, & ligamenta, & nervi sunt: adeps verò, & caro, vel omnino nulla est, vel perquam exigua. In hac siquidem hypothefi, si quanto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula iusto sit ficcior, nec adiiciendum, nec detrahendū pharmaco quicquam est, sed tale adhibendum, quale si vlcus, vulnūve, in medij temperamētū particula cōsisteret. Si sit ficcior debito particula fuerit, quàm corporis temperamentum iusto est humidius, utique in tantum intendi siccitatem medicamen-
 10
 20
 30

*Epilogus
 præcedēti.*

*Præci com-
 muni.*

conveniet, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris sit pars exulcerata medio temperamento ficcior: ægri verò natura gradibus tribus humidior: manifestum est particulam, quæ nunc vulnerata exulceratæve est, ficcior vno gradu desiderare medicamentum, quàm pars quæ sit temperata cæteris paribus. Sed ut hæc omnia coniectura sola cognosci possunt, ita longam in hominū naturis, & medicamentorū facultatibus contemplandis, exercitatione postulant: nec est præterea, q̃ de indicationibus, quæ à calido, & frigido sumuntur, dicatur. Quandoquidem ad portionē doctorum intelligi possunt. Vidēs ne igitur clarissime, quot huic theoremaris sit opus, qui probè ac certā methodo curare vulnus cauum voluerit. Nam postquam inuentum est, humorem omnino huic vitio inesse, utique siccans medicamentū parandum indicavit. At quoniam ipsorum siccantium quædam magis siccant, quædam minus, partim ex vulnerū diversitate, partim ex ægri natura, quod expedit, est desumptum. Itaque non modò de corporis natura meditatus sit oportet, quisquis eōmodè, & ex arte sanare vulnus eiusmodi studet: verū etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse, tum fici hu-
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000

Stata iam sanguinis profusione, & parte affecta, ab inflammatione, & dolore vindicata, vino calente vulnus abluitur: mox ipso perluto, ac deficcato, pulvis aliquis carnem regenerans, aut vnguentum aliquod sarcoticum, admouetur. Itaque linamenta ijs sarcoticis (quorum lib. 6. abundè meminimus) imbuta, aut conspersa, in sinum vulneris demittuntur. Post hæc stupæ aridæ, vel quæ vino maduerint, superponuntur. Ac demùm, quæ medicamenta ad probè continere possint, deligatura adhibetur: atque æstate bis, hyeme semel duntaxat, auxilia eiusmodi permutantur. Porro eiusmodi medicamina, quæ vulnere, atque vlcere cavitates implent, mediocriter, citraque morsum abstergentia sunt, vt lib. 4. simplic. medica. Galen. annotauit.

De vulnere impleto, siue aquali.

CAP. VII.

Cacterùm vbi vulnus purgatum, impletumq; carne fuerit, æquale tunc, siue æquabile, latũ, planũ, atq; impletũ nominatur. Hoc autè cicatrice tarũ induci postulat. Porro vt ad cicatricem perducatur, amissam cuticulã, quam epidermida Græcè vocamus, desiderat. Hanc igitur tũ regignere, tum sibi vnire oportet. Verùm cùm ex femine ortũ habeat cutis, talis omninò, qualis erat, quæ periit, prorsus regigni non potest: simile quiddam tamen cuti, & quod eius officium suppleat, restitui potest: non tamen planè cutis. Quando igitur vt cutis regeneretur, fieri omninò nequit, quod superest, efficere est tentandum: nempe instaurare aliquid, quod cuti deperditæ simile sit, & carni sit veluti naturale aliquod tegumentũ. Id enim est vulnus iam repletum, planumq; redditum, ad cicatricem ducere. Qui finis est, quem nunc hìc præterdimus: Huius itaq; efficiendi ratio hæc est. Portio quæpiam subiectæ carnis nuper genitæ, & restitutæ (ea scilicet, quæ summo tenus eui denter apparet) sic alterada est, vt non amplius caro permaneat, sed veluti cutis euadat. At quo pacto iniquis ita alterabitur: profectò alicuius alterantiũ qualitatum ope. Ergo (vt Galen. ait) quoniam cutis carne ipsa tum siccior est, tum etiã densior, si car nò siccabimus, & adstringemus, cuti etiã persimilem reddemus. Et hæc quidè est medicamenti, quod cicatricè inducit, summa. Verùm ea non satisfacit: nã & glutinatoria, tum siccabant, tũ etiã adstringebant, sicuti & epulotica, id est, cicatricè inducentia. Adijciendum ergo est, quo ordine, gradũve siccare debeant medicamenta, quæ cicatricem inducunt, quemadmodum & de

Methodus inducenda cicatricis.

Cutis eadem specie cū ea quæ periit, regigni non potest.

Lib. 3. meth. meden.

far-

*Epuloticorū
facultas.*

*Tres gradus
desiccantiū
medicamentō
rū, in cura-
tione vulne-
rū statuen-
dos esse.*

Sarcotica.

*Agglutina-
toria.*

Epulotica.

*Epulotica
proprie di-
cta quam fa-
cultatem
habeant.*

*Cicatricem
per accidens
inducentia.
Cathareti-
ca.*

sarcoticis, & glutinatorijs fecimus. Id autem ex ipsa rerum sub-
stantia facile inuenies. Epuloticum nanque, id est, cicatricem
inducens medicamentum, non modò, qui influit, humorem (vt
glutinatorium) sed cum quoque, qui in ipsa carne subiecta con-
tinetur, consumere debet. Quò fit, vt multo profectò siccius,
quod cicatricem inducat, quàm quod agglutinet, medicamen-
tum esse conueniat. Itaque tres gradus desiccantium medica-
mentorum, in curatione vulnerum necessario statuendi sunt.
Nempe sarcoticorum, id est, carnem regignentium, quorum fa-
cultas ex primo ordine est desiccantium. Agglutinatoriorum, ¹⁰
quæ secundo gradu, vel etiam tertio resiccant. Et epuloticorū,
hoc est, cicatricem inducentium, quæ siccandi facultate, prædi-
cta adhuc superant. Hæc enim non accidentalem modò, & con-
fluentem (quæ præter naturam est) humorum redundantiam
desiccare, ac consumere debet: sed eum quoque humorem, qui
secundum naturam est, & in ipsa (vt dictum est) subiecta car-
ne continetur. Quod & sequentibus verbis Gale. testatus est,
Glutinatorio (inquit) vnum id propositum est, vt eius, quod præ-
ter naturam est, redundantiam consumat. Qui cicatricem indu-
cet, non hoc modò, verum etiam vt ei, quod secundum naturam ²⁰
se habet, aliquid deradat. Priusquàm igitur vulnus cicatrice pos-
simus obducere, eo vsque resiccanda caro est, donec calli simili-
tudinem induerit, & cuti similis euaserit. Quod sanè per se, pri-
marie, ac proprie, hoc est, peculiari facultate, medicamenta effe-
cerint, quæ adstringendi modicè facultatem habent: & eiusmodi
quidem, vt plurimum frigida sunt, & sicca. Cuius generis re-
putantur, galla immatura, malicorium, id est, mali Punici, seu
Granari cortex, balaustium, qui flos est sylvestris Pumicæ, fru-
ctus spinæ Aegyptiæ, vel eius loco acacia, rhus, seu sumach, &
eius generis vniuersa, quæ modicè adstringunt, atque desiccant. ³⁰
Per accidens verò, & secundariò carnem alterando, & calli in-
staurando, cicatricem etiam inducunt calida medicame-
na, quæ carnem detrahare, ac colliquare sunt nara, Gale. libr. s.
simplic. cathartica, id est, detractoria dicuntur, vulgò autem
consumptiua. Cuius generis sunt chalcitis, & æs vltum non lo-
tum: quod enim lotum est, verè est epuloticum: & æris squam-
ma, & misy, & fissum alumen, & quod vulgò vitreolum appel-
latur. Quæ prædictis verè epuloticis, id est, primariò, & ex
sua facultate cicatricem inducentibus, multò sunt valentiora.
Misy quidem, & chalcitis præcipuè. Minor autem æris squam-
ma:

De Plagis, seu cruentis vulneribus.

219

ma: atque etiam hoc mitius æs vñtum quod etiam si lauabis, utique (inquit Galenus) minus mordens medicamentum habebis. Itaque si quando ijs vti ad cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissimè ipsis vtemur: largius enim admota, mordicant, colliquantque carnem, & vlcus cauum efficiunt. Summum igitur tantum specillum, hoc est, specilli cuspidem, in ea ad exactissimum læuorem tusa dimitemus, ac post velut tenuissimum quendam pollinem, partibus, quæ cicatrice induci postulant, leuiter eas contingentes imponemus. Quod si
10 illa etiam aduras, vt minus acia, sic ad cicatricem inducendam, reddes magis apta: si verò etiam laues, adhuc fient mitiora. Sed de his locupletius, atque accuratius dicemus in antidotario, & in tractatu de vlcenibus.

De cicatricibus reparandis in vulneribus.

DEformes, atque indecoræ cicatrices, teneræ quidem adhuc, & recentes instaurantur Razi, admoto diachylo, aut lithargyro (vt vocant) nutrita. Cicatrices nigras tollunt, oleum in quo radix bryoniæ tum candidæ, tum nigræ, incocta sit,
20 dum succum reddat impositum: calamintha ex vino cocta, argenti quoque spuma cum rosaceo albo lota. Crassiores verò, & iam inueteratæ reparantur, oleo balsamite appposito, vel radice cucumeris syluestris (quem asininum vocant) trita, & apposita. Quod si his, aut similibus non tollantur, id totum quod supereminet, atque excrefcit, cultro rasorio rescindendum est, vel cauterio amouendum. Crustam verò resolues admoto gallinæ, aut anatis adipe, vel etiam mastiche. Hæc quidem in ijs agenda censent recentiores chirurgi. Verum Cornelius Celsus stultum esse existimat, si vel excreuit cicatrix, vel concaua est, decoris causa
30 rursus & dolorem, & medicinam sustinere. Alioqui (ait) res vtrique succurri patitur. Siquidem vtraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæc, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem, exedentia medicamenta conijcenda sunt: super concauam, implentia, donec vtrunque vlcus sanæ cuti æquetur, tum cicatrix inducatur.

*De vulnere supercrescentem carnem habente,
quam Græci hyper-sarcoma vocant.*

40

CAPVT

VIII

Vulnus

*Vlcus super-
crescentem
carnem ha-
bens, non v-
nus est mor-
bus.*

*Carnis de-
tractionem
medicamen-
tis perfici,
nō operā na-
tura. lib. 3.
metho.*

Vlcus quod hyperfarcosus, id est, supercrescentem carnē habet, morbus est ex eo genere, quod in quantitate magnitudinēque partium spectatur, quemadmodum & cauitas erat, de qua paulò antè egimus. ergo veluti vulnus cauum, non vnum est vitium: sed pariter cauitas, & vulnus. Ita vulnus aut vlcus, quod supercrescentem carnem habet, non vnus est morbus, sed simul caro supercrescens, & vulnus, vlcusūc. Prior morbus, qui instrumentarius est, (nempe magnitudo, quæ præter naturam est) primam indicationem (quæ veluti meta est inueniendorum remediorum) nobis insinuat, ipsius scilicet exuberantis, & præter naturæ modum excrecentis, ablationem. Alter verò morbus qui communis est (nempe soluta vnitio) coniunctionem indicat. Porro ipsa agglutinatorio, seu disidentium coniunctio, vt & carnis generatio, naturæ quidem operâ (vt prius diximus) perficitur. At supercrescentis carnis detractio, nullum quidem (inquit Galenus) naturæ opus est, sed solis medicamentis, seu medicamentorum ope perficitur, quæ vehementer exsiccent, & naturâ acria sint: cuiusmodi sunt, atramentum futorium, quod Græcis chalcantum dicitur: chalcitis seu vitreolum, sponsia, radix asphodelorum, hermodactyli, stupæ minutim incisæ, linamenta è panniculo carpta, muria acriori imbuta, & resiccata, vnguentum viride, & id genus alia tum simplicia, tum composita, quæ ex libro sexto sunt requirenda. *Cicatricum id vnum semper fideli memoria obseruandum moneo: nempe pro diuersis corporum & partium temperamentis, varianda esse remedia.* Eadem enim medicamenta quibuscumque naturis carnem excrecentem infumunt, alijs verò cicatricem inducunt, alijs solùm glutinatorio minùs præstant. Eiusmodi namque medicamenta quæ carnem minuunt (septica Græcis impropria quidem appellatiōe, dicuntur) proxima sunt, tum ijs quæ valenter detergent, tum ijs quæ cicatricem inducunt. Sic vt non pauci interim (inquit Gal. lib. 3. meth. med.) per errorem medicamentum, quod carnem minuit, vel pro eo quod sordem deterget, vel pro eo, quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli gratiâ, misy, & chalcitis (quæ inter cicatricem inducētia annueramus) si naturæ humidæ applicabis, potius carnem demere, quam cicatricem inducere deprehendes. Adde, quòd inter eiusmodi septica, quæ carnem tenellam vuleribus, dam valentiora sunt, quædam imbecilliora, & mediocria. Quo-

circā nonnulla mediocres carni supercrescentias exedunt. Alia verò maximas hyperfarcoses, id est, carnis immodicas excreſcentias minuit, & ad vsq; penitiora crustis obducūt. Cuius generis est, quod recipit calcis viuæ, squāmæ æris, & mannæ thuris pares modos. Sed de ijs quidem adhuc locupletius libro sexto dicitur: quare ad reliquas vulnerū differentias properandum est.

De vulnere contuso, ab aëre alterato, dura, calloſaq; labra habente, cruciante, & phlegmone, aut alio præter naturam tumore, implicito.

CAP. IX.

10

Vulneris (vt in præcedentibus demonſtrauiſimus) quā vulnus est, ſanatio, mediocris ſiccatio est. At vulneris, quod cum alio affectu coniunctum est (cuius videlicet præcedere curationem oportet) eius curatio, vt vulneris ſolius non est, ſed prior illius affectus, qui cum vulnere conſiſtit, ſecunda verò ipſius vulneris: nam ſiue phlegmone quæpiam, ſiue nigriria, ſiue ecchymōſis, ſiue eryſipelas, ſiue tumor is, qui cœdema dicitur, vlceratam, vulneratamve carnem obſederit, primū eius molienda curatio est. At verò quod
20 vulnus interim non ſolū non commodè curatur, ſed multo etiam maius redditur, id neminem (inquit Galenus) latere puro. Itaque ſiue contuſa fuerint circumpoſita vulnere loca, ſeu phlegmone, aliūſue tumor præter naturam in his conſiſterit, propria eius affectus ſanatio inuenienda nobis est: illud pro certo habentibus, fieri non poſſe, vt vulnus ſanetur, niſi locus, in quo conſiſtit, prius ſit ſanatus. In cuiusmodi igitur vulneribus, ſuppoſito communi regimine phlebotomiæ, purgationis, & dietæ (quandoquidem hi affectus præterquā quod vulnera ipſa ad cacoethiam præparant, fluxionem etiam in vnum locū do-
30 lentem excitant, auocantque, tamenſi etiam corpus nec ſanguine, nec vilo ſuccorum vitio redundet) topica, ſeu localis curatio communis est, agglutinationem prohibere, & fluxionē arcerere. Quocirca rectè mihi feciſſe videberis, ſi in contuſo, cruciante, & phlegmonoſo vulnere, ſtatim per initia, loca circumiacentia illiueris, vel roſaceo, vel myrrino oleo, vel vnguento, quod conſtat bſolo armenia, oleo, & aceto. Suprà verò dolentē partem olgum aliquod admoueris, quod vel leniendi, vel moliendi, vel maturandi (vt res exigit) vim habeat. Ponamus igitur carnoſam aliquam particulam telo tum caſam, tum contu-
40 ſam eſſe: huic ſanè ita ex Hippocratis ſententia medendum est,

Vulu. contuſi recta curandi ratio.

Hypotheſis.

vt

*Gemina in-
zētio: in cu-
rado vulne-
re cōtuso p-
ponitur.
Li. 4. The.*

vt quàm celerrimè suppuret. Neceſſe enim eſt, carnes ſic contu-
ſas, putreſcere, & in pus verti. Poſtquàm verò ſic per quandam
putreſcentiam in pus verſæ fuerint, liquari, & tandem nouam
carnem naſci. Adde, quòd hac curandi via, & ratione obſerua-
ta, minus (eodem Hipp. autore) phlegmone vrgebitur caro ipſa
ſic cæſa, contruſa quæ. Duæ igitur intentiones in curando vul-
nere contuſo, nobis proponuntur: nempe ſuppuratio, & nouæ
carnis generatio. Porro cùm ſuppuratio cum quadam fiat pu-
treſcentia, & omnia quæ putreſcunt (Gal. autore) ex calido, &
humido ſic afficiantur, nimirum quæ calfaciant, humectent- 10
quæ, hiſce contuſis vulneribus, atque adeò omnibus ijs affecti-
bus, quibus moueri pus expedit, admouebimus. Cuiusmodi
ſunt, maluæ coctæ, radix althææ, tetrapharmacum, panis triti-
ceus, hordei farina ex aqua, & oleo: item quæ panis ex aqua &
oleo. Præterea fomentum multæ calidæ aquæ: hæc enim, & ſi-
milis omnia quæ ſic calfaciunt, & humectant, celerrimè pus mo-
uent. Horum autem materiam copioſam habes libro præced.
de tumorib. præter natu. & in antidotario: item lib. 5. de ſimpl.
Verùm enim verò non fuerit alienum, hîc vnum, atque alterũ
compoſitum medicamentum ſubijcere, quod ad ſuppuratione 20

*Ex Ari. ſ. n.
3. quartu.*

in propoſito vulnere beneficiat. ꝛ. radices althææ, cucumeris »
agreſis, ſingulorum vnciam ſemis, origani agreſis, hyſſopi ana »
manipulum ſemis, ſorum chamæmeli, ſeminis lini, ana pugillũ »
vnum, ficus pingues ſex, vnas paſſas pari numero: vna bulliant, »
ac tandem ijs preſſis, ac diligenter tuſis, adde galbani, myrrhæ, »
ſtyracis liquidæ, cæſypi, ana drachmam vnã ſemis, ſanguinis »
draconis, adipis porci, ana vnciam ſemis, componatur mala- »
gma. Conducit plurimũ ad eandem intentionem aſſequen- »
dam, & infrâ ſcriptum medicamentum, in formã emplaſtri re- 30

Emplaſtrũ.

Accipe foliorum maluarum, & violarum ana mani- 30
pulum vnum, radices althææ libram ſemis: decoquantur in iu-
re carniũ abſque ſale, poſtea ſubigantur in mortario, & cribro
incernantur, ex cribrata cum prædicta decoctione, & farina
hordei, ac tritici, ana quantum ſatis eſſe videbitur: fiat empla-
ſtrum ſolidum, ſiue malagma. addẽdo buryri & olei communis
ſingulorum vncias tres, vitellos duorũ ouorum, & croci momẽ-
tum. Hoc autem, vt & præcedens malagma ſuper vulnus, & cõ-
tuſam carnem, dandũ eſt. In ipſo vero vulnere imponi debet
diſeſiuũ (vt vocant) ex terebinthina reſina, & ouorum luteis.

*Digeſſiuum
vulneri im-
ponendum.*

Ceterũ perducto ad ſuppuratione vulnere, hiſ, quæ pus mo- 40
uent,

De Plagis, seu cruentis vulnereb.

223

uenæ, relictis, ad purgatiã, & detergentiã transeundum erit, vt
suar, tincta in melle linamenta, mundificatiuũ ex apio, & id ge-
nus alia, quæ in antidotario descripta inuenies. In omnibus au-
tem eiusmodi vulneribus, recte inditur turunda melle rosaceo,
aut vnguento Apostolorũ nuncupato, imbuta. Suprà verò id pur-
gans, detergentiũ medicamentum, suprà aridæ dandæ sunt:
adaptandæq; est deligatura, quæ admora medicamenta probè
retineat, donec perfectè expurgatũ vulnũ fuerit. Tum demũ
autem purũ vlcus est (inquit Celsus) cùm rubet, ac nimium ne-
que siccũ, neq; humidũ est. Ac quodcũque sensu caret, quod nõ
naturaliter sentit, quod nimium aut aridũ, aut humidũ est,
quod aut pallidũ, aut albidũ, aut liuidũ, aut nigrũ est, id pu-
rum non est. Purgato, vt decet, vulnere, carne ipsum implere
oportet, quæ secũda erat in curando hoc contuso vulnere, intẽ-
tiõ. Carnẽ igitur modo, quo suprà diximus, generare oportet,
& iam impletũ vlcus ad cicatricẽ perducere. Quẽ scopum faci-
le assequeris, si turundã indies paulatim imminueris. Ita enim
soliũ naturæ operã, ac citra vllũ medicamentũ, vlcus carne im-
plebitur, & cicatrice obducetur. Quod si caro multũ effer dila-
cerata, & futura utilis videretur, cõsuatur laxa quadã futura, la-
bia retinẽte. At si labra vulneris ab ambiẽte alterata fuerint,
ac dura, callosaq; appareãt, scalpello illa (modò nulla alia obsti-
terit dispositio) conium amouendo, renouare oportebit: dein-
de cõfuerẽ. Porro si cæsa contusãq; caro enumeratis modò au-
xilijs, ad suppurationẽ perducì nõ possit, videaturq; in gangre-
nam, ac partis corruptelã degenerare, (quod ex tarda, difficultq;
maturatiõne, & fusco, liuido, aut nigro loci affecti colore, de-
prehendes) vnguentũ Aegyptiacum nominatũ, capite de cura-
tione gangrænæ descriptum, aut aliquod aliud simile medica-
mentum, quod ad eiusmodi corruptionem, & mortificationem
fit idoneum, protinus erit admouendum. Quod si alia
quædam symptõmata, vel affectus, huic contuso vulnere super-
uenerint, vt dolor, phlegmone, aut quicvis alius tumor præter
naturam, aduersus illa congruis (quæ suo loco dicta sunt) reme-
dijs erit pugnandum.

*Detergẽtia
quando ad-
mouenda.*

*Stupa ari-
da.*

*Corne. Cel.
lib. 5.*

*Secunda in-
tentio cu
randi vulne-
ris contusi.*

*Si caro con-
tusa multũ
sit laniata.*

*Si labra vul-
neris fuerint
dura, & cal-
losa.*

*Si cõtusa ca-
ro in gangre-
nã degeneret.*

*De ecchymosi, seu ecchymomate, id est: sanguinis subtercu-
tem effusione, & coitu, quod vnũ cum contusione, ruptioneq;
cutẽ integrã manente, hoc est, non vulnere, &, incidit.*

*Ecchymosis
quid.*

*Ecchymosis
ma à quib⁹
occasionibus
excitetur.*

*Ecchymosis
nota.*

*Anastomosis
vnde exci-
tetur.
Lib. 5. the.
Diapedesis
vnde oria-
tur.*

*Species ec-
chymoma-
tis.
Iudicia de
ecchymoma-
te.*

Ecchymoma, id est, sanguinis subtercutē effusio & coitus solutæ continuitatis genus quoddam est, quod plurimum (vt lib. 4. metho. ait Gal.) vñ cum contusione, ruptioneque incidit. Quocirca non fuerit à proposito alienum, si propter affinitatem, quam habet cum prædicto vulnere, pauca nunc obiter de eo dicamus. Itaque incidit interdum hoc vitium, cum sola contusione, citra carnis musculosæ, in profundo hærentis corpore, ruptionem, quod Græci rhegma adpellant: vt ex violento ictu, vel graui casu. Aliquando verò cum sola ruptione, absque etiam contusione carnis (quod Græcis farcothlasma & thlasma dicitur) consistit: vt cum motu quoque valente, & confertim factò, citra graue ali- quod extrinsecus incidens, caro dirumpitur. Nonnunquam etiam cum utroque, vt cum graui, ac duro quoque corpore, quod extrinsecus superinciderit, vel casu ab alto, non modò carnosæ musculorum partes, sine cutis diuortio contunduntur, sed etiam ex distentione violenta, & confertim facta, ab- rumpuntur. Tunc enim venis exiguis, in ea sic contusa ac rupta carne, diuortium expertis, sanguis exilit, vnde ipsum ecchymoma sub cute collectum nascitur. Cuius apparentes notæ sunt, tumor mollis, & tactui cedens, liuidus, & magna ex parte indolens. Fit autem etiam aliquando ecchymosis, & ex oris vasorum apertione, quam anastomosis vocant, & ex ea, quæ à nonnullis diapedesis dicitur: id est, transcolario, exilitio, vel transmissio, aut subsultus. Porro accidit anastomosis propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius impetu ruat, copiam. Adhæc, ob acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat qualitatem. Diapedesis ex tunica quidem ipsa rarsa, sanguine verò tenuato oritur. Accidere præterea interrim potest, & ex gracilium vasorum ore adaperto. Verum de ea tantum ecchymosis nunc agitur, quæ contusionem, vel ruptionem consequitur. Hanc igitur ecchymosim propter solutam vnitatem affatim factam, dolores, & ob sanguinis in profundo concursum, abscessus nonnunquam insequuntur, qui magna ex parte per halitum digeruntur. Species autem ecchymomatis sunt hypopia, quæ Romani suggillata vocant, & liuores ex ictu prouenientes, Græcis hyposphagmata nuncupata, quæ & interpreti Auicennæ vestigia percussione, Latinis verò propriè vibices, dicuntur. Ecchymoma quod cum magna, ac violenta contusione incidit, periculo non vacat. Solet enim frequenter

(si ne-

(si negligatur) non modò afflicta particula, sed & coporis totius corruptionem adferre. At si forsan in contusione, quæ cum ecchymosis consistit, cutis à carne seiuncta, maneat pendula, raro vel nunquam agglutinatur. Proinde satius est, eam præscindere, & exsiccantia medicamenta admoovere, vel absque deligatura, locum sic excoiatum relinquere. Aer namque ambiens cutis ipsius instaurationem non mediocriter adiuvat.

Curatio ecchymomatis, quod vel contusio, vel ruptio excitantur.

10

CAeterum, quoniam ecchymosis seu ecchymoma, plurimum (ut Galenus ait) vna cum contusione, ruptioneque incidit, idcirco in ipso curando, plures erunt indicationes observandæ. Semper enim pro affectuum numero, etiam medendi indicationes respondent. Prima indicatio est, fluentem ad locum affectum materiam vacuare, & auertere. Quod optimè quidè sit, auctore Avicenna, venæ sectione, quam omnes etiam artis periti, in hoc affectu imperant, quamvis corpus mundum, hoc est, purum ab excrementis, fuerit. Secunda intentio est,

20

dolorem sedare, & parti læsæ, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis, & stypticis eam perfundendo, arque illinendo. Vnde Razes, & Lanfrancus partem eo vitio laborantem, iungebant rosaceo, & post vñctionem, pulvere myrrillorum respergebant, ac mediocri deligatura stringebant. Verùm enimverò in communi usu observatum est, ut per initia oui candidum rosaceo permixtum, loco dolenti, ac sic affecto, admoventur. Tertiò, curationis consilium eò dirigere debemus, ut sanguinem ipsum totum, qui subter cutem effusus est, dissipemus, ac resoluamus, idque confestim, priusquam nigrescit, & in grumos iam coierit. Quod factum quidem haud difficile erit, si & sanguis effusus tenuis, & prope summam cutem; non autem in profundo situs, fuerit. Quod si discuti non possit, tum infra scriptis digerentibus medicamentis, tum scarificationibus educendus erit, & si nihil hæc promouerint, affectus eiusmodi more abscessuum curandus erit. Itaque sanguinis sic per contusionem ruptionemque, subter cutem dispersi, dissipatio, & vacuatio, ecchymomatis, quæ ecchymoma est, propria est curatio, ut libro quarto methodi medendi ijs verbis Galenus testatus est: Sanè (inquit) ecchymosis omnis vacationem pro remedio

40

curationis indicat. Quare calfacientibus huic, & modicè

Lib. 4. meth.

Prima indicatio in curanda ecchymosi, observanda.

Secunda intentio.

Tertia intentio.

Propria ecchymoma curatio.

Omnes ecchymosis vacatione

indicantur.

cantibus medicamentis est opus [quale est ex nigris populis aco-
pon]. Quippe quæ vehementer siccant, digerunt illa quidem
in principio euidentiùs, quàm quæ sunt imbecillia: cæterùm
nonnihil ipsius vitij scirrhum, difficileque curatu relinquunt.
Curandum verò est, vt ruptis, quæ in profundo hærent corpo-
re, hæc tum vires habeant magis intentas, tum ipsa magis acria,
magisque dissipantia sint: tum (vt semel dicam) tanto effica-
ciora, quantò magis à cute ad profunda ecchymæsis recessit.

*Cucurbitu-
le vsus, in
quibus ecchy-
mæmatis
utilis.*

*Ecchymæ-
matis p. ini-
tia, nonni-
hil adstrin-
gentiū discu-
tientibus ad-
miscendum.*

*Ad inuetera-
ta ecchymæ-
mata.*

*Lib. 4.
digestio p. ior
solum hæc sumit*

*Potiones
quàm in ec-
chymæsi re-
centioribus
propinquantur.*

In talibus sanè nec cucurbitæ vsus sit inutilis: id enim instru-
mentum, ad violentū attractum, à medicis est excogitatum. Ve-
rùm enim uerò, quoniam tunicæ venularum, ex quibus sanguis
exiit, contusæ sunt, per initia sanè (vt Galeno, & Paulo visum
est) nonnihil ex adstringentibus, ijs quæ digerunt, admiscere o-
portet. Contusæ enim illæ venularum tunicæ aliquam densa-
tionem requirunt, vt ad naturalem suum statum reducantur, &
ne noua materia ob dolorem attracta, ad locum contusum de-
labatur. Quandoquidem si solam digerentem vim haberet me-
dicamentum in principio applicatum, non modò id quod effu-
sum est digereret, sed & per contusionem aliquid sanguinis,
qui contusis venulis continetur, extraheret, vt testis est Galib.
5. de compositis medic. secundum locos. Quando autem in na-
turalem statum venulæ redierint, citra adstrictionem ad sola
digerentia medicamenta venire tempestiuum est. Porro in qui-
bus sic modicè adstringentium quiddam, nec non per halitum
digerentium miscere conuenit, perspicuum est, imbecilliora pri-
mum debere assumi: validiora autè inueteratis & ijs quæ nigre-
scunt, amoueri. Ad inueterata igitur ecchymæmata, Paulo etiã
autore, radícula illitu prodest; quippe discutit ea, vbi erodere
inceperit: vel ipsius radiculæ succus, cum micis panis inductus.
Cæterùm ex moderatè digerentibus, quæ vulgò resolutiua do-
3

mesica vocant, hæc sequentia sex auxilia in communem vsum
veniunt. Primum, constar vino, melle, & sale. Secundum,
ex farina hordei, calaminthe, & vino conficitur. Tertium,
recipit ceram, & cuminum. Quartum, fit ex floribus chamæ-
meli, meliloto, storchade, & cumino, omnibus in vino de-
coctis. Quintum, ex maluis, fursure, absinthio, cumino, aut
anetho, aqua, vel vino incoctis. Sextum fit, ex farina hor-
dei, & fœnigraci, croco, & momento auripigmenti, omnibus
quidem aqua calaminthæ incoctis. Solent & potiones quæ-
dam insitui, quæ si assumantur, sanguinem concretum, & extra
4
vasa

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

227

vaia effusum (vulgò mortuum vocant) dissipare, ac resolvere creduntur: cuius generis est ea, quæ constat bdellio, casto, centauro, & syropo acetoso, atque huic aliæ quædam confimiles, quæ in casu ab alto, offensione, & violento membrorum tractu, ac distentione, offerri consueverunt. Cum autem totum ecchymama, digestum per halitum est, siccare iam vehementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere, omniaque in summa facere, quæ ut vlcus coalescat, efficiant. Ergo si euocatum celeriter totum ecchymama sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spacio, sordes multa subnascens, medium inter vlcis labra spacium occupabit, ita, ut iam coire ruptio non possit. Atque inde adeò fit, ut qualibet leui de causa, nos hæc sui admoneant: nam siue quis obriguit, siue parùm concoxir, siue febris laborauit, siue se vehementius fatigauit, cuiusmodi illicò particulis dolet. Non enim (ut modò dictum est) in idem coire ruptionis labra, sed tantum propè sunt admota. Quò fit, ut leui momento ea facile separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur. Et quid quæso aliud, quàm assidue nouum ecchymama creatur, & primò illi (cùm videlicet primū caro est rupta) persimile? nisi quòd ex tenui magis sanie nunc constat: cùm in principio è sanguine ecchymama esset. Ideoq; facilius etiam nunc, quàm prius, seu per initia, digeritur. Cæterum quomodo curari debeant, suggillata, liuores, aliaque id genus accidentia, quæ contusiones, graues casus, & offensiones consequuntur, aliquando forsitan alibi dicetur. Hactenus de vulneribus, quæ in carne maximè per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicamus, quæ morsu fiunt.

Si totum ecchymama per halitum digestum sit.

Cur quæ rupta fuerit, subinde dolorem renouent.

30 De vulnere ex morsu, vel ictu animalium, tum venenatorum, tum aliorum non ita noxiorum illato, & præsertim de morsu canis rabiosi. CAP. XI.

DE vulneribus, quæ ex morsu punctiue animalis inferuntur, & præsertim canis rabiosi, aut alicuius venenatæ feræ, vel bestię, quidam memoriæ pauca tradiderunt. Quippe quæ non adeò frequenter accidunt, & si aliquando inciderint, solcant rustici, ac plebei homines neglectis chirurgis, ac medicis, medicamentum præsens ad hæc ipsa conficere, ex alijs, cæpis, & oleo, quod cataplasmatibus modo vulnere imponunt. Adde, quòd exquisitè de ijs tractare, magis ad medicum (quem physicū appellant) quàm chirurgicum,

*Qui præfer-
tim auctores,
tum recen-
tes, tum ve-
teres, de ve-
nenatis vul-
neribus scri-
pserunt.*

nisi quod ad vulnus spectat, pertinet. Itaque qui absolutam eorum cognitionem habere desiderat, ex Arabicæ familiæ scriptoribus, Avicennam, Razem, & Rabi Moysen; & ex recentioribus Barbaris, Henricum legat, oportet, qui de omnibus ferè venenis, fusiſſimè tractauerunt. Sed multò his doctius, atq; accuratius de eiusmodi morſibus, & ictibus venenatorum animalium scripſerunt, Aëtius Antiochenus, Paulus Aegineta, Cornelius Celsus, Aëtuarus, Oribasius, & ante hos omnes adhuc Dioscorides. Quos omnes, si velis, hac in re poteris consulere, aut vnum saltem ex illis, quem placebit, deligere. Tantum enim hoc loco 10
vniuersalem, vulnere ex morſu punctuue illatorum, curationem, referemus, atque eam duntaxat adhuc: quam maximè chirurgia molitur. Itaque morſus animalium punctuue, duplici constant differentia: alij enim sunt venenati, alij verò minimè: venenati dicuntur, qui à virulentis bestiis inferuntur: cuiusmodi sunt, rabioſus canis, serpentes, peregrinæ angues, ſcorpio, basiliscus, draco, vipera, coluber, mus araneus, phalangium, aspis, & id genus aliæ virus eiaculantes feræ. Contra verò non venenati morſus dicuntur, qui ab animantibus non ita virulentis imprimuntur, inſigunturve: cuiusmodi sunt, canes domestici, ſimia, 20
homo, equus, ſues tam domesticæ, quàm sylueſtres, felis in domibus oberrans (quem nominant elurum) & ſimilia. Ictu quoq; hominum corpora lædunt, vesper, apes, muscæ, culices, pulices, & cimices. Sed qui à vesperis, & apibus punctus inſiguntur, plus noxæ, ac doloris inferunt, interdumque chirurgi operam desiderant. Omnis autem ferè morſus (ſi Cornelio Celſo credimus) habet quoddam virus. Paulus non addubitat ipſius etiam hominis morſus, cum virulentis bestiis conſcribere. Siquidem (inquit) ma-

*Morſus om-
nis quoddam
virus habet.*

ligniores multo, cæteris alijs vlcenibus apparent, præſertim ſi qui morſum intulit, ieiunus fuerit, anteaque legumina, pro cibo 30
ſumpſerit, atq; imprimis lenticulam. Eapropter, quæcunque communiter in alijs virulentis morſibus, vel ictibus commemorantur, ac profunt, eadem quoque in his morſibus, extrinſecus per initia adhibere cōueniet, exceptis nimium acerbis, & cauſticis, id eſt, adurentibus. Cæterum morſus ipſi, ac punctus, tam venenatorum, & lethalium, quam non virulentorum, in quibusdam, quod ad rationem curandi atinet, conſpirant, & in quibusdam euariant. Conueniunt quidem in eo, quod neque deſiccantia, neque repellentia, neque cicarricem inducentia (quorum natura adſtrictoria eſt, & deſiccatoria) deſiderant, 40
quin

*In quib⁹ con-
ſpirent, et in
uicem diſsi-
deant viru-
lenti mor-
ſus, & non
venenati.*

- quin potius attrahentia, dilariantia, relaxantia, atq; emollientia statim ab initio expostulāt. Tam hi etiam, quā illi, sedulo repurgari appetunt: ac demū postquā vlcera probē fuerint repurgata, cicatrice obducī. In hoc autem differunt, quōd morsū non venenato abundē satisfaciunt, domestica (vt vocant) attrahentia, & maturantia. Cuius generis sunt, cæpæ, & allia, tam aggregata, quā satua, cocta, trita, & cum fermento, oleo, & sale mixta. Si vērō vulnus morsū, aut ictu virulentum aliquod animans homini intulit, quæ vehementer etiam trahunt, ne virus interna subeat, & ad cor serpat (cuius destructionem ex sua pte natura semper appetit) statim crunt ad mouenda, vt cucurbitula, loco prius scalpello inciso, & emplastra, quædam validē virus extrahentia, quæ statim subiungemus. Deindē candentē ferro (si paritur locus) vulnus adurendum est, aut caustico saltem aliquo medicamento, ac vehementer exedente vtendum. Eiusmodi enim vulnera omnia lethalia sunt, & præsentem sepe perniciem (si protinus non succurritur) adferunt. Proindē & extrema illis (iuxta Hippocratis consiliū) adhibenda sunt remedia. Adeoque vt membrum, quod sic à lethali, ac virulenta fera, vel morsum, vel ictum est, interdū præcidere, seu amputare conueniat. *Quemadmodū Galenus memoriæ prodidit,*
- 10 *vinitorem quendam à vipera morsum, vbi feram agnolceret, confestim læsum digitum falce abscidisse, atque in totum sic periculum liberatum.* Porro venenatos morsus, aut ictus, punctusve ijs sequentibus notis deprehendes. Vulnus infixum validē doler, punctiois, & mordicationis sensus vehemens, in afflicta parte per sentitur: Vulneris, atque affecti loci color perit, ac mutatur: aut enim rubet, atque inflammatur, aut liuet, vel nigricat. Laborans grauibz angitur molestijs, ac
- 20 *totus ardet: corpus totum eius ipsius, qui vel demorsus, vel ictus est, ita nonnunquā obstruescit, ac talem (vt sic dicam) obdormitionem sentit, vt tangentem non sentiat. Verū nihil ferē in ijs perpetum est. Neque enim dolor semper adest vehemens, aut atrociter molestans in omnibus eiusmodi ferarū, ac bestiarū venenosarum ictibus, aut morsibus: sed in quibsdā satis remissus est, vt in morsu canis rabiosi. Nec enim protinus infestū quicquā, vbi momorderit (vt inquit Dioscorides) infligit, nisi vt vulnus dolorem, hoc est, statim quidem, vbi morsu excandescens rabie canis, in partē aliquā vulnus intulit, nihilo*
- 30 *plus doloris, aut molestiæ ab initio adferre videtur, quā non rabiosus.*

*Venenum
semper cor
petit.*

*Vinitor mor
sus à vipera
sibi digitum
amputauit.
Morsū, ac
punctū ve
nenatorum
notā.*

*Morsus ca
nis rabiosi p
initia nihil
molestiæ ad
fert, præter
quā ex
vulnere do
lorem.*

*Scorpionis ichus, quæ symptoma-
ta inuehat.* rabiosus. Sed & qui à scorpionis ictu dolor accidit, modò de-
crescit, modò intenditur: ac nunc feruor, nunc frigus, tum per-
cussim locum, tum corpus totum vicissim inuadit, vt Paulus an-
notauit: & vt breuiter dicam, sua cuiusque animantis morsibus,
& ictibus propria, ac peculiaria signa sunt, vt videre est apud
Dioscoridem, Paulum, Aëtium, Cornel. Celsum, & alios, qui
de venenatis hisce bestijs fusius, atque accuratius scripserunt.
Cæterùm alijs venenatis bestijs (quòd apud nos rarissimè sunt)
prætermisiss, operæ precium non absre duximus, si vnus rabio-
si canis, particulatim meminerimus. Siquidem hoc animal & 10
fecundum prouentu, id est, frequens, & contubernale homini,
ac domesticum esse consuevit. Adde, quòd & rabie sæpius cor-
ripitur, ac perit, ab eoque difficile caueri possit. Inde periculum
ineuitabile hominem manet, nisi multis, & conuenientibus vsus
fuerit prædijis. Plærunque autem flagrantissimis & sibus canis
in rabiem efferatur. Interdùm etiã per frigora maxima, vt Ly-
cus memoriæ mandauit. Iam verò rabiosus, potù, & escam auer-
satur, siti premitur, neque tamen bibit: anhelat præterea nò pa-
rum, idq; exerta lingua, aures inclinat, largam, spumantemq; pi-
tuitam naribus, & ore projicit: mutus in totum est, & veluti insa- 20
nus, vt ne domesticos quidem agnoscat: toruè, & solito tristius
intuctur, in omnes passim sine latratu irruit, & nullo discrimine
beluas, & homines, notos iuxta ignotosque morfu adoritur. Vbi
autem momorderit, statim quidem nihil molestiæ, vt prius dixi-
mus) adfert, præterquam ex vulnere dolorem. Exinde aurè (nè-
pe téporis progressu) morbus ille, qui ab aquæ metu, hydropho-
bia Graia est voce appellatus, exoritur. Miserrimum sanè (in-
quit Celsus) genus morbi, in quo simul æger, & siti, & aquæ me-
tu cruciatur: quo oppressis in angusto spes est. Porro magna ex
parte circa quadragésimum ferè à morfu diem, solet hic morbus 30
hydrophobicus ingruere: quibusdã & post sex menses: alijs pro-
ditum etiam est, post septè obuuisse. Sunt & qui post annum
vnum, vel etiam duos interdùm, à morfu impresso, morbū hunc
contrahi testentur. Narrant, & aliquos post septenniū hoc aquæ
metu fuisse tentatos: Quò fit, vt qui à cane rabido morsi sunt,
non valde tuti mihi esse videantur. Non enim statò, definitoq;
tempore post morsum, aquæ pauor exoritur. Itaque quoniam
non confessum à morfu, huiusmodi aquæ metus, homines inua-
dit, quidã decepti, canem, qui momorderat, nò fuisse rabie per-
citus, arbitrati sunt, & proindè vulneri cicatricem inducere, pro- 40
perarunt.

peratunt. Atque hoc pacto ipſimet huius mali autores, ſibi per-
 niciem attulerunt, dum ſcilicet huic affectioni cauſam dede-
 runt. Hac autem uſus probatione atque experientia, facile de-
 prehendes, rabioſus ſit canis, nec ne, qui momordit: *Iuglandibus* *Rabioſi canis*
 « nuciſus conciſis, & accuratè tritis, vulnus diligenter obſtruitur, *nis morſus*
 « & poſtea circumligatur, ſequenti die ablata, gallinaceo, aut gal- *probatio, canis*
 « linæ in cibo apponatur, ac primum ſanè non attingent: fame *Oribasius,*
 « autem vrgentè, ſi eas vorauerint, rem attentius conſiderato.
 « Nam canis qui momordit, ſi non fuerit rabioſus, ſoſpites, ac ſu-
 10 perſutes aues, quæ nuces illas comederint, permanebunt: ſin cõ
 « trã rabie correptus fuerit, poſtera die peribunt: atque tunc ad
 « vulneris dilationem properandum erit. Iterumque poſt pan-
 « cos dies eadem experientia vtendum: Et ſi non perierint galli-
 « nacei, tunc vulnus ad cicatricem perduces, nullum iam veritus
 periculum. Huiusmodi indicationis, ſeu experimèti, autor quõ-
 dam fuiſſe putatur Oribasius, vt refert Paulus. Cæterum hy- *Hydropho-*
 drophobiam, id eſt, aquæ metum, Græcorum aliqui, ex immodi- *bia vnde.*
 ca fieri ſiccitate, dixerunt: quaſi in contrarium habitum, muta-
 ta penitus humida eorum ſubſtantia, veruntamen Ruſſus anti-
 20 quæ medicinx grauis author, infamix ex atrabile ſpeciem, eam
 eſſe teſtatur eſt, magna ſcilicet veneni eius cum humore illo ſi-
 militudine. Itaque non ſecus quàm reliquos melancholicos, &
 atra bile inſanientes, ſciamus alios alia timere: idque etiam ſenti-
 re videntur, qui dicunt: canis ipſius qui momorderit imaginem,
 in aquis opinari eos ſe videre, eoque metu territos aquam fu- *Pauci ex ijs*
 gere, & auerſari. At ex ijs qui hoc vitio ſunt occupati, nullum *qui aquam me-*
 (inquit Paulus) præterquàm vnam, aut alterum ſeruatum fuiſ- *lulaborant,*
 ſe ex hiſtoria didicimus. Eosque non à rabioſo cane morſos, *ſeruantur.*
 ſed ab homine quodam morſo rabienteque, & aquam iam ti-
 30 mente, vitium adeptos. Siquidem Eudemus (vt refert Dioſcori
 « des) ſuperaſſe, ac ſuperuiuiſſe quendam aſſeruat. Et Themiso-
 « nens (inquit) aliqui de morſum in idem vitium inciſiſſe, & euafiſ-
 « ſe fatentur. Moleſtiſſimum itaque, & dum iam occupauit, inſa-
 nabile eſt hoc morbi genus. Ante tamen huius occupationem,
 multi etiam quos canis momordit, ſeruati ſunt. Euenit autem
 hic morbus hydrophobius, cum neruorum diſtentione, vel
 conuulſione, totiusque corporis rubore, præſertim faciei, cum
 ſudore, & languore quodam, ſuique ſuſtudio, & domeſticeorum
 ignorantia. Aliqui auræ ſplendorem, & aquam fugiunt, & dum
 40 vident, & dum admoventur, Nonnulli etiam omnem humore

*Cor. Cel. re-
mediū con-
tra aqua
metum.*

auerantur, & horrent: alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam, qui canum more latratus edant, & obuium quemque dentibus impetunt, morsuque suo alios simili vitio labefaciunt. Miserrimum sanè (vt iam diximus) & molestissimū morbi genus. Cæterum vnicum eo oppressis remedium esse scribit Corne. Celsus lib. 5. suæ medicinæ: nempe non opinantem in piscinam non antè ei prouisam proijcere. Et si natandi scientiam non habet, modòmersum bibere pati, modò attollere. Si habet, interdum deprimere, vt inuitus quoque aqua satietur. Sic enim (inquit) simul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in oleum calidum dimittendus est. Sed iam tempestiuum est, communem virulentorum omnium vulnere (vt sumus polliciti) curationem aggrediamur.

Communis, aduersus omnes morsus, & ictus virulentos, curatio.

*Geminā esse
curandi ra-
tionē, in om-
ni morsu,
aut ictu ve-
nenato.*

*Virus in cor-
pus morsu,
vel ictu eia-
culari, qui-
bus auxilijs
vacuetur.*

*Alteratio
eius quod do-
lore creat.*

Virulentorum omnium animantium morsus, aut ictus, non nimium distantem curationem desiderant, quamvis in ea multum antiqui variarunt, vt in singula genera bestiarum, siue animantium, singula medendi genera præciperent, atque alijs alia. Sed in omnibus eadem valde multa, maximè proficiunt. Itaque quæ ad hanc communem medendi rationem attinent, primū exponemus: deinde cursim perstringemus, quæ ad peculiarem prouocant: eorum curationem pertinent, quos rabiosi canes (quæ frequentiores apud nos sunt, quàm alia virulentæ bestia) commemorerint. Igitur in omni morsu, vel ictu animalis, quod venenum vibrat, gemina est Gale. lib. 13. meth. med. curandi indicatio: nempe virulenti ipsius liquoris vacuatio, & eius, quod dolorē creat, alteratio. Sanè (inquit) virus eiacularum vacuant, tum exalta-
tione medicamenta omnia, tum quæ citra calefactionem vehementer trahunt: veluti & cucurbitulæ, & cornuæ quædā, quibus nonnulli cucurbitularum vice vtuntur. Sunt autem & quorum suo virus extrahunt, ægre videlicet particulæ admoti, ipsumque vulnus labijs complexi. Huc sanè pertinet & cauterium, & medicamenta, quæ cauterijs similiter esccharam efficiunt. Atque hæc omnia totam eius quod infestat, substantiam exinaniunt. Alterum auxiliorum genus est eorum, quæ qualitatem per contrariam qualitatem alterant. Scilicet exhibentibus nobis, si vehementem calorem æger vel in ipso demorso loco, vel in toto corpore

et corpore sentiat, auxilia refrigerantia. Sin frigus sentiat, calfacientia. Hactenus Galenus. Eius autem compendiosam dictionem, & vniuersalem methodum sic interpretamur. Inter ea, quæ virus è profundo euocant, primò medicamenta enumerat, quæ calfaciendi facultate prædita sunt: deindè cucurbitulas, & cornua: postea verò oris suctionem: & postremo vstionem, quæ vel ferro, vel medicamenti fiat. Itaque de his singulatim nobis dicendum est, quò res peruiā magis cuique euadat, ac modus vsus eorum neminem lateat. Id vnum autem imprimis omnes scire

Aduerte.

20 volo, ea, quæ modò ex Gal. retulimus auxilia, & id genus alia, quæ mox subiungemus, si primis diebus prætermissa fuerint, frustra postmodum adhiberi. Non enim virulentam illam materiam, quæ iam ad intima, neglecta curatione, pertransijt, satis euocare possent. Quare nulla vtiq; adiectionis eorum foret vtilitas, sed incassum corpora doloribus sternerentur. Inter ergo principia morsus, aut ictus illati, hæc, & similia adferenda erūt. Sed & priusquàm hæc, quæ sic venenum extrahunt, atque eliciunt, admoueantur, supra vulnus membrum id, quod vel demorsum, vel ictum est, deligandum erit, non tamen nimium ve-

Membrum demorsum supra vulnus deligandum.

30 hementer, ne torpeat. Hac enim deligatura impedies, ne tam subito virus interna subeat. Itaque si leuior morsus, aut ictus est, oris suctio apprimè conuenit. Homo igitur aliquis statim adhibendus est, qui vulnus exugat. Sugentem vero oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & vino os colluisse, postea exguum olei in ore continens, ictum exugat, & expuat venenum. Cauere etiam oportet, ne qui vulnus sic exucturus est, internam aliquam oris partem exulceratam habeat. Siquidem venena

Oris suctio.

Venena non gustu, sed in vulnere nocent.

(vt supra ex Cello retulimus) non gustu, sed in vulnere nocent. Sed & locus ipse priusquàm exugatur, spongiā in potam calidam immersā, fouendus, ac proluendus erit. Alij vulnus abludum aquā censent, in qua decoctum sit chamæmelum, & sylvestris lapathi radix. Sunt, qui gallinarum, aut aliarum quarundam auium podicem vulneri admouent, ad virus exugendum. Quòd si quæ applicatæ fuerint volucres, moriantur, venenū extractū esse suspicantur: post hæc verò cinis aceto subactus, pro cataplasmate imponatur. Maxime autem ad hanc rem conducit, cinis fermentaceus, id est, ex lignis vitis: vel ficulneus, aut laurinus. Qui si non adsit, eo, qui haberi potest, vtendum est, diligentia (inquā ceteris) ad hoc potissimum adhibita, vt inflammatio

40 no in loco excutetur, & materię ad morsum prouocetur.

Sal

*Sal morſui
canis rabi-
di optimum
medicamen-
tum.*

*Vnguentum
Dini.*

*Auxilia ad-
uerſus ma-
gnos, & ve-
hementes
morſus, &
iſtus vene-
natos.*

Actius.

Sal quoque his vulneribus, præcipueque ei (ſi Celſo credimus) quod canis fecit, medicamentum eſt, ſi manus vulnere imponitur, ſuperque id duobus digitis verberatur. Exſaniet enim, & ſanſamentum quoque recte ſuper id vulnus deligatur. Porro in omni morſu tam venenato, quam non venenato, Dinus hoc vnguento utebatur. *Æ* ceræ, picis nigre, axungię, veruecinę, olei antiqui ana quart. vnum, galbani vnciam vnā: fiat vnguentum.

Morſibus verò, aut iſtibus venenatis magnis, ac vehementioribus commodè illinuntur, cæpe cum ſale, & ruta, ſinapi quoque, & ſtereora. Item iuglandes nuces cum alio, ſale, & melle. Emplaſtra quoque, & cataplaſmata ex dictamno, & alijs medicamentis caſſactorijs, quæ vehementem trahendi vim habent, apparatus. Plurima enim ex ijs non modò virus ipſum potenter eliciunt, ſed & vulneris oras (præſertim in rabidi canis morſu) latas, ac hiantes ſeruant. Neque enim permittendum, vt hæ citò coëant, aut committantur. Præter opinionem autem facit Acrio, ex viperis theriace Andromachi, emplaſtri modo impoſita, & compoſitum hoc ſequens medicamentum: quod recipit ſpumę argenti, ceruſę, reſinę pinus, ſingulorum libram vnā, olei veteris libras tres, cerę vncias ſeptem, ammoniaci thymiamatis trientem, id eſt, vncias quatuor, galbani etiã trientem: ceruſam, argenti ſpumam, & oleum coquito, donec non inquinent manus, deinde liquefacta adijcito, vnito, & vitior repoſito ad omnem morſum, & ad abſceſſus, & tubercula mammillarum, panos, ſinus, fiſtulas, parotidas: ad miraculum enim (inquit) diſcutit ipſas. Vitior & ad carbunculos. Arcet vehementer inflammationem, & raro citra magnam commoditatem, & efficaciam adhibetur. Porro in magnis quoque, ac vehementioribus, tum iſtibus, tum morſibus potens eſt hoc ſubſequens emplaſtrum, quod acrioris eſt potentię. *Æ* galbani, ſagapeni,

*Guid. empl.
acrioris po-
tentia.*

opopanacis, aſiæ fatidæ, myrrhę, piperis, ſulphuris, ſingulorum ſemunciam, ſtercoris columbini, & anatis ana vncias duas, calaminthę, mentaſtri ana vnciã vnā: diſſoluantur gummi ex vino, & in vnum miſceantur omnia cum melle, & oleo antiquo, & fiat emplaſtrum. Pleraque alia tum ex veteribus, tum ex recentioribus adduci poſſent, quæ vel commorſam, vel iſtam partem vehementer caſſacere, & vellicare, poſſunt: proinde & venenum euocare. Verùm quoniam iterùm de hac re dicemus libro ſexto, hæc abundè ad præſens ſufficere putamus. Interim tamen monemus cū Eraſtraſtrato, vt in cognita peregrina, &

& inusitata vitentur. Cuiusmodi sunt fel elephantis, ova crocodili, & consimilia, quæ difficile, nisi regia facultate peruestigari possunt. Adde, quod neque frequenti observatione (vt Dioscorides ait) hæc sufficiens experimentum præstiterunt, quo nostra fides ijs obstringatur. Iam verò tempestiuum est, vt de cucurbitulis, & cauterijs dicamus: vtrisque enim etiam virus è profundo euocamus. Ergo si vehementior morsus est cucurbitulam cum largiori flamma ad vulnus adfigito. Sed antequam circumstantia loca altioribus vlcusculis (si id membrum patitur) scarificato, quo plus vitii iam sanguinis extrahatur, & vt sanguinis illius corrupti vacuatio obsistat, ne venenum membratim insinuetur. Attrahetur enim pluribus quasi canalibus, & foras euocabitur, vnà cum sanguine, & spiritu, ipsius virulentæ bestię venenum. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit, vt calliculus, vel pulcarius (vt inquit Celsus) oris compressioris. Optime autem auxiliatur, si statim in principio post amotas cucurbitulas, super vulnus imponantur, & conuoluatur animalia parua discrepta, hoc est, per medium diuisa, intus adhuc calentia, 20 veluti sunt gallinaceus pullus, sed mas præsertim, hœdas, agnus, & porcellus. Sic verò calida eorū caro statim percussio loco imponenda est, vt pars interior corpori iungatur: venenum enim exugunt, & dolores leniunt. Ferè autem inter cætera animalia magis placent gallinarum pulli, quippe qui calidiorē naturā præditi sint, argumento, quod deuoratum insignis virus eliquent, & aridissima quæque semina consumant. Item nonnunquam harenas, lapillosque, quos faucibus insinuarint, dissolunt. itaque animantis calore, spiritus ictæ partis imperū capeffens, venenū exigit. Porro à maioribus canis rabiosi mor- 30 sibus, abscedentes carnes, hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, ac prehensam hamo carnem amputare oportet: si modo tamen locus neque nervosus, neque musculosus est. Hæc itaque carnis circinatio, seu circumscriptio, & sectio, scarificatione longè potentius opitulatur. Quod si locus carnis circumscriptionem, & sectionem non admittat, cucurbitulæ (vt diximus) cum largiori flamma adfigendæ sunt. Nec verò maiora hæc vulnera in demorsis à rabioso animante, ita vereri oportet, vti minora, & vlcusculis cutis similia: maiori nanque vulnere copiosus sanguis emanans, potest nonni- 40 hil virulenti liquoris exhaustire: quod in minoribus non accidit.

Cucurbitula.

Animalia parua discrepta, & virulento morsu admota. Gallinarum pulli.

Abscedentes carnes amputanda.

Maiora vulnera in demorsis à rabioso cane, minus verenda, quam minora.

At

Vstio expeditissimum est auxilium.

Sanguinis missio.

Vlceratio - nes ex mor- su virulento in longū tē- pus proro- gandas esse.

Membri de- morfi, aut icli, ampu- ratio.

At verò & vstio, contra ipsos virulentos morsus, aut ictus, cum locus nervosus non est, & tuto inuri potest, expeditissimum censetur auxilium. ut potè cum ignis cætera viribus præstet: simul quòd virus domet, ipsiusque vires hebetet, & penitus ferri, hoc est, ad intima illabi, nō patjatur: simul quòd pars igne experta, deinceps non vilem, nec indecoram loci instauratio- nem efficiat, manente diutius exulceratione. Si verò vri non potest, Cornelio Celso autore, sanguinem homini mitti, non alienum est: tum vstio quidem vulnere superimponenda, quæ ce- 10 teris vstis sunt. Ei verò, quod expertum ignem non est, ea medi- camenta, quæ vehementer exedunt, & si laborans patitur, quæ adurunt, & crustas vlceribus inducunt. Cæterum animaduertendum, ex eo tempore, cum crustæ (seu igne, seu adurentibus medicamentis inducæ fuerint) decident, ne vlceris oræ coale- 20 scant, & cicatrice obducantur. Sed si fieri potest, ad longū præ- finitum tempus vlcerationes, & fordidas adhuc, & inflamma- tionem minantes, prorogari cōuenit, quòd virosa materies sem- per effluat: non autem intus contineatur, & ad intima se infi- nuet. Id autem optimè præstabit, inditum ijs (vlcerationibus inquam) salsamentum, & sylvestre allium detritum: item cæpæ, 20 & id genus alia. Si verò (quod persæpe accidit) ante dies præ- finitos, cicatrices coirent, committerenturque, manum postula- bunt. Nanque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere expediet. Vbi verò propositum tēpus præterijt, vlcus ad cicatricem perducendum erit. Quandoque etiam (ut 30 suprà diximus) haud importunum fuerit, partem ictam, si com- mode sectiōnem non respuat, ut sunt extrema, amputare, præ- fertim si fera quæ momordit, aut ictu vulnus impressit, lethalis sit, & ineuitabile periculum adferat, cuiusmodi sunt serpentes omnes, ut aspis, cerastes, vipera, & consimiles.

De vulnere, cum profusione sanguinis, ex venis, & arterijs.

CAPVT XII.

Postea quàm de vulneribus, quæ carnosus partibus inci- dunt, abundè satis determinatum est, nunc tempestiuū videtur Galeni doctrinam, atque institutum sequentes, de ijs vulneribus dicamus, quæ in arterijs, & venis fiunt.

Gal. li. 5. me- thodi med.

Ergo si cui arteria venæue magna vulnerata est, & copiosum sanguinis profluvium continò superuenit, & glutinari id vul- 40 nus, difficile quidem etiam in vena est, in arteria verò non so- lum

« lūm difficile, sed etiam, quod fieri (sicut nonnullis medicorum
 « est visum) omnino fortasse non possit. Dicendum ergo de vtri-
 que est, vulnere inquam, in arteria, aut vena accepto, & hæmor-
 rhagia, ac prius quidem de sanguinis profusio, quippe quod
 magis urgeat: secūdo verò loco de ipsius vulneris agglutinatio-
 ne, ac curatione. Sanè profluit ex vena, vel arteria, sanguis, *Profusionis*
 aut tunica earum diuisa, aut reserato earum ore (Græci *ἀνα-* *ex vena, vel*
σώματα vocant) aut (vt si quis dicat) transcolamus, siue transimis- *arteria cau-*
 sus, vt in diapedesi. Verū quoniam in duabus posterioribus *sa.*
 10 capis solent magis medici, quos phisicos appellant, accersiri:
 hic duntaxat agemus de sanguinis effusione, quæ ex prima cau-
 sa ortum habet, & vulnera consequitur, hæc nanque ad chi-
 rurgum magis videtur pertinere. Cæterū sanguis profun-
 ditur interdū ex arteria, interdū ex vena, atque ex earum
 quidem aliquando vna duntaxat: nonnunquā verò ex pluri-
 bus, iisdemque, vel maioribus, vel minoribus. Sed & sanguinis
 eruptio, accidit ex eo interdū vulnere, quod cum amissio-
 ne sit substantiæ: aliquando verò ex eo, in quo nihil substan-
 tiæ perditum est. Interdū etiam cum erosione: interdū
 15 verò citra erosionem, quæ Græcis *διὰ τοῦ ποῦ* dicitur. Item quan-
 doque iam profluit sanguis, & quandoque postea fluxurus est.
 Interdū quoque causa huius profusuij sanguinis apparens est,
 quæ in vena, aut arteria diuortium facit, cuiusmodi est sagitta,
 telū, vel aliquod, aut erosio præsens, & non ex vulnere ex-
 citata. Hæ itaque sunt differentiæ præcipuæ, profusionis san-
 guinis in vulneribus, à quibus curandi indicationes desumun-
 tur. Porro causæ fluoris sanguinis, ex diuisione tunicæ vena-
 rum, aut arteriarum, sunt, vulneratio, contusio, ruptio, erosio.
 Quæ autem vulnerant, ea sunt acuta, atque ad secandum habi-
 20 lia: cuiusmodi sunt sagittæ, & gladij. Quæ contundendo sol-
 uunt, ea grauiora, & duraque sunt, vt sunt lapides, aut quæpiam gra-
 uis moles. Quæ rumpunt omnia, id tensionis interuentu fa-
 ciunt. Tensionem autem efficiunt, intentior actionis vehe-
 mentia, succi abundantia, non utique virium respectu, sed quæ
 cum à vase suo non continetur: etiam casus ab alto, & graue
 quippiam, durumque incidens. Erosio autem vcnis, & arterijs
 intrinsecus saltem accidit, ex succo aliquo, cui mordens natura
 25 inest, vt est bilis flaua, vel atra superaffata. Ex ijs itaque manife-
 stum euadit, quod venæ, vel arteriæ vulnerari non possunt,
 30 quin cutis, & caro vulnerentur. proinde suppressio iam sangui-
 ne,

*Differentia.**Diabrosis.**Cause.**Erosionis cau-
sa interna.*

*Discretio ,
quando san-
guis ab ar-
teria , &
quādo à ve-
na reijcitur.
Prognosti-
ca.
Apho. 3. li. 5.*

ne, glutinandi, seu (vt dicunt) incarnandi indicationes, ab ipsis (carne inquam & cute) sumendæ sunt, vt in sequentibus dicitur. Signum venæ, atque arteriæ incisæ, est sanguinis profusio. Quod si sanguis cum impetu, ac saliendo profluat, & tenuis, ac flauus feruensque appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si verò crassior, & nigrior conspiciatur, ac quietè, sine pulsu, & citra saltum effundatur, iudicium est ipsum à vena effluere. Hæmorrhagia, id est sanguinis profluium, omnium calculo, ac iudicio periculosa est. Nisi enim cōstiterit ac supprimatur, mortem adfert inuitabilem. Quippe quod sanguis (vt dici solet) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hæmorrhagijs malum portendunt, vt Auicēnas post Hippocratē annotauit. Porro subit admirari, quod Arnaldus scriptis prodidit: Nempe quod arteria per transuersum dissecata, promptius coalescit, & agglutinatur, quam si secū dum longitudinem esset diuisa.

Curatio profusionis sanguinis ex vulnere.

*Modi tres si-
stēda hæmor-
rhagia.
Auertentia.*

Capita methodi, qua sanguinis profluuia, quæ ad manum sunt, curantur, duo traduntur à Galeno, quibus Auicēnas tertium addidit. Vt igitur omnium fiat mentio, hæmorrhagia trifariam sistitur. Primò ijs, quæ fluxionem auertunt, tum deriuando, tum reuellendo: secundò infrenantibus, atque interceptientibus fluxionem: & tertio, topicis, id est, localibus auxilijs. Porro ex ijs, quæ sanguinis profluium auertunt, tam à venis, quàm arterijs sanguinem fundētibus (huic enim hæmorrhagiæ propriæ debentur auertentia eiusmodi auxilia) quæ dā id efficiunt citra vllam extra corpus vacuationem: alia verò cū euacuatione. Citra vacuationem, fluentem è vasis sanguinem auertunt, & aliò trahunt, cucurbitulæ siccæ, seu læues, & cum 30 flamma admotæ, frigidiones, & ligaturæ, primū in propinquo ribus partibus factæ: deindè in remotioribus. Auertitur autem sanguis cum euacuatione, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, venâ in ea parte incisâ, quæ profusioni è directo responderet, quæque ipsis membris sanguinem fundentibus coniuncta est. Itaque hæc (inquit Galenus) Hippocratis inuenta sunt. Omnis scilicet immodicæ vacuationis, communia remedia. Deriuatio ad latus, & ad vicina fit, reuulsio ad contraria, non tamen semper ad remotissima, vt falso quidam putauerunt. Illam parocheteusin, 40 hanc

*Li. 5. metho-
meden.*

*Parocheteu-
sis.*

hanc antispasmi Græci vocant. Antispasmi igitur, id est, reuulsi, in ijs, quæ supra sunt, omnibus, deorsum semper agitur: sursum, in ijs, quæ sunt infra. Præterea à dextris ad sinistra, sicut ab ijs, rursus ad illa similiter ab ijs, quæ intus habentur, ad ea, quæ foris sunt: contraque ab his, ad illa. Itaque si resolutus adhuc æger non sit, vena (vbi diximus) in eo loco secanda erit, quæ profusioni sanguinis è directo responderet, & vulneratæ parti coniuncta est, siue deriuare, siue reuellere studueris. Vbi autem paululum detraxeris, mox vnam horam intermittens, rursus mo-

dicum quid detrahes: post iterum, atque iterum, pro laborantibus viribus, vt Galenus consulit lib. 5. Therapeutices methodi. Sed de hac sanguinis in vulneribus detractione, latius alibi superius diximus. Causæ sanguinem infrenantes, atque eius fluxum interceptientes, quædam sunt incrassantes, ac inspissantes, vt lentæ, oriza, iuiubæ, coronæ mala, quæ Græci *αυλωνα* vocant, & in vniuersum fructus omnes styptici, hoc est, austeri, in hunc usum offerri solent in omnibus sanguinis profusionibus.

Aliæ verò sunt stupefacientes, veluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum, ex quo profluit sanguis projecta. Non au-

tem supra vulnus ipsum: viceribus enim frigidum mordax.

Item res omnes, quæ insigniter refrigerant, sicuti & syncope, seu animi deliquium, in quo propter sanguinis ad interiora reuocationem, totus corporis habitus refrigeratur, & sanguis sistitur, vt loco nuper citato Galenus annotauit, ad hunc mo-

dam scribens: Porro confluere prohibetur [sanguis] & propter animi deliquium, & cum ad contraria reuclitur, & cum ad vicina deriuatur: & per refrigerationem, tum corporis totius, tum verò præcipue ipsius partis afflicte. Hæc enim ratione, etiam frigida pota, sæpe hæmorrhagias suppressitadem

facit & frigida foris infusa. Sed & quinto Aphorismorum in ijs frigido vtendum esse præcipit Hippocrates, vnde sunt sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa (inquit) sed circa ipsa, vnde influit. Topica, hoc est, localia, remedia, quibus sanguis cohibetur, tamen numero octo ponantur ab Auicenna, ea tamen nunc ad quinque reduximus. Primum genus auxilij sit per suturam: secundum, per linamenta, quos *μοίρας* quibus Græci vocant, vel per penicillum siue turundam, quod aiunt: morrhægia tertium remedium est, totius vasis sanguinem fundentis præ-

cisio: quartum deligatura, & vinculum: quintum est ad-

suo per candentia, feramenta, vel per caustica medicamenta.

Præterea.

Antispasmi.

*Quæ sangui-
nē sistāt in-
crassando.*

*Quæ suppri-
māt sangui-
nem stupefa-
ciendo.*

*Quæ refrige-
rātō sangui-
nē fluere in-
hibeant.*

*Topica au-
xilij.*

*Quinq; au-
xiliorum ge-
nera localia
supprimun-
tur in vul-*

Sutura sanguine coërcens.

Situs parvis ad hemorrhagiam plurimum conducere.

An venarum & arteriarum vulnera suenda. Lib. 5. meth. meden.

Primus modus coërcendi sanguinem, qui per futuram fit, his maxime vulneribus competit, in quibus nulla facta est substantiæ deperditio. Tunc autem commodè fit futura, cum vulnus ipsum à sanguine concreto, qui thrombos Græcè dicitur, integrè est repurgatum. Itaque hoc peracto, ipsius vulneris labra in idem adducenda sunt, nostrarum manuum operâ: ubi sic ad manum vulnus se exhibet, postea consuantur, futura quidem communi, vel ea quam pelliones facere solent, præsertim si magno impetu sanguis prorumpat. Dum autem ita sinitur vulnus, satis altè acus in carnem demittenda est. Post hæc, pulvis astrictorius superponendus erit. Deinde stupor ovi candido liquore, & pulvere illo astringente, cuius in sequentibus fiet mentio, imbutæ, superimponendæ erunt. His ritè peractis, membrum affectum deligandum erit, & situ apposito collocandum. Appositus enim vulneratæ partis situs, inter hæmorrhagias re media Galeno censetur. Quod autem modus is supprimendi sanguinem, utilis sit, ex eo manifestum euadit, quod labra vulneris prius biantia, & adinuicem distantia, in vnum adducuntur, & inter se committuntur, locus affectus refrigeratur, & adstringitur. Quæ omnia in hoc affectu Galenus desiderat, lib. 20. s. suæ meth. med. Sed & multoties adserit Auicennas in quarto, necessarium esse, ut carnis vulnera consuantur. In quo etiam Theodoricus, & Henricus consentiunt. Dicunt tamen plurimi Galenum non præcipere venarum, arteriarum, & intestinorum vulnera, suenda esse, quippe quod dura nimis, & exanguia sint, atque ideo agglutinari, & in pristinam unionem coire non possint. Verum pace illorum (inquit Guido) dixerim, non inhibuit Galenus, suenda esse venarum, & arteriarum vulnera: quod si id tacuit, certè adfirmasse videtur. Quinimò & litera ipsius Galeni, quod dicimus planè innuere videtur, quæ sic habet: Neque enim snere fas est, arteriæ, venæve vulnus: veluti dixerint, qui nullam à vulneratæ partis substantia, naturæque sumi indicationem aiunt. Sed tu (subaudi) per regulam operatorum, nos qui sumimus indicationem à substantia, & natura partis vulneratæ, suemus eas. Quod si non seorsum, ac separatim, coniunctim saltem cum carne, ad modum peritonæi, id est, ut peritonæum, suere consueuimus. Atque ita si non iuxta primam intentionem coeant, atque agglutinentur, saltè iuxta secundam (vbi superius in sermone communi diximus) coibunt. Secundus modus supprimendi sanguinē, qui fit per linamenta, &

vulne.

- vulneribus, in quibus aliqua est substantiæ deperditio, potissimum accommodatur, ita perficitur. Imprimis vulnus ipsum pulnere aliquo, qui adstringendi facultatem habeat, respergitur: deinde linamentis, vel stupis hiantem plagam oppleto: siccis quidem primum, deinde si hæc parum prociunt, aceto, vel ijs medicamentis, quæ sanguinis suppressendi facultatem habent, madesactis; supraque spongiam ex aqua frigida expressam imponito, ac manu superposita, eam comprimito, vel alligato: & post hæc membrum appositæ (vt superius dictum est) collocato. Qui sanè modus sistendi sanguinem apprimè utilis est, vt loco paulo antè citato testatur Galenus, sic inquit: Obstruatur vasis [sanguinem fundentis] osculū, & sanguine ipso concreto, qui thrombos Græcè dicitur, & ijs, quæ foris illi imponuntur: cuiusmodi sunt linamenta, quos *μώτες* Græcè vocant, & medicamenta ea, quæ idcirco, quod ex lenta, crassaque substantia consistant, meatus obstruunt, Græci emplastica vocant. Horum autem optima sunt eidem, quæ ex frixa resina, & farinæ triticeæ tenuissimo polline, & gypso, alijsque id genus sunt confecta, cui candido macerata, & cū leporinis pilis imposta. Tertius modus sistendi sanguinē qui fit, totū vas sanguinē fundens, per transversum præcidendo, cōpetit maximè venis, & arterijs, quæ in profundo sitæ sunt, vt idem Galest autor. Cogimur (inquit) nō modò arterias, sed etiā interdū venas totas præcidere, vtiq; transversas. Incidet autem huius necessitas in ijs, quæ ex profundo loco rectè assurgunt, præsertimque per angustas, vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex vtraque parte, pars vtraque, celaturq; ac integritur, superiacentibus corporibus vulnus. Post hæc, pulvis aliquis sanguinem cohibens, super vulnus imponendus, & stupæ, vel spongia medicamentis facultatem suppressendi sanguinem habentibus, imbura, superalliganda erit, & figura particule vulneratæ accommoda, adhibenda. Quartus modus suppressendæ profusionis sanguinis, qui fit funiculo vasi sanguinem fundenti circumposito, competit præsertim arterijs, quæ in penitioribus delitescunt. Itaq; si alia auxilia profusio vincuntur, arteriæ nudandæ sunt, vt Auicenna præcepit, & hamo apprehensæ, mox vinculo aliquo gracili, vt filo serico, excipiendæ, ac fortiter stringendæ sunt. Post hæc medicamentum ad glutinans, siue incarnarium, vulneri apponendum erit, & membrum fascijs vt oportet, deligandum, sinuque appposito collocandum. Porro vinculum ipsum radici vasis erit iniungendum,

Secundus modus suppressendi sanguinem.

Quomodo obstruatur os vasis.

Tertius modus sistendi sanguinem. Lib. 5. Ther.

Quartus modus suppressendi hæmorrhagie.

*Radix va-
sis, quæ.*

dum, vt libro quinto methodi Galenus nos admonuit. Tutius autem est iuxta eiusdem Galeni sententiam, vtrunque facere; funem quidem radici vasis circumdare, & quod deinceps habetur, id est, inde procedit, præcidere. Radicem vasis vocat hic Galenus, priorem eius partem, quæ vel iecinori propior est, vel etiam cordi. Hæc (inquit) in collo, ab inferiore est parte: in brachijs, & cruribus, à superiore. In singulisque reliquarum partium, prout ex dissectione intelligere licet. His sic peractis, implendum carne vulnus quam primum est, priusquam funiculus à vase decadat. Nisi enim producta caro prius locum, qui circa præcisam arteriam est, impleuerit, si locus aliquis vacuus superfuerit, vtique quod Græci aneurysma dicunt, sequitur.

*Quintus mo-
dus sistendi
sanguinem.
Lib. 5. the.*

Quintus modus, excretionis sanguinis sistendæ, qui per aduersionem fit, qua crusta (quam Græci escharam vocant) inducitur, maximè competit venis, suæ vnionis diuortium ab erosione perpeffis. Galeno ipso autore sic ad verbum inquit: Maximam autem necessitatem, vel crustificis, id est, crustam inducentibus medicamentis, vel ignitis ferramentis vtendi animaduerti, vbi ex erosione putrescentis alicuius profusum sanguinis concitatur. Hic itaque modus sistendi sanguinem perficitur, tum candentibus ferramentis, tum medicaminibus crustam inducentibus, quibus cum calore adstringendi facultas sit coniuncta. Cuius generis sunt, chalcantos, id est, atramentum futorium, misy, & chalcitis, seu quod vitreolum vulgò appellatur, ijsque tam vltis, quam non vltis. Quæ autem ex calce viuæ, id est, non extincta conficiuntur, valentiora quidem his sunt: cæterum quia adstringendi vim non habent, crustæ, quæ ab ipsis fiunt, citius excidunt. Hærent autem diutius, quæ ab adstringentibus: quod vtique longè est vtilius. Quippe ita prius in basi, seu in imo earum, caro super-
pernascitur, efficiuntque vasis profluentibus veluti operculum, donec venæ agglutinatio facta sit. Vnde nec nosmet (inquit Galenus) præcipites esse, veluti nonnulli sunt, ad crustas detrahendas oportet, vbi hæmorrhagias periculum imminet. Si enim properes illas resolvere, ac deicere, tantum inde accidit interdum sanguinis profusum, vt vix cohiberi possit. Quocirca præcipiebat Auicennas, aduersionem faciendam esse, ferramentis vehementer ignitis, & valenter in profundum adactis, quò crassa, ac profundæ escharæ fiant, quæ nec faciliè separentur, atque excident. Hinc Theodoricus crustificis, seu causticis omnibus

medicamentis præferebat arsenicum, quod vocant sublimatum, nec sanè immeritò. Nam & protinus omnem sanguinis profusionem sistit, & altam, ac diutius hærentē crustam inducit. Horum autem medicamentorum crustam inducentium, materia, suo loco, nempe libro sexto) explicabitur. Porro ipsa ferramenta igne flagrantia, ex aceto, aut vino (vt rectè quidam consulant) restringere oportet. Ceterum alius quidam ab ijs modus est peculiaris reprimendi sanguinem, qui tamen nondū adhuc profuatur, mox tamen fluxurus est: vt cum sagitta, telūmve ali-
 10 quod corpori infixum, extrahendum est. Itaque cum hæc occasio nobis occurrat, puluilli tres, aut quatuor apparandi sunt: rotundi quidem, & circa medium (vt sic dicatur) fenestrati perforative, medicamine aliquo sanguinem coercente delibuti. His ergo ritè sic apparatus, ipsius teli infixi supitem, seu hastile, per foramen immittito, ipsosque puluillos circa hastile stringendo, minister aliquis, suprà vulnus comprimat. Medicus verò ipse vulnerarius sagittam, vel aliud quoduis telum infixū extrahat. Exempto telo puluilli sunt adæquandi, ita vt nullum amplius foramen in illis pateat, & suprà vulnus comprimendi: dein alij non
 20 pertusi supra illos sunt apponendi. Hi igitur sunt modi, quibus sanguis à venis, & arterijs vulneratis profluens cohibetur, qui vt arte, & ratione fiât, sequentia præcepta obseruanda sunt.
 « Primum est Galeni libro quinto Therapeutices methodi, qui
 « in omni fluore sanguinis ex vulnere, iubet vt is, qui vulnerato
 « astiterit, illicò digitum super os vulneris vasis imponat, blandè
 « innitens, ac sine dolore comprimens. Quippe simul (inquit) tum
 « sanguinè sistet, tum cū cōcrescere in vulnere faciet. Thrombos
 enim, id est, sanguis concretus, ex ijs est auxilijs, quæ hæmorrhagiam sistunt, sicuti & linamenta, quos *μωτὸς* Græci appellant, &
 30 medicamenta ea, quæ ipsdē emplastica dicuntur. Ideò autem thrombus sanguinem supprimit, quia vasis sanguinè fundentis osculum obstruit, vt paulò antè diximus. Secundū documentū est, quòd in omni sanguinis ex vulnere profusione, post admotionem pulveris adstrictorij, tres aut plures, vt videbitur, panni linei, aut ex stupis puluilli, oxycrato primū madefacti, & postea expressi, medicamento sanguinè supprimente imbuantur, vulneri agglutinètur, & suprà ipsum adalligentur. Tertius canon est eiisdē Gal. qui per deligaturā docet supprimere sanguinè,
 « sic inquit: Alligandam autem id forinsecus fasciā est, ex tenui
 40 linæo, cuius fasciæ primi quatuor, quinqueve amplexus:

Arsenicum sublimatum optimum ad hæmorrhagias præsidium.

Modus alius supprimendi sanguinem, quò statim fluxurus est.

Præcepta quedam de supprimendo sanguine obseruanda. Digitus compressens.

Puluilli.

Deligatura.

*Appositus
vulnerata
partis situs.*

*Deligatura
ante diem
tertium mini-
mè solueda.*

*Laborās ocu-
los claudat,
aut locò ob-
scurore con-
tineatur.*

Auicenn.

ipſi profluenti vaſi iniiciuntur. Ab hinc vaſis radicem verſus,
ducuntur, in quibus videlicet partibus radicem verſus ducere li-
cet. Licet autem ferè in omnibus, præterquàm cerebri membra-
nis. Hac quidem deligatura (vt inquit Auicennas) quod confluir,
reprimitur, & vena ſanguinè fundens, conſtringitur. Quartus
canon in ſupprimendo ſanguine obſeruandus eſt vt membrum
à quo ſanguis profluir, ſitu appoſito collocetur. Vnde Galenus
libro quinto methodi medendi ad hunc modum ait, Præter om-
nia iam dicta, inter hæ morrhagias, id eſt, proſuſionis ſangui-
nis, remedia, cenſetur, & appoſitus vulneratæ partis ſitus. Por-
rò appoſitus fuerit eidem Galeno, vulneratæ particulæ ſitus, ſi
ad geminum hunc finem ſit directus. Nempe, vt & dolore pars
careat, & ſurſum ſpectet, cuſtodito tamen in hac ſitus figura
modo, ne dolor incidat. Si verò vel prona ſpectet, vel doceat,
non ſolum proſuuium non ſiſtetur, ſed etiam ſi non ſit, prouo-
cabitur, & inflammatio augebitur, præſertim ſi pars dolore in-
feſtetur: cum nihil quidem æquè ſanguinis proſuuium exciter,
inflammationeſque augeat, ac dolor. Quintum documentum
ab eodem Galeno præſcriptum eſt, quo caueretur, ne ante diem
tertium deligatura ſoluatur: vbi autè illam tertio ſolueris die, ſi
tuto adhuc medicamentū emplaſticū, & ſiſtens ſanguinè, vlceri
adhæreat: aliud rursus ſuper ipſum accommodabis, ac veluti li-
namentū id quod ex pilis factū in hæ ſit maſefaciens, deligabis:
ita, vt initio deligaſti. Sin prius ſua ſponte reiecerit linamentū,
radicem vaſis, digito blandè comprimens, ne videlicet quippiā
confluat hoc quidā ſuſpenſa manu, ac ſenſim adimes: atq; alterū
impones. Quod etiam eodem, quo & primum (ſi neceſſitas exi-
gat) imbues medicamento, vel oui candido liquore cum roſa-
ceo ſubacto, vel vino craſſiore, & ſtyptico. Ad hunc modum,
quoad carne obducetur, ac munietur vaſ, curare debebis: vtique
à principio ad finem uſque (vt ſuprà dictum eſt) particulam ſu-
pinam ſeruans. Sextum præceptum in larga ſanguinis proſu-
ſione obſeruandum, eſt, vt laborans oculos clauſos contineat,
aut loco obſcurore reponatur, ne vel proprium ſanguinem, vel
rubrum quidpiam videre poſſit. Atq; illi aſſeueratione affir-
metur, quod ſanguinis proſuuiū coſupit: & ſi adhuc ſanguis fluat,
magno ipſius commodo id fieri: atque ita contraria imagina-
tione, virtus naturalis ipſius roboratur. Hinc dicebat Auicen-
nas, quod grauiſſimum accidentium animalium, mouentium
imaginationem, eſt motus ſanguinis, & conſecutio eius, qui
paratus

- paratus est ad eum, cum multum intentus fuerit, ad confide-
 • randum res rubras. Cæterum tempestiuum est subijciamus me- *Medicamen-*
 • dicamenta, quæ sistendi sanguinem vim habent: statutum enim *ta sanguinē*
 • erat nobis postremo loco de ijs dicere. Itaque primum, atque *supprimē-*
 • omnium optimum est, quod à Galeno describitur libro quinto *tia.*
 • methodi medendi. Quo etiam ad cerebri membranarum hæmor-
 • rhagias uti, securissimum est. Item ad colli vulnera, ipsarumque
 • venarum iugularium, quas sphagitidas vocant: etenim & harum
 • sanguinem citra vinculum prohibet. Verba autem Galeni hæc
 10 sunt. Thuris pars vna, aloës partis vnius semissi, miscetur. Mox
 • cum vtendi tempus instat, tantum huius pulueris cum oui can- *Gale. medi-*
 • dido subigitur, quantum mellis reddat crassitudinem. Hoc de- *camentum*
 • hinc leporis mollissimo pilo excipitur, deinde rum vasi ipsi, tum *sanguinem*
 • vlceri toti liberaliter imponitur. Alligandum autem id forinse- *supprimēs.*
 • cus fascia, ex tenui linteo, modo, quo in tertio canone supra di-
 • ctum est. Hoc autem medicamento (inquit paulo post Gale-
 • nus) multifariam vtor, aliàs (vt dictum est) duplam thuris aloë
 • admiscens: aliàs pari modo ambobus vtens: aliàs paulo superan-
 • te aloën thure, aut etiam plusculo, sed non dum duplo: etiam
 20 mannâ pro thure aliquando iniiciens. Porro constat in duris
 • corporibus, plus aloës esse immiscendum, in molliibus plus thu- *Auicenna*
 • ris. Secundum medicamentum sumitur ex dictis Auicennæ, *puluis.*
 • quod & ab omnibus chirurgis approbatur: habet autē ad hunc
 • modum, ℞. boli Armeniæ, sanguinis draconis, thuris, aloës succo-
 • trini, pares portiones, terantur in puluerē, qui apponatur, vt dictū
 • est. Tertium medicamenti genus est Bruni, qui ipsum desum- *Bruni medi-*
 • pit ex lib. diuisionum Razi., & ex Albucasē. Recipit autem *camentum.*
 • calcis viuz (quæ sola, vt supra diximus, sanguinem cohibet, &
 • sistit) sanguinis draconis, gypti, aloës, thuris, vitreoli, singulo-
 30 rum æquas portiones, rediguntur in puluerem, & cum oui can-
 • dido liquore, & tela araneorum miscentur, donec in corpus
 • vnum coeant, & superponuntur. Est qui plurimum commen-
 • dat gallam combustam, maceratam in vino, & aceto, etiamque, *Galla com-*
 • & super arteriam admotam. Alij in huiusmodi pulueribus sym- *bufta.*
 • phyton addunt, quod posteriores consolidam vocant. *Symphyton.*

Curatio vulneris in vena.

- S Vppresso sanguine, qui ex vulnere profluebat, ad propriam
 • ipsius vulneris curationem mox accedendum est, vt su- *Lib. s. meth.*
 40 penus est annotatum. Porro tamen (vt Galenus ait) sanatu dif-
 • ficilior

*Curatio vl-
ceris in ve-
na.*

facilior sit arteria, quàm vena, non tamen est medicamentorum admodum diuersus in vtraque vsus: imò specie planè idem, maioris minorisq; ratione euarians. Quippe tanto ficioribus medicamentis eget arteria, quàm vena, quanto ipsa est suapte natura ficioris temperamèti, quàm vena. Ergo quod venæ infedit vulnus, vbi ad manum est, & citra substantiæ deperditionem, eandè desyderat curationè ijs, quæ in carne accidunt. Nam siue ex recenti ictu factum est, id agendum est vt medicamentis ijs, quæ enghæma vocant, coëat: siue ex erosione, quæcunq; dicta de rebellii vlceru curatione sunt, ea prius ratione discernenda, ro- mox vt opere perficiantur, tentanda. Quinetiã vbi vinculo vas- sis complexus, aut medicamētis sanguinem supprimentibus, aut ferramentis ignitis vsus, ita, vt facta fuerit substantiæ deperditio: illudq; tibi curationis propositum restet, vt quæ circa vulne- ris vlcerisve labra sunt, carne impleas: ijsdem omninò medi- camentis vtendum erit, quæ in methodo sinuosorum ac cauo- rum vlcerum sunt descripta.

*De vulneribus neruorum, tendonum, & syndesmorum, id
est, ligamentorum.*

CAP. XIII.

30

*Differentia
vulnerum,
partium ner-
uosarum.*

Vulnera neruosarum partium Auicennæ lib. 4. suæ me-
dicinæ, & Gal. lib. 6. meth. med. quandoque punctum,
quandoque cæsum sunt. Eadem interdum sine con-
tusione, interdum verò cum contusione accepta sunt.
Ex puncturis autem, quædam hiant, atque apertæ sunt, quæ-
dam cæcæ, atque oclusæ manent, adeò vt earum ora sic con-
tineant, ac inter se coëant, vt conspectum effugiant. Porro
ex dissectionibus, hoc est, ijs, quæ in neruosis partibus cæsum
sunt, vulneribus, aliæ per transversum, aliæ per longitudi-
nem infixæ sunt. Atque ex harum vtrisque, quædam sunt si-
ne amissione substantiæ carnosæ, quædam verò cum deperdi-
tione ipsius substantiæ carnosæ, cute etiam, quæ interueniebat,
diuisa, adeò vt neruus nudus appareat. Adhæc nerui transuer-
sim vulnerati, quandoque non ex toto, sed duntaxat ex parte
dissecti, quandoque verò toti præcisi sunt. Atque in omnibus ijs
vulnerationibus, quandoque dolor ingens, & inflammatio, &
convulsio accidunt, quandoque verò non. Itaque ab ijs nuper
commemoratis vulnerum differentijs, curationis indicationes
sumuntur. Omnium eiusmodi vulnerationum causæ sunt cæ-
quæ insidunt, pungunt, ac penetrant, & contundunt, vt in

Cause.

superio-

De Plagis, seu cruentis vulneribus. 247

superioribus (vbi scilicet de causis vulnerum in vniuersum discerimus) ostensum est. Cæterum ex præcedentibus cõspicuum euadit, quòd neruus vulnerari non potest, quin cutis, & earo solutionem continui, & vulnerationem etiam patiantur. Neruum conuulneratum esse testantur, dolor ingens, læsio sensus, & motus, & si in loco neruoso vulnus acceptum est. Sed ab hoc postremo, coniecturalis solum nota defumitur. Neruis vulneratis, aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, acumine, inflammatio, & dolor immodicus accidit. Quare & febres, & conuulsiones his oboriantur, quibusdã & delirium, ob neruorum cū cerebro cõmerium. Interim verò, in alijs quoque particulæ affecte locis, inflammationes, & abscessus super ipsum neruum conuulneratum, quod cohæreat, solent accidere. Ita quidem iudicatur Galen. lib. 3 artis medicæ, ut in superioribus annotauimus. Si in vulneribus neruorum tumor apparuerit, & postea disparuerit, conuulsio, ac delirii periculum imminet. Hinc de tumoribus, qui vulneribus superueniunt, loquens Hippocrates lib. 5. Aphorism. in vniuersum omnes illos tumores damnat, qui de repente detumescunt. Sed & ingens malum portendi ibidem adserit, cum vulneribus prauis (qualia sunt, quæ in capitibus, aut finibus musculorum, & maximè neruorum sunt) tumores omnino non adueniunt. Si in vulneribus (inquit) foribus, & prauis tumor non appareat, ingens malum. Sequenti quoque aphorismo, qui pars est antecedentis, docet Hippocrates, tumores omnes, prauis maximè vulneribus, cuiusmodi sunt ea, quæ neruosis partibus illata sunt, superuenientes, quicunque molles sunt, optimos esse, contrarios verò prauos. Molles (inquit) boni, crudi verò mali. Vbi crudum tumorem vocat, durum, atque renitentem, qui opponitur molli. Adhæc, neruo per transuersum vulnerato, sed non omnino dissecto, maior conuulsio, nis metus impendet, quàm si totus præcisus esset: phlegmone scilicet à defectis fibris, ad non sectas, cõmunicata: cæterum conuulsione, ab ipsis non sectis excitata. At si totus quidem neruus præcisus sit, metus præterea nullus instat, nec periculum ullum inde sequetur: debilis tamen particula manebit, ut prius dictum est, cum de spasmo ageremus. Meminisse præterea oportet, quod frigidum, partium neruolarum vulneribus, magis est mortuæ, quàm ijs, quæ carnes occupant. Neruea ligamenta, siue corpule, quos syndesmos vocant, cū simillimã habeant tendonibus speciem, valentissimorum remedium Gale. 6. Therapeuticæ.

Signa & indicia.

Quæ symptomata, quicquid affectus, ex neruorum vulneribus oboriantur.

Tumor in neruorum vulnere.

Crudus tumor, qui dicitur Hippocrate. Gall. lib. 6. Therapen.

Ligamenta vulnerata, valentissima, tolerant remedia.

vim tolerant: quippe q̄ nec ad cerebrum pertingant, & sensu careant. Nam nervi omnes, alij quidem ex ipso plane cerebro ortum habent, alij spinali interueniente medulla. Tendones quoque, quoniam compositam ex nervo ligamentoque substantiam habet, quatenus nervi participes sunt, eatenus ex cerebro oriuntur. Ceterum minus saltem, quam ipsi nervi convulsionem accersunt. Syndesmus verò vulneratus, si is est, qui ab osse ad os permeat, ac duorum ossium coniunctio est, & maximè sine periculo est, & ipsum quibuscumque siccat medicamentis, nihil hominem offendet. Sin is qui in musculum se inserit, quanto est nervo & tendone minus periculo, opportunus, tanto utique, nisi ritè, hoc est cautè, & diligenter curetur, reliquis syndesimis, magis terrere debet.

Curatio vulnerum, partium nervosarum.

Curatio vulnerum eiusmodi partium nervosarum, communis est, cum ea, quæ & vulnibus partium carnosarum accommodatur: hoc vno tamen excepto, q̄ symptoma illis superueniens, nempe dolor, primo medici sollicitudinem (cùm nimis contristat) ad se convertit. Ita tamen, ut universales, ac communes illæ intentiones suprà memoratæ, haud profus interim negligantur. Hæ autem numero erant quatuor. Prima quidem, extranea, quæ vulneris labris intercidunt, removere. Secunda, vulneris labra dissidentia committere. Tertia, commissa, atque in vnum coniuncta, servare. Quarta, particule læsæ substantiæ conservare. Ceterum quomodo has intentiones assequamur, ex differentijs iam suprà enumeratis planè cognoscemus. Ergo à simplici exordium sumentes, de nervi punctura primum dicemus. In nervi puncti curatione, neque unionem moliri statim oportet, neque coacta, seu in vnum coniuncta conservare: Quin potius cutis quidem vulnus apertum, inglutinatumq; custodire. Itaque infixæ duntaxat (si quæ nervis inhaerent) extrahenda, & particule oblæsæ substantia servanda. Porro, quæ ratione defixa euellenda sint, abundè in præcedentibus ostendimus. Reliquum est igitur, ut quomodo læsæ particule substantia servanda sit, & ab ingruentibus iniurijs vindicanda, aperiamus. Ceterum partis ipsius laborantis, hoc est, puncti nervi substantiam optime servabis, si, & dolori (qui ob exactum, atque excellentem partis affectu sensum vehementissimus excitari solet) sedulo, ac maturè occurreris: & phlegmonem fieri prohibeas.

Ingenti dolori primo succurrendum.

Puncti nervi curatio.

In nervi punctura vulnus diu apertum servandum est.

Symptoma nervi puncturæ committantia.

- ris. Quæ duo ex necessitate (nisi obstitueris) nervi puncturam consequuntur, & convulsionem subindè accerunt, vt in præcedentibus iam annotauimus. Vt autem geminum hunc scopum assequaris, hoc est, dolorem, ac inflammationem prohibere possis, quatuor intentiones rursus tibi erunt diligenter obseruandæ. Prima, erit recta vitæ institutio. Secunda, materiæ antecedentis subtractio: ne scilicet ratione doloris, confertim ad locum affectum confluat. Tertia, corpus à convulsione noxa vindicare. Quarta, dolorem sedare, & æruginosam saniem educere. Et hæc quidem puncturæ nervi propria est, & maximè peculiaris. Aliæ verò tres, omnibus nervorum vulneribus sunt communes. Quod ad primam intentionem attinet, præcipit Auicennas, vt cui nervus punctus est, vitæ in extremo tenuissimè seruet iuxta eam formam, quam superius expressimus, dum in vniuersum de vulneribus tractaremus. Locus in quo cubabit æger, tepidus esse debet, vt Celsus nos admonuit. Lectulus verò molli, vt Galeno, & Auicennæ placuit. Sed & collocari quoque membrum, quod id est, ratione certa debet. Optimum etiam medicamentum laboranti quies est: moueri enim, & ambulare, nisi sanis alienum est. In quiete igitur, ac lectulo molli hominem continere oportet. Vt autem secundam intentionem assequi possis, sequendum omninò tibi est Galeni consilium, qui lib. 6. meth. med. iubet in nervi puncturæ corpus totum sanguinis missione inaniendum esse, vtiq; si virtus robusta fuerit, & nihil aliud obstitent: et si nulla etiam adsit in corpore laborate sanguinis redundantia. Morbi enim magnitudo, ac doloris vehementia, corpore etiam plethorico non existente, hoc genus auxilij (vt antea diximus) plerumque desiderat. Carterum in hac per sanguinis missionem, vacatione, seruanda semper erit locorum affinitas, vt frequenter admonuimus. Si verò vitiosis succis repletum corpus sit, protinus congruo medicamento illud purgabis. Leuis quoq; frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius ab sunt a vulnere. De tertia indicatione abundè satis dictum est in præcedentibus, vbi de convulsione vulneribus supermodò tractauimus. Itaq; si puncto nervo, vel quouis modo vulnerato, aut etià cōtuso, spasmus acciderit, aut eius merus ingruat, protinus caput, collū, atq; vniuersam dorsī spinā, oleo liuorū, vel cōmuni, calente fouebis. Porro si in partibus superioribus, vt manu, vel brachio, id genus vulneris nervus acceperit, præter iam commemoratas partes, axillas quoque vbera

Quatuor intentiones in curanda nervi punctura obseruande.

Vitæ ratio.

Materie antecedentis subtractio. Sanguinis missio.

Purgatio.

Frictio.

Convulsionis præcautio.

rima

tim oleo calenti delinies. Si verò pūctus, aut quouis modo vulneratus nervus ex ijs sit, qui in crure habentur, bubones, fræ inguina, pubes, & loca vicina, largo oleo itatim crunt imbueda. Tū per totā spinā, ad collum, & caput vsq; ascendendum. Sed & tendones, & ligamēta, ac loca ipsa vulnere vbiuis illato propinqua eodē modo fouenda sunt, vt 6. lib. met. med. Gal. facere nos edocuit. Cæterū, neruorū vulneribus, sed maximè pūctim influctis, perperā a principio curaris, maxima omnino inflammatio, & putredo superuenit. Ergo cū nerui vulnerati sic iam inflammatione tentātūr, & putrescunt, farinā hordeaceā, aut fabaceā, aut potius eruinā, in aqua lixiua aut oxymelite, vel syro po acetoso decoctā, loco phlegmone occupato, & putrescenti statim illinere oportet. Non autē triticeā farinā, aut eius generis cataplasmata, quæ particulā putrem efficiunt: imo verò neq; aquā calidam adhibebis. Hæc enim tametsi reliquis inflammationibus, quas phlegmonas appellamus, sit accommodatissima (vt quæ eas valde mitiget) vulneratis tamen neruis est infestissima.

Si nerui vulnerati phlegmone occupentur, aut putrescant.

in illa farina eruis cassis non proponenda

Aqua calens vulneratis neruis est infestissima.

Ab humectantibus namq; & calefacientibus medicinis, putredo huiusmodi affectibus cōparatur. Quod si vehemens inflammatio cū maximo dolore infestauerit, eruinā farinā, aut fabaceam, cū optima sapa, addito paucissimo aceto, decoctā, illinito: prius tamen parte affecta, oleo calido affatim perfusa. Tāta verò interdū ex eiusmodi pūcturis, & neruorum vulneribus oboritur putrefactio, vt ferro candenti, vel caustico aliquo medicamento (cuiusmodi est Aegyptiacū) eam adurere cogamur.

Empla. ex metallicis ad gangrenas, & putredines.

Halyab. & Auicēna ad eiusmodi phlegmonas, & gangrenas, seu putredines, emplastro ex metallicis, & aceto præparato vtebantur, cuius cōpositio lib. 3. de cōpositione medicamen. & Galeno sub hac verborum serie descripta est. Cereæ pondo vnc. sex, olei vnc. nouem, myrios pondo vnc. sex, chalcitidis denarij pondo vnius, squammæ æris pondo vnc. duas, & semis, thuris pondo vnc. semis, galbani pondo vnc. Quæ liquari possunt, hoc est, cera, & galbanū: liquefacta, metallicis in aceto acri prius accuratè tritis, superfunduntur. Hoc pharmacū ignorauit Galenus, quis cōposuerit, neque apud vllum hoc modo citatum vnquam (vt ipse testatur) comperit. Eadem tamen præstare, quæ & alia quedā odorata simul, & sumptuosa, quæ paulo antè recenseret, adfirmat. Receniores autē eo medicamento vti nō cōsueuerunt, sed illo potius, quod constat farina hordei, fabarū, & orobi, in lixiuo stillaticio (vt prius diximus) decoctis. Quippe quod

quod à Galeno, & Auicenna maxime fit celebratum, & frequen-
 ti experientia, optimum ad hanc rem à multis comprobatum.
 Addit autem in decoctione Auicennas, mel, & acetum. Quod
 verò ad quartam intentione consequendam attinet, quæ neruo-
 rum quidem puncturæ magis propria est, Gal. lib. 6. meth. med.
 valde multa pharmaca recenset, ab ipso excogitata, & deorum
 quadâ providentia (ut alibi testatur) inuenta. Quæ vulnere im-
 posita, ad utrumque mirè sunt comparata, tum ut dolorem miti-
 gent, tum ut exitum saniei patefaciant. Tutius verò fuerit in
 60 nervis acu, aut paxillo, aut quopiam tali compunctis, præsertim
 si in altum recessum vulnus, hoc est. punctura descenderit, & cõ-
 spectum effugiat, cutim etiam in vulneris orificio aperire, ac la-
 tius incidere, quo melius sanies effluat, & cõmodius ad profun-
 ditatem loci, medicamentorum vires perveniant. Porro alijs
 cultro rasorio, alijs verò cauterio cutem ipsam aperiendâ esse
 magis placet. Galenus in id genus puncturis, orificium duabus
 in cutem sectionibus rectis dividere iubet libro tertio de com-
 posit. medicamentorum secundum genera. Itaque nisi oræ an-
 gustiorum eiusmodi puncturam aperiuntur, convulsiois pericu-
 10 lum magis imminet. Quippe quod obsecrato ita cutis vulnere,
nihil à profundo extrorsum expiret. Facta autem cuius apertio-
 ne, exiccandû mox vulnus est, substantia aliqua tenui, quæ vñs
 ad ima nervi offensi possit penetrare, ut libro artis medic. Gal.
 nos admonuit. Cuius generis est oleum Sabinum, præsertim
 verus, quod tanquàm vtilissimum ad præsentem curationem,
 libro sexto methodi medendi, & tertio de compo. med. narrat
 20 idem autor deligit. Vitandum autem (consilio eiusdem)
 omnino est, oleum crudum, quod *ἀνέτριπτος* vel *ἀνέτριπτος* du-
 plici nomine Græcè dicitur: & quod denique vim habet adstrin-
 30 gendi, cuiusmodi est oleum myrtinum, tribus saltē primis die-
 bus. Hoc enim per halitum non digerit, sed obstruit, & perspi-
 ratum prohibet. Præstat igitur nervos punctim ictos oleo te-
 nuï, adstrictione prorsus carente, perfundere, quale dulcissimû
 est, quod longè melius erit, si duos aut tres annos transegerit.
 Sed neque Sabinum etiam ipsum oleum, quamvis sit tenuissi-
 mum, aut aliud quodvis simile, ut est lasminum (quod vocant)
 frigidum admouendû est, sed calens: frigidû nanque præterquâ
 quod nervis aduersatur (ut quinto Aphor. expressit Hippo.) te-
 40 lidum verò digerit, ac dilatat, doloresque magis demulcet.

*Doloris seda-
tio, & sanies
eductio.*

*Punctura di-
latatio.*

*Oleum Saba-
inum.*

*Olea adstrin-
gentia vñs-
ta.*

*Frigidû pan-
ctis nervis
aduersatur.*

Si dolor vehemens adest. Si vehemens dolor laborātem discruciat, oleum ex vitellis ouorum cōmodē administratur. Ad eandem quoque intentionē in nervis punctim vulneratis, Galenus saepe vſus est terebinthina resina, medicamento sanē apprimē idoneo: per se quidē in pueris, & mulieribus, & generaliter ijs, qui molli essent carne: cum euphorbio verō emolliata, in duris corporibus. Non secus autem & propoli, non per se modō, verū etiam cum euphorbio molliens, vſus est: & si nonnunquā duriora contigerint, cum oleo quodam tenuiore. Quin (subiungit) & sagapeno in duris corporibus sum vſus, vtiq; cum oleo, & terebinthina id miscens. Sed & opopanace ad eundem modum, quo & sagapeno. Mihi verō & lachryma Cyrenaica non inutilis forē videtur, si quis emplastrum ex ea faciat: cuiusmodi est, quod nos ex euphorbio composuimus. Verū (inquit) nondū id experientia, quemadmodum reliqua omnia: comprobauimus. Quippe praecedere oportet eam, quæ a vera methodo proficiſcitur. remediorum inuentionē huic verō experientiam ad certiorē etiam fidem, subscribere. Siquidem ex tali methodo etiam sulphur, quod neque ignem expertum, neque lapidosum sit, sed omninō tenuium partium, ei cui nervus vulneratus esset, conducturum sperauimus. Tantum eius [sulphuris inquam] tenui oleo miscens: dū quod ex vtriusque mixtum erat, sordium haberet crassitudinem. In valentioribus verō durioribusque corporibus etiam si ad mellis crassitudinem redigas, sic quoque iuueris. Nam id quoque, comprobatur experientia est. Haecenus Galenus. Cuius sententiam approbat Auenzoar, huiusque rei periculum se aliquando fecisse testatur. Quæ autem de lota calce subdit Galenus, nervis denudatis magis conuenire videntur: Quare in sequentia ea reseruamus. Cæterū paucis quibusdam interiectis refert Galenus, se composuisse emplastrum ex cera, resina terebinthina pice, & euphorbio, ad hanc intentionem longē optimum quo & plurimi sua ætate, felici successu vterentur. Recipiebat autem ex cera partem vnam, ex terebinthina, & pice, vtriusque partis vnius dimidium (sic vt quod ex vtriusque conflaretur, ceræ par esset) ex euphorbio verō, ceræ partem duodecimam, etiam plus aliquando, vbi scilicet valentius efficere est in animo. Licet quoque interim & plus sit, quod ex terebinthina, & pice confit, quā cera. Licet rursus & alterum eorum tantum ceræ admiscere. Quin etiam in penuria terebinthinae resinæ (quæ vix apud nos reperitur) abietinam, Galeno etiam

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

253

autore, commodè admiscebis. Emplastro verò aliquo ex prius memoratis apposito, lanam mollem oleo calente mada-
scam supra decenter alligabis. Igitur ut summam, atque vni-
uersim dicamus, quæ in puncti nervi curatione observanda sunt,
Galenum ita sexto libro Therapeutices scribentem audiamus.

*Gal. li. 6. me-
thodi. med.*

« Vulnerati nervi curatione, medicamenta postulat, quæ & tepi-
« dum calorem excitent, & valenter sine molestia tamen defic-
« cent. Tum quæ ex substantiæ suæ natura, & trahendi vim ha-
« beant, & tenuium sint partium. Et rursus ibidem. In pharmacis
10 autem huc omne consilium direxi, ut esset eorum facultas, tum
« tenuis, tum modicè excofaciens, & quæ admodum ficcare ci-
« tra dolorem posset. Cum sola hæc trahere ex profundo sanie,
« neque contrastra, neque demorsa particula, possit. Porro cum
« permagna humanorum corporum (ut alibi Galenus ait) sit dif-
« ferentia, tum in temperamentis, tum ætatum mutationibus, in-
« super vitæ studijs, nulla ratione quodque medicamentum, omni-
« bus convenire potest. Quamobrem duo in promptu habero,
« altero valentius ex similibus genere confectum, alterum mitius:
« quæ inuicem mista dum usus postulat, permulta inter hæc iuxta
20 mixturæ quantitatem consues.

*Lib. 2. uera
yux.*

*Vide reli-
qua apud
Gale.*

De nervis æsim vulneratis.

Si autem nervus non punctim, sed planè æsim vulneratus
fuerit, diligenter considerandum est, quo pacto facta vulne-
ratio sit, utrum ne per transversum nervum, an secundum longi-
tudinem eius. Tum verò quantum interuenientis, seu præiacen-
tis cutis diuisum sit. Adhæc spectandum etiam est, nū totus ner-
vus dissectus sit, an non ex toto præcisus. Eiusmodi nanque vul-
nerum differentia, curandi ratione non parùm euariant, ut ex
30 sequentibus euadet manifestum. Itaque si cutis, quæ interuenie-
bat, sectio, non satis pateat, ampliori diuisione apertenda est, ut
iam in præcedentibus admonuimus. Proponatur igitur primū
satis esse cutis adaperitum, non ita tamen hiare vulnus, ut ner-
uus ipse incisus, sensui nudus adhuc appareat. Sanè huiusmodi
nervi scissura, siue per directum, siue per transversum facta di-
uissio sit, ultra communes tres iam intentiones dictas in punctu
ra observandas, tres adhuc alios scopos, siue intentiones habet.
Prima est, ut in loco vulneris magis declui, turunda aliqua mol-
lis & suavis blandè imponatur. Secunda, ut aliquod medicamē-
40 tum anodynum, seu mitigatorium, & ut vocant incarnatiuum,
nervis,

Hypothesis.

*Tres inten-
tiones par-
tial.*

neruis dicatum, vulnere superponatur. Tertia, vt lana mollis succida, vel oleo calente, delibuta, desuper blandè alligerur.

Ergo non ita exactè vulneris oræ committendæ sunt, & glutinandæ, quin emissarium aliquod relinquatur, quo collecta sanies effluere possit. Hæc enim si in profundo retineatur, neruis putrefactionem ac corruptionem inducet, atque ita conuulsionem etiam inuehet. Eam ob rem profuerit (prius saltem diebus) turundam aliquam mollem, digestiuo ex terebinthina, oui luteo, & croci momento illitam, loco vulneris, vt dictum est,

Turunda.

dechloriori mollior immittre, donec nullum amplius phlegmones, aut conuulsionis periculum timeatur. Medicamentum autem his neruorum, ac etiam tendinum vulneribus, cæsum, non punctim acceptis, expeditissimum, apprimeque idoneum esse creditur, quod vnguetum ex vermibus vulgò nuncupatur. Recipit autem centaureæ minoris, linguræ canis, lanceolaræ, quæ

Vnguentum ex vermib⁹.

plantago est minor, pilosella, consolidæ maioris & minoris, ana. M. vnum, vermium terrestrium, quos lumbricos appellamus, lib. semis, olei cômunis, lib. vnam, vini lib. vnam & semis: subigantur simul, & ita septem diebus nutrantur, seu (vt loquuntur) fermententur. Deinde illis addantur sepi arietis à pelliculis emundati, lib. vna, picis nigræ, resinæ, ana quart. vnum, gummi ammoniaci, galbani, opopanacis in aceto dissolutorum ana drach. quinque: simul omnia moderato igne decoquantur vsq; ad vini & aceti consumptionem, & colentur. Vbi verò hæc penè refrixerint, adde terebinthinæ quart. semis, thuris, mastiches, sarcocollæ ana drach. tres, croci drach. duas: spatulâ agitentur in mortario, & fiat vnguentum. Porro longè alia multa medicamenta, paratu etiam facilia, hisce neruorum diuisionibus, valde accommodata reperiuntur à Gale. lib. 3. de composi. medic. secundum genera, & 6. meth. med. Cuiusmodi est, quod ex oxy-
30 melite, & fabarum farina, vel eruorum, vel lilij, vel ciceris, vel lupinorū amarorū, vel hordeaceæ farina, cataplasma cõficitur.

Cataplasma.

Pix liquida.

Itē pix liquida fermento tēperata, atq; vulnere imposita. Ernuorum quoq; aut alia ex prædictis farina, fermento permixta. Imò

Oxelaum.

Propolis.

& interim fermentū ipsū solū. Quintiā oxelaum solū quod caleat, modò acētū abundè acre, & vetustū sit. Propolis quoque

fermentum in buln.

recēs, liquida, & pinguis, vulnere imposita, sæpe præsidio fuit: interim quidē per se, interim fermento cõmixta. His itaq; præsidij ad neruorū vulnera, tā in agris, quàm in vrbibus, felici admodū successu, Galenus sæpe vñs est, non solū in his, quos 40 iam

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

255

iam phlegmone prehēderat: sed etiā, vt refert, protinus ab initio. In summa oportet medicamēta omnia, quæ neruorū vulneribus tam cæsum, quā punctim infligis, ex vī futura sunt, ea possere facultate, quæ & modicè calfacere (id est, tepidū calorem, & veluti ex sole suauem, excitare) & valenter, citra dolore tamen, siccare possit. Tū ea quoque esse substantiæ natura, quæ ex alto saniem, atq; humores educere, ac digerere valeant. Atq; ex ijs minis molesta esse cōsueuerunt, quæ liquida sunt, vt Galenus etiā annotauit, lib. 3 de cōpo. medic. secundū genera. Super eiusmodi verò medicamēta, lana mollis succida, vel oleo calente respersa, apponēda est, & leniter obstringenda. Cæterum quoniam frigus cum omnibus, tū verò maximè neruorū vulneribus infestissimū est, plurimū conferet lanā ipsā superpositam permanere calidā, siue oleo tantū, siue oxelæo quoq; imbuta fuerit, fiet hoc, si alia lanæ siccæ vellera, aut pani calidi subinde mutati, extrinsecus circūponātur, & æger intra rectum, si modò hyems fuerit, ad quintū vsque, vel septimum morbi diē sese cōtineat. Nā si cō vsq; phlegmone non tentetur, vacetque prorsus dolore, & nullā sentiat tensionē in posterū (inquit Galenus) tutus erit. Atq; hæc de neruo cæsum vulnerato in vniuersum, ac generaliter dicta sunt, siue per transuersum, siue per directum, seu longitudinem neruus diuisus sit. Quæ verò sequuntur, peculiariter de neruo per transuersum vulnerato dicuntur.

Qualia in vniuersum medicamenta esse debent, neruorum vulneribus accommodata. Lana mollis succida.

Lib. 3. cap. 2. 714.

De neruo per transuersum cæso.

AT si neruus per transuersum vulneratus sit, nō tamen ex toto præcisus, maior conuulsionis metus impendet, infirmatione scilicet (vt supra diximus) à dissectis fibris, ad integras & nō sectas succedēte, cæterum conuulsione ab ipsis non sectis excitata. Huic itaque memoratis prius auxilijs, quā cūctissimè occurrendum est. Ergo in quiete omnino, & strato molli ssimo cōtinendus æger est, plurimūq; oleo affatim, & assidue, in gulo, spina, axillæ, collū, & caput perfundēdum. Cæterum in hoc vulnere largius sanguis inritēdus est, & victus tenuior adhibendus, quē in neruo per directum inciso. Quod si cōuulsio iam superuenierit, & nulla conuenientium medicamentorū vi remittatur, reliquæ fibræ quæ integræ remanserāt, præcidi debent. Si enim totus neruus præcisus sit, nullum quidem prætereā (vt Galenus inquit) conuulsionis periculum sequetur, debilis tamē particula manebit. Verū laesio quā mors potius optanda.

Sexto meth.

Ther. 12.

Hoc

Lib. 3. *ἔκτῃ*
γίμνῃ.

Hoc pacto quibusdam in priore infernaque femoris parte, per transuersum percussis, reliquum tendinis amputauit Gale. vt tuta illi esset curatio. Porro si transuersa hæc diuissio, tam insigniter alta in musculo facta sit, vt deligatura nihil prodesse possit, non dubitabis musculi distantes inuicem partes (præsertim si vulnus recens fuerit) futuris altioribus contrahere, curâ tamen semper adhibita, ne ab acu neruus, vel tendo compungatur. Carnosa nanque ipsa musculorum pars, dum acû fitur, periculo vacat. Nerui verò, aut tendines, non mediocri periculo continentur. Horum quidem omnium Galenus nobis autor fuit lib. 3. de compo. medi. secundum genera. ad hunc modum

Historia de
gladiatore
in femore
vulnerato.

scribens: Contemplatus (inquit) gladiatorem quendam ex his, quos equites nominant, transueriam diuisionem in priore, ac inferiore femoris parte habentem, eamq; satis altâ: tum vulneris labrum intuitus, sursum alterum reuulsû, infra alterû, quasi ad patellam detractum, non dubitavi distantes inuicem musculorum partes, futuris contrahere, curatione illa, quæ Græcè ἀ latitudine *ἔκτῃ* *ῥατ* dicitur, neglecta. Itaque veritus tendines ipsi consuere, denudatis prius illis, sic altioribus futuris vsus sum, haud ignarus carnosam ipsam musculorum partem

Cur futura
alta esse de-
bent.

periculo vacare: tendines verò non item, quanquam hoc nulum ex præceptoribus facientem viderim. Has autem futuras in eiusmodi vulnere, ideo non superficie tenus, sed altius moliræ conuenit, ne quæ in imo sunt, inconglutinata dehiscant. Reliqua verò, quæ ad vulneris curationem attinent, hæc quoque sunt eadem, etiam si totus neruus præcisus sit. In solo itaq; per transuersum accepto vulnere, eodemque insigniter alto, cum deligatura nihil prodesse potest, ex sola futura curatio absoluitur. Etenim in vulneribus, iuxta membri longitudinem factis, deligatura vulnerati musculi partibus inuicem contrahendis;

Lumbrici in
rosaceo deco-
cti.

sufficit Galeno. Cæterum futura decenter facta, biduo confutum vulnus fouendum erit rosaceo, in quo lumbrici terrestres prius decocti fuerint, ac supra puluis aliquis qui futuram contineat, aspergendus erit, cui parem ipsorum lumbricorum deficcatorum, & contritorum portionem, si lubet, adicies. Quidam enim memoriæ prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, neruisque diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse, vt libro simpli. II. Gale. refert. Sunt qui & centaurium asfactum, & contritum etiam inspergunt. Medicamen enim est admodum deficcatorium, mordacitatis expers, quodq; si glutinatos,

Centaurium.

natorijs,

De Plagis, seu cruentis vulnerib.

257

natorijs, & deficcatorijs miscetur, vlcera maligna: & cacoethe sanare creditur. Quin & ipsius herbe recentis illitu, magna vlcera glutinantur: vetusta quoque, & quæ ad cicatricem ægre perducuntur, eodem modo vtentibus, cicatrice obducuntur Galeno libro septimo de simplicium medicamentorum facultatibus. Refert Dioscorides, & quodam in loco Auicennas, quod carnes minutim incisæ coalescunt, si cum centaury maiori decoquantur. Eisdem quoque centaury minoris radix recens, aut andæ ante madefacta, vulnera conglutinat, & coniungit. Sed iam tempus est, vt de nudato neruo dicamus.

Nerui cæsim vulnerati, & nudati curatio.

- N**udato neruo, omnis curationis consilium huc tibi dirigendum est, vt minima cum rosione siccet. Proinde si neruus non punctim, sed planè cæsim vulneratus fuerit, cure etiam quæ interueniebat, diuisa, adeò vt nudus appareat, nullum iam supra commemoratorum medicamentorum, quæ ex euphorbio, ac similiter acribus, emplastri specie sunt, applicabis.
- Nudatus nanque vehementem ipsorum vim ferre nequit, ita vt, cum interposita cutis erat, tulit. Optimè igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompholygem, ac metallica omnia, resinas quoque, olea, mel, & ceram, quæ eiusmodi medicamenti, nudato neruo, ac diuiso, apprimè idoneis, miscenda sunt, elucris: quò scilicet citra rosionem vllam sint siccatura. Quippe medicamentis omnibus (vt Galenus inquit) quæ laueris, acris, mordensque humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum erit, calcem ætatis tempore in diebus canicularibus sub sole, aqua salubri, & dulcissima sæpius elotam, & exiccata, plurimo optimoque rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum, quod è pompholyge (vt dictum est) elota fit: largiore iridem: ac probatissimo rosaceo salis omnino experte, solutum, liquatumve. Salubre quoque medicamentum est, & quod ex melle optimo sub emplastri specie componitur. Solui verò & id rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus fit optimū: tum salis omnino experte, vt scilicet minima cum rosione siccet. Nihil enim acre (vt diximus) nudato neruo (quæ pars est suapte natura sensu vegetissima) vnquam admoendum est. Si verò robustus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit à superuacuis humoribus mundum, in hoc fas est, etiam valentioribus remedijs nonnullis vti, vt pastillis, seu trochiscis ex Polyda au-

De cæsim
Radix cen-
taury mino-
ris.

Nudatus
neruus rebe-
mentem me-
dicamento-
rum vim fer-
re nō potest.
Lib. 6. meth.
& 9. simpli.
Calx elota
cum rosaceo.
Medicamen-
tum ex pom-
pholyge.
Emplastrū
ex melle.

Neruo denus-
dato nihil
acre admo-
uendum.

Lib. 6. meth.
Nihil frigi-
dum nuda-
to nervo ad
mouendum.

Diapalma.
Pastilli.

Oleum nu-
dato nervo
et vulnera-
to, no esse ad
mouendum.
Sanies qui-
bus abluenda.

Aqua nuda
to nervo ad
uersatur.
Deterforium
medicamen-
rum.

Candens fer-
rum.

tore, sapa calida solutis, & in linamentū illitis. Id autem vel im-
primis (inquit Galenus) semper habendum curæ est, ne quid ex
ijs, quæ vulnus contingunt, frigidum sit. Quandoquidem ipsa
laborans particula, & iensilis maximè est, & principum cor-
poris partium primati [nempe cerebro] continua, & tempera-
mento suo frigida. Quorum omnium occasione, & ex facili à
frigido offenditur, & suam offensam cerebro imperit. Ad iam
dicti verò pastilli vsum propè etiam accedit & medicamenti
vsum, quod *διὰ χαλκίτης* Galeno nominatur, vulgò autem dia-
palma. Hoc ergo medicamine, si trochiscos Polyidæ ad manum
non habemus, vti tutò poterimus. Pastilli autem Polyidæ
ex quinto libro de compositiorum pharmacorum miscella,
sunt requirendi, quorum si copia non est, Andronis, vel Pa-
sionis, vel etiam Galeni pastillus erit sumendus, quorum com-
positiones libro superiore cap. de carbunculo, descripsimus.

Ceterum vulnus eiusmodi oleo perfundendum non est, præ-
sertim cum nunc memoratis pastillis curatio suscipitur. Nam
oleum illorum viribus aduersatur, & sordidū vlcus reddit. Ne-
que enim parū interest (inquit Galenus) nudò ne nervo oleum,
an per interpositam cutem admoucas. Abluenda igitur à vulne-
re sanies est, molli lana specillo circumuoluta, in sapa tepida
intincta, & mox expressa. Quod si omnia benè atque ex animi
sententia succedant, etiam vino dulci, non acri, & mordaci,
vulnus commodè poteris madefacere. Eo autem iam penè ad
cicatricem ducto, etiam vtile fuerit album, tenue, & quod
Græci oligophoron vocant. Aquæ verò vsum, ob causam
superius adductam, sicuti & relaxans cataplasma semper in
nervo nudato deuitabis. Blandè etiam, ac suauius vulnus (si
necessitas urget) detergebis, vnguento ex vermibus facto, vel
aliquo alio deterforio medicamento, quod recipiat mel pro-
banissimum, terebinthinam, & farinam hordei, aut fabarum:
vel alio ex ijs, quæ in antidotario habentur. Nonnulli pro-

comperito habent, quòd si dissecti nervi capita, seu extremi-
tates candenti ferro, carne vitata, leuiter attingantur, opti-
mè postea conglutinari. Postquam autem peruum denuda-
tum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet,
ex medicamento (inquit Paulus) quod angustis vulneribus
faciat: nempe eo, quod ex euphorbio preparatur, aut fi-
mo columbarum, sed ita, vt etiam sanas partes ampliter com-
prehendat.

De neruorum contusione.

Neruorum contusionem promiscuam cum ecchymosi, seu carniū contusione habere generationem, facile nobis insinuat similis vtriusque affectus curatio. Itaque illic & digerentibus, & adstringentibus medicamentis utebatur, hic verò etiam siccantibus, & adstringentibus nobis vtendum est, præsertim dum cutis vnà eum neruo contusa exulcerataq; est. Si verò abique cutis simili affectu neruus quidem contusus est, huic auxilia, quibus euocandi, ac digerendi facultas insit, adferenda sunt. Contuso igitur neruo, si cutis simul contundatur, & vlceretur, fabarum loimentum oxymelitre dilutum, aut si magis siccare voles eruina[m] farinam cum sapa, & modico aceto illines. Quòd si amplius adhuc siccare desideras, urum quoq; illyricam, vel eam quam vulgò florentinam vocant, immittes. Recentiores in hoc affectu per initia rosaceū cum oui candido liquore admouent, & mingato dolore laborante particulam fouent vino tepescito, quod crassè sit substantiæ, & adstrictionis particeps. At si vnà cum contusione dolor infester, picem liquidā cataplasmati è farina fabarum adijcies, & vbi simul bene decoxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi autem corporis curatio, eadem est cum ea, quam paulò antè docuimus. Verùm si neruus quidem contusus sit, curis verò nihil quod sensui appareat, à natura recesserit, oleo calente discussorio, quale anethinū est, & rutaceum, irinum quoq; & amaracinū, continūe locum irrigabis, perfundesq; & lana oleo madefacta fouebis, ac totius corporis curam prædictis similem adhibebis. Porro si neruus totus sit præcisus, metus præterea nullus (vt paulò antè diximus) instat, nullum enim inde periculum sequi potest. Membrum tamen ea parte debile efficietur, præsertim si dissectus neruus in 30 signis magnitudinis fuerit. Curatio verò eius communis est, cum ea quæ aliorum est vlcerum.

*Neruorum
contusio, pro-
miscuam ha-
bet cum ec-
chymosi, tū
generationis
tū curatio-
nis rationē.*

*Sicum neruo
cutis contu-
sa sit.*

*Nerui & cutis
contusio.*

*Si dolor vnà
cum contu-
sione infe-
stet.*

*Si neruus
contusus est,
cutis verò
nequiquā.*

*Si neruus
totus sit præ-
cisus.*

De vulneribus ossium.

CAP. XIII.

TRadita vulnerum carnosæ substantiæ, venarum, arteriarum, & neruorum partium curandi ratione, nunc de vulneribus ossium nobis agendum superest. Cæterum tamen omnis continuitatis seu vnitionis solutio in ossæ Galeno sexto methodi medendi & passim alibi, Græcè proprio nomine catagma, (quod Latinis est fractura) dicitur, recentiores tamen tum medici tum chirurgi, fracturam 40 vocare

Vulnus ossis
Ex ossiū vulnere praua oboriuntur symptomata.
 vocare consueuerunt, solam ea ossis diuisionem, quæ sine incisione, à violentia quadā, vt ruptura extrinsecus accidente fit, de qua in sequentibus latius dicitur. Vulnus verò ossis appellare, solent, præcisionem ense, aut quopiam alio simili incidente, vel in profundum penetrante factam, de qua in præsentiarum dicere statuiamus. Huiusmodi autem præcisio quandoque (vt nunc loquuntur) est totalis, quandoque partialis. Ceterum cum os ipsum vulnerari non possit, quin caro & venę, & aliæ superiacetes particulæ etiā vulnerentur, sæpenumero ex ossium vulnere, pessima quædam symptomata excitantur. Nempe profusio sanguinis, dolor vehemens, conuulsio & syncope: à quibus & agendorum etiam indicationes sumendę sunt. Porro cum notæ vulnorum ossium sensu sint satis conspicuæ, his prætermisissis iudicia seu præfagia subiiciemus, quæ tam ab ipsis veteribus quàm recentioribus, scriptis mandata sunt. Itaque iudicat Galenus libro artis medicinalis, & rursus tertio & sexto methodi medendi, quòd ossis soluta semel partiū continuitas nunquàm postea adamussim & per se instaurari potest: præsertim verò in iuuenibus, & adolescentibus, & viris, multoque minus adhuc in senibus. Potest namq; os illud tantum vnitionem per se & sine alterius ope recipere, atque in idem adamussim coalescere, quod abundè molle est, cuiusmodi conspicitur in puerulis, Alterius tamen ope, vt substantiæ cuiusdam interuentu, seu glutino quodam, ossa ipsa quantumuis etiam dura siccaq; sint, concreiscunt glutinanturve. Vocant autem glutinum hoc, seu substantiam illam interuenientem, cuius beneficio separata ossis particulæ secum agglutinantur colliganturque, Græco vocabulo πῶρον sarcoidem, id est, callum carnosum. Huius prognostici ratio superius adducta est, vbi de iudicijs vulnerū in vniuersum agebatur. Hippocratis oraculum est libro septimo Aphorismorum, 30 casum prauum esse, osse nudato, carnem circumstantē videri ab Erysipelate apprehensam. In ossis (inquit) exuritione, hoc est, nudatione, erysipelas, malum. Sed hic casus (vt Galenus ait in commentario) ossibus ita patientibus rarò superuenit. Adhęc, frigidum nudatis ossibus, eiusdem Hippocratis testimonio, est infestissimum: partes enim sunt exangues, ac natura sua frigidiores. Quæcunque autem tales in animalibus partes sunt, citius, ac magis à frigido offenduntur, vt libro quinto Aphorismorum Galenus annotauit, commentario decimo octauo. Si magna ossa, veluti est os, quod propriè brachium, & humerus di-

Iudicia.

Puerorum ossa diuisa per se coalescunt.

Erysipelas in ossis nudatione malum.

Nudata ossa, à frigido magno perire offenduntur.

citur,

eitur, vulgò autem os adiutorij, & vtrunq; focile, siue os tibiz, *Magnorum osium præcisio, cum exciditur medulla, periculosa admodum est.*
 maius inquam, & minus (illud cneime, hoc perone Græcis dicitur) tota præcisa sint, adeò vt medulla egrediatur, vulnus tale periculosum admodum est, & magna ex parte membrum, quod ita præcisum est, emoritur. In tam insigni nanque incisione, nervi, venæ, & arteriæ maiores, quæ vitam, sensum, atque alimentum particulæ iam sic affectæ prius ministrabant, omninò præcinduntur. Quanquàm non defuerint aliqui, qui Avicennam perperâ intelligentes, ausi sint oppositum planè asserere. Inquit
 10 autem ad hunc modum Avicennas, Et quod dicitur de incisione medullæ, & interficit, est intentio, in qua nulla est utilitas. Haber enim medulla lenitatem, & viscositatem, & non inciditur. Quod dictum sic accipiendū est: quod nullus vnquàm interiije ob præcisionem medullæ osium, quanquàm membrū sic percussum tandem contabescat, & emoriatur: ob eam scilicet, quæ nuper adduximus causam. Cùm verò dicit, medullam non incidendi, hoc intelligendum, cùm os frangitur, nō autem cùm totum excinditur. Quis enim addubitat, cùm os totum præcinditur, & medullam quoque simul excindi posse? Cæterum summo-
 10 perè cauendum est, ne aliquid osis vulnerati subitò, ac magna vi extrahatur. Nā si ita fit, vix à fistula, convulsione, delirio, & febre, laborans tutus erit, vt Avicennas nos commonuit libr. 4. suæ medicinæ. Proindè satius est, extrahenda ad tempus relinquere, & medicamento aliquo attractoriam facultatem habente, naturam adiunare, quàm sic ea subitò, & magna violentia eximere, vt suprà etiam monuimus, cùm de telis è corpore extrahendis ageremus.

Lib. 4.

Os is vulnerati frustra, nec subito, nec magna vi euellenda.

Curatio vulneratorum osium.

30 **I**n curandis osium vulneribus, sicuti & in fracturis, atq; aliarum partiū soluta cōtinuitate, finis, seu scopus saltē primus, ac generalis, vnus est: nempe vnio. Quòd si is per affectarū partiū siccitatem (vt paulò antè diximus) perfici nō possit, restat alter, vt alterius scilicet cuiusdam interuentu disidentes osis vulnerati partes glutinentur. Vt autē finem hunc secundum possis assequi, quatuor alij scopi tibi proponūtur obseruandi, suo ordine exequendi. Primus est, vt ijs quæ infixæ sunt, & osium frustulis (si quæ sunt) exemptis, partes inuicem distantes, in vnū adducantur, & vt cōmissæ iam seu coniunctæ maneant, vulnus in
 40 carne acceptū, futuris alioribus, ac validioribus cōtrahendū est.

Quatuor scopi in curatione vulneris osium obseruandi.

Primus scopus.

Secundus est, vt præsidia, quibus huic affectui ritè mederi possis, prudenter deligas. Tertius, vt deligaturæ modus decens adhibeatur. Nempe talis, vt commodè vulnus tractari, ac curari possit, citra omnimodam eius ipsius deligaturæ remissionem, & ademptionem. Quartus, vt postquam à phlegmone iam tuta esse videbitur laborans particula, victus p̄ro gignendo aptissimus, instituat. Cæterum, quomodo primus scopus attingi possit, iam in sermone vniuersali de vulneribus superius dictum est. Quod autem eiusmodi futuræ in carnosissimis partibus factæ, in proposito affectu sint ex v̄su, hinc manifestum euadit, quoniam 10 distinctas vulneris partes, in vnum adducit, adductas verò, coniunctasque haud amplius dissidere patiuntur, ac præter hæc, partis substantiam tuentur. Vices enim deligaturæ, & ferularum tenent, prohibentque ne circumfluis aër plagam temerè subintret, & os ipsum alteret, ipsique noxam inferat, quod magnopere vitandum est. Atque hæc omnia in proposito casu sunt utilissima permittendū igitur, vt vulnus mox carne impleatur, atque caro ipsa medicamentis exiccatoria facultate præditis, ita obduranda est, vt tandem callosa fiat, & p̄rus gignatur. Itaque si aliquid ex ipsius ossis substantia deperierit, eiusmodi cavitates ad 20 vnguem impleri non potest, sed insanabilis remanebit, vt libro tertio methodi medendi Galenus nobis est autor. Secundum autem scopum hoc modo assequeris. Sutura decenter facta, turundam, in locum vulneris decliuorem imponito, vt per hoc emissarium ossis frustula (si adsint) vel sanies, aut purulenta colluies, educi & expurgari possint. Sed & puluerem futurarū (vt vocant) conseruatiuum, superponito, quem primis diebus cum oui candido liquore remiscebis. Postea verò agglutinatorium commune ex puluere illo, quo omnes passim v̄untur, terebinthinæ permixtum, ita vt in vnum corpus coeant, superaccommodaro, vel aliquod aliud simile, ex ijs quæ incarnatima vocant, prout res exoptulabit. Ergo turundulam melle rosaceo, quod puluerem glutinatorium ex myrrha exceperit, illitam, indito. 30

Secundus scopus.

Myrrha.

Tertius scopus.

Myrrha enim Auicennæ, carne nudata ossa vestit, & operit. Itaque si os exurum nudarūve appareat, prædicto puluere, & linamentis ex optimis pannorū lacinijs confectis, ipsum operito, munito ve. Deinde emplastrū, vel stupas, aut pannos lineos vino calente delibutos, super applicato. Cæterum, tertius scopus in curando ossium vulnere propositus, ita absoluetur. Cum os totum præcisum est, facta imprimis (vt dictum est) sutura, totum 40 membrum,

membrum, vt Razes præcepit, excepto vulnere, duplici panno, obtuluito. Pannos autem eiusmodi, primis quidem diebus oui albore, sequentibus verò, vino calido, tum austero, tum nigro, imbuito. Et fascia longa ac lata iuxta membri magnitudinē & figuram deligato. Ea enim longitudine & latitudine fascia ipsa esse debet, quam vulneratæ partis conformatio desiderat. Vt autem conueniens sit eiusmodi deligatura, eius principium iuxta finem laborantis particulæ incipiat. Ab hinc facta ad superiorem partem circunuolutione, vbi prope vulnus ventum erit, fasciam ex aduerso plagæ circumducito, atque eam versus corpus non comprehenso vulnere, quousque satis erit, dispensato. Mox fasciam vertendo, eam supernè deorsum ducito. Atque vbi iā ad locū vulneris eam deduxeris, in partem vulneri oppositam, supra priorem aliam circunuolutionem, circumductus inijecto, eosque ita dispesato, vt ibi vnde initium accepit deligatura terminetur, & vulnus minime coopertum remaneat. Porro, fasciæ sic reuolutæ extrema acui bidem erunt assuenda. Deinde ferule duæ vel tres (si vulnus in artubus acceptum est) laues ac politæ, membri læsi figuræ, ac magnitudinē accommodatè inijectur, quæ laesam partem ita fulciant, vt vulnus minimè contegant. Has autem fasciam deligabis, nec prius solues, quam vulnus percurarum fuerit: nisi tamen dolor, vel eo loci excitatus pruritus, aut inflammatio nos ad id compellat. Quibus quidem symptomatis modo, quo in sermone vniuersali diximus, succurrendum erit. Vulnus verò extrinsecus stupis contegendum est, & fascia deligandum, quæ singulis curationibus solui debebunt, quum aliæ supradictæ fasciæ maneant: deinde vulnus detergeri, exiccari, & more aliorum vlcera curari debet. Quod autem (inquit Galenus) neoterici inuentum est glossocomion, quo maximè tem-

30 pore gignendi calli vitur, laudandum id quidem, quantum aliud quidvis eiusmodi machinarum, ducimus. Porro quod ad quartam intentionem attinet, quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est, cibis boni succi, & qui multum nutriat, ex quibus prouenire succus soleat, non solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maximè expedit: de quo plura in sermone de fracturis. De duritie autem, quæ diuortium continui sequitur in fractura, quam Græci catagma vocant, fusius etiam alibi dicetur.

*Deligaturæ
modus in
vulnerato
osse.*

moderari

*Quartus
scopus.*

Lib. 6.

Generalis diuifio Vlce-

RVM, IN LIBRVM III.

CHIRVRGICARVM INSTITV- TIONVM IOAN. TAGAVLTII MEDICI.

Vlcus.

10

1 Simplex, { Id est, cui nec vllus affectus alius, nec symptoma vllū coniungitur.

2 Compositum, { Seu cum alio affectu, aut symptoma com-
plexum.

1 Vlcus simplicis, ac solū cōsistentis differentię.

Verā, ac propriā, { Hoc est, à natura vlcus accepta.
Extrinsicus accedentes, { Et nō à substantia rei desumpta.

Vlcus differentię verā, ac maximē propriā, at-
que à substantia rei accepta, sumuntur.

20

A figura ipsius vlcus.

Ab ipsis dimensionibus, { Hoc est, à dimensionis magnitudine,
spacio seu quantitate, &c.

Vlcus differentię à figura.

Vlcus rectum.

Vlcus obliquum.

Vlcus pampini modo retortum.

Vlcus hami ritu vncum.

Vlcus differentię à magnitudine, & spacio
ipsius diuisionis.

30

Vlcus magnum. } Longitudo, & latitudo.
Vlcus paruum. }

Vlcus in summo residens. } Altitudo.
Vlcus profundum. }

Vlcus æquale. } Differentia sunt etiam in alto.
Vlcus inæquale. }

Vlcus magnum, & profundum. --- Longitudo, & altitudo.

Sub magno comprehenditur longum, & latum: sub paruo, breue, &
angustum. Quæ differentia sunt à dimensionibus sumpta.

40

Vlcus

Vlceris fimplicis differentia extrinfecus accedentes, & non à fubftantia rei, hoc eft, à natura ipsius vlceris, accepta, fumuntur.

A tempore.

A parte affecta.

A fitu, feu loco in parte affecta.

Vlceris differentia à tempore.

Vlcus recens.

30 Vlcus inueteratum.

Vlceris differentia à parte affecta.

Similari.

Organica.

Vlceris differentia à parte fimilari affecta.

Vlcus in cute.

Vlcus in carne.

Vlcus in arteria.

Vlcus in vena, &c.

30 Vlceris differentia à parte organica affecta.

Vlcus auris.

Vlcus narium.

Vlcus oculorum.

Vlcus oris.

Vlcus faucium.

Vlcus pulmonum, &c.

Vlceris differentia à fitu in parte affecta.

Vlcus in confpectu.

Vlcus fub cure conditum, & non apparens.

30 Vlcus in principio, in fine, vel medio mufculi.

Vlcus in fupernis partibus.

Vlcus in infernis partibus.

Vlcus fecundum longitudinem.

Vlcus fecundum latitudinem.

Vlcus fecundum tranfuerfum.

2 Vlceris compofiti differentia fumuntur à cõplexu ipsius.

Cum fymptomate.

40 Cum morbo.

Que à generationis modo, & ratione fumuntur differentia, magis ad vulnus pertinet, quàm ad vlcus.

Nō sunt propria differentia, fed re-

Cum

*ritus compli-
cati affe-
ctus.*

Cum fua caufa.

Cum fua caufa, & morbo.

Cum fua caufa, morbo, & parte affecta.

Vlceris differentia à cōplexu cum fymptomate.

Vlcus crucians.

Vlcus dolore vacans.

Vlcus purum.

Vlcus fordidum.

Vlcus faniofum.

Vlcus cruentum.

19

Vlceris differentia à complexu cum morbo.

Vlcus dyfcratum, id eft, cum intemperie.

Vlcus phlegmonofum.

Vlcus eryfipelatofum.

Vlcus gangrænofum.

Vlcus cancerofum.

Vlcus putridum.

Vlcus cauum.

Vlcus fupercrescens.

Vlcus phagedænicum.

21

Vlceris complexus cum fua caufa.

Vlcus fpontaneum.

Vlcus ab animali venenofum.

Vlcus à fimia morfu.

Vlcus ab hominis morfu, &c.

Vlceris complexus cum fua caufa, & morbo.

Vlcus cacochymum, id eft, vitiofo fucco obfelfum.

Vlcus cacoëthes, id eft, malignum.

Vlcus rheumaticum, id eft, fluxione vexatum.

31

Vlcus arrofum.

Vlcus finuofum.

Vlcus ab atra bile.

Vlceris differentia à complexu cum fua caufa, morbo, & parte affecta.

Erofio.

Caries.

Esthiomenus.

Sphacelus.

Dysenteria.

Inftitu-4

Institutionum Chirur

GICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER TERTIVS,

De Vlceribus in vniuersum.

10

Quid sit vlcus vulgò apud Chirurgos, & eius diffinitionis interpretatio.

CAP. I.



20

Inimus libro superiore, de cruentis vlcibus, seu de ea continui solutione, quæ in carnosa parte ex vulnerando recens facta est, ac relicta. Nunc transeundum ad id vnionis etiam in carnosa ac molli substantia factum diuortium, quod nec recens est, nec cruentum: sed iam inueteratum, & in quo vna, vel plures consistunt disposi-

Vlcus quid vocetur chirurgis vulgariis.

tiones, quæ vnionem, vel consolidationem remorantur, atque impediunt: ex quibus saniosa, & purulenta quædam colluuiæ, putredoque excitatur. Vocant autem vulgares medici, & chirurgi tale vnionis diuortium, seu continui solutionem, communiter vlcus. Quanquam vulnus, & vlcus ferè passim apud probatos auctores pro re eadem sumantur: nempe pro dissolutione vnionis in parte carnosa. Quæ siue recens sit, siue antiqua (quarenus saltem solutio tantum vnionis est) eandem sanationem (vt Galenus ait) semper desiderat. Cuius vitioque propositus finis vnus est, seu vlcus

Vulneris, seu vlcus finis.

30

nempe vnio, vel agglutinatio, vel coitio, vel continuatio, quæ eadem sunt. Itaque discrimen quod à tempore sumitur, nihil plane proprium indicat Galeno. Nam recens (inquit) vetusue vlcus nihil indicat. Quanquam indicare videtur nonnullis, sed hi seipso fallunt. Non abs re tamen factum putauimus, si recentium, ac vulgariarum medicarum, ac chirurgicarum familiarum scriptorum morem iam ab omnibus receptum sequuti, discrimen inter vulnus (quam & plagam vocant) & vlcus posuerimus. Vlcus quidè cum ipsis appellantes continui solutionem in substantia carnosa & molli, in qua vna vel plures consistunt dispositiones, vitio-

Vlcus definitio.

40 nem, seu agglutinationem fieri impediens, ex quibus sanies,

&

Vlcus quid & purulenta quædam colluies, ac putrilago excitatur. Apud
Auicenna. interpretem autem Auicennæ, vlcus ita breuiter definitur: Solutio
 continuitatis in carne, quando iam continet saniem & pus,
 nominatur vlcus. Cæterum in hac vlcis definitione, solutio
Definitio continuitatis, locum generis obtinet, cuius species libro superiori
vlceris exa- re de vulneribus abundè recensuimus. Reliquæ verò definitio-
minatio. nis particulæ pro differentia appositæ sunt. In substantia quidē
 carnosa, siue in carnosis, & mollibus particulis, ad discriminē cor-
 ruptionis ossium, quæ propriè vlcus non est, sed caries, & cor-
 ruptela, quæ tereḍon Græcè dicitur. Quæ autem subnectun-
 tur, ad differentiam vulnerum addita sunt. Vulnus enim recēs,
 & cruentum, quatenus saltē vulnus est, & quantum nominis ra-
 tio indicat, solutio est continui, simplex, ac per se consistēs, hoc
 est, nulli alteri affectui, aut præcedēti, aut sequenti coniuncta,
 qui eius curationem, nempe agglutinationem (quam solum de-

Vlceris no- siderat) remoretur, & impediat. Vlceris verò nomine, commu-
mine quid niter in chirurgia eam vnionis, seu cōtinui dissolutionē statim
intelligatur inaudimus, quæ non simplex sit, vt vulnus: sed quæ alijs dispo-
in chirur- sitionibus, eius curationem impredientibus, seorsumque, ac per
gia. se nonnunquàm consistere valentibus, complexa semper atque
 annexa reperitur, vt in differentiarum enumeratione clarius
 innotesceat. Quò fit, vt vulnus generaliter, si ad vlcus conferatur,

Vlcus quo à simplicis, ac minimè compositi affectus rationem obtineat: vl-
vulnere dif- cus verò (quo de hīc agimus) compositus semper affectus intel-
ferat. ligatur. Non imus tamen inficias, quin & vulnera proprijs quī-
 busdam dispositionibus, quæ necessariò illis accidunt, compli-
 cari possint: vt verbi gratia, magnitudini & paruitati, rectitudi-
 ni & obliquitati, æqualitati & inæqualitati, profunditati & re-
 sidentię in summo, & ita de alijs, quæ vulnerum discrimina, si-
 ue differentias constituunt: generalem tamen vulnerum, quate-
 nus vulnera sunt, curationem parum aut nihil euariant, vt suprà
 in tractatu de vulneribus diximus. Iraque vulnus magnum &

Vulneris at paruum, rectum & obliquum, æquale & inæquale, in summo
que vlcis residens & in profundo penetrans, longum item & breue, re-
propria dif- cens & inueteratum, veræ ac propriæ sunt simplicis soliusque
ferentia. vulneris, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, differentia: si-
 cuti etiam & vlceris, quod solum consistit, vt in sequenti capite
 dicemus. Porro in definitione vlceris ex Auicennæ superius ad-
 ducta, per saniem, & putredinem, sordities, squammæ, & crustæ
 (quas Græci escharas vocant) etiam inaudiuatur, quæ in ipsis
 vlceri-

ulceribus contingere possunt. Itaque Auicennas, & qui eum sequuti sunt, vulnus & plagam vocant, ubi nondum est pus: vlcus verò, ubi iam pus adest. In qua sententia fuisse quoque videtur Cor. Celsus, Latinus ferè. Hippocrates, libro quinto suæ medicinæ, ubi recentem, & cruentam adhuc plagam, vulnus appellat: vlcus verò, cum iam vetustas occupauit, siue extrinsecus qui dem per vulnera inciderit, siue intrinsecus corrupta aliqua corporum parte nascatur. Quid autem sit sanies, quid pus, quid foras, postea diceretur.

De differentijs vlcum, & à quibus sumantur.

CAPVT II.

Vlcum differentiæ sumuntur quibusdam à tribus potissimum, nempe à causis ea excitantibus, mèbris, & accidētibus, seu dispositionibus cum eis complicatis. Alij verò breuitati studentes, eas à duobus duntaxat desumunt, vt potè à causis, & symptomatis, atque etiā affectibus ipsis, quibus cōplicantur: ea quidē, quæ à membris siue laborantibus particulis sumuntur discrimina, omnino prætereuntes: quippe quæ ad particularem, non autem ad vniuersalem de vlceribus tractationem pertineant. Adde, quòd & in tractatu de fistula, id est, sinu, qui occalloit, de ijs obiter ageretur. Dicemus tamen hîc & de ijs nonnihil. Differentiæ, quæ à causis sumuntur, saltem communiore, & magis propriæ, hæc communiter solent à chirurgis assignari: vlcus virulentum, & corrosiuum, siue comedens: vlcus sordidum, rhyparon Græci vocant: & putridum, siue putrefactum, quod Græci serpe dona appellant: vlcus cauernosum, & profundum, vlcus fistulosum, vlcus cæcerosum. Differentiæ autem, quæ ab accidentibus, siue symptomatis, & affectibus, quibus ipsa vlcera complicantur, ferè communes, atque æquiuaçæ sunt, & ipsis vulneribus, primò tamen, & magis propriè (vt recentibus placet chirurgis) de vlceribus, quàm de vulneribus dicuntur. Hæ autem sunt: vlcus cum intèperie, quod Græcè disceratum vocant: vlcus crucians, siue dolorosum: vlcus cum tumore aliquo præter naturam, quod apostematosum nominant: vlcus contusum, vlcus supercrescens, cum carne molli, & superflua, *ὑπερσάρκῃ* Græci appellant, Auicennæ interpreti carnem additam super vulnera: vlcus durum simul & tenebrosum: vlcus cancerosum, & gangrenosum, vlcus cauum, vlcus cariolum, id est, cum osse corrupto: vlcus cum varicibus, vlcus ca-

*Vlcum differe-
rentia vnde
sumantur.*

*Vlcum dif-
ferentia à
causis.*

*Differentia
vlcum ab af-
fectibus qui-
bus compli-
cantur.*

coëthes,

*Affectus cū
ulcere com-
plicati.*

*Vlceris com-
plexus cum
symptomate*

*Vlceris com-
plexus cum
sua causa,
& morbo.*

*Vera ac pro-
pria vlcerū
differentia,
unde suman-
tur.*

*Vlcerum dif-
ferētia ma-
ximē pro-
pria.
Figura.
Quantitas.
Dimensio.*

coēthes, id est, malignum, & ægrè sanabile, atque id genus alia. Cæterum multæ ex suprà commemoratis differentijs, veræ vlc-
cum differentia non censentur Galeno, sed aliorum affectuū
cum ulcere cōplexiones, cuiusmodi sunt vlcus cancerosum, gan-
granosum, supererescens, putrefactū, cauum, & cum tumore ali-
quo, vt vlcus phlegmonodes, erysipelodes. Putredo nanque,
gāgrana, phlegmone, erysipelas, cancer, & reliqua id genus, ex
morborum sunt genere: nempe affectus præter naturam, actio-
nem vitiantes, qui seorsum ac per se consistere possunt. Quod
enim consistere seorsum, & per se potest, id nullius vnquam (in-
quit Galenus) alterius fuerit differentia. Esto igitur hoc tibi ve-
luti præceptio, ac regula, qua discernere liceat, differentiæ ali-
cuius affectus aliquid sit, an alterius affectus complexum. Sed
& alio rursus modo vlcus cruciās siue dolorosum, & vlcus sor-
didum, ceu quædam vlcus differentia dicuntur, cum tamen
veræ aut propriæ differentia non sint, sed complexus potius
symptomatis cum ulcere. Dolor nanque & sordes ex sympto-
matem sunt genere. Pari modo & cum dicitur cæochymon
vlcus, id est, vitioso succo obsessum, aut fluxione vexatū, quod
rheumaticum Græcè Galeno dicitur, aut arrosus, id est, quod
exeditur, causa cum affectu copulatur. Talia igitur multa pro
differentijs vlcum chirurgis & medicis vulgarijs vsurpantur,
quæ reuerà differentia non sunt, saltem apud Galenum, sed al-
terius dispositionis complicationes seu affectus compositi. Sim-
plicis igitur soliusque vlcus differentia veræ ac propriæ, ab ipsa
vlcus natura sumuntur. Vlcus autem simplex hîc cum Galeno
appellamus, quod solum consistit, id est, cui nec vllus affectus
alius, nec symptoma vllum coniungitur. Simplex igitur nō erit,
si quæ exulcerata est particula, vel fluxione vexetur, vel malo
succo vitiosa sit, vel omninò extra naturalem temperiem fuerit, 30
vel ylla cauitas adsit, vel si aliqua cutis amissio contigerit. Ita-
que differentia, quæ ab ipsa vlcus natura sumuntur, vel maximè
propriæ sunt, & à substantia rei acceptæ, vel extrinsecus accedē-
tes. A substantia rei capiuntur, quæ à figura, & à diuisionis ma-
gnitudine seu quātitate, ac dimensione, siue spaciō ducuntur. A
figura, vt vlcus rectū, vlcus obliquum, vlcus circulare siue rotū-
dum, vlcus retortū, vlcus vncū. A diuisionis magnitudine, siue
quātitate, vt vlcus magnū, vlcus parvū. Ex dimensionibus siue
spacijs, vt vlcus longū, vlcus breue, vlcus latū, vlcus angustū, vl-
cus sublime, siue superficiale, id est, in summo residēs, vlcus pro- 40
fundum

fundū, vlcus æquale, vlcus inæquale. Extrinsecus verò accedē- *Vlcerum dif-*
 res vlcenū differētiæ sumuntur à tēpore, & à generatōis ra- *ferentiæ ex-*
 tione: itē ex eo quod totū vlcus, parsūe vlcenī conspēctū fugit, *trinfecus ac-*
 vel conspiciendū se præbet, hoc est, à situ in parte affecta. A tē- *cedentes.*
 pore quidē, vt vlcus recens, vlcus inueteratū. Ex generatōis ra- *Tempus.*
 tione, vt vlcus incisum, vlcus diruptum, vlcus partim incisum, *Mod' & ra-*
 partim diruptū. A situ in parte affecta, vt vlcus in conspēctū *tio genera-*
 siue euidenter apparens, vlcus intus conditum, siue nō apparēs, *tions.*
 idq̃e in toto, vel in parte: item vlcus in principio musculi, vlcus *Situs.*
 10 in fine musculi, vlcus in medio musculi. Cæterū quæ ex loco *Locus affe-*
 affecto sumūtur vlcenū differētiæ (si tamē differētiæ censē- *ctus.*
 dæ sunt) nō vtiq̃e, vt Galenus inquit, à propria ipsorū natura,
 vt præcedentes, desumuntur. Loci autē in quibus cōsistunt vlce-
 ra, sūt partes similes, & organicæ. Igitur si à locis, in quibus
 est vlcus, differētiās censēas, hoc modo fiet diuisio vlcenī à loco
 affecto: vlcus in parte simili, vlcus in parte organica, siue in-
 strumentaria. Rursus vlcenī differētiās à parte simili affecta,
 hoc pacto diuides: vlcus in vena, vlcus in arteria, vlcus in cute,
 vlcus in musculo. Censetur enim musculus, & pars similis, sal-
 tem ad sensum. Differētiæ verò à parte organica affecta, eiu-
 20 modi sūt, vlcus auris, vlcus in faucibus, vlcus in aspera arteria,
 vlcus pulmonis, vlcus pectoris, vlcus in pene, vlcus in sede, & sic
 discurrendo per singulas corporis partes, quas instrumentarias
 vocamus. Atque hæc completa, & absoluta est simplicis solui-
 quæ vlcenī, & cui nullus alius adiūctus sit affectus, in suas diffe-
 rentias diuisio, quæ à propria ipsius natura sumitur. Quod si af-
 fectus aliquis, seu dispositio, quæ seorūm (vt diximus) & per se
 consistere possit, vt phlegmone, gangrænâ, putredo, vlcenī ad-
 iungatur, ab eo (vt suprà diximus) sumi non possunt vlcenī
 30 differētiæ, saltem verè & propriè dictæ. Verū enim uerò
 quoniam ab ipso etiam Galeno locis sexcentis dictum est,
 non oportere de nominibus contendere, si quis putrescens vl-
 cus, & quod exeditur, & quod gangrænâ, & quod erysipelate
 affligitur, & cancerosum, & sinuosum, & cariosum, & cacoë-
 thes, & dolens & indolens, arque id genus alia, vlcenū diffe-
 rentias nominauerit, non erit cum eo contendendum, modò
 rectā illis curationē adhibeat. Vocabunturq̃e vlcenū differē-
 tiæ, sumptæ ab eo cum quo complicantur. Nempe differētiæ
 à complexu cum morbo, differētiæ à complexu cum sympto-
 40 mātē, differētiæ à complexu cum sua causâ, & si quæ sint alię.
 De

*Non esse de
 nominib' cō-
 tendendum.*

*Vlcerū cau-
sa antecede-
tes.*

*Cause vlc-
erum continē-
tes.*

*Tres modi
agrē sanabi-
lium vlcenū.*

Vlcerum causas in vniuersum geminas tantum chi-
rurgorum posteritas statuit, nempe antecedentes seu
præcedentes, quæ Græcis προηγμένας dicuntur: &
continentes siue coniunctas, quæ συνεκτιγγῆς, Græcè
appellantur. Procatarticas nanque, hoc est prægressas & cui-
dentes seu primitiuas illis minimè tribuunt. Quippe quæ dum
carnem incidunt, disrumpunt, aut laniant, aut quouis alio mo-
do continui solutionem in ea efficiunt, nequaquā primo statim
occursum saniem aut pus, aut sorditiæ (quæ necessario vlcera co-
mitari arbitrantur) creare, aut excitare possunt. Quinquam cō-
sequio quodam id præstare valeant, nempe corporeas, atq; an-
tecedentes causas commouendo. Itaque vlcenum anteceden-
tes causæ sunt, cacochymia, id est, succorū vitiū, cum scilicet so-
la qualitate peccant humores, non etiā quantitate, atque eorū-
dem prauorū succorum, siue humorum in corpore existentium
nimis exuperans copia, qui corporis ipsius particulas arrodere,
& tādē corrūpere possint. Porro eiusmodi succorū prauitas,
aut ex deprauata victus ratione generatur, aut totius corporis,
vel alicuius notæ membri, vt hepatis, aut lienis, vitio cōtingit,
vti plerisque locis Galenus nobis testatum reliquit. Causæ ve-
rò continentes, siue coniunctæ vlcenum dicuntur intemperies
illæ, quas malitias cōplexionum vocāt, in vulneratas particulas
ex causis προηγμένας siue antecedētibz modò dictis, vel etiā
ex ipsis vulneribus, aut abscessibus, alijs siue præter naturā tumo-
ribz (sed malignis præsertim) ruptis & apertis, excitatæ. Quæ-
admodū enim ex herpete, tum miliari, qui Græcis cenchrias di-
citur: tum etiam esthiomeno, id est, exedente, qui ex bile fit cras-
sior, & acrior, vlcus corrosiuum, siue erodens, generatur: ita
ex anthrace, seu carbunculo præsertim venenoso (quod vlcus
est escharosum) rhyparum, id est, sordidum, & ex abscessibus
profundum, & concauum, siue cauernosum procreatur. Itaque
tres hi agrē sanabilium, rebelliumque vlcenum modi videntur.
Primus, qui ex intemperie subiectæ carnis provenit. Secun-
dus, qui ex vitio confluentis fit sanguinis. Et tertius, qui ex
mensura, seu copia, vel quantitate confluentis nascitur, vt libro
quarto methodi medendi Galen. annotauit. Qui & aliter ibi-
dem diuisionem posse fieri tradit: nempe agrē sanabilium, re-
belliumque vlcenum, alia propter vlcenatæ carnis intemperiem,
alia ob confluentem humorem, talia fieri. Tum intemperiem
rursus

rursus ipsam bifariam diduci, cum aliâs in qualitate sola nature modum egressa, subdita caro sit, aliâs etiam cû accessione quopiam tumore. Iam ipsum confluxum bipartitò etiam scindi: nempe in confluentis succi, tum qualitatem, tum quantitatem. Quatuor igitur erunt in vniuersum contumacium, & ægrè sanabilium vlcerum modi: nempe sola subiectæ carnis intemperies, quam & dyscrasiam vocant: intemperies cum accessorio tumore, humor influens, aut vitiosus, aut multus. Humor nanque qui copiosior in partem vlcere laborantem influit (ramersi vitiosus non sit) sanationem vlceris (quòd in eo excrementa creet) moratur, atque in longum tempus protrahit. Cæterum quintum modum adieciſſe videtur Galen. in commentario huius aphorismi Hippocratis: Vlcera quæcunq; annua sunt, &c. nempe passionem ossis corrupti in loco vlcerato. Vbi enim caro, quæ ossi superiacet patienti, adhibitis (vt oportebat) idoneis medicamentis exiccata, contraxerit cicatricem, statim quidem integra sanitas restituta videtur. Rursus verò paulatim aliqua influente sanie ex osse corrupto, in parte penitiorè iterum aduenit inflammatio, & puris generatio consequitur, à quo cicatrix eroditur, caro verò exulceratur. Subdit autem Gale. loco nuper ex 4. lib. Therap. methodi citato, interim dictorum affectuum siue dispositionum, aut aliquos, aut etiam pariter omnes misceri, atque ita multas, ac diuersas vlcerum differentias iam supra commemoratas enasci. Porro tradenda est medendi methodus, non omnium simul, sed cuiusque seorsum, quod in sequentibus faciemus, à simplicioribus quidem exordium sumentes, vt eorum curatione tradita, compositiorum sanationis methodus facilius, ac melius intelligatur. Cæterum quoniam passim cum de vlceribus tractamus, voces hæc, sanies, pus, virus, sordes, & id genus alia, nobis occurrunt, non abs re factum putabimus, si hoc loco quid apud chirurgos, & medicos significent, quoque inter se coueniant, & dissideant, paucis aperiamus. Sanies proprie Latinis is tenuis humor est, qui Græcis *ἰχθὺρ* dicitur, qualis exit ex vulnere nec recenti, nec iam sanescente, sed inter vtrumq; tempus. Quibusdā ichor sanguinis sanies interpretatur. Saniei duæ sunt species apud Celsum, Græcis distinctæ nominibus, quarum vna *ἰχθὺρ*, altera *μελικερία* nominatur. Ichor tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximeq; vbi peruo læso inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida, mellisq; albo sublimilis fertur. Hæc quoque ex malis vlceribus, vbi perui

Hippocra.

Sanies quid,
Saniei species due Cels.
In aliquibus exemplaribus nō ἰχθὺρ legitur, sed ὕδρωις.
Meliceria

exustione sanguinis, qui vbi ex toto exustus fuerit, residuum
 eius sit pus, quemadmodum ex lignorum exustione cinis, vt Ga-
 lenus testatur reliquit in commentario huius aphorismi Hip-
 pocr. Dum pus conicitur, &c. Ex ijs igitur manifestum euadit,
 quid sit pus, quomodo generetur, quæ sit eius causa efficiens,
 & materia. Nunc quid sit virus, seu virulentia, & fordes, apud
 chirurgos, paucis aperiamus. Virus ergo illis, seu virulentia
 est superfluitas subtilis, ex abundantia humorum aquosorum
 generata. Quæ (inquit Guido) duplex est, calida, & frigida,
 10 terosa, & rubicunda. Sordes autem eadem, est superfluitas que-
 dam crassior, ex humoribus crassiorem substantiam habenti-
 bus procreata, quæ quidem est triplex: quædam enim (inquit)
 est spissa, inæqualis, coagulata, & alba: quædam verò nigra,
 & alia velut fex, cinericea. Porro quod illi virus appellant, Ga-
 leno Græcè *ἰχθῆρ*, Latinis sanies, dicitur. Est autem sanies, siue
 virus (vt verbo vno dicatur) tenuius illud excrementum in vlcere-
 ribus, quod ea humida reddunt: sicuti fordes crassum, quod vlcus
 rhyparon, id est, sordidum efficit. Quemadmodum enim (vt
 Galenus inquit) omnem qualitatis alimentum mutationem, alterū
 20 crassius, alterū tenuius excrementū sequitur, ita & in vlceribus
 præsertim cauis, duplex excrementum provenire solet: nempe
 tenuius, quod Latine sanies, Græcè *ἰχθῆρ* appellatur, & crassius,
 quod fordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vlcus hu-
 midum redditur, ex crasso sordidum. Quò fit, vt vlcus ipsum
 duplicibus egeat medicamentis, utique vt humidum est, sic
 cautibus: vt sordidum, ijs quæ expurgant. Sed hæc alterius
 sunt contemplationis. Cæterum mediam quodammodò
 substantiam sortitur pus, inter tenuem, & crassam, si saltem
 laudabile atque optimum est. Optimum autem est (vt scribit
 30 Hippocrates) si album, leue, æquale, ac quàm minimè forti-
 dum sit. At illud malum est Celsò, quod multum tenue, di-
 lutumque apparet, magisque si ab initio tale est: itemque si
 colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est.
 Præter hæc, si male olet. Porro genus quoddam puris est
 apud eundem Cornelium Celsum, Græca dictione *ῥαισῶδες*
 appellatum, quod in magnis (inquit) vlceribus sanescentibus
 apparet, tenue, subalbidum, quasi vnctum, colore, atque pin-
 gutudine oleo albo non dissimile. Sanies autem mala est, mul-
 ta, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut
 40 mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei cutem erodit.

Virus.

Sordes.

Sanies, siue
virus quid.
Lib. 3. meth.Pus medium
est inter sa-
niem, & sor-
dem.Bonum, ac ma-
li puris no-
te.Pus *ῥαισῶ-
δες*.Male sanies
notæ.

Melior non multa, modicè crassa, subrubicunda, aut subalbida. Itaque spes sanationis in his vlceribus maior est, ex quibus melioris generis quæque prædictorum proueniunt. Sicuti, & eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Eamobrem, bonitatis atque maliciæ notæ, in horum singulis diligenter à chirurgo perpendendæ sunt, vt & deprehendere, & pronunciare possit, quæ vlcera insanabilia sint, quæve facilem, aut difficilem curationem habeant. Quæ res non parui sanè est momenti, vt chirurgus ipse, & se alijs admirabilem præstet, & calumniam deuitet. Atque hæc de pure, sanie, ac sorde dicta sufficiant. Nunc autem dicendorum ordo postulat, vt vlcusum signa, ac etiam iudicia subiiciamus.

Nota siue signa, quibus vlcusum differentia dignoscuntur, ex eorum definitionibus petita, CAP. IIII.

Vlcus cuiusque suæ sunt propriæ notæ, quibus vnum ab altero distinguitur. Hæ autem ex singulorum definitionibus petendæ sunt. Quocirca præcipuarum supra memoratarum differentiarum breuissimas definitiones hic obiter recensere operæ præciû esse duximus. Quod dum facimus: non tam verba, quàm rem ipsam lectorem spectare volumus. Maluimus enim communibus, & ab omnibus chirurgiæ professoribus iam dudum receptis vti definitionibus, licet aliquando rudibus, plebeis, & non ita elegantibus, quàm rei per se satis obscuræ, verborum lenocinijs, & tersiore stilo tenebras offundere; crassam tamen illam, & supinam barbariem, quantû nobis licuit, ybiq; deuitalimus. Ergo vt semel dicamus, vlcus virulentum est, in quo virus, hoc est tenue quoddam, ac liquidum excrementum, quod saniem propriè Latinis appellari diximus, citra erosionem abundat. Alio nomine saniosum dicitur. Vlcus, quod sua malignitate siue malitia, parti quam iam occupauit, erodendo, atque interdum escharam (quam acris mordaxq; succus ad ipsum confluens excitat) gignendo, maius atq; amplius indies efficitur, corrosium, siue arrodens nominatur. Quod si eius malitia adeo crescat, vt non modò vlceras atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat, depopuleturque, vlcus iam depascens appellabitur. Græci omnes medici vniuersim hunc affectum, Galeno etiam teste, nominant, propterea quod pergere pascendo id vitium ab ægris particulis ad eas, quæ integræ sint, soleat, atque harum semper aliquid ægris adiungere.

Vlcus virulentum

Vlcus corrosium, siue arrodens.

Vlcus depascens.

Nomen.

- adiungere. Cuius species est phagedæna, ambulatorium vlcus ap- *Phagedæna.*
pellant, quod huc, atque illuc serpendo, cutim, ac subiectam car-
nem, sed extimam tantum ac superficiale, depascitur, ac ro-
dit. Nunquam enim eiusmodi vlcus in penitiora penetrat: quò
fit, vt vlcus in summo residens, minimè autem profundum, dici
merito debeat. Vlcus sordidum est Galeno, quod crassiore il- *Vlcus sordi-*
lo ac viscoso scatet recremento, quod sordem appellauimus, *dum.*
Græci rhyparon vocant. Recetiores verò aliter definiunt, nem-
pe quòd crustas aliquas habet crassas, seu (vt loquuntur) grossas, *Lanfrancus*
aut carnem aliquam mollem, crassam, & superfluam. Vlcus pui- *sic diffinit.*
tre siue putridum dicitur, ex quo vapor aliquis graueolens, seu (vt *Vlcus putri-*
aiunt) fumus quidam foetidus, & cadauerosus expirat, atque at- *dum.*
tollitur, persimilis illis qui à putrescentibus ac corruptis iam car-
nibus effertur, habetque semper annexam sibi sorditiem, atque
extraneam caliditatem cum humiditate superflua, & plerumque
febrem. Hoc à sordido differre volunt sola malitiæ, ac fraudu-
lentia intentione. Cauernosum vlcus appellant cuius orificiū
strictum est, atque angustum: profunditas verò latior, & sensum
effugiens, siue occulta, multosque anfractus habet, & cuniculos,
siue vias hinc inde discurrentes, citra tamen callositatem & du- *Vlcus cuni-*
ritiem. Sunt qui & apposito nomine cuniculosum ipsum appel- *culosum.*
lāt. Fistulosum vlcus à nuper descripto cuniculo seu cauernoso
vlcere non differt, nisi quòd meatus illos anfractuosos & sinuo-
sos, callosos habet, & duros. Vlcus cancerosum, est visu hor-
rendum, foetidum, labra habens dura, crassa, tumida, atque inuer-
sa: colore inter rubrum, & nigrum medio, vt pote fusco, aut liui-
do: adhæc circa locum vlceratam venæ quædam liuidæ appa-
rent, exaltatæ, & turgidæ, crasso, & nigriore sanguine plenæ.
Vlcus discraton, siue vt vulgò dicunt, dyscrasiatum, est in quo
quædam *δυσκρασία*, id est, intemperies, seu mala quædam quali- *Vlcus fistu-*
tas præter naturam dominatur, vt caliditas immoderata, vel fri- *sum.*
giditas aut humiditas, vel siccitas, aut plures ex illis simul. No-
minatur autè propriè nobis vlcus cū intemperie. Vlcus crucians
siue dolorosum appellatur, quod laborantem atrociter mole-
stat, seu (vt ait Guido à Cauliaco) in quo sensibilitas rei con-
trariæ reperitur, Græcè *δυσ-οδυνησών* dici potest. Vlcus
rheumaticum Galeno dicitur, quod aliundè fluentes humo-
res verant faneferre. Verminosum vlcus appellatur, quod ver-
mibus scatet, *σκολεκώδες* à Græcis dicitur: horum autem ver-
minum opifex est putredo. Vlcera cacoethe Galeno, & Græ- *Vlcus can-*
cis *cosum.*

*Varicosum
vltus.*

*Vltus apofte-
matofum.*

cis omnibus medicis dicuntur, quæ omnibus ritè decenterque factis, sanari tamen non possunt, quòd scilicet in particula laborante siue vlcerata, malignitas quædam adsit cæca, & nobis occulta, ea sanari prohibens. Nos eiusmodi vlcera, maligna, contumacia, rebelliaue, atque ægrè sanabilia dicimus. Varicosum vltus nominatur, quãdo in partibus eo superioribus venæ quædam emittentes, ac turgidæ, crasso sanguine, aut vitioso aliquo succo appletæ apparent (varices vocant) quæ ipsi vlceri fluxionē suppeditant, atque ita sanescere ipsum verant. Apoftematofum vltus nuncupant, in quo tumor aliquis præter naturam est, ab humore quopiam procreatus, vt phlegmone, aut erysipelas. Cetera satis ex præcedentibus innotescunt.

Vlcerum prognostica, siue iudicia.

C A P. V.

*Aph. 45. li. 6.
Vlcera an-
nua, & diu-
turna.*

Vlcera (inquit Hippocrates) quæcunque annua sunt, aut etiam diuturniora, os abscedere est necessarium, & cicatrices cauias fieri. Quæcunque vlcera (vt Galenus ait in commentario huius aphorismi) longo tempore manent, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, rursus resoluta (nihil videlicet medicis in curatione delinquentibus) cacoethiam, hoc est, malignitatem quandã ostendunt, difficulterque ad sanitatem perducuntur. Id autem accidit, vel propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem in membro ex humoribus in id confluentibus, processu temporis contractam, vel ob aliquem vitiatum ac corruptum inibi osis affectum. Vltus omne (vt scribit Auicennas) quod, posteaquam carne impletum est, & cicatrix illi induci debet, subito renouatur, periculum est, ne in fistulam degeneret. Eidem mala vlcera iudicantur dura, & quæ ad virorem aut nigriciem vergunt. Eiusmodi enim color natui particulæ vlcerate caloris extinctionem insinuat. Vlcera (vt idem Arabs ait) frigida, albedine & mollitie dignoscuntur, & præsertim si calidis iuuentur. Calida verò ad ruborem declinant, & frigidis gaudent, sed & tactu etiam discernuntur. Itaque horum utraque agnosces, partim colore, partim tactu, partim (vt Galenus inquit) laborantis sensu. Quippe aliàs visionem sentire se fatentur, aliàs manifestum frigus, in particula: gaudentque vel frigidis medicamentis, vel calidis, & alijs quidem rubor leuis insidet, alijs color magis albicat. Siccis quoque atque humidis vlceribus suæ sunt propriæ notæ, quæ tactu maxime deprehenduntur. Hic

nanque

*Fen. 4. ca. I.
Vltus se re-
nouans.
Vlcera dura
viridia, aut
nigra.
Vlcera frigi-
da.
Calida vltu-
ra.*

Lib. 4. Ther.

nanque sensus sicca atque humida, & quæ eas qualitates conse-
 quuntur, duritiem scilicet & molliem, asperitatem & lenita-
 tem, experitur. Adhæc si maligna vlcera totius corporis colore
 repræsentent, ut verbi causa, candidum, purpureum, aut fuscum,
 vel citrinum, vitium aliquod effatu dignum hepatis, atque insi-
 gnem sanguini, ab ipso iecinore procreato, corruptelam inesse
 significatur. Aliud. Vlcera, quæ alijs morbis succedunt, ægrè
 sanabilia sunt. Aliud. Vlcera circumglabra praua sunt, hoc
 est, cum videris pilos à circumiacentibus vlceri locis defluere,
 10 vel cutem squammulas è summa parte dimittere, scito, ac iudi-
 cato tale vlcus prauum esse. Prauos nanque humores, seu mali-
 gnos succos ad partem vlceratam tunc confluere simile veri est,
 qui vehementer vlcus erodunt. Itaque eiusmodi maligni succi,
 neque radículas pilorum omnes abolere queunt, neque exulce-
 ratum locum ad cicatricem perducunt, ac solidescere patiuntur.
 Cum autem pili qui prius deciderant, in ijs quæ circiter vlcus
 sunt sedibus renascuntur, bono indicio esse solent. Aliud. Vl-
 cus (ut primo libro prædictionum scribit Hippocrates) siue an-
 te exitit, siue in ipso morbo natus est, diligenter obseruari de-
 20 bet. Nam si moriturus æger est, aridum & luens, aut pallidum
 ante mortem apparet. Aliud. Vlcera, in quibus post longam
 saniei, seu virulentæ emissionem pus laudabile apparere inci-
 pit, bonum nobis portendunt. Siquidem & naturæ robur, & ma-
 teriæ obedientia notatur. Quæ autem sunt puris optimi ac lau-
 dabilis notæ, in præcedentibus dictum est. Aliud. Vlcera, quæ
 in extremitatibus musculorum dorfi, vel triabiarum, aut bra-
 chiorum sunt, periculo non vacant Auicennæ. Valde etiã pe-
 riculosa eidem censentur, quæ interna membra occupant, losa
 aut ad ea vsque perueniunt. Aliud. Quibus vlcenibus ante
 30 absolutam deterfionem, sarcatica, id est, carnem producen-
 tia medicamenta administrantur, mala, ac superflua caro in
 illis generatur. Quæcunque verò probè & opportunè expur-
 gata semper ad ficius promouentur, his caro (inquit Hippo-
 crates) magna ex parte non supercrescit, nisi si contusa sunt.
 Aliud. Vlcera in orbem circumducta, hoc est, rotunda, pes-
 sima (ut de vulncribus dictum est) esse solent, ac tardè magno-
 que negotio ad cicatricem perducuntur. Proinde pueros sub-
 indè in perniciem trahunt. Itaque in eis consilium chirurgorum
 est, ut cauterio figura illa orbicularis aboleatur, & linearum mo-
 40 do (quantum saltem fieri poterit) in rectum diducantur.

*Vlcera to-
 tius corporis
 colorem re-
 præsentant
 Aph. 4. lib. 6.
 Vlcera circū
 glabra.*

*Vlcus ante
 morbum, vel
 in ipso mor-
 bo emascens.*

*Vlcera in
 quibus par-
 tibus pericu-
 losa.*

*Vide Hippo-
 crates apud Gale.
 lib. 4. Ther.*

*Vlcera rotū-
 da.*

*Artuum vl-
cera.*

Aliud. Artuum siue extremarum partium vlcera, vt pedū, aut manuum, sæpenumerò phlegmonas, aut alios eiusmodi præter naturam tumores in adenotis partibus, seu glandulis (quas Græci adenas vocant) accersunt, atque excitant, præsertim verò vbi corpus plethora laborat. Hæ enim partes, quoniam imbecillæ sunt, & raræ, facillè tentantur fluxionibus. Sic igitur fit, vt & propter vlcus, quod in manus, aut pedis digito sit, eiusmodi glandulæ in inguinibus, & alis, tum intumescant, tum phlegmone occupentur, cum defluentem ad vltimos artus sanguinem, aut alios quosuis humores, priores acceperint, & exceptos, ob eam quam ¹⁰ habent laxitatem, & raritatem retinuerint. Quinetiam in collo, & secus aures sæpenumerò glandulæ his quibus in collo, capite, vel aliqua vicina parte vlcus est narum, intumescunt. Nominant autem (inquit Galenus) ipsos adenas, cum sic intumuerint, bubones.

*Collis & ca-
pitis vlcera.*

Bubones.

*Si auxilia
profuerint,
aut nocue-
runt.*

Aliud. Cum medicamenta vlceribus adhibita conferunt, aut saltem nihil nocent, argumentum est ea ritè ac decèter administrata esse. Cum verò noxæ aliquid adferunt, & vlcus humidius reddunt aut siccius, calidius aut frigidius, indicium est, ea non esse præsentī morbo idonea. Eruntque magis desiccantia, aut humectantia, calidiora aut frigidiora, prout res po- ²⁰ stulabit, deinceps admonenda. Quòd si ex admotis vlcus etiam mollius redditur, adstrictoria statim erunt adijcienda. Cæterum si vlcus eroditur, & profundius efficitur, sedulo aduertendū est,

*Si vlcus ar-
rodatur.*

num id ex acrimie succorum vitio, & vlceris malignitate accidat, an ex facilitate medicamentorum (quæ admouentur) plusquam oportet detergentium. Hæc enim vlceratam particulam arrodendo, multam saniem procreant, & vlcus humidius reddunt. Quò fit, vt imperitos chirurgos atque improvidos sæpe- ³⁰ numerò falli contingat, qui dum putant vlceris cacoëthia, id est, malignitate, eiusmodi saniosam colluuiem, seu (vt ipsi loquuntur) virulentiam, atque superfluam humiditatem prouenire: quæ adhuc efficacius detergunt, properant admouere, atque ita profundius, & magis cauum vlcus, imo verò & calidius, ac etiam interdū phlegmonodes efficiunt. Hinc erosionis, ac mordicationis sensum laborantes persentiscunt. Sed hæc non minus ad curandi rationem pertinere videntur, quam ad signa prognostica, de quibus nunc agimus. Porro inter cætera quæ magis efficiunt vlceribus, ventus est (vt Guido à Cauliacò annotauit) meridionalis, atque aeris ambientis humiditas caliditati adiuncta. Hæc enim vlceribus putredinem inuehant: siquidem quæ putrescunt ⁴⁰

*Ventus meri-
dionalis offi-
cit vlcerib⁹.*

omnia,

omnia, ex calido & humido sic afficiuntur. Hinc fit (inquit) vt tibiarum vlcera Auinione, ægrius ac difficilius multo curentur quàm Parisijs. Contrà verò accidit in capitis vulneribus. Cæterum quemadmodum plurima vulnerū iudicia, vlceribus etiam communia sunt, ita & vlcerum, de quibus modò differimus, iudicia permulta vulneribus adaptari possunt. Quocirca quæ in iudicijs vulnerum dicta sunt, vlceribus conuenientia, huc reuocanda erunt.

De curatione vlcerum in vniuersum.

CAP. VI.

10

IN curatione vlcerum duo nobis spectanda proponuntur, nempe ipsius vlceris, quæ vlcus est, contemplatio, & vlceris cum sua causa, aut symptomate aliquo, aut alia quauis dispositione complicati, aut etiam hanc vel illam particulam occupantis consideratio. Omne enim vlcus (vt suprà diximus) aut solum est, ipsumque per se (hoc est, nullo alio affectu, vel cū eo simul inuadente, vel ipsum præcedente, aut sequente) aut cū alio quopiam vno, multisve consistit. Quorum alij non modo statim ab initio vlcus excitantur, sed etiam nunc maius efficiūt,

Duo spectanda in curatione vlcerum.

20 alij eius sine quo non, vt ad curandi opus, rationem obinent.

Cæterum vlcus omne, quæ vlcus est, vnam cōmunem habet curandi indicationem. Siquidem (vt Galenus ait) vlceris, quæ vlcus est, sanatio, mediocris siccatio est. Hæc autem indicatio cōmunis etiam est vulneribus curandis, quæ saltem vulnera sunt, id est, plagæ vulnerando acceptæ. Sed hoc discrimen habent, q̃ hæc minori, illa (q̃ humidiora sunt) maiori desiccatione indigent. Verum enimverò vlceris, quod cum alio affectu coniunctum est, cuius videlicet præcedere curationem oportet, eius curatio, vt vlceris solius non est: sed prior illius affectus, secunda vlceris.

Vlceris sanatio, mediocris siccatio est.

30 Nam siue phlegmone quæpiam, siue erysipelas, siue tumoris, qui cedema dicitur, siue nigritia, siue ecchymosis vlceratam carnem obsederit, primum molienda eius curatio est. Quod si valentior aliqua intemperies (quæ imbecillitatis affectus partis causa esse solet) exulceratæ carni adsit huic nimirum primo medendum erit. Vbi autem intemperiei affectum iam sanaueris, exulcerationis postea affectum sanabis. Ita quoque & varices, qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlcus sanemus. Cæterum nulla harum curationum (inquit Galenus) ipsius est vlceris, sed alterius cuiusquam

40 affectus, qui vlcus vel gignit, vel certe fouet. Porro duplex in

cuiusmo-

In tollendis eiusmodi cum vlcere complicatis dispositionibus consilium est
dispositioni ipsi Galeno lib. 4. meth. med. nempe vt vel eiusmodi affectus è
bus cũ vlce- corpore prorsus eximas, vel incommodum quod inferunt, vin-
re complica- cas. Verum hoc (inquit) vbi exiguus planè affectus est, fieri licet,
is, duplex cõ- vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius nõ poterit, quàm
silium esse. illi affectui remedium attuleris. Talium igitur vlcèrum quæ sic
Particul. in cum alijs affectibus complexa sunt, quatuor sunt particulares
curandis vlce- curandi intentiones. Prima vitæ rationem, sanandis eiusmodi
ribus scopi. vlcèribus accommodam, præscribit. Secunda materiã ante-
 cedentem, auertit & intercipit. Tertia symptomata siue ac-

De primo, &
secundo sco-
po.

Si succus qui
influit, nec co-
profus sit, nec
malignus.

cidentia, & dispositiones, quæ cum vlcèribus complicantur, cor-
 rigit, & summouet. Quarta correctis, & profligatis ijs dispo-
 sitionibus, quibus vlcera complicantur, ea more vulnerum con-
 cauorum sanare præcipit. Cæterum primam, & secundam
 intentionem assequimur, humores copia, aut praua qualitate no-
 xios, quibus laborantis corpus scatet, qui que in partem vlcèratã
 influunt, tum corrigendo, tum vacuando, & auertendo, fluxio-
 nemque ipsam intercipiendo. Porro auxilia quibus commodè
 succorum abundantiam, & vitium tollimus, corrigimus, atque
 auertimus, sunt, venæ sectio, purgatio, proba victus ratio, cau-
 terium, vomitio, & id genus alia. Fluxiones verò intercipimus
 ligaturis, perfusionibus, & epithematis: item vnguentis ex boio
 Armenia, atque alijs refrigerantibus, & adstringentibus, de qui-
 bus in sermone de tumoribus præter naturam, abunde dictum
 est. De ijs autem sic Gale. lib. 4. meth. med. vbi maligni succi, &
 exulcerantis curationem pertractat, ad verbum scribit: Acquè »
 verò & mali succi, qui ad exulceratam partem confluit, vt vlcè- »
 rans quidem est, sanatio eius hîc dicitur. Vt malignus succus est »
 aut copia redundans, in proprijs ipforum locis tractabitur. Cũ »
 ergo qui exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iu- 30
 sto, nec multo deterior sit, auerti hunc regerique conueniet, »
 adstrictis scilicet, refrigeratisque ijs particulis, quæ ante exul- »
 ceratam sunt. Inchoanda quoque deligatio est, à laborante ipsa »
 particula, deducendaque versus sanam, veluti in fracturis ossiũ »
 præcepit Hippocrates. Talis enim deligatura meatus adstrin- »
 git, per quos materia ad particulas vlcèratas influit. Sed & quæ »
 vlcèribus ipsis admouentur pharmaca, siccent valentius opor- »
 tet, quàm ea, quæ simplici admouentur vlcèri. Quod si fisti »
 compescique medicamentis influxus nequeat, causa eius inue- »
 fuganda est, atque hæc prius adimenda. Ac si quidem ob par- 40
 tis,

- «tis, quæ fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum me-
 «dendum est: fuerit autem vlcera quæque partis propria quæ-
 «dam curatio. Sin propter sanguinis copiam, vitiosumve succum,
 «vel corporis totius, vel alicuius suprapositarum partium, illa sci-
 «licet prius sunt corrigenda. At imbecillitas quidem partis,
 «propter quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab in-
 «temperie provenit, non tamen ab omni. Eoque fit, ut exulcera-
 «ta caro nonnunquam intemperata tantum sit, non autem im-
 «becilla, nonnunquam utrunque, & intemperata, & imbecilla.
 10 Quippe imbecillitatis affectus partis, valentior intemperies cau-
 sa est. Quomodo autem curari debeat illa dyscrasia, siue in-
 temperies, mox in sequentibus dicemus. Cæterum qua ratione,
 quibusve modis fluxiones, quæ vel à toto corpore, vel à mem-
 bro quopiam in particulam vlcere laborantem intrant, intercipe-
 re, atque auertere oporteat, supra in tractatu de tumoribus præ-
 ter naturam abundè dictum est. Quare ne eadem identidè ubi-
 que repetamus, ex eo loco, quæ ad rem præsentem attinent re-
 quirenda erunt. Tertia intentio, quæ symptomata, & disposi-
 tiones, quæ cum vlcere complicantur, corrigit, ac summouet:
 20 perficitur prout cuiusque symptomatis, & affectus cum vlcere
 complicati natura requirit, ac desiderat. Porro (si Galenum se-
 quimur) tradenda est medendi methodus, non omnium simul,
 sed cuiusque seorsum. Itaque Galenum ipsum imitantes, exor-
 dium sumamus ab intemperie, quæ cum vlcere complicatur,
 corrigenda, de qua ad hunc modum scribit libro de morbis me-
 thodo curandis quarto.

*Si fluxio si-
at ob partis
imbecillita-
tem.*

*Valentior in-
temperies cau-
sa est imbe-
cilitatis par-
tis.*

*Tertius sco-
pus.*

*Lib. 4. meth-
med.*

Vlcus dyscrati, id est, cum intemperie iuncti, curatio.

CAPVT VII.

- 30 **C**arnis intemperies, si squalens siccaque videtur, aqua
 temperata fouens humectansque corriges. Quoties
 autem eo remedio vteris, esto tibi perfusionis hume-
 ctationisq; meta, ut cum primum rubescit, attollitur-
 que particulæ moles, tum desinas. Quippe si ultra pertundas,
 quod attraxisti, id euocabis. Itaque nihil profeceris. Quin-
 etiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto,
 quam ut in sana carne præceptum est. Si vero humidior,
 quam pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio ineunda
 est; ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua
 40 verò nullatenus admoquenda. Imò si lauandum vlcus videtur,
 vinum,

*Si squalens
ac sicca intē-
peries cura-
tio.*

*Humidioris
intemperies
curatio.*

*Caloris &
frigoris na-
ta.*

*Curatio fit
per contra-
ria.*

*Caro rectè
se habet, si
propria ser-
uet tempera-
mentum.*

*Vlcus cru-
cians.*

vinum, aut posca, aut decoctum austeræ cuiusquæ herbæ præ-
parandum. Eodem modo & calidiorem quàm par est carnis ha-
bitum refrigerabis, & frigidiorē calefacies. Agnosces verò
(inquit) horum utrunque, partim colore, partim tactu, partim
laborantis sensu. Quippe aliàs vitionem sentire se fatetur, aliàs
manifestum frigus in particula: gaudentque vel frigidis medi-
camentis, vel calidis. Et alijs quidem rubor levis infidet, alijs
color magis albecat. Breuiter quæcunque partes vlceratæ per
intemperiem aliquam à naturali habitu recesserunt, eorum sa-
nationem per eas, quæ contraria viribus sunt, fieri omninò est
necesse, calidam utique intemperiem (vt dictum est) refrigeran-
do, siccam humectando, frigidam calfaciendo, humidam siccan-
do. Quòd si frigidior humidiorque locus sit, calfaciendo pa-
riter ac siccādo, & in alijs ad eundem modum, vincetem vide-
licet qualitatem, contraria semper oppugnans. Atque vbi intem-
periei affectum iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affe-
ctum sanabis. Non aliter planè nunc curata intemperie, quàm
si citra vlcus incidisset. Quo manifestum fit, non esse vlcus, sed
intemperiei propriam omnem eiusmodi curationem, quæ ta-
men vlcus ipsius sanationem omninò præcedere debet. Siqui-
dem fieri non potest, vt in vlcere vel carnis productio, vel si-
nus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio, rectè vn-
quàm cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat.
Hæc autem rectè se habuerit, si (quod reliquis etiam omnibus
est commune) proprium temperamentum tueatur. Ergo si exul-
cerata caro iusto, calidior, frigidiorve effecta fuerit, utique me-
delam exigit, quæ in tantum calfaciat, refrigeretve, in quantū
ipsa à naturali suo habitu recessit. Subiectæ nanque carnis affe-
ctus, causæ rationem obtinet ad id quod efficitur. Quippe ex
hac (vt Galenus inquit) & per hanc, tum quæ dissident, glutini-
nantur, tum quæ caua sunt, carne implentur. Itaque tempera-
tam esse subiectam carnem, ad vlcera tum glutinanda, tum car-
ne implenda prorsus oportet. Dolor quoque vnum est, ex sym-
ptomatis, quæ vlcetum curationem remorantur, & impediunt.
Quocirca si vehemens aliquis dolor vlceratæ parti incidat, pro-
tinus hic aut tollendus erit, aut saltem quoad licebit, demulcen-
dus. Dolor enim præsertim vehemens, vires prostermit, & flu-
xionem proritat: proinde & vlcus ipsius curationem prohibet.
Itaque tamen si quæ vlcetatis particulis ad doloris sedatio-
nem admoventur, vlceri aduersentur quoniam tamen ex dolo-
ris

ris vehementia plarumque imminet laboranti periculū, & propriam vlcis curationem moratur, neglecto ad tempus vlcere, dolori tanquā vrgentiōri primū, maximeque intendēdum est. In complicatis nanque affectibus, id ex quo primū maximeque homini imminet periculū, quōdque magis accelerat, & vrget, primū curari, atque auferri debet. Cāterū quibus auxilijs dolor mitigari, aut sedari possit, in duobus libris superiori bus copiose satis dictum est, diceturque iterū in antidotario.

In complicatis affectibus argentiōri semper primum succurrendum est.

De vlcere cum tumore particula.

CAP. VIII.

10

Cāterū ad eundem quoque modum, & paritū, que cum aliquo prāter naturam, tumore exulceratæ sunt, earum prius sanandus tumor est: fieri enim nō potest, vt vlcis tumore manente, ad sanitatem perducatur.

Quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco vlcato excitetur: quōd si id prohiberi non possit, remedijs dicatis curari debebit, vlcere tamē interim non neglecto. Quæ autem omnis prāter naturam tumoris curandi ratio sit, in prācedentibus fusissimē dictum est. Nunc

20 quantū eius rei coniunctum cum vlcere curatione est, obiter, ac compendiosē tractabitur. Compendiaria igitur obfessarum phlegmone partium vlcerararum curatio, per id genus præsidia obitur Galeno, quæ sanē vel affectum prorsus sum mouent: vel

*Lib. I.
Phlegmone si vlcis curatio.
Lib. 4. meth.*

si quid exiguum, quod suppuret reliquerint, alterum medicamentum acre, quod educere pus queat, requiruntur: vel si tenuis circūposita cutis sit, velis que celerius explicatum ægrum, sectio petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo, quod calfaciat humectetque, illinantur partes vlceratæ, quæ phlegmone infestantur, lenientis (vt Galenus ait) tractatio est,

30 nō medentis, & contra malū pugnantis. Id enim non ex prima ratione fit, hoc est, vt remediū affectus, sed vt symptomatis mitigatio. Si quidem ipsius phlegmones remedia (vt autor est Hippocrates) sicciorum sunt virium. Itaque si inflammatio vlcera aut etiam vulnera adhuc recentia obsideat, vñs est medicamentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcent. Ex liquidis igitur (inquit Paulus) laudatissimum est vinū, deinde posca. Si verò sordes quoque cum inflammatione occupent, multa diluta conuenit. Ex ijs autem medicamentis, quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem conferent inflammationi

*Si inflammatio vlcera exerceat.
Vinum.
Posca.*

40 bus dicata, quæ in tractatu de tumoribus prāter naturam descripta

Malum Punicum dulce.

scripta sunt, si oleosa, acriaque excipias: priuatim autem hoc proficit. Malum punicum dulce, vino incoctum tritumque illinitur. Mirabile nimirum, & (vt Paulus ait) multiplici vñ commendatum est remedium: facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum etiam ea, quæ toto corpore excruciant, oculorumque inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accesserit, ijs vtendum erit prædijs, quæ aduersus illa superius scripta sunt.

Vlceris contusi curatio.

CAP. IX.

10

*Vlcerum cum
coruſione facta,
ad ſup-
purationem
ducenda.*

*Cataplaſmata ſup-
puratoria.
Aqua calida.
Tetrapharmacum.
Hipp.*

CAlapi ex Hippocratis teſtimonio ſententia ſait, vlcera omnia, præter ea, quæ contuſa ſunt, ſiccari oportere. In ijs verò quæ cū contuſione facta ſunt, quàm celerrimè pus mouendū eſſe. Siquidem neceſſe eſt carnes ſic contuſas putreſcere, vt noua tandem caro gignatur. Pus autem ipſum ſiue carnis contuſæ ſuppuratione, cum aliqua putreſcentia fit. Porro quæ putreſcunt omnia, ex calido, & humido ſic afficiuntur. Proinde fit, vt ea quæ calefaciunt & humectant, omnibus his affectibus, quibus moueri pus expedit, ſemper admo- ueamus. Cataplaſmata igitur ex hordei farina, aqua, & oleo: ite 20 quæ ex pane, aqua, & oleo, cōponantur, cōueniunt. Præterea ſo- mentum multæ calidæ aquæ, & tetrapharmacum (ceu quæ cal- faciant, humectentq; & pus quàm celerrimè moueant) vlceri- bus contuſis rectè adhibentur. Sed præſtat ipſius Hippocratis verba ſubiicere. Quodcunque vlcus (inquit) cæſum percuſumve » acuto telo eſt diuiſum, medicamentum enſænum & ſiccās ali » quod, quod ſuppurare veteri, admittit. Sin caro aliquo telo tum » contuſa, tum cæſa ſit, huic ita medendum eſt, vt quàm celerrimè » ſuppuret. Nam & minus phlegmone vrgebitur, & neceſſe eſt » carnes, quæ contuſæ cæſæque ſint, putreſcitas, & in pus verſas 30 liquari, poſtea nouam carnem naſci. His itaque verbis apertè » nos docet Hippocrates vlcera quæ ſine cōtuſione accepta ſunt, quàm maximè ſiccare. His verò quæ cū contuſione facta ſunt, quàm primū pus mouere. Porro eorum quæ puri mouendo aptiſſima ſunt, materiam in ſermone de tumoribus præter na- turam, & in antidotario copioſam reperies. Sed & de ijs etiam ſuprà tractauimus, vbi de vulneribus contuſis meminimus.

*Carne in vlceribus ſupercrescente, quam Græci hyperſar-
cōſin nōminant tollenda.*

CAP. X.

40

Caro

Caro in vlceribus supra quam par est, excrefcens, medicamentis exiccantibus tollitur. E quorum sanè numero sunt diphryges (cuius tria sunt genera apud Dioscoridem) inpersum, aut cataplasinatis instar inducū, squamma aris, omniaque testacea combusta. Item echini, hoc est, erinacei vtrique tam terrestres quam marini, cum toto corpore concremati. Verū hęc non admodum eximie, sed modicè ac mediocriter duntaxat purgant, & supercrefcencia compescunt. Asiæ verò petra flos longè validius id muneris obit, atque hoc magis adhuc sori, chrysocolle, chalcitis, misy. Quæ si combusta fuerint, minus vellicant, ac rodunt. Item aris flos, qui chalcanthos Græcis vocatur. Cæterum ærugo his adhuc omnibus valentior est. Sales autē concremati carnes cū humore flaccidas consumunt, ac liquefaciunt. Sic etiam linamenta è panniculo discerpta, muria acriori imbura, & denuò resiccata atque imposita, mediocres carniū supercrefcencias liquefaciunt, atque exedūt. At maximas carniū excrefcencias adusque penitiora crustis obducunt. Faustini pastilli, tritici atque inpersi. Item medicamentum quod recipit calcis viuæ, id est, aqua non extingitæ, squammæ aris, & mannæ (quæ mica est thuris, concussu seu attritu elisa) pares modos, hoc est, partes æquales. Porro Faustini pastilli, id est, trochisci, Paulo Aeginetæ libro septimo ad hunc modum describuntur: Auripigmenti drachmæ duodecim, sandarachæ (quæ rubrum est auripigmentum, & à natura magis excoctum) drachmæ sex, calcis viuæ drachmæ octo, chartæ combustæ drachma: myrti baccarum succo vel decocto excepta in pastillos redigito. Sed de eiusmodi supercrefcentem carnem compescentibus, & absumentibus iterum in antidotario dicemus. Ad hanc autem intentionem in communi vŭ est vnguentum Aegyptiacum nominatū. Cæterum dum hęc caustica atque erodentia medicamenta admouentur, partes quæ in circuitu sunt, refrigerantia desiderant, ne scilicet in partem vlceratam ex rosione, calore, & dolore, humorum fluxio aduocetur. Deinde crustæ vlceribus inducæ resoluendæ crunt, & vlcus ad sanitatem perducendum.

*Diphryges.**Squama aris.**Echini.**Asy lapidis flos.**Sales concremati.**Medicamentū ad maximas hyper-sarcoses. Faustini pastilli.**Vnguentum Aegyptiac.**Vlcus cum duritie: & decoloratione labrorum curatio.*

CAPVT XL

Cum labra tantum vlcus decolorata durave plusculum fuerint, excidenda ea sunt (Galeno auctore) ad sanam vŭque

Excisio Gal

Scarificatio
Auic.

vsque carnem. Auicēnas autem decolorata eiusmodi, duraque vlcēris labra scarificanda esse pręcipit, & ab eis sanguinem, admotis etiam cucurbitulis, extrahendum. Sanguine autem, quod satis esse videbitur, educto, spongiam siccam, hoc est, nullo liquore madentem, ac postea etiam medicamenta quędam resiccantia superimponere iubet. Sed & de ijs ante Auicennā

Hippocra.

ad eundem ferē modum scripserat Hippocrates: qui certē nihil omninō eorum, quibus ad vlcērum curationem est opus, omisisse videtur. Hic enim non solum vlcērum (ipso etiam Galeno teste) quę citra alium affectum consistunt, sanandorum rationē inuenit (vt quę in siccando, vt suprà dictum est, consistat) sed etiam priuatim per species affectuum cuiusque. Siquidē vel liuidum, vel nigrum, vel rubrum conspicitur, scarificando, ac sanguinem emittendo. Mox spongiam statim sicciorē magis, quā humidiorē, hoc est, siccam potius quā humefactam, superimponendo. Posthęc verō etiam resiccantia remedia applicando. Ab his, si res postuler, rursus sanguinem auferendo. Ac mox iterum talia peragendo, donec parva omninō sanitas sit. Quod si labra vlcēris dura collofaque appareant, etiam ea excidendo. Cū verō amplius progressus huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendūne omne id sit, quod

Lib. 4. the.

pręter naturam visitur, an spatio potius curandum: proculque dubio est, ægri animum hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiori tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quiduis subire, dummodō citius sanentur, sunt parati. Ceterum excidere (vt postea Galenus ait) res est promptissima: maius verō quippiam atque artis egens medicamentis, sanare.

Varicum cum vlcere complicatarum curatio.

CAPVT XII.

30

Varicum superiacentium, hoc est, supra exulceratum locum existentium occasione, contumax ad sanandum sæpe vlcus redditur: quippe quod ex his humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur (vt suprà dictum est) prius sanare oportet, vt deinde mox vlcus sanemus. Igitur varices, qui cruribus & alibi quā in testiculis prouenire solent, hoc modo ex Hippocratis, atque Aëtij Antiocheni, & Pauli Aeginetę sententia curabis. Primō in cure, vasculo seu venę in fastigium tumefactę, hoc est, varici, adiacēte simplicem sectionem scalpello per longitudinem facito. Ita le-

Varicum curatio.

uiscer

40

inter tamen, vt venam sic in verticē elatam non diuidas, & scal-
pello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in cute
sectione, oras vulneris hamulis diducito, & membranulas, cul-
tro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blandē exco-
riato. Mox vena detecta nudatave, & à circumiacentibus cor-
poribus vndiquaque explicata, cam vossella aut obtuso hamo
attrahito, ac suspensam teneto. Deindē acum duplex linum, seu
lineum funiculū duplicem, trahentem subiycito, subtrēve trans-
mittito: liniq; habenulam amputato, sic vt duo funiculi efficiā-
tur. Tum venam dilatatam, non aliter quā in phlebotomia
fieri solet, scalpello per medium diuidito, ac sanguinis quantū
satis esse videbitur, detrahito. Deindē altero funiculo superio-
rem vasis partem constringito, crureque eleuato, sanguinem qui
in ipso apparebit, manū expressu euacuato. Quod vbi factum
fuerit, venam ab altera parte lino altero rursus deuincito. Par-
tem verō illam venę, quę inter duo vincula est, vel statim excin-
dito, vel manere finito, vsque dum putrefacta sua sponte cum
funiculis excidat. Peracto opere, sicca linamenta in plagam inse-
renda sunt, spleniumque cenceleo, id est, vino cui oleum adiectū
sit, madens superimponendum, ac deligandum est. Tum lina-
mentis, medicamento aliquo ad pus faciendum apto, imbutis,
curatio prosequenda erit, cetera quę reliquis vlceribus commu-
nia sunt peragendo. Sed interim quies ægro imperanda, seruatō
acclui membri decubitu: ne si decliue iaceat, humores ad ipsum
confluant. Pranso autem magis quā ieiuno & parū pleno,
potoque, item concalescēto, & (vt Paulus voluit) loto, dicq; ca-
lido potius quā frigido, venam eiusmodi (si dictis Hippocra-
tis auscultes) secabis, atque ex ea sanguinem mittes. Itaque si va-
rix crus (vt magna ex parte solet) occupauerit, loto prius (vt præ-
cepit Paulus) homine, funiculum superiori femoris regioni cir-
cundato, ac vt inambulet iubeto. Inde venam ita repletam,
atramēto scriptorio, aut collyrio notato, iuxta eius situm trium
digitorum spacio, aut paulō ampliori interposito. Deindē re-
clinato seu decumbente ægro, crusque ipsum extendente, alte-
rum vinculum, paululū supra genu iniycito, ac mox quā atra-
menti nota est, sectionem facito, & reliquam curationem (vt su-
prā modō annotauimus) prosequitor. Quidam ex veteribus, fu-
nibus siue vinculis minimē utebantur, sed venam vel statim vbi
à carne absoluta erat, & vndiquaque nudata, excindebant, vel
ab imo etiam adhærētem violenter extrahendo abrumpebant.

*Si varix cr⁹
occupauerit*

*Emulso vs-
ricis.
Vltio.*

Alij verò vitionem eligentes, digitalibus interuallis innixa cauteria vasis admovent. Atque vbi crusta exciderit, vlcusque incarnatum, & cicatrix induc̃ta fuerit, locum roborant. Verum omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem suprà diximus. Porro varices in imo ventris suborientes, consimiliter tractandi sunt. lili item, qui in temporibus existunt, ea ratione, quam in angiologia, siue exemptione venarum docuit Aegineta, tolluntur. Atque hæc satis de varicum curatione, quantum saltem præsens locus postulat.

Lib. 6. cap. 5.

De verminoso vlcere.

CAP. XIII.

10

Ad vlcera
vermes.

VT vermes, qui vlceribus procreantur, arceas, primum quidem est, vt humiditatem putredinemque, eorum opificem, tollas. Itaq; vermes in vlceribus exortos interficiunt, & putredinem simul auferunt, succus & decoctum absynthij, & agrimonie, vel centaurei, vel marribij, calamenthi quoque officinarum (quod primum genus est calaminthæ Diosco.) succus, iugiter instillatus, atq; id genus multa, quæ etiam aurium vermes enecant. Priuatim autem ad vermes qui vlcera infestant, commendatur Archigeni, & Theodoro medicamentum, quod recipit cerussæ & polij parem mensuram, cum pice liquida illitum. Conducit etiam magnopere linamentum salua ieiuni hominis illitum, & applicatum. Hoc vermes etiam in auribus perimit, & concolores cicatrices reddit, vt testatur Aëtius.

Vlceris disrupti, & cum ossis corruptione complicatis curatio.

CAP. XIII.

Ossis vitia
et nota.

VLcerum nonnulla cicatrice obducta, postea tempore haud ita multo interiecto, denuò inflammatione tentantur, rursusque sua sponte & per se rumpuntur, & à continuitate sua discedunt. Osse enim quopiam substrato malè affecto, hoc est, vitiatò, & corrupto, circumdata ac superiacens caro, ex facili quidem interdum ad cicatricem ducitur, & sana ex toto, ad vnguemq; restituta esse videtur: verum cursu humoris valido, paulatim ex osse in alto contabescente, ac putrescente, tum inflammatio, tum pus oboritur. quod cicatricem lacerat, ac disrumpit. Cæterum vitiatum ac corruptum osse signa hæc sunt. Primò ferè pingue fit: deindè vel nigrum, vel cariosum. Quæ supernatis (vt Celsus ait) grauibz vlcenibus,

ant

aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupa-
tis eueniunt. Quænam igitur horum vlcerum curatio erit? cer-
tè eatenus exiccare; quatenus squamma affecti ossis exciderit.

Ossium autem squammæ facile excident, si agrestis papaue-
ris, & fici arboris folijs cum polenta læuigatis, atque ex vino
illis ipsius ossis sinus concavos repleueris, aut alterci (quem
Græci hyoſcyamū dicunt) semen, & attramentū sutorium, pari
pondere confrita imposueris. Sed & peucedani radix contrita
subitò squammas ossium remouet, ac separat. Squammas etiam

*Que ossium
squamas ex-
cidere faciūt*

10 ossium breui detrahit, & nouam probamque carnem desuper
renasci facit, sequens medicamentum, quod admirabile vocat

Auicennas. Recipit autem aristolochiæ, ireos, myrrhæ, aloes,
corticis plantæ panacis [ex qua fit succus opopanax dictus] ca-
nabil (quod apud Arabes genus est cuiusdam terræ rubræ mi-
nutæ vt arena, & Galeno ac Græcis eretrias, vt puto, dicitur)
adusti, scoræ æris, corticis pini, singulorum portiones æquas,
melle omnia excipiantur, & fiat emplastrum. Oportet autem

*Emplastrū
Auicenn.
Canabil.
Terra ere-
trias.*

ante omnia vitiatum ac corruptum os nudare, vlcere exciso, &
si latius eius corrupti ossis vitium est, quam vlcus fuit, carnem sub-
20 secare, donec integrum os vndique pateat. Os autem sic nuda-
to, totum id quod pingue & corruptum est, candente ferramen-
to semel iterumve (vt res exigit) admoto adurendum est, vt ex
eo statim secedat. Aut certè eradendum, donec iam aliquid cruo-
ris ostendatur, quæ integrioris & minimè corrupti ossis nota
est. Neque alia facienda sunt, vbi caries nigriciue in summo
osse est. Siquidem id vel paulò diutius eodem ferramento ad-
urendum est, vel radendum est. Porro qui radit hæc (inquit Cel-
sus) audacter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid,
& maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad soli-

30 dum ventum est. Albo nanque finiri ex nigritie vitium, solidi-
tate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris
aliquid integro suprà dictum est. Cæterum si caries altè de-
scendit, per cerebram virgenda crebris foraminibus est, quæ al-
titudine vitium aquent. Tum in ea foramina demittenda
candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat.
Simul enim post hæc & resoluetur ab inferiori ossè quod-
cunque viciatum est, & is sinus carne replebitur, & humor, aut
nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut
si caries ad alteram quoque partem ossis tranſiit, oportet ex-
40 cidi. Sed quod totum vitiatum est, totum eximendum est. Si

*Si caries al-
tè descendit.*

Vstio.

Qua post
vstionem fa-
cienda.

inferior pars integra est, eatenus hoc est, vsq; ad subiectam partem osis integram, quod corruptum est excidi debet. Sunt qui post abrasionem cauterium admouendum esse suadent: nec immerito sanè. Nam si corruptela osis ex humiditate excrementosa & superuacanea, ipsius osis substantiam labefactante ortum habet (vt certè magna ex parte habet) nullum præsentius aut tutius remedium excogitari potest, ipsa vstione, seu cauterio (vt vocant) actuali. Hoc enim decenter admotum, & citò, & rurò, in summo quoque & in alto (non secus quàm ignis ipse actualis) desiccatur. Post vstionem verò ferro candente factam, ro-
faceum calidum infundunt. Guido autem à Cauliaco post vstionem cauterio (vt dicunt) actuali (quod in hoc affectu magnoperè probat) decenter factam, rosaceum oui candido liquore permixtum, tribus primis diebus admouet: tri-duo verò alio sequeute, loco albuminis, luteum oui (quod vitellum appellant) rhodino, id est, rosaceo commiscet: Po-
stea butyrum cum melle rosato infundit. Sed præstat eius ver-
ba hoc loco subijcere. Ego (inquit) post cauterium pono oleum
rosarum cum albumine oui per tres dies, & per alios tres dies
cum vitello oui, & postea butyrù cum melle rosato. Et desuper
continuo vnum de mundificatiuis vsq; ad osis exfoliationem,
& post cum puluere emplastri dicti, hoc est, ex Auicenna supe-
rius commemorati, incarno, & contolido.

De vlcerebus dysepulotis inueteratis, & ijs, quæ cacoëthe, &
chironia dicunt.

CAP. XV.

Dysepulota
Cacoëthe.Chironia.
Telephia.

Vlcera quæ ad cicatricem ægrè ducuntur, Galenus Græcè dysepulota nominat. Quæ verò ægrè sanabilia, dolosa, malefica siue maligna, contumacia, rebelliaue dicimus, eidem, & Græcis alijs, qui de re me-
dica scripserunt, autoribus, cacoëthe nominantur. Hæc quoque, præsertim inueterata, & quæ vix cicatricem recipiunt, alijs chironia appellarunt, ceu Chironæ medicinæ peritissimo indigentia: alijs telephia, quòd in tali vlcere Telephus consenuerit. Gal.
lib. 4. de compositione medic. secundù genera, vlcera cacoëthe diuidit penes vehementiæ differentiam in maligniora, seu præter modum malefica, & mediocria seu moderatiora: atq; hæc quidem imbecillioribus, illa verò valentioribus remedijs curari præcipit. Illa autem non mediocriter, sed maximè maligna contumaciaq; vlcera. Asclepiades atque alij veteres (vel ipso Galeno
teste)

- testē) chironia propriè nominabant. Cæterū Cornelio Celso Chironij vlcere descriptio ex Cornelio Celso.
- autore, chironium vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras duas callosas, tumentes: exit sanies nō multa, sed tenuis. Odor malus, neque in vlcere, neq; in eius tumore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit: ideoq; nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdū tenuis cicatrix inducitur: deindē iterū rumpitur, vlcusq; renouatur, & maximè in pedibus & cruribus. His similia sunt, quæ Auicennas ægrè sanabilia, & occultam quandam nobis proprietatem habentia nominat. Hæc enim (inquit ille) neq; putrida sunt, neque corrosiua, neq; ambulatiua, sed sunt vnius dispositionis, plana, claudientia sese, & reciduantia sæpe, hoc est, cicatricem frequenter ducentia, & rursus sæpè se aperientia & renouantia. Porro multæ ac variæ sunt causæ, quæ eiusmodi malignorum, contrumaciū atq; ægrè sanabiliū vlcerū cōitionē & sanationem remouantur, & impediūt. Nempe fieri aliquādo potest vt labra exulcerate partis callosa, & dura, causā sint, quominus sanescat vlcus. Potest etiā causa esse intemperies, vel quæ citra tumore præternaturā in vlceratis partibus consistat, vel quæ cum tumore quidē aliquo cōiuncta sit. Potest & varix superiacēs, vel lienis auctior & male affectus, vel in iecinore vitiiū aliquod: præterq; hæc omnia, imbecillitas ægræ partis, quæ (vt Galenus ait) ipsā quoque intensā quædam est intemperies, vlcusis curationem in multis menses protrahere. Quinetiam vitiosus in toto corpore succus (cacochymiam vocant) maxima causarum est, quæ incommodare vlceribus possunt, & ea diuturna contumaciāq; efficere. Vexat sanè non minus vlcera, atque ea curatu difficilia reddit, succorum æquabiliter se habentium exuperantia, quam plethoram appellant. Quæ omnes causæ, & si quæ sint aliæ, in duas (vt suprā docuimus) reuocari possunt: nempe in carnis subiectæ intemperiem, & humorem confluentem. Itaque si eiusmodi vlceribus dyspulosis, id est, ægrè cicatricem admittentibus, maleficis, contumacibus, atque inueteratis, aliquando mederi velis, necesse est causas, quæ illa creant, primū summo-ueas atque abscindas, deindē maligni ipsius vlcusis curationem aggrediaris. In morbis nanque omnibus nedum vlceribus, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Magna igitur attentione inspicendum venit, num corpus totum cacochymum vel plethoricum existat, vel lien, aut iecur male afficiatur, vel labra vlcusis dura, & callosa sint. Item num

Auicennas.

Varia causa propter quas non sanescat vlcus. Labra callosa.

Intemperies. Varix.

Lienis, aut iecinoris vitium.

Imbecillitas partis.

Cacochymia.

Plethora.

aliqua insignis subfit partis vlcerae intemperies, aut etiam varix aliquis iuperiacens fuerit, cuius occasione contumax ad sanandum vlcus redditur. Ergo si totum corpus cacoehymia aut plethora laboret, prius expurgare, vacuareque expedit, quam medicamentum vlceri admoveas. Si verò lien, aut iecur malè afficiatur, his prius providere, deindè ad vlcus curandum venire oportet. Ad eundem modum & varices, qui sæpè suprà exulceratum locum sunt, prius (vt suprà docuimus) tollendi sunt, deindè mox vlcus sanandum. Intemperies quoque atque imbecillitas, quam sæpè insignis quædam parit intemperies, antequàm ad vlcus curationem accedamus, corrigenda erit. Breuiter ei quod fluxionis in partem vlceraam decumbentis, est causa, atque ægrè sanabile vlcus reddit, providendum, ac si fieri potest, medendū, prius erit. Deindè maligni ipsius vlcis & contumacis curationem aggredi oportebit. Itaque malignorum & difficulter cicatricem recipientium vlcum, curationis summus scopus est, valida citra demorsum exicatio. Hæc enim ab alijs vlcibus hoc vno dissident, quòd medicamenta citra demorsum atque erosionem vehementer exiccantia desiderant. Quæ enim mordendo vlcus, & manifestam in eo exasperationem excitando, dolorem inferunt, fluores, hoc est, humores vlcerae partis influentes, irritant, & phlegmonas concitant. Talis igitur pharmacorum materia, quoad eius fieri potest, ad dysepulora, id est ægrè cicatricem admittentia, & cacoethe, id est, maligna vlcera, inuenienda est, vnde vlcus citra mordicationem & dolorem siccescat. Hæc autem non ita inuentu facilis statim videbitur, sic attentius rem ipsam fueris contemplatus. Vt enim generalem hunc scopum, nempe validam vlcum desiccationem, assequaris, duo tibi alij scopi proponuntur: vnus, vt id quod influit, regeas, repellasve, si saltem qui vlcerae partis influunt iuccus, nec multò plus, iusto, nec multò deterior sit: alter, vt quod affectæ parti inhæret, infixumq; est, discutias. Atq; hæc contrariæ vires præstant. Siquidem influxum reprimunt, quæ sunt adstringentia pharmaca: digerunt, impacta iam exceptaq; trahendi potestate prædita. Porro quæ adstringunt, vt plurimum exasperant, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia verò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiūt. At acrimoniam dolor aliquis necessario sequitur, vlceraam partem erodens. Atque sic propter dolorem, quem exasperantia erodentiaque concitant, humores (vt paulò antè dicebamus) vlcerae

*Malignorū
& contumacium vlcerū
summus curationis scopus.*

Mordacia medicamentorum quid efficiant.

Duo alij scopi ad summum, & generale scopum assequendū necessarij.

Repellendū quod influit. Digerendū quod iam partis inhæret.

30
30
40
vlcerae

- viceratis partibus influentes irritari, & vlcus phlegmone obfideri exedique contingit. Ex quibus sanè dictis, colligitur, vlcibus dyssepulosis, id est, cicatricem difficulter recipientibus, præsidia inueniri non posse: & multò minus adhuc malignis, quæ Græca dictione cacoëthæ suprà iam sæpius vocauimus. Quid ergo nobis agendum erit, vt talia vlcera cacoëthæ, & dyssepulota dicta, ad integram sanitatem perducantur? Deligenda sanè erunt pharmaca, quæ vtraq; vi & facultate (nempe adstrictoria & digerente) polleant, atque ita quod insuit, repellant, *Medicamentis dyssepulotus & malignis vlcibus sanandis accommoda.*
- 10 quod verò iam affectæ parti inhæsit, discutiant. His itaque mista facultate præditis medicamentis, vlcera, de quibus nobis in præsentia sermo est, citra erosionem demorsumve vt res exoptulat, desiccabis. Cæterùm tamen si medicamentum ex ambobus compositum, erodente pura, & adstringente, necessariò validum existat: sordes tamen & humiditatis copia id genus vlcibus incumbens, veluti propugnacula quædam vlcerratis particulis facta, rosionem valentibus pharmacis adimunt, soluantque. Porro artificio hac in re potius (vt videtur) vi debebit medicus, quàm experimento inniti: nempe quòd sciat rationalis medicus vlcus non alia medicamentorum virtute curari, quàm dum affecta pars eam siccitatem consequatur, quàm in naturali statu sua possidebat. Quod factum intelligimus, vbi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat. Hæc autem dispositionem vlcera nanciscuntur, quo dicebamus modo sicciscentia, hoc est, adstricta, discussaque. Dein vbi sicca quidem fuerint, verùm sordida adhuc appareant, deterforijs pharmacis repurgantur. Cæterùm cum manifestè constet omnibus in artis operibus exercitatis, rationem sine operè exploratione probabilem non esse, medicus diligenter attende-
- 30 re debet, quem effectum medicamentum vlceri adhibiturum, quotiescunque ipsum soluerit, in particula vlcerrata præstiterit, quantum scilicet humiditatis in vlcere desiccauerit, vel si etiam sordes adsit, quantum inde absterferit. Sed & animum intendere oportet, vtrum vlcus carne quæ subest exesa, ac colliquescente, sordidum euaserit, an quia medicamen sordibus auferendis aptum requirat, imposuim verò tale non sit. Quod nimirum medicis etiam bonis (Galenò attestante) existimatis, nonnumquam imposuit, ac nostris quoque chirurgis quotidie adhuc imponit. Vbi enim vlcus post vnâ aut alterâ medicamenti appositione sordidius cõspexerint, statim nò cogitantes, an id ex ro-
- Lib. 4. comp. secundum genera.*
- Diligenter inspicienti, unde sordes in vlcere enata sit.*

*Nō vnū idē-
q; medicamē-
tū omnibus
corporibus
mederi po-
test.*

*Lib. 4. & 7. &
viii.
Quæ in cu-
randis ma-
lignis vlcē-
ribus praci-
pue conside-
randa.*

*Dioscorides.
Qui de me-
dicamentis
indetermi-
natē, & ci-
tra distin-
ctionē scri-
pserunt, ex-
toris occasio-
nem alijs de-
derunt.*

fione pharmaci acciderit, ad absterſorium valentius accitiusque ſe cōferūt, vnde iterū vlcus eroſum ex æquo ſordidū, vel etiā magis adhuc altera ſolutione viſitur. Carne enim id ſedatur, à medicamēto colliquata. Nam ita in prauam ſaniem degenerat. Quicquid autem in his ipſis tenuioris ſubſtantiæ eſt, à pharmaco diſſiatur, reliquum ibidem vlcenibus infixum, ſordes ipſis red datur. Cæterū cū ampla ſit latitudo vtrinq; in eo, q; alterum vlcus altero magis minūſve dyſepulorum, malignūq; ſit, corporaque omnia, quibus mederi cogimur, nō eādē omnino temperaturam ac diſpoſitionem habeant, ſed alia vitiōſo ſucco, alia plethora laborent, quædam dura & robuſta ſint, quædam verō tenera & mollia, atque ad ſentiendum inſigniter habilia: fieri non poteſt, vt vno eodēque medicamēto omnibus indi- ferenter dyſepulotis & malignis vlcenibus, quæuis corpora occu- pātibus, medicamur: ſed tantū medicantiū pharmacorū (vt Gal- ait) eſſe numerū oportet, quantum ipſorū quoq; vlcerū extiterit. Ergo in curandis eiufmodi vlceribus ægrē ſanabilibus, ſuppo- ſita eorum natura, & maiori cuiuſque minoriue à naturali habi- tu reſeſſu, laborantis cuiuſque corporis habitus ac diſpoſitio di- ligenti animaduerſione erit conſideranda. Deindē cuiuſq; me- dicamenti tam ſimplicis, quā compoſiti, vis & facultas ada- muſſim ediſcenda. Quæ ſcilicet deſiccant, nō tamen vlcen ſor- des abſtergunt. Item quæ aſtergunt quidem, non tamen probè deſiccant, ac quæ vtrunq; etiam poſſunt efficiere. Sed & accu- ratè proſpiciendum eſt, ex quoto quodq; medicamentū ordine exiſtat, hoc eſt, an imbecillum, an moderatū, an validum. Atque in vno quoq; ordine maioris minorisve ratio attendenda erit. Quod maximum Galeno cenſetur, inter ea, quæ ad horū vlcē- rum curationem pertinent, neglectū tamen (inquit) plerique medicinalis materiæ ſcriptoribus. Nā hi ſolās vniuerſales ipſius vires dicere ſtuderūt: inter quos fuit & Dioſcorides, quē nulli eorum, qui in eadē quaſi arena deſudarunt, hoc eſt, de medi- cali materia ſcripſerunt, ſecūdum eſſe, vel Galeni ipſius teſtimo- nio quiſquam dixerit. Sed & qui compoſita medicamenta tra- diderunt, de ijs indeterminatē, & citra diſtinctionem ſcripſerūt. Neque enim virtutem ipſius medicamenti, an ſcilicet validiſ- ſimū, an moderatum, vel imbecillum eſſet, explicauerunt: neque diſſicultatis, aut malignitatis latitudinem ipſorum vlcerum, aut naturam, habitūve corporum vlcere laborantium expreſſe- runt: qua nimirum diſtinctione omiſſa, permultos medicos & chirur-

chirurgos, interdum benè, interdum malè, ipsi pharmacis, quæ postenscripto reliquerunt, vti cōtingit: ideoque nonnunquam scopum mirificè adsequi, interim ab illo errare, aliò delabentes. Itaque non iniuria tam veteres, vt Andromachus, Crito, Asclepiades, quàm recentiores scriptores accusandi veniunt, qui sine vlla distinctione remedia scripserunt ad dyssepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia: item ad cacoethe, id est, malefica, siue maligna, & contumacia vlcera: plurima enim ex ijs sunt virtute inuicem longè diuersa. Siquidem nonnulla horum vehementiora sunt, alia moderatiora: quædam verò imbecilliora. Adde, q̃ & alia vlcera (vt diximus) magis, alia minus dyssepulota, & difficilia, malignaque sunt. Sed nec corpora omnia eius generis vlceribus scatentia, eiusdem prorsus (vt paulò antè dicebamus) naturæ ac dispositionis reperiuntur. Quare neque eadem omninò medicamenta desiderant. Itaque ad maligniora vlcera, & corpora duriora ac robustiora, valentioribus vrèdum erit remedijs: ad mediocria verò, & molliores ac delicatiora corporum habitus, imbecillioribus. Meritò igitur (vt initio quarti libri de compositione medica. x̃. & ỹ. scribit Galenus) omnes, qui vnum duntaxat medicamentum vlceribus malignis cicatricem inducere promittentes habent, successu crebro frustrantur. Nam duo (minimum) quæ idem pollicentur, eademque facultatem ostendunt, diuersa alioquin inter se non simpliciter maioris minorisq̃, verum (vt inquit ille) maximi ac minimi ratione in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus vitia curare proposuerit. Nos itaque deinceps pharmaca, primùm quidem simplicia, deinde composita recensēbimus, ac etiā seriatim enumerabimus, quæ vlcera (de quibus nobis hīc sermo est) citra demorsum, & manifestam exasperationem exiccare possunt. Cæterum cum variè (vt iam sæpius dictum est) inter se differant, in eo quòd magis minúsve siccant, expressam eorum mentionem faciemus, quæ validè ac vehementer, quæ moderatè, & quæ obscurius seu imbecillius exiccent: à metallicis, Galenum secuti, incipientes: quibus etiam terræ species adnumerantur. Siccant igitur modicè lemnia sphragis, siue lemnium sigillum, ita quidem cognominatum ob impressam illi sphragida, hoc est, sigillum Lianæ sacrum: nos & terram sigillatam eam vocamus. Et cadmia, quam climiam & cathimiam nuncupant. Hæc autem pluribus deinceps diebus sub canis feruore ex aceto trita, aut vino planè giluo, & substantia pellucida, faculta-

Ordo dicendorum.

*Moderatè
siccantia
simplicia.
Lemnium
sigillum.
Cadmia.*

Chalcitis.

cultatem acquirit magis siccantem. Quod si ex acri aceto teratur, siccataque reponatur, vlcerebus valde etiam magnis, Galeno & Aetio commodè inspergitur. Valentius cadmia & lemnio figillo, hoc est, terra figillata, pharmacum est chalcitis (quæ species est vitreoli, apud Arabes colorat, chalcadis, & zegi nuncupata) combusta, in cadmiaque morem trita, atque in pulverem redacta, & postea exiccata. Nam cruda, hoc est, ignem non experta, tanta pollet efficacia, ut iam crustas inducat. Lora quàm vsta minus desiccet, minusque mordax reperitur. Persimile quoque

Aerugo.

medicamentum est ærugo cremata, quæ & aris ærugo etiam dicitur, & vulgò hodiè ab omnibus viride aris. Non combusta autem nimis efficax medicamen est, sicuti & chalcitis, quæ igne non experta est. Verùm hæc (chalcitis inquam nonnihil etiam adstringit, & ea multò magis adhuc chalcanthum id est, atramē

Chalcanthū.**Misy.****Suri.**

tum futorium, quod inter metalla maximè siccet Misy autem & suri chalcitidi genere cognata sunt, ex vna, ut ita cum Galeno dicam, radice producta. Itaque tria hæc (quæ sub vitreoli genere comprehenduntur) maioris tantum, & minoris ratione disse-

Subi vel sti-**bium, vulgò****antimonii.****Diphryges.**

runt. Subi siue subium, quod Græcis *σίμυ*, vulgò autem in officinis antimonium dicitur, magis quàm suri desiccet, & adstringit. Porro diphryges appellatum pharmacum, vlcerebus ægrè humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptissimum est. Valde enim desiccet, tamen si modicè mordax sit. Ad hæc præter acrum

tum qualitatem, tum potentiam, vim habet adstrictoriam: quas tamen utraque fortiores, & chalcitis cruda, & chalcanthum, id est atramentum futorium, repræsentat. Omne quoque aluminis genus vlcera exquisitè desiccet, & generosè adstringit. Vnde nemo (inquit Galenus) solis his ad vlcera vitur, sicut nec cruda chalcitide, & æruginè: vsta verò & hæc, & misy utilia sunt: ut elota morsum quidem remittunt, verùm minus sic-

Alumen.**Erosio me-****tallicis per****cōbustionem****edomatur.**

cant. Illud enim metallicis omnibus commune est, quod combustis citiusque erosio, quæ prius adfuit, edomatur, ac interit. Quamobrem his sic crematis & lotis uti quidem licebit in pueris, eunuchis, mulieribusque, præsertim candidis, imò etiam & viris, qui cute alba videntur, & molli carne naturæ sunt præditi. Item in eis, qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & plethora, vitiosæque succo laborant. Talium enim corpora facili ex morsu, seu rosione phlegmonem accerunt. Itaque cum permulta corpora, quibus mederi cogimur, vnā quandam dispositionem habeant, qua vehementem commor-

sum

sum ferendo non sunt, tutius est lotis, quam non lotis vti. Ca- *Tutius est lo*
 tera alia, præter hæc metallica superius commemorata, plu- *is metalli-*
 rima adhuc simplicia sunt pharmaca, quæ malignis vlceri- *ci, quæ nō lo*
 bus curandis sunt idonea. Sarcocolla namque, & ichthyocol- *is vti*
 la, id est, gluten piscium, & his magis adhuc chrysocol- *sarcocolla.*
 la, id est, glutinum appellat, tali facultate prædita sunt. Huc etiam *ichthyocol-*
 optimè faciunt, plumbum combustum: plumbique recremen- *la.*
 tum, quod *σκωρία μολύβδης* Græci vocant, & vulgus cacaturā: sic- *Chrysocol-
la.*
 cat & ferri squamina, præsertim stomomaris, id est, partis ipsius *plumbū com-*
 10 squammæ subtilioris, hæc enim probè siccant. Porro æris squam- *busum.*
 ma, ex malleorū percussione decussa, quæ Græcè *λεπίς καλ-*
κόν, vulgò autem batitura æris dicitur, præter quòd siccant, etiā *scoria plum-*
 abstergit purgatque Galeno & Aëtio, vnde pura quoque vlcera *bi.*
 efficit, quod reliquæ squammæ præstare non possunt. Itaque si *squama fer-*
 hæc omnia medicamenta arida vlcenibus malignis ac contuma- *ri.*
 cibus inaspereris, mirificè (inquit Galenus) videbis citra erosio- *Squama*
 nem ea desiccari, sicut vbi buccinorum, purpurarumque, ostræo- *æris.*
 rum [sepium] aliorumque id genus ostracodermorum pisciū *Ostra ceder-*
 testas concrematas, & (vt addit Aëtius) lotas adhibueris. Vitru- *morum testa*
 20 combustum leuiter ac sine morſu exiccat, hinc dysepulotis, id *concremata.*
 est, cicatricem difficulter admittentibus, non item malignis, ac *Vitrum com-*
 rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quam illa requirūt. *busum.*
 Caterum galla omphacitis, hoc est, immatura: & malicoria, id *Galla om-*
 est, mali Punici cortices seu putanina, cremata, & arida appo- *phacitis.*
 ta, ad malefica & quæ malè coalescunt vlcera, efficacissimū me- *Malicoriū.*
 dicamentum deprehenditur. Hæc enim non solum siccandi, sed *Cortex cap-*
 etiam adstringendi potestatem habent. Cortex etiam capparis *paris.*
 tritus, & aridus, maleficus & putridus vlceri vtilissimè imponi- *Astati ex-*
 tur Aëtio. Malum terræ, quod Græci aristolochiā appellant, *iccantia.*
 30 iris, acorum, arthemisia, panacis radix, argemone, chamæleon- *Terra ere-*
 tis nigri radix, cyperum, dracunculus, & gladiolus asiatim exic- *trius.*
 cant Galeno. His euidentius adhuc centaurium, & polium: *Cambil.*
 quibus paulò imbecillior est terra nomine eretrias, quæ Aui- *trius.*
 cennæ & alijs scætarum Arabicæ scriptoribus, cambil nomina- *Cambil.*
 tur. Talis sanè medicamentorum simplicium, ad dysepulo- *trius.*
 ta vlcera, maligna ac contumacia, materies existit, quibus &
 humorum fluxionem intercipere, & locum vlceratum valen-
 ter, citra demorsum tamen atque erosionem, exiccare possis.
 Quomodo autem simplicibus eiusmodi medicamentis scicis mo-
 40 dō commemoratis, in vlcenibus ad cicatricē ægrè venientibus, &
 malignis

malignis vtendum sit, ex Galeno & Aëtio requirédum est. Porro ex his suprà memoratis simplicibus pharmacis, Gale. lib. 4. de compositione medicamentorum secundum genera, varias remediorum formulas, nempe cerata, vnguenta, emplastra, & pulueres conficit, quæ ad eiusmodi maligna, & ægrè ad cicatricem venientia vlcera, mirè proficiunt. Ex cuius quidem scriptis Auicennas formulam vnâ medicamenti desumpsit, quam magnoperè Guido à Cauliaco, & illius ætatis chirurgi celebrarunt. Recipit autem cadmiæ, aluminis, chryfocollæ, id est, glutini auri, singulorum partes octo, floris æris, qui spontè ex ære 10 profilit, & corticis æris, hoc est, a ruginis, quæ in officinis vnde æris nominatur, & Græcis ἰὸν ξυσόν, vstorum ana partem vnâ, gummi cupressi, partes quatuor, ceræ, olei rosæci, aut myrtini ana quantum satis esse videbitur, fiat vnguentum. Cæterum, cum vnâ omnibus medicamentum (vt frequenter dictum est) commodè adaptari non possit, tutiorque sit leniorum pharmacorum vsus, mordaciorum verò periculosior, composita medicamenta disunctè hoc loco describam, quæ ad dyssepulota, id est, cicatricem difficulter recipientia, inueterata, contumacia, maligna, & chironia vlcera, ex Galeni sententia bene faciunt: primumque mitiora ac moderatiora referam: deinde validiora, ac potentiora subiiciam.

*Vnguentum
Auic. longè
optimum.*

*Aerugo, vel
æris aerugo,
est viriæ
æris.*

*Lib. 4. de
cōpo. med.
ægr. à γιν.*

*Andromachi emplastrum ad vlcera dyssepulota id est,
ægrè ad cicatricem venientia, sed nondum maligna,
quod probatur Galeno.*

Diphrygis denarium pondo quatuordecim, argenti spumæ denarium pondo quadraginta, ceræ denarium pondo quinquaginta trium, olei myrtei pondo vnciæ decem.

Aliud eiusdem generis mitissimum & lenissimum.

30

Eloti plumbi denarium pōdo duum, spodij denarium pondo quatuor, cadmiæ tantundem, diphrygis denarij pondo vnius. Ea omnia excipiantur terebinthinæ denarijs sex.

*Aliud cicatricem obducens, imbecillius autem, quam
vt cacoëthe persanet.*

Compositio hæc capit, molybdenæ, id est, plumbaginis, drachmas quinque; & viginti, diphrygis drachmas quatuor, sorios [aut vitreoli] drachmas duas & semissem, misyos tosti 40 drachmas


drachmas duas, terebinthinæ drachmas nouem, ceræ & myrtei vtriufque drachmas decem. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, deinde rasa siccis diligenter in puluerem redactis admisceto. Nam si li quida ipsi affundas, sepe sient gruii ceræ modò, maxime cùm frigus fuerit. In sole feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere: mouendo vehementer rudiculâ primùm, deinde cochleari. Præstat autem in hisce omnibus (inquit Galenus) rudiculam palmæ esse rasnasculum.

10 *Aliud medicamen epuloticum, id est, cicatricem ducens, optimum, quod ὀλὴ λαδάνης, id est ex ladano inscribitur: ad Critionem relatum callosis, veteribus, & curatu difficilibus vlceribus apprimè idoneum.*

Pleis aridæ denarium pondo viginti quinque, æ ruginis rase denarium pondo octo, æris combusti denarium pondo quinque, squammæ rubræ denarium pondo octo, ladani vncias tres, vini optimi sextarium semis, quod capit vncias duodecim Oribasio. Conuenit etiam hoc medicamentum prætu-
20 midis vlceribus & cauis. Deligatum verò membrum in diem quartum continendum est. Argenti spumam & oleum coquito, donec aliquam spissitudinem accipiant: deinde squammâ æris, æ ruginendum confluerint, vt colorem bonum acquirât, æris picem adijcito. Posteaquàm refrigeratum fuerit, ladanum ex vino tritum: obseruans, ne ex hoc adiecto, effruescat. Postremò supra moderatum ignem vnita confundito subigitoque.

Mediocre medicamentum ad moderatè maligna vlcera idoneum.

30 **A**ccipe æris combusti, & æ ruginis, vtriufque vnciam vnâ, aluminis scissi, vel scissilis (quod vulgò in officinis alumè de pluma appellatur) semunciam, ceræ vncias duas semis: hoc pharmacum temperatum est, & mediū facultate. Porro minus mordebit medicamentum, lenèq; prorsus efficietur, si loco aluminis scissillis diphrygem acceperis, & æ ruginem combustam apposueris. Quòd si expurgare sordes statueris, æris squammæ semuncia addetur. Hæc autem pingui cera & recenti excipienta sunt. Quòd si siccior paulò fuerit, quàm vt cōmemorata excipiat, tēperandum est oleum myrteum, quo mollescat: vel meli-
40 num, quod oleū de cydonijs appellât: vel ricinini, quod vulgo



in officinis oleum de cherua nominatur: vel omotribes *vetus*. Aut si omninò nihil olcosum medicamēto adhibere placeat, laticē resinā admisceto: cui⁹ si copia nō est, terebinthinā assumito.

Aliud validius medicamentū ad chironia vlcera, id est, nō mediocriter, sed maxime maligna contumaciaq; ex Asclepiade.

Platysma. *Platysma.* A Eris squammæ, & æruginis rasæ, vtriusque pondo vnciâ, ceræ, scilicet, hoc est, vncias sex, resinæ laticis, vel si eius copia non est terebinthinæ, pondo vnc. & semissem. Ea quæ liquari possunt aridis affunduntur. Quibus acceptis, ac curiosè mollitus vitior. Item platysma (hoc est, linteam latum, cui emplastrum illitum sit) exiguum soli affectæ parti, vt vlcus tantum comprehendat, iniicito. Carterum ambientes particulas, pharmaco quod phlegmonem arceat, circumdare oportet, atque inter curandum tertio quoque die soluere expedit, deinde formentis mitigare, ipsumque emplastrum, quod a latitudine platysma vocatur, abluendo emollire, ac rursus (vt iam suprà diximus) imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Porro mediam, ac (vt Galenus ait) symmetriam habebit temperiem, vt etiam modicè maligna curet, si non tripla, vt in præcedenti descriptione, sed quadrupla ceræ portio metallicis, squammæ scilicet & ærugini, commixta fuerit. Sed moderatius adhuc extiterit, si quincupla adiciatur, vt nondum cacoëthe, sed ægrè cicatricem ducentia persanet. Itaque cum auxilium ad aliquid spectet, ac mollius pharmacum ad moderatiora cacoëthe, id est, malefica, magis quā vehemētius conducat, satius fuerit in vlcerebus non ita malignis & cōtumacibus, cerā quadruplā, vel quincuplā amborū simul metallicorum esse, vt rectè Gal. admonuit.

Aliud pharmacum vehemens & mitigatorium ad cacoëthe, Andromachi.

Ceræ tyrrhenicæ (vel eius loco pinguis & recētis, optime) drach. octo, seu i taurini, terebinthinæ, plumbi vsti, singulorum drachmas quatuor, linamentis excepto vitior.

Ad desperata vlcera, quorum scilicet curationem plerique aggressi, non absoluerunt, sed tanquā ab insanabilibus desistere, emplastrum admirandum, (cui autem Galeno,) cum propter alia, tum quoniam longo experimento probatum est, multum confidere oporteat,

Sonios [cuius loco vitriolum sumi potest] drach. viginti-
 tuor, aluminis scissilis [quod vulgo alumen de pluma nomi-
 nant] calcis viuar, malicorij [id est, corticis mali granati] singulo-
 rum drachmas sexdecim, thuris gallarū immaturarū, vitriulique
 drachmas viginti duas, ceræ drachmas centum viginti, seui vitu-
 lini, vel si eius copia non sit, veteris suilli, quam axūgiam vocāt,
 drachmas centum sexaginta, olei veteris heminam, hoc est vn-
 cias nouem. (Aetius assumit olei antiqui libram vnā.) Arida
 trita, & tenuitimo cribro excussa, denuo simul terito. Quæ de-
 30 inde, his quæ liquari oportet, liquatis, & ab igne remotis, permi-
 sceto: Cumque omnia probè vnita fuerint, aluminē, tuus, suū, cal-
 cem, singula prius è vino adstringenti trita adicito, & vitōr.
 Dum Galenus medicamentum hoc conficeret, oleum & adipē
 quadraginta annorū adiciebat, atque ita semper diuturna vl-
 cera, præter modum maligna ac deplorata, opinione melius sā-
 nauit. Eius autem generis sunt ea, à quibus pars affecta in tā vi-
 tiosum, ac deprauatum habitum ducitur, vt sanguinem probè
 etiam coctum, qui ad eam nutriendi causa deferretur, muret cor-
 rumpatque, vel id quod infuit, adeo caco-chymum existit, vt
 20 etiam si pars nihil passa fuerit, ab illo certè ipso solo erodatur.
 Hoc itaque medicamento quod noxium est, transmutatur, at-
 que discutitur. Satius autem fuit caco-chymiam prius conue-
 nienti medicamento expurgare, deinde (vt suprà monuimus)
 vlceris curacionem aggredi.

In codice
 Grec. Gal.
 & Aetij,
 hæc pōdera
 reperiuntur.

Hemina,
 Græcis co-
 ryle dicta,
 continet o-
 lei vnc. 9.
 vini 10.
 mellis 13.
 Oleum, &
 adipēs anno-
 rum 40.

*Aliud Galeni, ad chironia vlcera in mollibus
 corporibus.*

Erit libram vnā, cerussæ vncias octo, rosacei librā vnā,
 salis ammoniaci vncias quatuor, iquāmæ aris vncias duas,
 30 thuris, aluminis, æruginis, malicorij, calcis viuar, singulorum vn-
 ciam vnā: quæ liquari debet, liquata, & frigefacta, aridis è vino
 tritis admisceto, atque placidiori igne decoquito. Ceterum innu-
 meræ propemodum aliæ formulæ compositorum medic. ex ve-
 rerum scriptis à Gal. lib. 4. de compos. medica. secundū genera,
 referuntur, quæ ad dysepulota, caco-chymia, innumerata & chironia
 vlcera persananda apprimè idonea sunt. Ex illo igitur libro, ve-
 lut è sylua quadam remedium, rationalis quisque medicus,
 & qui methodum ab eo illic traditam artificiosè didicerit, ido-
 neam vlceri, quod curandum suscepit, remedij formulā sibi deli-
 40 gere poterit, atque hæc solus vti sciet. Porro nonnullas, easdem-
 que

*Quarta in-
tentio cura-
dorum vlce-
rum.*

que ex ipsis præcipuas, exempli gratia hoc loco adscripsimus, quò magis lectori ad manum essent, & in particularibus, non vniuersalibus solis contentus, exerceatur. Sed iam tempus est, quantam curandorum vlcærum in vniuersum intentionem persequamur. Quarta igitur intentio curandorum vlcærum cum alijs dispositionibus complicatorum, quæ ablata, & (vt loquuntur) reëctificata dispositione agglutinationi seu consolidationi repugnante, loci vlcæcati curatione nos aggredi debere suadet, ipsæ omninò intentionibus & modis perhicitur, qui suprà dicti sunt in curatione vulnærum concavorum, in quibus substantiæ aliqua deperditio facta est. Proinde methodus ac curandi ratio, quæ illic à nobis tradita est, in memoriam reuocanda erit. Itaque cum tanta sit curationis vlcærum, cum vulnærum atque etiã apostematum curatione communitas ac conuenientia, nil mirum: si Galenus multis locis eorum tractationem ac doctrinam commiscuerit. Cæterum his ita ad vmbilicum deductis, tempus est, de proprijs ac (vt dicunt) famosis vlcærum differentijs pertractemus, inter quas primùm se offert vlcus, quod virulentum & corrosiuum appellantur.

*De proprijs ac (vt loquuntur) magis famosis vlcærum differentijs, & primò de vlcære virulento, & corrosiuo, quod Græci *νεκρὸν* appellant, id est, exedens appellatur.* CAP. XV.

Causa.

Quid sit vlcus virulentum seu saniosum, & vlcus corrosiuum, siue arrodens, quid item ambulatiuum, & depascens siue manducans, quod Græci *νεκρὸν* appellant, & quomodo hæc inuicem dissideant, in definitionibus differentiarum vlcærum, abundè est explicatum. Excitantur autem eiusmodi vlcæra à prauis humoribus, sed præsertim biliosis, acris, & mordacibus, qui propter adustionem, cacoëthiam quandam, hoc est, malignitatem acquirunt. Atque hæc magna ex parte oriuntur post herpetas, & pruriētes pustulas, quas acris, & biliosus humor excitauit: atque etiam post vulnæra, quæ mordacibus medicamentis exacerbata atque irritata fuere. Cæterum vt ad perfectam sanationem perducantur eiusmodi vlcæra, triplici egent auxiliorum genere, sicuti & pleraque alia, nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatione, quæ succo prauo, acris, & erosiuam in affecta particula excitanti, sit accommodata, & localibus remedijs. Age igitur, esto aliquis, qui sanus quidem sit, hoc est, omnia

Curatio vlcæris exedens.

Hypothesis ex li. 4. sbe.

omnia naturæ munia inculparè exerceat, sed ex scabenda de repente quapiam particula, veluti brachio, pustulam statim excitarit, mox eadè ipsa particula iterum atque iterum pruritu vexetur, pustulaq; dirupta vlcus decolor, & inæqualiter erosum gignatur, atque hæc in tribus quatuorve diebus à principio inciderint. Hac itaq; hypothesi posita, dicat mihi hoc loco quispiã, quonam pacto sanare huiusmodi vlcus conueniat? Certè vt eius curationem feliciter assequaris, imprimis qualis sit totius corporis tali vlcere laborantis affectus, statim tibi erit considerandũ.

- 10 Inuenies nanque tum ex vlcere ipsius symptomatis, id est, accidentibus, tum ex notis quas totum corpus præ se feret, cuius proximè generis sit is qui redundat succus. Atq; hunc (si Gal. consilium sequari) idoneo purgante medicamento protinus educes, nec protrahes, dum totus hominis cubitus affectum quandam contumacem rebellemq; curationi contrahat, quemadmodum facere solebant Thesiali sectatores, ipsius videlicet præcepta mordicis obseruantes. Præcipitur nanque ab omnibus ferè (inquit Galenus) antiquis medicis, quicumque ratione quadam ac methodo de vlcerum curatione scripserunt, causas quæ illa

A purgatione incipienda curatio.

Lib. 4. Ther.

- 20 creant abscindendas esse, æquè profecto vt ceterorum omnium morborum. Itaq; hoc tibi tanquàm commune præceptum esto, omninò in omnibus morbis nedum vlceribus, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoandam curationem esse. Hinc rectè monebat Gal. lib. 13. metho. meden. digerentia, hoc est, resolutia, seu discurrentia medicamenta, nequaquam particulis quibusdam applicanda esse, vbi redundantia in toto corpore aut superiacente particula subest. Quippe quòd hæc sic admota implerent potius quàm educerent. Itaque tunc à totius corporis, aut superabundantiæ mittentis partiæ superiacentis

Comune de digerentibus præceptum.

- 30 vacuatione incipienda curatio est. Deindè euaporante auxilio vtendum. Facta igitur totius corporis, vt decet vacuatione (vt factum quondam fuit in Romana quadam illustri muliere, quæ herpetem esibiomenum, id est, exedentem, in malleolo primum habebat, qui tandem ad bubones vique ascenderat) ad curationem particularis affectus, hoc est, ipsius vlcere arrodentis deueniendum erit. Ergo si particulam exulceratam atque arrosam, supra modum calefactam videris, ipsam statim frigidis stypticis desiccantibus refrigerabis. Commodè autem feceris, si vlcus ipsum, & particulam totam vlceratam aqua aluminosa ablueris:

Particularis curatio vlcere arrodentis.

Aqua aluminosa.

- 40 hæc enim ablutio magno vsui talibus vlcenibus esse solet. Quip-

pe quæ influentes humores potenter repellat, & siccandi facultatem obtineat, ut autor est Auicennas. Poteris etiam affectum locum irrigare, vel aqua plantaginis & rosarum, vel aqua in qua ferrum candens extinctum fuerit, aut etiam decocto cyperi, myrobalanorum, cupressi, plantaginis, malicorij, balaustij, quod flos est mali Punici sylvestris, & confamilium. Ut autem ab ingruentibus defluxionibus, seu ab iniuria influentium humorum, vlcerrata particula vindicetur, optimum fuerit, circumiacetes partes vnguento ex bolo Armenia illinere. In medio vero vlceris, pulvis aliquis, qui vim desiccandi habeat apponendus erit, ut ex lithargyro, plumbo vitro, pompholyge, quæ vulgo tutia dicitur, antimonio, quod stimmi & subium Græcè dicitur, ære combusto, corallio, lapide hæmatite, spodio, loris. Atque etiam sidijs, id est, corticibus mali Granati, myrobalanis, & id genus alijs. Item pannorum lacinia in linamenta formata, siue plagula, quæ & splenia Græcis dicuntur, vnguento albo Rhasis illita, aut vnguento quod sextam partem lithargyri recipiat, in quod omnes consentiunt, vel vnguento quod diapompholygos nuncupatur, supra vlcus ipsum danda sunt. Cæterum supra eiusmodi pulveres, ac linamenta vlceri imposita, puluillus, seu puluinus aliquis, quem plumaceolum vocant, posca aquosa imbutus, adhibendus erit: deinde conueniens deligatura, quam exprimentem nominant, cuius supra in tractatu de vulneribus meminimus. Guido à Cauliaco in talibus vlceribus solebat post lotionem absque aliquo [hoc est, nullo alio adhibito auxilio] ponere laminam plumbi tenuem perforatam, in qua virtus argenti viui, cum aqua plantaginis erat infixæ, & ligare ligatura exprimente, quod non est (inquit) fas loqui propter idiotas. Itaque tria hæc, molybdos, id est, plumbum, aqua aluminosa, & deligatura decenter facta, miram, ac ferè incredibilem vim habent, in sanandis eiusmodi vlceribus. Porro deligaturam talem esse conueniet, quæ ad vsum magis, quàm ad elegantem formam conducat: hæc autem duobus modis fit, nempe vel vnico vinculo seu fascia vna, vel duabus. Itaque si vna tantum fascia fuerit, principio eius versus superiorem vlceris partem statuto pæstenda erit, siue fura, siue genu, siue malcollus, siue cubitus, siue manus summa, aut alia quæuis pars laborauerit. At si duabus fascijs uti malueris, quemadmodum in fracturis fieri solet, altera à parte affecta, hoc est, ab ipso vlcere, ad superiorem regionem feretur, altera deorsum prius ducetur, mox

- in superiore parte desinet, eo videlicet loco quo prior incepit. Caterum præter reliqua commoda, quæ ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quod vlcera, quæ ob rotunditatem coalescere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non singulis diebus, sed alterius facienda est. Neque in solatione vlcus aqua inspergendum, sed molli linteolo, puro, & sicco, sanies detergenda. Quod si partes vlceri adiacentes inflammari videantur, & iam phlegmonôdes quippiam repræsentent, platysmati exterius plurimo spatio liquidum medicamentum illinere oportet, quale est Galeni phœnicinum, hoc
 10 est, è palmulis confectum, vel aliquod simile non quidem quocunque contrigerit dilutum, sed vino adstringente, quantum imbibi poterit. Sitque oleum quod adijcitur refrigerans, & adstringens, cuiusmodi sunt myrteum, & melinum. Quod si hæc non adsint, omphacinum, & omotribes nominatum adhibebis. At si durities circa partes vlceri adiacentes apparuerit, ipsum phœnicinum, seu emplastrum è palmulis, oleo veteri, aut ricinino (quod officinæ oleum de cherua nominant) diluendum est. Tutiusque fuerit superpositæ regioni, quodpiam
 20 ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere, quo si quid vel prauum, vel plusquam par est, influat, regeratur. Atque id maxime, cum in crure vlcus obortum, superpositam venam varicosam habeat. Quæ dum magna est, ac sanguinem nec colore rubrum, nec probum, sed atriozem & melancholicum continere videtur, excidenda, vt prius diximus, auferendaque est.
- Caterum si vlcera eiusmodi admota medicamenta continent, indiesque magis atque magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde à vitiosis succis repurgandum erit, continensque ipsa seu (vt vocant) coniuncta materia depascens atque arrodens, inustione seu cauterio (vt loquuntur) actuali absumenda & desiccanda veniet, modò laborans id genus auxilij tutum, atque vtile, cæterisque alijs longè præstantius, non reformidet, ac renuat. Quod si ferrum candens ob timiditatem, aut delicatam nimis naturam pati, atque admiscere noluerit, medicamenta acriora, & quæ ignis vires habeant admovebis, cuiusmodi sunt pastilli Andronis, Musæ, aut Pafsonis, in tractatu de tumoribus præter naturam descripti, vel trochisci asphodelorum, aut qui calidicon nominantur, quorû formulæ ac descriptiones libro sexto referuntur. His etiam atramentû scri-
 30 ptorium, quod & incaustû vocant, magna vtilitate admouetur.

*Deligatura
alterius die-
bus soluenda.*

*Si partes ad-
iacentes in-
flammetur.*

*Olea refrige-
rantia, et ad-
stringentia.
Si durities
adfit.*

*Si erosio nō
cedat medi-
camentis.*

Vfio.

*Pastilli cau-
stici.*

Arsenicum.

Quod si hæc parùm profecerint, arsenicum, quod sublimatum nominant, modica tamen (vt alibi dictum) est quantitate, tuto adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circumpositæ vlceri partes, interim refrigerantibus perpetuò municiendus erit, ne tam vehementibus adnotis præsidij, fluxio irriteretur. Porro si ne his quidem tam potentibus auxilijs malum aliquando victum fuerit, nec erosio ipsa depascens quouis modo fisti possit, membrum amputare necessarium est, vt voluit Auicennas.

10

De sordidi & putris vlceris curatione. CAP. XVI.

Vlcus sordidū & putre.

Quid sit vlcus sordidum, quod Græci rhyparon vocant: quid item putre, seu putrefactum vlcus dicatur, supra diffiniuimus. Porro sordidum, & putrefactum vlcus Guidoni dicitur, quod sui malicia (vt eius verbis

vtar) putrefacit membrum, dimittendo viscositatem, aut carnem mollem, siue (inquit) crustosam, foetidam, à qua fumus eleuatur foetidus, & cadauerosus. Ac tale quidem vlcus fraudulentū etiam appellant. Cæterum si eius malicia ulterius progrediatur, & serpat, in sphacelū (quem vulgus esthiomēnū vocat) degenerat, & homini vitam adimit. Horū autē vlcerum causæ sunt, succi prauī, crassi sanguinis naturam quodammodò resipiscētes, hoc est, sanguinei, qui feruore quodam velut ebullientes, venenositatem, atque malignitatem quandam indispiscuntur. Et hæc quidem magna ex parte carbunculos maleficos, siue anthracas, abscessus, & vulnera malè curata, consequuntur. Porro talium vlcerum curatio consistit in proba victus obseruatione, & euacuationibus accōmodis, quibus corpus vniuersum ab excrementis, atq; à natura alienis humoribus expurgetur. Vbi autem iam purum ab excrementijs, atq; à natura alienis humoribus corpus vniuersum tibi apparuerit, tum particula ipsa laborans, hoc est, vlcerata, cucurbitulis, scarificationibus, hirudinibus, atq; epithematis siue foribus, à corruptis ac deprauatis succis ipsam occupantibus, vindicāda erit, vt rectè præcepit Auicennas. Post hæc verò propriā ipsius vlceris curationē aggredieris. Sordes igitur primò tibi ablunda erit, aut hydromelite quidem, aut marina aqua, vel si eius copia non est salsa. Deindè mundificandū vlcus, vnguēto vulgò Apostolorū dicto, aut eo quod Aegyptiacū nominatur. Post hæc, quidam desuper adhuc dandum esse morient mundificatiuum aliud, ex absinthij

40

succo,

*Vlcus fraudulentum.**Causæ vlcerum putriū & sordidorum.**Curandis ratio.**Sordis ablutio.**Vlceris mundificatio.*

succo, melle rosaceo, myrrha, & farina hordei compositū, & circumiacentes vlceri partes, vnguento ex bolo Armenia illinunt, ac supra cætera prædicta puluillos, ex stupis canabinis studiose pexis, aut ex lineis pannis læuibus, pulca aquosa (quod oxycrato vocant) imbutos apponunt, atque alligant. Si verò sordes in putredine, aut corruptione degeneret, locus abluendus erit oxycrato, aut (ut voluit Guido) aqua cineris, vel saponis. Deinde emplastrum ex carnibus piscium salforū, farina orobi, & aristolochia longa, non autem rotunda, & scilla, omnibus ex vino coctis, & cum melle mixtis, superaccomodandum est. Ad eandem intentionem Auicenna subsequens medicamentum describit, multa (ut adfirmat) experientia comprobatur. Concipit tragacanthi rubri vnc. vñā, calcis viuz, aluminis, corticis granatorū, ana drach. sex, thuris, gallarū ana drach. quatuor, ceræ, & olei, ana quod fuerit satis. Aliud. Vitrioli partes duodecim, chalcitis (quod & colcotar Arabes appellant) partes decem, tragacanthi partes nouē, coquuntur in aceto, & ex eis fiat linimentum. Ac semper quidem vnguentum ex bolo in ambitu vlceris, ut supra monuimus, apponito: desuper vero stupeos puluillos oxycrato madefactos. Porro si vlcera eiusmodi depascētia putridaque, eousque feritatis, & maliciæ deuenierint, ut partes adiacētes magis atque magis semper erodant, ac sine modo in illis corruptelā excitet, vehementissimis medicamentis (qualia supra in curatione malignorum vlcerū recensuimus) indigebunt. Imò verò frequēter inuersiones, atque etiā excisiones illis erunt necessariae, ita ut quicquid vitiatum, ac corruptum est, prius extirpetur, & viua ac sana duntaxat caro relinquatur: quam ex natio ipsius colore, & sanguinis bonitate, facile deprehendes. Inter cætera autem medicamenta acria, quæ viuum à corrupto separant, & in hoc affectu celebrari solent, omnium præstantissimum atque efficacissimum quotidiano experimento deprehenditur arsenicum, quod sublimatum vocant, ut aliquoties alibi annotauimus. Hoc enim confestim malum sistit, & id quid sine dolore. Quod si medicamentis eiusmodi malum non cesserit, membrum ipsum tali depascente ac putrido vlcere affectum cogimur abscindere, ut cætera pars tuta sit. Id autem miserum atque vltimum auxilium, nunquam tentandum est, nisi dum cætera præsidia nihil proficiunt, & malo prorsus victa sunt, ut alibi admonuimus.

Si sordes in putredinem degeneret.

Emplastrum Auicennæ.

Linimentum.

Arsenicum sublimatum.

*De profundo & cuniculoso vlcere, quod & sinus
Latins dicitur.*

CAP. XVII.

V 3

Vlcera

*Vlcus cauer-
nosum.*

V

Lcera cuniculosa, seu cauernosa supra appellauimus, quorum orificia stricta sunt, profunditas verò in latum se diffundit, & sensui occulta est, multos interdum anfractus habens, modò rectos, modò obliquos, citra

duritiè tamen & callu. Atq; hoc vno à fistula disider, quamuis promiscua turba, eiusmodi vlcera omnia cuniculosa, fistulas no-

Fistula quid

*Sinus quid,
& eius dif-
ferètia mul-
tiplices.*

minenti: cum tamè fistula propriè vlcus sit altum, angustū, & callosum, Galeno, Cel. Aët. & Paulo. Itaq; quod profundum & ca-

uernosum vlcus recentiores chirurgi appellant, id Latini appo-

sitè sinum, Græci colpon nominant. Fit autem cum adiacens- 10

vlceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit, glu-

tinaturque: cuius multæ ac variæ sunt differentiæ, nimirum ex ca-

uernarum magnitudine, situ, figura, ac numero desumptæ. Aut

enim breues sunt, aut altè penetrantes, iuxta carnem desinentes,

aut ad ossa, vel cartilaginem subeuntes, sursum, deorsum, vel ad

latus tendentes, recti aut flexuosi, simplices ac duplices, triplicè-

ve. Galenus autem eorum duntaxat, qui à positionis figura su-

muntur, meminit: vt qui præcipuè curandi rationem immutent.

Siue enim magnus, siue parvus aut brevis, vel altus, aut iuxta su-

perficiem consistens, simplex vel duplex, triplexve fuerit, eadem 20

semper est eorum curandi ratio. At si vel sursum, vel deorsum,

vel ad latus, vel intrò ad ossa tendit, curationem variat. Cū enim

sursum tendit, facillè per eius ossa saniosa colluuiet, atq; ipsum pus

effluit. Cū verò deorsum vergit, intus retentū pus, aut sanies,

contiguas partes erodit. Quare nisi factò ex aduerso (vt statim

dicetur) emissario, nihil omnino profeceris, siue carnè genera-

re, siue glutinare velis. Cū verò ad latus declinat, aut sursum

vergit, aut intrò fertur, sed ita locari pars afflicta potest, vt libe-

rè sanies, aut pus, è sinu effluere possit, incisione ex aduerso fa-

cta opus non est, sed de his adhuc in sequentibus. Cæterum cau- 30

se eiusmodi sinuū, seu cuniculosoꝝ vlcum, sunt abscessus, siue

suppurates affectus tardius, dissecati & vulnera perperam curata.

Pus nanque longo nimis spacio in suppurato abscessu, aut in

profundo vulnere, quod non ritè expurgatur, retentum ac de-

litescens, malignitatem, & veluti acrem atq; erodentè quandam

naturam acquirit, & cuniculos tandem molitur, qui difficile ad-

modum carne impleri, & glutinari queunt. Ad affectam nanque

particulā, quæ iam imbecillitatē contraxit, vndiq; ex circumiacen-

tibus ac vicinis partibus, imò verò & ab vniuerso corpore, super-

Diffé

Differentiæ cuniculorum, seu cauernularum eiusmodi vlc- *Sinum dif-*
rum deprehenduntur turundis (quas tentas vocant) & specillis, *ferentia quæ*
siue contis (quæ probæ vulgò dicuntur) argenteis, vel plumbeis, *bus depre-*
aut alia consimili materia factis, in ipsos cuniculos læuiter, ac *hendantur.*
blandè immisissis. Item minutis quibusdam, atque exilibus radici-
bus, & cereis candelis, necnon & coloratis quibusdam iniectioni-

nibus. Color verò materiæ, quæ ab ipsis cauernulis & sinubus
egreditur, qualitatem eius manifestè insinuat: si enim tenuis fue- *iudicia.*
rit, & loturæ carnis persimilis appareat, calidam esse haud teme-
rè eam iudicabis. At si candida visitur & serosa, indubiè frigida
erit. Sed & saniei purisve bonitas, & paucitas, doloris quoque &
tumoris, qui prius aderant, priuatio, sinum carne impleri, & glu-
tinari demonstrant. Si verò contraria his adfuerint, glutinatio-
nem nequaquam adhuc fieri nobis indicant: vt Galenus ijs ver-
bis nobis testatum reliquit libro secundo de ratione curandi, ad
« Glauconem. An verò (inquit) altæ sinus partes coaluerint, ex
« manante sanie deprehendes, si ea multa vel pauca, cocta vel cru-
« da sit. Præterea si neque in ipso sinu dolor sentiatur, nec tumor
« appareat, sed totus locus æquabilis sit, siccus ac doloris expers.
20 Quòd si puris probè cocti portio exigua in ore conspicitur,
« multò magis de glutinando sinu sperandum est. Hactenus de si-
num differentijs, causis, & iudicijs dicta sufficiant. Itaque tem-
pestiuum est, eorum curationem aggrediamur, & qua poterimus
breuitate, nunc prosequamur.

*Ratio curandi sinus, seu vlcus profundum & cauernosum,
non tamen adhuc callosum.*

Cum sinus, quo de hîc agimus, vlcus sit cauum, & profundum *In curandis*
geminus in eo curando scopus ac finis mederi proponitur *sinu, gemi-*
30 vnitione scilicet & repletio. Vlcus enim quæ vlcus est, vnitionem, *num esse sec-*
cauitas verò impletionem desiderat. At quæ dissident, vniri nò
possunt, nisi prius cauitatem (si cū vlcerè, vt in sinu coniuncta
sit) impleuerimus. Ordo igitur curationis postulat, vt à cauita-
tis impletionem ordiamur. Sed cauitas rursus carne impleri non
potest, nisi laborans particula & iusto temperamento prædita
sit, & sinus ipse omninò purus, & ab omni sorde immunis ex-
titerit. Itaque si vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna,
vel intemperies aliqua simplex aut composita, partem affectam
obsederit, manifestum est, quòd nisi quis illos affectus prius sa-
40 nauerit, implere cauum vlcus non poterit. Fieri enim nò potest

*In noua car-
nis generatio-
ne duplex
prouenire ex-
crementum.*

*Vlcus sinuo-
sum duplici-
bus eget me-
dicamentis.*

*Agglutinan-
tiū facultas.*

Hypothesis.

*Si sinus oris-
cium deor-*

(vt lib. 3. metho. med. Gale. inquit) vt in vlcere vel carnis produ-
ctio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio
recte vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se ha-
beat. Adhæc cum in ipsa nouæ carnis generatione, duplex pro-
uenire excrementum necesse sit, alterum quidem crassius, quod
sordes propriè appellatur: alterum tenuius, quod Græcis $\rho\chi\alpha\varsigma$,
nobis verò sanies dicitur: ac ex tenui quidem hoc excremento,
vlcus humidum reddatur, sicuti ex crasso sordidum: duplicibus
sanè medicamentis sinuosum vlcus egebit, antequàm carne re-
pleatur: nempe vt humidum est siccantibus, vt sordidum expur-
gantibus seu detergentibus. Ordo igitur sanationis à sorde ex-
purganda in curando sinu incipiet, q̃ uidelicet nec glutinari
quicquàm, nec carne impleri possit, priusquàm purum, hoc est
deterisum, & à sordibus rite expurgatum fuerit. Vbi verò iam
ab omni alio affectu immunis, & purus ab excrementis sinus fue-
rit, tum primum agglutinantibus medicamentis vtendum erit.
Hæc autem nec detergēt, nec expurgant, vt sarcotica, id est, car-
nem generantia, sed contrà prorsus (inquit Galenus) substantiā
omnem in idem cogunt. Cuiusmodi facultatem habent medica-
menta ea, quæ austera & adstringentia vocantur. Hæc enim sic-
cant tantisper, dum humoris redundantiam cui secundum natu-
ram est, absumant. Sed de ijs alibi fusius à nobis dictum est. Po-
ne ergo in eadem particula sinu occupata, intemperiem aliquā,
vel phlegmonem, aut consimilem affectum, & cavitatem, & vl-
cus, & sordem simul consistere, ordo curationis expostulat, vt
primum phlegmonem aut intemperiem, secundo loco sordem,
tertio cavitatem, & quarto vlcus persanet. Siquidem iusta subie-
ctæ carnis temperies, causæ rationem habet, vt quæ concrefcere
secum quod vlcera tum est, faciat, & cavitatem impleat. Puritas
viceris, rationem eius sine quo non. Atque hanc sordes interpel-
lans, curationem moratur. Habet verò & ipsa cuitas, ad vlcus,
rationē eius sine quo non, vt lib. 3. Therap. Galenus annotauit.
Quando (inquit) nisi cuitas prius impleta sit, induci cicatrice
vlcus non possit. Atque hæc in vniuersum dicta sint de ratione
curandi sinus, quod & vlcus profundum, & cauernosum nostri
chirurgi appellant. Cui magna ex parte complicari solent, quæ
suprà commemorauimus. Hac igitur vniuersali methodo præ-
missa, particularium ipsorum sinuum differetiarum (quas curā-
di rationem variare diximus) sanationem subiungamus. Con-
stituat igitur imprimis sinus ad superiorem partem porrectus, 40

ita vt eius orificium deorsum spectet, talis certe non adeò multum negotij in sanando faciescit. Quandoquidem per os eius facile sanies effluet, atque ideo promptè conglutinabitur, adhibitis saltem ijs, quæ statim dicentur auxilijs. Sed neque cum ad latus declinat, aut intrò fertur, aut etià deorsum vergit, incisione ex aduerso facta opus erit, si pars ipsa afflicta ita locari possit, vt liberè sanies è sinu emanare queat. Itaque ponatur sinus artus aliquos, nempe cubitum, aut femur occupare, poterit vtique decliuus figuratus, citra diuisionem ex aduerso factam coalescere.

10 re. Etenim in cubito cum oris gibbero vicinæ sunt, summâ manum elatius protendens, sinum ad effluxionem incitabis. Sic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os autem ipsius sublime supra femoris mediû sit popliti mollem puluinum subijcies, quò demissus inguen quàm genu positum sit.

Cæterum si sinus deorsum vergat, aut ad latus declinet, vel intrò feratur, & situm affectæ parti còmodum dare non possis, quò liberè sanies effluat, nihil vnquam promouebis, siue carnè generare, siue glutinare velis, nisi prius collectioni purulentæ effluxum molitus fueris. Intus enim retenta sanies contiguas partes erodet. Porro saniosæ illi colluuiæ effluxum bifariâ moli-

20 liri poteris. Nempe vel factò, tantum in imo sinus vulnere, vel tota cavitare dissecta. In imo, seu radice sinus sit sectio, si vlcus magnum fuerit, & locus totus sine periculo secari non possit. Fresterit autem semper, si nihil obstiterit, totam ipsius sinus cavitatem disseccare, quàm ex aduerso plagam facere. Ita enim facilius, ac citius multò, ad sanitatem vlcus perducetur. Tota igitur cavitare dissecta, ellychnijs, & pannorum lacinijs in liquamēta formatis, congruisque medicamentis sic expurgandus, atque resiccandus erit sinus, vt tandem caro regignatur, cavitatis impleatur, & ad perfectam sanationē, modo quò suprà de artibus, & canis vulneribus docuimus, perducatur. Cæterum priusquàm ex aduersa parte diuisio fiat, purulenta colluuiæ sinenda est, magna satis copia in fundo ipsius sinus colligi, quo sinus parietes magis attenuentur, atque ita melius specillum supra quod sectio fieri debet in cavitatem demittatur, sinu scilicet ex puris copia distēto, & ampliore factò. Specillum autem ipsum quod sic in sinum immittitur, læue, hoc est, minimè asperum esse debet, ac vntuoso aliquo (vt citra dolorem immitti possit) illitum. Adhæc parte posteriore perforatum esse decet in modum acus, vt in eo

40 imponi possit ceto aliquis (vt vocant) ex stupis canabinis, aut aliqua

sum spe-
ctus.

Incisio ex ad-
uerso, quādo
in sinu fieri
debeat, &
quando non.

Ex Paul.
Ex Gal.
2. ad Glau.

Bifariâ efflu-
xum moliri
posse saniei,
aut puri, in
sinu.

Quid multa
puris copia si-
nenda est col-
ligi in fundo
sinus, prius-
quam ex ad-
uerso diuida-
tur.

Specillum,
quod in sinu
immittitur,
quale esse
debeat.

aliqua gracili fascia, aut certe funiculo quopiam molli, vt cana-
 bino, factus. Incisione autem facta, dolor qui per eam excitatus
 est, sedandus erit, & impetus profluentis sanguinis, oui candido,
 atque alijs id genus supprimendæ sanguinis profusioni dicatis
 auxilijs, compescendus. Post hæc autem cetero alius, quando opus
 erit, detergente aliquo medicamēto imbutus, indendus erit, at-
 que vt id commodius fiat, alteri, qui sinum adhuc occupat, aut
 affuerit, aut alligabitur. Poterunt & ellychnia, seu linamenta in
 mundificatio aliquo tincta, in sinum ipsum imponi, superque,
 atque in ambitu danda sunt, quæ mox infra dicemus. Porro *ita*
Sineq; aper- si neque in imo ipsius sinuosi vlcēis, plaga commodè fieri pos-
tio in imo, sit, neque cavitās tota dissecari, sinus totus eluendus erit collutio-
neq; cavitās nibus, primum quidem deterforijs, si inhaerentem sanie subesse
tota dissec- suspicaris: deinde sarcoticis, id est, carnem generantibus: postea
ri possit. verò ad glutinans medicamentum transeundum erit. Proinde
Sinus qui- Galenus libro secundo de ratione curandi ad Glauconem, sinū
bus liquori- ipsum nunc melierato solo, id est, mulsa, nunc quidem puro vi-
bus abluen- no, nunc verò mulso, eluendum esse monet. Itaque ad detergen-
dus. dam, expurgandamque sinui inhaerentem saniem, melieratum
Meliceratum præferendum est. Sed præsertim in sinu cuius os deorsum spe-
 ctat, per quod sanies liberè effluat. Huius nanque sinus profun-
 ditatem totam, ad glutinationem aptam (vt Galenus inquit) so-
 la reddere potest iniecta mulsa. Ad purgandum verò simul & ro-
 borandum, vbi scilicet adhuc aliqua leuis cuiusdam sordis dere-
 lictæ suspitio est, vel ipso etiam Aëtio autore mulsum eligimus.
Mulsum. At vbi carnem iam in sinu mediocriter regenitam, omnino pu-
 ram esse coniecerimus, & glutinationem quatimus, vino puro
Vinum sub- subadstringente sinum ipsum eluemus. Vinum enim eiusmodi,
austerum. quod medium est inter dulce & adstringens, leuiter glutinat.
 Si autem cruentus foetidusque sit humor, qui è sinu excernitur,
Oxymeli. oxymeli (Aëtio autem) cæteris præstat. Auicennas & quidā alij
 sinum præsertim malignorem, & vehementer sordidum deter-
 gent, & eluunt, aut lixiuio, aut marina aqua, aut etiam aluminō
 sa, quæ in hoc affectu præstantissima est. Hæc enim præterquam
Aqua alumi- quod potenter sordes abluit, à parte quoque affecta fluxionem
nosa. arceat, & repellit. Albucasis chirurgus insignis vagenturum Aeg-
 yptiacum, cum aqua & melle liquatum, in sinum eiusmodi, de-
 terforijs & corrigendæ malignitatis gratia immitti iubet. Ga-
 lenus quoque, vbi sinus ipse, aut situs, aut alterius cuiusvis occa-
 sione, sordidior aut humidior est, medicamenta, quæ valentius
 quam

quàm multa deficcant, & detergant, ad mouenda esse suadet. Cu
 iusmodi est medicamentum ex combusta charta compositum,
 « quod ad hunc modum temperatur. Squammæ, galilæ, myrrhæ,
 « singulorum pondo denarium octo, sandarachæ, arsenici, elate-
 « rij, id est, succi cucumeris agrestis, singulorum pondo denarium
 « quatuor, thuris pondo denarium trium, atramenti futorii; (quod
 « Græci chalcanthum vocant) tantundem, chartæ quantum satis
 « est ad inducendum colorem. Debet autem exigua eiusmodi me-
 dicamenti portio largo rosaceo misceri, quò & eius vehemen-
 tia remittatur, & per angustum foramē, in sinus profundum, per
 10 fistulam, aut aneam, aut corneam, recto ductu foratam, posita
 injici. Iniecto autem medicamento, vlcis os linamento con-
 cepto claudendum est, ne id resinat. Nisi enim diutius maneat,
 exiccare non poterit. Cæterum si vlcus calidum fuerit, hoc
 est, calidam intemperiem sibi adiunctam habuerit, & virus ab
 ipso sinuoso vlcere manans, rubrum & loturæ carnis recenter
 maceratæ persimile appareat, non alienum fuerit ipsum ablucere
 melicrato, hoc est aqua multa recenti, in quo lenticula hordeū,
 rosæ, & balaustium incocta fuerint. Si verò vlcus frigidum sit,
 20 & sanies tenuis & aquosa conspicitur, multa in qua incocta sint,
 marrubium, absinthium, pimpinella, & myrrha, eluendum est.
 Porro vbi sic ab omni sorde puros sinus effecerimus, carne re-
 plentibus medicamentis (sarcotica Græci vocant) si cani saltem
 fuerint, deinde glutinantibus, & tandem cicatricem inducenti-
 bus, similiter reliquis vlceribus vtendum erit. Carne autem re-
 plent, quæ humiditatem siccant, & sordem detergent. Itaque,
 idem medicamentum primariò atque ex sese sordis deterforium
 Galeno appellatur, altero verò significatu sarcoticum & gluti-
 nans. Quippe quòd tali imposito medicamento, vlcera carne
 30 replentur, ac coeunt. Opus enim ipsorum proprium est (vt
 alicubi scripsit Galenus) affectam partem recrementis vacuare,
 ne videlicet sanies carnis generationem glutinationemque im-
 pediat. Sarcotica igitur detergendi etiam vim habent, sed
 omnis rosionis seu morsus expertem. Finis autem glutinan-
 tium est, nullam inter coitura subnascentem humiditatem per-
 mittere. Glutinatio nancque (vt tertio methodi Galenus ait)
 vnum id propositum est, vt eius quod secundum naturam est,
 redundantiam consumat. Epuloticorum verò, id est, cicatri-
 cem inducentium medicamentorum finis est, non hanc totam
 40 subnascentem, ac redundantem humiditatem impedire, sed etiã
 nunc

*Medicamen-
tum ex char-
ta combusta.*

*Si vlcus si-
nuosum: cali-
dum fuerit.*

*Si vlcus si-
nuosum: frigi-
dum fuerit.*

*Idem medi-
camentum
deterforium
sarcoticum
& glutinans.*

*Sarcoticorum
finitas.
Glutinan-
tium finis.*

*Epuloticorum
finis.*

nunc consistente, in ijs, quæ mox cicatricem ducent, cōsumere; adhæc callo obducere, & adstringendo indurare. Sed de ijs in antidotario fufius dicemus. Ergo, (vt ad propositū reuertamur) si cauus si-
nas carnem
requirat. ra constar, aridi, paululum cum multo rosaceo inferi conuenit. Deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum fſis aut Machæionis, aut simile quoddā, vnā cū rosaceo cerato liquidiore solutū inijcitur. Vbi verò mediocriter carne repletus est sinus, aliquid ex glutinantibus inedicamētis, nō vehementer siccantibus adhibendū est, quod crescentem tenellam carnem blā-
Enhama. de, & sine morſu cogat, nō aliter ac si recens ac cruentū vulnus curaretur. Curatur autem hoc mollibus, blandis, minimeque dolorē excitantibus medicamentis, qualia sunt enhama, quorum opus seu facultas est cōiungere, & diuisas partes cōglutinare, vt in pristinā vnitatē particula reducat. Multa (inquit Galenus) eiusmodi medicamenta inueniūtur, alia quidē ex bitumine cōfecta, vocanturque nescio qua ratione, vt idē ait, emplastra Bar-
Cirrho, & phæa medi-
camenta.
Auicē. bara: alia verò, quia fului & fulci sunt coloris, cirrho, & phæa nominātur, ex argenti spuma & erugine liberalius decocta. Hiorum autem medicamētōrū misturas, Galenus, Paulus, & Celsus
 docent. Sed præstat de hac re interpretis vulgaris Auicēnæ verba subijcere. Ad incarnādum (inquit) oportet q̃ medicinæ fiat
 » currentes lauatinae, cum viscositate adhærente, & inijciantur »
 » in eis cum clysterijs, & immittantur cum clychnijs & tentis. Et »
 » nos quidem iam experti sumus emplastrum Apostolicum, id est, »
 » Apostolorum, & centauream, quando cum ea implentur, & est »
 » mirabilis valde. Succedit huic symphyton, deinde iridis Illyri- »
 » cæ radix, postremò erui farina, & id genus alia, quæ glutinādi
 » facultatem habent. Porro sequēs medicamentum, quod in fre-
 » quenti est vſu apud chirurgos, miram vim habet in glutinandis
 » seu incarnandis eiusmodi vlceribus. æ. aquæ decoctionis hor-
 » dei libram vnā, mellis rosati vncias tres, sarcocollæ drachmas
 » duas, myrrhæ, thuris, singulorū drachmam vnā, vini odoriferi
 » vnc. sex. Coquantur omnia simul vsque ad tertias, id est, vs-
 » que ad consumptionē tertiæ partis. Quibus & addi potest ali-
 » quando aliquid aloës. Cæterum post glutinantis medicamenti
 » impositionem, sola spongia noua ex mulſo iuxta Galeni consi-
 » lium circumponēda est, quā fieri potest molliſſima: Eius au-
 » tem deligatura à sinus fundo incipiat, & eius ore finiat: fasci-
 » rum verò spiræ siue circumflexus, sinus profundum sine dolore
 » arctent.

arctent, ac paulatim vsque ad os eius elaxentur, eidemque (ori-
 inquam sinus) indatur medicamentum molle, circumdueto fo-
 rinsecus emplastro ad os ipsius sinus forficibus discisso, vt sanies
 effluere possit. Effluet autem è sinu sanies, supposito aliquo alio
 paruo emplastro ad solutionem vsque, quam tertio quoque die
 faciens, hoc ipsum tanquam operculum circumpositum auferes,
 relicto eo quod totum ambit sinum, medicamento. Ideò au-
 tem tertio quoque die, aut certè citius aut tardius, prout res effla-
 gitabit, demenda spongia est, ac paruum emplastrum quod super-
 10 positum erat, vt si qua humoris colluuijs in ore sinus collecta sit,
 vacuetur, exploremusque, an altæ sinus partes coaluerint, an mi-
 nimè, quod ex manente sanie (vt docet Galenus) deprehende-
 tur. Si scilicet ea multa vel pauca, cocta vel cruda sit. Itaque altas
 ipsius partes coaluisse demonstrat, pus coctum ac paucum, præ-
 fertim si neque in ipso sinu dolor sentiat, nec tumor appareat,
 sed locus totus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Cumque
 spongiam rursus imposueris, rursusque (vt diximus) ad alliga-
 ueris, postero vel tertio die soluto, vt dictum est, semper linteo-
 lum sinus ori admotum permutans, quod eodem emplastro illi-
 20 tum, totum os ambitu cingat. Neque verò omninò appressum
 (vt Galenus admonet) esse debet, sed ita, vt per id tota sanies va-
 cuari possit. Itaque cum secundo vel tertio quoque die (vt iam se-
 mel atque iterum dictum est) spongia, vel paruum emplastrum exi-
 mitur, considerandum, multane an pauca, cruda an cocta mate-
 ria ad os vlcis affluerit. Deindè expers ne sit, an particeps do-
 loris locus affectus, & an tumor remanserit, aut diminutus sit.
 Altas enim sinus partes coisse testatur pus coctum ac paucum,
 præcipueque si dolor & tumor non adsint. Contrà, multum &
 crudum, & cum fetore, & loci humiditate, dolore & tumore, nõ-
 30 dum coaluisse significant. Neque verò (vt scribit Galenus) si pri-
 mo vel secundo die tenuis quædam sanies ex sinu manet, de glu-
 tinatione omninò desperandum est. Sæpe enim vis medicamen-
 ti affectæ particulæ admoti, ex ipsa cute & subiecta carne te-
 nuem humiditatem vehementer exprimit, quoties eius qui cu-
 ratur corpus ita affectum est, siue ex natua temperie, siue mala
 vietus ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocriter resic-
 cata glutinantur. Quod si tertio, aut quarto ab initio die, sa-
 nies cruda in ore apparuerit, scito (inquit idem) sinum non esse
 glutinatum. Quare affecto loco medicamentum, quod vehè-
 40 menter quidem exiccet, sed nec mordeat, nec cutem contrahat,
 circum-

*natorij me-
dicamenti in
positionem.*

*Tertio quo-
que die spon-
gia, ac par-
uum empla-
strum demē-
da.*

*Lib. 2. de ar-
te curati. ad
Glauc.*

*Notæ coitio-
nis altarum
sinus paruum*

*Cirrhu me-
dicamentu.*

*Guido à
Cauliaco.*

circumponendum est. Cuiusmodi Galeni medicamentum est, quod à fuluo colore cirrhum dicitur, ex concoctis, metallicis, oleo ricinino, quod oleum de cherua appellant, & aceto sine cera confectum. Hoc enim medicamentum (vt idem Galenus testatur) sine morsu vehementer exiccat. Cuius compositio & vsus ex libro secundo de compositione medicamentorum 78. & 79. requiri debent. Guido à Cauliaco iubet post glutinantis medicamenti impositionem, de super apponenda esse emplastrum, & pannas, aliquo quod habeat (vt eius verbis utar) rectificata re illa, illitos. Cuiusmodi sunt, emplastrum *δια χλωιδεως* nominatum, quod à palma Græcè *φοινικίον*, & vulgò diapalma appellatur. Item emplastrum (inquit) nigrum vel flauum cum gallis: & mel coctum cum puluere thuris, myrrhæ, & aloës: vel quædam horum, vel omnia simul: & vinum stypticum crassum, quod grossum vocat. Postea ligare præcipit, vt docet Gale. lib. 2. ad Glauconem. Paucis autem interiectis subdit, de tenta (vt loquitur) hæsitasse multos, vt Henricum, & præceptorem suum Bononiensem, quod solida non ponatur, qua saniem (inquit) in loco retinet: sed cannulata, aut duplicata, vt sanies continuè valeat exire, & sponsia super orificium ponatur, vt sanies trahatur exterius fugendo. Sponsia nanque ideò circumdatur atque alligatur, vt exiccet manantemque è sinu saniem excipiat, alioqui partem erosuram, aut pruritum excitaturam. Imbuta autem (vt supra diximus) multo sponsia fit, vt detergeat: molli, ne asperitate lædat: noua verò, vt aqua marina adhuc imbuta partem affectam desiccet. Hactenus de ratione curandi vlcus alii angusti, & cauernosi, non tamen callosi. Nunc ordo postulat, vt de calloso vlcere, seu callo obducto sinu, quam fistulam nominant, dicamus.

*Sponsia qua
lis esse de-
beat.*

De fistula.

CAP. XVIII.

30

Sinus.

*Sinus dege-
nerat in fi-
stulam.
Fistula quid*

QUum pus in abscessibus sic excoiat particulam, vt continentia à subiectis separet ac diducat, dein eo quomodocunque euacuato, distantia inter se pristinum statum recuperare nequeant, affectio eiusmodi sinus appellatur Galeno, libro de tumori- bus præter naturam. Quem si quis (ait ille) nō statim curet, callo obducitur, durusque temporis progressu fiet, nec conglutinare ipsum cum subiectis sibi possibile est, vocaturque tunc hic affectus propriè fistula, de qua nunc dicere institimus. Est igitur ⁴⁰ fistula

fistula (quam Græci syringa nominant) arctus oblongusque, & callosus sinus, aliquatenus indolens, qui magna parte ex abscessibus parum dextrè curatis, oritur: sed & ex alijs nonnunquam vicerum generibus ac sinibus perperam curatis nascitur. Hæc autem nomen accepit ab harundinearum fistularum tralatione, vt Paulus annotauit. Quandoquidem in eis cauitas quædã deprehenditur, harundinum cauitatibus similis. Fit autem fistula in omni ferè parte corporis, habetque quedam (vt Celsus ait) in singulis locis propria, sed de cõmunibus hîc dicemus. Differentiæ igitur fistularum plures sunt, sicuti & sinuum, quæ ex figura, numero, magnitudine, & alijs id genus sumuntur. Si quidem aliæ sub cute extensæ sunt, aliæ altius penetrant: aliæ rectæ, aliæ flexæ & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant: aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Aliæ nervos attingunt, aliæ venas aut arterias occupant. Aliæ præterea simplices sunt, aliæ duplices triplicisque, ab vno ore intus oris, quæ tres sunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur. Aliæ deinde facilè, aliæ cum difficultate curantur. Atque etiam (inquit Celsus) quædam insanabiles reperiuntur.

*Fistularum
differentiæ
multiplices.*

De signis & iudicijs fistularum.

Fistularum dignotiones sumendæ sunt, ab his quæ secundum essentiæ rationem ipsis insunt, atque etiã ijs, quæ consequuntur accidentibus, & effectibus. A substantialiter quidem inhaerentibus, vt ab illo (inquit Guido) corio calloso, & à forma fistulæ instrumentalis, & factitiæ. Callositas nanque cum forma fistulari, essentialis est differentia ipsius fistulæ. Ab accidentibus verò & effectibus, vt à virulentia illa horribili, quæ aliquando ab ipsa fistula effluit, emanatve. Item à dolore, qui in ea modicus esse solet, nisi dum partes quæ iuxta nervum sunt, occupat. Cæterum simplices ne fistulæ sint, aut in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cuius si plus fertur, quàm quod simplici spacio conuenit, plures sinus callosos esse manifestum est. Corporis quoque inquinatio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint. Quia sæpe cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit, pus ferri, quod iam desierat, incipit: testaturque non solum alium sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Cumque ferè iuxta sint caro & nervus, & aliqua nervosa:

*Fistularum
notæ à quibus
petantur.*

*Quibus
notis deprehen
datur sim
plex ne sit fi
stula, an
multiplex.*

*Lib. 5.
Aëtius.*

*Nervi in fi-
stula erosi
nota.*

*Vena atq;
arteria ero-
sa signa.
Fistula spe-
cillo maxi-
mè explorā-
da.*

*Ossis cariosi
nota.*

*Obliqua fi-
stula quo-
modo explo-
randa.*

neruosa: quales ferè tunica, membranæque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. Siquidem ex carne (inquit Celsus) pus læue, albū, copiosius fertur. At ex neruoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius, & minus. Ex neruo pingue, & oleo non dissimile. Cuius sententiæ refragari videtur Aëtius, sic de nervi fistula in-
quies: Humor indè delatus tenuior est, ei similis, qui ab ossibus defluit, non quidem oleaginus, aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Sed & ex alijs notis, quàm ex pure, apprehenditur nervi fistula, nempe dolore: stuporis enim punctioisq; sensum in-
curit. Deindè motus, qui ab eo neruo perfici solet, deterior apparebit. Sed in specillo attractu (inquit Aëtius) molestus acutusque sensus redditus, rem manifestissimè iudicabit. At fistula locū erodete, si vena suberit, plurimus crassusq; sanguis effunditur. Sin arteria aperiatur, tenuis & flavus cū multo spiritu stri-
doreq; exibat. Ante omnia autē (vt rectè consuluit Celsus) demitti specillum in fistulā conuenit, vt quò tendat, & quàm altè perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an sic-
cior sit: quod extracto specillo pater. Si verò os in vicino est (id quod disci potest sic, iam nec ne eò fistula penetrauit quatenus
nocuerit. Nā si molle est, quod ultimo specillo cōtingitur, intra carnē adhuc vitium est. Si verò magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deindè si labitur specillū, nondūm caries est, si non labitur, sed æquali innititur, caries quidē: verūm adhuc levis est. Si inæquale quoque & asperū subest, vehementius os exesum est. At cartilago vbi subhæsit, ipsa sedes docet, peruentumque esse ad eam ex tenui patet. Cæterum si obliquæ fuerint fistulæ, flexumque aliquem, vel plures habuerint, vt specilli apex pro-
gredi nequeat, virgulam plumbeam, stanneamve constabimus, aut ceream potius candelam assumemus, quā iter pertentemus. 30
Cum enim flexilis admodū sit, ad fistulæ figurā facillè accomodabitur. Hactenus de signis fistularum: nunc de iudicijs.

Fistularum iudicia, seu prognostica.

Lib. 7.

Cor. Cel. li. 5

Fistulæ si altius penetrant, vt ad vltimas demitti collyrium non possit, si tortuosæ atque anfractuosæ sunt, si multiplices: maius (inquit Celsus) in manu, quàm in medicamentis præsidium est: minusque operæ est, si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intro tendunt. Expedita quoq; curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile,

iuuenile, si firmum est: inimica contraria his, sunt. Itemque si fistula, os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit: si vel ad vesicam, vel ad pulmones, vel ad vuluam, vel ad grandes venas, arteriasve, vel ad anam, vt gurgur, stomachum, thoracem, penetrauit. Ad inreissima quoque eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Aegre (inquit Paulus) confanescit in ano fistula, que orificio caret, cum quæ delitescit, & in os terminatur, multifariamq; *Paulus.*
 10 fissa est. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spacia, & noxæ. Præterea an simplices hæc sint, an multiplices, & in plures partes ductæ. Hactenus igitur de fistularum differentiis, signis & iudicijs. Deinceps verò de medicamentis ad eandem conferentibus differere oportet.

De fistularum curatione in vniuersum.

Imprimis genus victus conueniens, & quod substantia & qualitate, causis, quæ fistulæ consolidationem impediunt, aduersatur, instituito. Deindè corpus vniuersum à superuacaneis, & *Ratio curandi vniuersalis.*
 20 noxijs humoribus (illis tamen prius, si ita res exigit, expulsionì paratis) idoneo cathartico medicamento purgato. Mox portionibus roborandis ac desiccandis interioribus partibus accommodis, fistulam ad consolidationem præparato. Cæterum tamen si potiones multæ ad hanc intentionem à varijs autoribus descriptæ sint, duæ tamen sunt quæ frequenti vsu, & felici successu à recentioribus medicis probatæ sunt. Prior ad hunc modum habet: Agrimonie partes tres, plantaginis partes duas, foliorum oliuæ partem vnâ, scindantur minutim & contrundantur, postea in vino albo coquantur, & fiat colatura, de qua
 30 quolibet die sub auroram cyathus vnus administretur. Altera, & osmundæ (quæ filix mas est Dioscoridi) partes tres, georixianæ partes duas, centaurei partem vnâ, coquantur in vino albo, & fiat potio, quæ vt prior administretur. Hæc postrema etiam valde efficaci est in ossium corruptorum expulsionè. Ego autem optimè factum existimauerim, si in prædictis decoctionibus nonnihil ligni Guaiaci, vel Indici (quod lignum sanctum, & palmam sanctam appellant) aliquot horas maceretur, postea moderato igne leuiter decoquatur, & ex colatura quantum assidenti medico satis esse videbitur, manè bibendum offeratur. Atque
 40 hæc regimen (vt loquuntur) vniuersale concernunt. Quod
 x autem

Potiones fistulis idoneæ.

Guaiacum, lignum sanctum.

Ratio curandi partium. autem ad topica pertinet auxilia, & regimen (vt vocant) particulare, quatuor sunt ordine peragenda. Primum quidem fistulae officium, si non satis hiet, hoc est, si nimis strictum fuerit, imò

verò & sinus ipse fistularis vsq; ad fines eius, si fieri possit, dilatari debet. Secundo loco callum eximere, fistulamque auferre, atque omnino destruere conuenit. Tercio post exemptum (quocunque modo id fiat) callum, sordines detergenda veniunt.

Quarto ubi purus iam ab omni sorde sinus videbitur, similiter reliquis vlceribus ad sanitatem perducetur: nempe glutinatorijs seu (vt loquuntur) incarnantibus medicamentis, & epuloticis, id est, cicatricem inducentibus, atque etiam (si carnis aliqua fuerit amissa) sarcocticis, id est, carnem generantibus pharmacis.

Ergo si nec aduri ferro, nec incidi commodè possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue vnus ac simplex siue multiplex fuerit, non latè satis pateat, immisso collyrio aliquo, seu (vt vocant) tenta, ampliari ac dilatari debet. Materia autè ad cōficienda collyria, dilatandis eiusmodi fistulis, & sinubus non callosis idonea, sunt radices gentianæ, & mali terre (quam aristolochiam Græci nominant): radix item bryoniæ, hoc est, vitis albæ, & dracontij seu dracunculi, præsertim maioris, qui serpentaria officinis, & Romanis veteribus columbrina nuncupatur. Sed imprimis huic negotio accommodata sunt frustra spongiæ contorta & valide compressa. Ex ijs igitur fiant collyria siue penicilla (quas tentas vocant) altera quidem parte tenuia, altera paulò pleniora. Atque ea parte qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed hilo semper appendice, vt tutius, si altius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Dimittantur autem horis duodecim, aut certè plus, aut minus, donec scilicet latè satis dehiscat fistula. Cæterum officio fistulæ, atque eius sinu, sufficienter dilatatis, ipsius destructio, prorsus molienda est. 30

Id autem trifariam fieri consuevit. Nempe vel medicamentis acrioribus, & callum exterentibus, vel incisione sinus, & vstione: vel incisione citra vstionem, cum calli euulsione. Ergo si recens fuerit fistula, aut non adeò multum antiquata, nec etiam admodum profunda aut flexuosa, & chirurgiam, hoc est, sectionem & vstionem, prorsus recuset æger, medicamenta callum exterentia adhibebimus. Deindè remoto callo ad curationem reliquis vlceribus communem vertemur. Itaque callos elidunt atque excindunt, quæ ex Galeno, Paulo, Aëtio, Cornelio Celso, & alijs retentionibus chirurgis subiungam. 40

Spondylii

Epulotica

Sarcoctica

*Sinus fistulae
ampliatio.*

*Fistulae
destructio seu
mortificatio.*

*Trifariam
fistulae
destruitur.*

- Spondylii radix circumrasa, & fistulis imposita, earum callos eximit. Item veratrum nigrum, duobus tribusve diebus inferum idem præstat. Adhæc amurca cocta, & in collutionem adhibita. At idem elaterium, id est, succum cucumeris agrestis, seu (ut vocant) asinini, terebinthina exceptum in collyria cogito, impositoque: vel laser pitij radice succum infundito. Id quod sequitur etiam callos consumit Paulo Aeginetæ. Aeruginis drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excepta aceto in longum inducuntur, & fiunt penicilla. Hoc medicamentum
- 10 expeditissimum atque ex primis esse ad callos eximendos, ex præcepto Megetis, nobis testatur reliquit Aurelius Cornelius Celsus. Verùm exemplaria omnia eo loci corrupta sunt. Pro drachmis enim duodecim, habent tantum denarios duos. Plurima eius generis collyria, hoc est, fistulis callos extertia, à modo nominatis autoribus describuntur, ex quibus quisque, quæ suo proposito magis conducere videbuntur, poterit deligere, & in usum assumere. In cōmuni autē vñ apud recentiores chirurgo sunt collyria siue penicilla ex trochiscis asphodelorum, quorum descriptionem habes in antidotario. Item ex calce & sapo-
- 20 ne. Adhæc, quæ auripigmento, hoc est, arsenico illinuntur penicilla, neminem vnquam fecerunt, ut præter quotidianam experientiam recentiorum ferè omnium scripta testantur. At verò si fistulæ multos & valde anfractuosos altosque cuniculos habeant, ita ut in eos collyria eiusmodi, prout res exigit, indè non possint, eadem ex aceto aut liquore aliquo ad rem accommodo per auricularium clysterem intro infundenda sunt, ut scilicet per omnes multiplicis ipsius fistulæ anfractus perferantur. Mirificè prodest in antiquis fistulis, & admodum callosis sequens iniection. Vnguenti Aegyptiaci semuncia, sublimati drachma dimidia, lixiui vnciæ quatuor, aquæ rosarum vnciæ duæ, arsenici scrup. i. aquæ plantaginis vnciæ quatuor, bulliant vsque ad consumptionem tertii partis. Iniectione medicamento, fistulosi viceris os, linamento concepto (ut de sinibus dictum est) aut quouis alio claudendum est, ne id resiliat. Nisi enim aliquandiu maneat, nullum effectum effatu dignum præstare poterit. Si autem duplices aut multiplices eiusmodi fistulæ, breues, intraque carnem sint, eadem etiam medicamenta quæ callos elidunt, arida in calamus scriptorium conijci possunt: Calamus igitur ori fistulæ aptandus est, postea in eum insufflare oportet, ut ea medicamen-
- 40 ta intus compellatur. Si quando vero longior (inquit Celsus)

*Callos extertia.**Loc⁹ in Cor. Cel. emendat.**Trochisci asphodelorum. Arsenicum.**Ad antiquas et valde callosas fistulas*

Si fistula longior et transuersa sit.

Aqua Alchymistarum. Secundus modus abolendi fistulas.

& transuersa fistula est, demisso specillo, contra principium huius incidi commodissimum est, & collyrium vtrinque demitti. Aqua fortis Alchymistarum saltem prima in eiusmodi tortuosis, atq; labyrinthi modo flexuosis fistulis, mirifice prodest. Hæc enim (inquit Guido ex sententia Arnaldi à villa noua) omnes fistulas mortificat, & dirumpit. Secundus modus abolendi fistulas est, qui primum per incisionem totius cavitatis fit, deinde per adustionem, quæ vel caustico medicamento, vel ferro candenti & ignito inducitur. Cæterum quæ in magnas arterias, vel neruos, vel tendines notatu dignos, aut membranam costas succingentem, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequaquam (vt supra diximus) vel certe cum multa artificiosaq; diligentia, ac prudentia attingendæ sunt. Reliquis verò hunc in modum manum admolieremur. Primum quidem tentabimus, an rectæ sint vel obliquæ, demisso intro (vt paulo antè monuimus) specillo, vel cerea candela. In quibus autem duæ pluresve ore habentur, quæ specillo aut consimili instrumento tentari minimè possint, ita notantur. Clystere in sinum per vnum os liquore compellimus, exque transitu eius in reliqua ora, facile deprehendimus, vnane, quæ multas oras habeat, an multæ fistulæ sint. His ita exploratis, si in summo fuerit sinus, atque is angustus, specillo demisso explicandus est, supraque id accommodata figura, scalpello incidendus. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemq; faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, diuiso vlceri imponenda sunt penicilla, oui candido liquore imbuta, quæ labra solutæ continuitatis distendant, & inuicè coire non sinant. Postera die locus adurendus erit, vel ferro candente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamento, nempe vel puluere asphodelorū, vel arsenico, aut alio consimili, quod facultatis sit causticæ siue vrentis. Auicennas hydrargyrum, id est, argentum viuum sublimatum admouet, quo efficitur, vt nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique quod præternaturam sit, in vlcere remaneat, quod non omnino deficiatur, elidatur, & absumatur. At si non summa occupauerint fistulæ, & sub cute non transuersæ ferantur, sed rectæ intro tendant, vbi quàm profundissimè potest, & quatenus licet, incisus fuerit sinus, orbicularim totum callum, modò qui nuper dictus est, si fieri possit, auferemus. Quod si aliquid ex eo relictum fuerit, adurente id medicamento absumemus. Si autem

Argentum viuum sublimatum.

Si fistula sub cute intro tendant.

multum

multum fit, quod ex callo remansit, nec medicamento cedat, can-
dentibus ferramentis adurendum est. Cæterum superponenda
sunt, atq; in circuitu semper admouenda quæ refrigerent, & re-
priant. Nam ferè quæ circa fistulam sunt (vt Celsus ait) aliquid
habent inflammationis. Signum autem, quo dignoscimus me-
dicamentum acre atque adurens, suum effectum, quod satis est,
induxisse, est, vlcis elatio siue tumefactio, ac trium dierum
mora, vt communis vsus habet. Itaque adusta, & vt oportet re-
ficcata fistula, mitigatorio aliquo medicamento primis diebus
vritur, vt oleo cum oui luteo mixto. Deinde ea quæ crustas, fer-
ro ignito aut adurente medicamento inductas resoluit, ac deij-
ciunt, admoueto: cuiusmodi est, buryrum, aut aliquod aliud si-
mile, pingue ac vntuosum. Aquorum vsu non prius desistito,
quàm cruitæ deciderint, & in pus conuersæ fuerint. Mortifica-
tæ autem fistulæ euidens argumentum est, cum pus quod antè
multum, & crudū appa ruerat, nunc paucum, & coctum visitur.

*Quid post
adustionem
& resicca-
tionem fistu-
le agendum
sit.*

*Mortificata
fistule signū*

Tertius modus abolendi fistulas est, qui per incisionem fit, si-
ne cauterio, vel actuali (vt vocant) vel potentiali. Itaque facta
quemadmodū antè proditum est, incisione vsque ad fines,
seu fundū ipsius fistulæ, callus totus vel vnguibus, vel acie scal-
pri, vel cultro rasorio, id est, nouacula detrahi debet, ita vt lo-
cus, seu sinus ipse purus, & ab omni sorde mundus appareat,
quod viuz ac probæ carnis præsentia deprehenditur, vt docuit
Alicennas. Et hæc vera est fistulæ curatio, quam statim, si ni-
hil obfuerit, aggredi debemus, quoties fistula nobis sananda
& abolenda proponitur. Cæterum dilataa fistula, atque in to-
tum abolita, detergentibus, si quæ sordes adhuc supersit, &
sarcoticis, siue incarnantibus medicamentis vt nos oportebit:

*Tertius mo-
dus abolen-
di fistulas.*

*Vera fistulæ
curatio.*

qui postremi duo scopi erant in sanandis fistulis propoliti. Er-
go callo fistulæ eliso, atque absumptō si sordes aliqua subsit,
mulso, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic quoq; mel-
lis paulum adiciatur, locum abluito, vel sequenti medicamento
repurgandis fistulis, post remotum callum longè accommoda-
tissimo, vritur. Terebinthine in aqua vitæ ablutz vnc. tres, suc-
ci apij, succi cynoglossi quod Romani linguā canis appellant
singulorū drach. tex, mellis rosacci colati seu iunoniam, aristo-
lochiæ rotundæ drachmas duas, farinæ lupinorum semun-
ciam, coquantur succi & terebinthina cum melle rosaceo, viq;
ad consumptionē medietatis succorum, deinde reliqua commi-
scentur. Si prædicto medicamento absterforio, myrtæ, sar-

Deterfio.

*Medicame-
tum fistulas
repurgans,
ac detergens.*

cocollæ,

Carnis gene cocollæ, radice Peucedani aridæ, & iridis, singulorum momen
ratio. tum adieceris, optimum incarnans medicamentum effeceris,
Lib. I4. modo ex eo turunda illinatur. Aliud Aëtij Amideni experi-
Medicamen mento probatum, callum exterens & incarnans. Radicum lilio »
tum callum rum crematarum cinere fistulam repleto, & callus excidet, quo »
exterens, & ablato similicem herbam sumito, arundinibus se implicantem, »
incarnans. flore candido, folijs hortensi phaselo similibus: qua arefacta, »
Aliud fistu vsta, & trita, fistulam replebis, & incarnabitur. Aliud aridum Ma »
las incar gistriani ab eodem relatum, fistulas incarnans. Chamæleontis »
nans. nigri radicem, pini corticem, thus masculum, aristolochiam lon ro
Medicamen gam pari pondere terito, fistulæque multa ablutæ aridum ap- »
tum ad fistu plicato. Sequens quoque collyrium, à quodam chirurgo nostri »
las longe op temporis usurpatum, fistulam agglutinat, insigniter desiccat, &
timum. affectæ parti robur addit. Aquæ vitæ vnc. duas, vini maluatici
 vnc. vnam, mellis rosacei drachmas decem, myrrhæ, radice peu-
 cedani tritæ, vtriusque drach. duas, sarcocollæ, aloës hepaticæ,
 vtriusque sesquidrachmam, id est, drach. vnam & semissem mi-
 sceantur, deinde bulliant omnia ad ignem moderatum vnico
 feruore, & per oricularium clysterem, quam syringam vocant,
 inijciantur in fistulam. Aliud ad fistulas, vsque ad os attingen- 20
Aliud tes, ex Aëtio. Squammæ æris, æruginis ammoniaci thymia-
Aëtij. matis, portiones æquas, ex aceto terito, & pastillum, id est,
 trochiscum conftrato. Deinde collyria, hoc est, turundas, fistu-
 læ æqualia formato, & imposito. Quomodo autem osi vi-
 tiato & corrupto medendum sit, in præcedentibus diximus.
 Hæc igitur de fistulis dicta sufficiant: superest vt de cancro vl-
 cerato dicamus.

De cancro exulcerato.

CAP. XIX.

C Ancrorum (vt in tractatu de tumoribus præter natu- 30
 ram diximus) alij cum exulceratione, alij citra vlcus
 fatigant. Ac de his quidē qui sine vlcere molestant (quos
 Hippocrates latentes nominauit) abundē à nobis su-
 præ dictum est. Itaque præsens locus postulat, vt de ijs differa-
 mus, qui exulcerati sunt, & adeo laborantes affligunt, vt inter-
 dum illis manum admolari (ægris etiam vitro id efflagitantibus)
 cogamur. Cæterum quibus locis maximè accidant can-
 cri tam vicerati, quàm non vicerati, ex quo humore potissimum
 gignantur, & à quibus causis excitentur, quibus notis deprehen-
 dantur, qui ex illis curationem recipiant, & qui non, atque in 40
 totum

- totum quid de illis presagendum sit, fuffissimè à nobis explicatum est, ubi de cancerosis tumoribus, qui citra vlcus inuadunt, egimus. Reliquum est igitur, vt compendiosam exulcerati ipsius cancri curationem deicribamus. Sed priusquàm id agamus, non alienum fuerit, eius notas in memoriam reuocare. Itaque in cancro vlcerato, præter dolorem, duritiem, tumoremque, vlcera crofa, ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris prætumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum coluic ingrata. Quæ verò (inquit Paulus) pura videntur, fo-
- 20 culenta, linida, atque interdum etiam subrubra, & cruenta apparent: sanies inde manat cōtinuò, tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, grauiter olens. Ergo si eiusmodi affectus chirurgiam, hoc est manus operam desiderat à vacuatione humoris melancholici curatio auspiciāda est. Deinde totum carcinōma, si locus patiatur, prorsus rescindendum, sic vt nulla supersit radix, sinemusq; sanguinem effluere, nec statim eum inhibebimus. Imò presis vicinis partibus crassum ac melancholicum sanguinē exprimemus. Postea alijs vlceribus similiter curabimus. Hæc curandi ratio tradita & probata est lib. 14. metho. Therapeu. Cuius verba hoc
- 30 loco subijcere placuit. Cæterum (inquit) si quando cancerum "per chirurgiam curare audebis, corpisse quidem ab vacuando "per purgationem melancholico humore oportebit: ubi verò totum quod vniatum est prorsus excideris, sic vt nulla supersit radix, sinēs effluere sanguinem, nec propere eum inhibebis: imò premendo potius vicinas partes, exprimes ex his crassiorem sanguinem. Mox alijs vlceribus similiter curabis. Hactenus Galenus. Sunt qui excisio carcinōmate, & crassiore sanguine ex circumstantibus partibus expresso, ferramenti igni flagrantibus locum adurunt. Alij cum partem aliquam corporis carcinōma eiusmodi modi, quod cum vlcere est occupauit, hoc (si locus non refragetur) circumcidi opus esse tradunt, dein viuotenus aduri, tritasq; cantharides ex alumine & cyprino oleo superponi. Alij verò à sectione, & vitione quæ fit ignito ferramento abstinentes, corrosione valida ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc totum extirpant, & destruunt. Porro medicamenta eiusmodi si quando adhibenda sunt, valentis admodum facultatis esse debent. Nam, vt scribit Hippocra. extremis morbis, extrema remedia adhibenda sunt. Tanta autē est huius viti, malignitas, vt minora planè contemnat remedia. Inter cætera autē
- 40 præstantissimum ac tutissimū auxilium in hoc affectu Guidoni

Signa cancri vlcerati.

Ratio curandi cancri exulcerati. Vacuatio. Excisio.

Vide Pauli lib. 6.

Vitio.

Cantharides.

Corrosio.

Carcinoma viciosa contemnit remedia.

*Arsenicum
sublimatū.*

à Cauliaco prædicatur, arsenicum sublimatum, cuius egregias dotes, suprà iam multoties commemorauimus, & in sequentibus adhuc celebrabimus. Hoc (inquit Theodoricus) cancrum, lupum, esthiomenum [hoc est spacelum, seu siderationem:] noli me tangere, fistulam, & omnes tales pessimos morbos, prima die occidit, & extirpat. Cæterum magna locorum circumstantiū, interim dum admonetur, cura semper habenda est, ne scilicet ea ipsa inflammatione, atque humorum confluxu, occupentur. Quod incommodum facillè deuitabis, si partes illas vicinas, & carcinoma cingentes, bolo armenia & id genus alijs, illeueris. 10 Sed & modo legitimo, seu iusta quantitate (quam coniectura tantum artificiali rationalis definit medicus) adhibendum est, arthenicum ipsum siue arsenicum (ut vocant) sublimatum. Vbi autem effectum quem desideras, præstiterit (quod ex loci inflammatione siue tumore, & mora triduana, deprehendes) dolor mitigandus erit, & crustæ castus, modò, quo suprà docuimus procurandus. Cancro verò sic penitus extincto, ac radicitus extirpato, vlcus ipsum quod remansit, similiter alijs cauis vlceribus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnosces, si proba 20 & sana caro apparuerit, si & nulla virulenta proliuies, se in parte affecta ostenderit, nullaque amplius graucolentia, eorum qui proximè astant, nares offenderit. Cæterum soli illi cancri etiam cum vlcere consistentes, curationem eiusmodi, quæ vltione vel sectione fit, admittunt, qui in summa corporis parte hærent, quique adeo laborantes fatigant, ut ipsi vltro (inquit Galenus) chirurgi manum efflagitent, & simul in talibus partibus consistant, quas refecare & exurere vnà cum radicibus possis. Sed cum hæc curandi ratio, non sine graui ægrotantis periculo (ut suprà de cancro non vlcerato monuimus) administrari, possit, temerè adhuc in talibus adhibenda non est. Itaque si in penitio 30 ribus corporis partibus, constituti sunt cancri istiusmodi, aut in talibus quidem consistant, quas nec adurere, nec excindere vnà cum radicibus possit, vel si loca principibus membris vicina occupent, vel laborans ob virium imbecillitatem tale curationis genus sustinere non possit, aut forsan (quia nimis timidus sit & pusillanimis) extrema hæc remedia subire non velit, adhuc si ex hac curandi ratione detentus aliquod malum sequeretur: breuiter si periculum ex chirurgia, id est, sectione aut vltione, timeamus, nec curari affectus aliter possit, sat fecerimus, si hunc augeri prohibeamus, proba imprimis victus ratione, & com- 40 modis

*Legitimi
effectus arse-
nici nota.*

*Extincti car-
cinomatis
nota.*

*Qui nam cà
eri vlcerasi
vltionem,
aut sectionē
desiderent.*

*Quibus can-
cro dunta-
xat ad blan-
diendū, vera
curatione
omissa.*

- modis vacationibus, solisque leuibus & quasi adblandientibus medicamentis vtentes: à vehementibus verò, & acribus (quibus malum hoc veluti crabro irritatur, & excandescit) prorsus abstinentes. Ergo imperanda ægris talis victus ratio est, quæ tenuis sit, bonumque & minimè melancholicum succum generet. Quòd si obiecoris caliditatem & siccitatem excedentem prohiberi non possit, quin crassius & melancholicus in corpore sanguis procreetur, cibis refrigerantibus & humectantibus erit vtendum, quibus hepatis intemperies paulatim emendetur. Conueniunt itaque in hoc affectu prisanæ cremor, lactisque serum, vinum paucissimum: & aquosum, pisces saxatiles, atque omnis generis aues, præterquam palustres. Ex oleribus malua, atriplex, blitum, cucurbita, atque id genus alia. Acrum esus, & repletio omnis vitanda. Sed & crassior ille succus qui in venis colligitur, ex intervallo vacuandus erit, interdum purgante medicamento, interdum (nisi quid prohibear) venæ sectione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per ætatem, menses euocandi, atque etiam in viris hæmorrhoides (si eas pati consueuerunt) proritanda. Loco autem affecto imponenda remedia sunt, quæ dolorem leniant, & ita ipsum firmare possint, vt nihil redundantia humorum amplius excipiat: quæ item refrigerent & exiccant, minimè verò mordeant aut irritent. Cuiusmodi sunt solani succus, vel aqua destillata, cum succi copia non est, plumbum vstum & elotum, vnguentum album, vnguentum ex lithargyro & plumbi vsto, item medicamentum quod ex pompholyge, vel chalcire constat, aut alijs id genus metallicis vstis & elotis. Aquæ etiam (vt vocant) camphorata, similiter & succi in mortario plumbeo ducti, huic vitio efficacissimè admoventur. Laminæ quoque plumbeæ maximo & pene incredibili usu canceris ipsis exulceratis superinducuntur. Modus autem vsus succi solani (quod medicamentum eiusmodi affectibus vtilissimum esse scribit Galenus) talis esto. Solani succo linteam molle duplicatum imbuito, & loco affecto imposito. Extrinsecus lanam molliusculam eodem succo madentem linteo circumdato, atque hæc, ne siccescant, eo succo subindè irrigato. Hoc remedium loco dolenti inductum sine dolore ac molestia (inquit Paulus) exulceratis canceris subuenit. Plurima medicamenta composita à Galeno, Paulo, Celso, & Aëtio, ad hunc usum conscripta sunt, ex quibus duo hæc selegimus. Argenti spumam, & cerusam in plumbea pila, cum oleo rosacco in sole tantisper conterito, dum plumbi colo-

Victus ratio in cancro vicerato observanda.

Succus melancholicus ex intervallo vacuandus.

Quæ loco affecto imponenda.

Succus solani.

Lamina plumbæ.

Modus vsus succi solani.

Vnguentum ad cancras vlceros. colore, vnguentum quod ex his fit, acquisuerit. Aliud quod magnoperè probo, recipit plumbi vsti & eloti, pompholygis, thuris, singulorum vnc. quinque, absinthij vnc. vnam, olei rosacei selibram, id est, libram semis: cere fescunciam, id est, vnc. vnā semis, succi solani quod sufficit ad vnguenti crassitudinem. Insigniter autem leniunt, solanturque plurimum in ipsis exacerbationibus, & cruciatus tempore malua, aut althea (quam bismaluā appellant) in mulso subacta liquefactæ, & rosacei paululo leuigata, instarque cataplasmatiss illita. Adhæc cataplasma ex ficibus aridis, meliloto, quam Latini fertulam campanam vocant, rura, thure, buniade herba, id est napo, diligenter cum oleo confusa. Lenit item cataplasma quod constat palmularum dactylis in passo decoctis, quibus adiecta sint ouorum lutea, polentaque. Adhæc quod ex papauere cum coriano factum est, aut polygono, aut feri, hoc est, cichorio: hæc quidem in doloribus vsum sunt. Multi (inquit Guido) mitigant eius fraudulentiam & lupacitatem, (ita enim loquitur) cum pecia scarlati, & appositione carniū gallinarum. Hinc vitium hoc ideo lupum appellari vulgus putat, quoniam carnes vnus gallinæ si apponantur, quotidie ferè absumit & deuorat. Quod si forsitan eiusmodi gallinacæ carnes vel similes illi pro pabulo non offerrentur, carnes sibi proximas, ceu lupus quidam famelicus, ad eandem quantitatem depasceret & exederet. Quidam huic malo veluti adblandiuntur, admoto puluere stercoreis humani, & anethi igne concrematorum. Item appositis quibusdam herbis vt scabiosa, trifolio, verbasco id est, tapso barbato, & herba robertiana nuncupata, quæ quibusdam myrrhis Dioscoridis esse putatur. Cæterum vtrunque res habeat, commemorata nuper remedia, (quoniam ferè temperata sunt) si magnoperè non profuerint, nocere saltem non possunt.

Herba Roberti.

Cancer vlcera, cur quibusdam Lupus appellatur.

Generalis diuifio Fra-

CTV R A R V M, IN LIB.

IIII. INSTITVTIONVM CHI-

RURGICARVM, IOANNIS TA-

GAULTII MEDICI.

10 Fracturæ, quæ Græcis *κᾶταγμα* dicitur, differentiæ.

Simplices.

Compositæ.

Simplices fracturæ differentiæ, plures sunt. Aliæ enim fiunt

- | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|-------------------|
| καυλιδόμ | } id est, ad | Caulium | } fracturæ speciem | |
| ραφανιδόμ | | Raphani | | ac similitudinem, |
| εικυιδόμ | | Cucumerum | | per transversum. |
| σχιδαιιδόμ | } id est | Quasi asseris modo, | } per longitudinem. | |
| 20 Eis ὀνυχᾶ | | In unguis formam. | | |
| αλφιδόμ | } Id est, ad similitudinem farinae, vel pollinis, quando scilicet os in multas tenues partes confringitur. | | | |
| καλὰ ἀπόθραυσιν | | } Id est, iuxta abruptionem fit cum pars ossis per superficiem abruptionem detrahatur, ac recedit | | |

Compositæ fracturarum differentia, seu potius implexus cum alijs morbis & symptomatis.

- 30 Fractura cum vulnere.
 Fractura cum inflammatione.
 Fractura cum gangræna.
 Fractura cum dolore.
 Fractura cum pruritu.
 Fractura cum fragmento ossis eminente.
 Fractura cum contusione.
 Fractura malè ferruminata.
 Fractura cum callo nimium excrecente.
 Fractura cum nimia calli siccitate, & duritie,
 40 Fractura cum superflua calli humiditate.

Sunt

Sunt & aliæ fracturarum differentię Albucasi,
& recentioribus chirurgis, à locis in quibus con-
sistunt defumptæ, quæ tamen propriè differen-
tiæ dici non debent, vt,

Fractura in caluaria.

Fractura in maxillis.

Fractura in naribus.

Fractura in clauiculis.

Fractura in spina dorsi.

Fractura in costis.

Fractura in scapulis.

Fractura in humero.

Fractura in brachio, id est, cubito & radio.

Fractura in femore.

Fractura in crure siue tibia.

Fractura in patella seu rotula genu.

Fractura in digitis, tum pedum tum manuum.

Institutionum Chirur

GICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER QVARTVS,

De fracturis.

10

Quid fractura, & quæ sint eius differentie.

CAP. I.



Vandoquidem tribus libris superioribus, de vitijis chirurgiæ subiectis, quæ carnosæ & mollioribus corporis partibus accidunt, abundè satis dictum est, ordo iam postulat, vt de alijs quæ ossibus contingunt, hoc est, fracturis & luxationibus, differamus: hæc enim Chirurgiæ generi etiam subijciuntur. Ac primùm quidem de fracturis

20 agemus, quas etiam Hippocrates luxationibus anteposuit. Est igitur fractura, vt in vniuersum dicatur, vnitionis, siue continuitatis solutio quæcunque in osse, quam Græci proprio nomine & omnibus suæ gentis hominibus noto, *catagma* vocant vt Galenus sexto methodi medendi, & alijs plerisque locis testatur reliquit. Paulo verò Aeginetæ, atque alijs posterioris medicinæ Graiis scriptoribus fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, discissio, à violentia quadam extrinsecus irruente accidens. Guido à Cauliaco, & alii quidam ætatis illius medici, fracturam definiunt, continuitatis solutionem in osse, non à

*Fractura
quid
καταγμα.*

Paulus.

*Guido à
Cauliaco.*

30 qualibet re factam, sed ab ea tantum, quæ contundit. Vt vera sit (inquit) prima differentia solutionis ossis, quod quædam est incisa, quædam contusa, ossium enim diuisionem quæ incisione fit, non fracturam, sed ossis vulnus appellant. Cæterum plures fracturarum eiusmodi differentiæ sunt: aliæ namque simplices sunt, aliæ compositæ. Ex simplicibus quidem aliæ sunt, quæ fracturæ ossis partes iam prorsus separarunt, easque cauledon, raphanidon, atque etiam *sicydon* factas Græcè dicunt, hoc est ad caulium, raphani & cucumerum fracturæ speciem ac similitudinem. Manifestum autè est eiusmodi ossium diuisio-

*Simplices
fractura
differentie.*

40 nem tranuersum per crassitudinem fieri. Hæc quibusdam virgalis

Fractura schidacidon facta. galis & transversalis nominatur. Aliæ verò sunt schidacidon, quasi asseris modo: hæc autem per longitudinem magis fiunt, dicunturque oblongæ ossis fissuræ. In ijs non omnino separantur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem finduntur. Præter has aliæ quædam adhuc simplices numerantur

Alia fracturæ rarè differētia. fracturæ differentiarum, quarum aliæ Græcis dicuntur fieri, ut *ἰσχυρά*, id est, ad instar vnguis, aliæ *αλφιδιδον*, id est, ad farinæ vel pollinis similitudinem. Aliæ *κατὰ ἀπόθραυσιν*, id est, iuxta refractionem, seu (ut alij interpretantur) adruptionem. Fractura quæ *ἰσχυρά*, id est, in vnguis formâ fit, fissura est ossis, quæ

Fractura vngularis. cum aliqua in parte recta sit, in extremo tamen lenata euadit. Atque hæc etiam calamidon, id est, harundinatum ab aliquibus nuncupatur. Alphitidon ad similitudinē farinæ vel pollinis dicta, est cum os in multas tenues partes cōstringitur, quæ & ipsa caryedon, id est, nucatum, à quibusdā vocatur. Apothrausis, quæ

Fractura alphiidon facta. & apocope dicitur, id est, abscissio seu præcisio, est cum pars ossis per summitatis rupturâ, seu superficiei adruptionē detrahitur, ita ut pars ea quæ detracta est, & recessit, super emineat, ut ferè fit cū squamula ab osse resoluitur. Cæterum hæc fracturarum differentiarum curiosè nimis (ut Galenus inquit) atque ambitiosè à medicis Hippocrate iunioribus, ijs proprijs nominibus interpretatæ sunt. Nō contenti enim fuerunt oratione, os quod varie seu multifariâ sit fractum, explicasse. Ab huiusmodi autē appellationibus, omninò abstinuit Hippocrates, sed quoad fieri licuit, vtitissimis vtens nominibus, orationē interpretari non est grauatus, non has modò fracturarum differentias, verū etiam quæ in capitis ossibus eueniūt. Breuiter duo potissimæ sunt fracturarum differentiarum simplices Galeno, à quibus curandi indicationes sumuntur, nempe quæ per transversum, & quæ per longitudinē facta est. Cornelius Celsus tertiâ addidit, quæ scilicet obliquè fit. Omne (inquit) os, modò rectum ut lignū in longitudinē finditur, modò frangitur transversum, interdū obliquum.

Dua sunt potissima fracturarum differentia simplices.

Composita fractura differentia.

Cæterū ossis fracturæ, nōnunquā carnis quoque; vulnus accedit, sed potissimū cum ossa multifariâ fracta sunt, sæpe etiā dolor ingens, & interdū inflammatio. Contingit etiā aliquādo ut aliud os super aliud efferatur, & ex osse malè ferruminato ac commisso, veluti tophaceus aliquis nodus relinquatur. Horū autem affectuū & symptomatū cū ossium cōiunctatis solutione complexus, cōpositas fracturæ differentias, iuniores medici vocauerunt, enim tamen propriæ differentie nō sunt. Quandoquidem

dem quod scorsum & per se consistere potest (vt alibi ex Gale-
no diximus) nunquam alterius erit differentia. Vulnus autē, do-
lor inflammatio, & id genus alia scorsum, & per se consistere
possunt. Proinde veræ fracturarum differentia, & à propria
ipsarum natura desumptæ, nec reuēta sunt, nec rectè dici pos-
sunt. Quod si quæ à loco quoque, seu parte in qua est fractura,
differentias censeas, veluti si nares, aures, maxillæ, costæ, clani-
cule, caluaria, spina dorsi humeri, brachia, femora, crura, digiti,
fracturam patiuntur, fuerint profectò & ipsæ fracturarū diffe-
rentiæ Albucasi non vtiq; à propria ipsarum natura, sicuti ne-
que præcedentes, desumptæ, sed à locis, in quibus consistunt.
Verum enimuero quoniam ab ijs omnibus iuprà commemo-
ratis agendorum sumuntur indicationes, donemus eas cum re-
centioribus medicis & chirurgis differentias appellari.

*De causis, signis, & iudicijs fractu-
re in vniuersum.*

CAPVT II.

20

Causæ fracturarū internæ nullæ sunt, externæ verò ea *Causæ*
omnia, vt breuiter dicam, quæ contundere, vel diuide-
re ossa possunt. Quæ contundunt, ea dura grauiorq; &
mole non exigua sint oportet, vehemētiq; impetu
deferri ac irruere. Ossa diuidunt quæ vulnerādo incidunt: item
casus ab alto, præsertim si ossa sicciora sint, nec admodum
crassa. Fractura quoque ossibus interdum accidit ex circuntor-
tione in luctantibus, vt si tibia siue crus Dioclis, cruri aduersa-
rij Socratis cum eo luctantis per transuersum supposita sit, ita
30 vt vtraque eius capita, & iuxta pedem, & iuxta genu deorsum
vehementer deprimantur, os proculdubio tibie ipsius Dioclis,
præsertim si infirmum sit naturā, hoc luctationis genere me-
dium disrumpetur, seu si manus frangetur. Id quod in lignis
quoque, quæ à nobis ipsis circuntorquentur, videre licet. Si e-
nim lignum aliquod neque magnum neque validum, sed par-
uum & imbecillū supra femur tuū impositum, ex utroq; capite
deorsum vehemēter manibus vrgeas, statim id in media parte
frangi aspicias. Signa aut ossis fracti, & præsertim per transuer-
sum, atq; in artubus, hæc ferè sunt. Tactu ossis partes dissi-
40 nite separatae ac variæ reperiuntur, membri figura inæqualis
percipitur.

Signa

Iudicia.

*Per cancrōs
hic gangra-
nā et sphace-
lū intellexit
sicuti & a-
lijs quibus-
dam locis.*

percipitur: dum membrum dimouetur, & manu, variè tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars afflicta, contacta dolet, corpus membro fracto haudquaquā inniti potest: causæ quæ frangunt, aut contundunt, præcesserunt. In ossē verò quod per longitudinem fractū est, substantiæ eius crassities non naturalis tactu percipitur, cætera signa non adsunt, præterquā quòd dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenduntur. Prognostica. Ossā minimè periculose media franguntur in humeris, brachijs, femoribus, cruribus, & digitis. Quò autem propior fractura capiti vel 10
superiori, vel inferiori ipsius ossis, est, eo peior iudicatur. Nam & maiores dolores adfert, & difficilior curatur. Ea itidem quæ in artuum vicinia est, curatu difficilis est, vel eo potissimum no-
mine, quòd commodè ligari non possit. Atque hæc ut plurimū motum relinquit difficile. Maximè tolerabilis est, simplex trāsuerſa, peior ubi fragmenta, atque ubi obliqua. Pessima ubi eadem acuta. Nam & carnem vulnerant, interdum neruum quoque aut muscūlum. Fractura quæ cum dolore vel inflammatio-
ne, aut carnis contusione incidit, mala est. Quippe quæ instaurari non possit, donec ea prius curationem receperint. Si ossis 20
fracturæ, carnis quoque nullus accessit, in malo etiam æger est, maximeque si id musculi femoris, aut humeri senserunt. Nam & inflammationes multo grauiore, & (ut inquit Celsus) prom-
ptiores cancrōs habent. Adde quòd in eiusmodi fractura, neque ferulis neque canalibus (inter quæ vulnus sanescere non potest) uti possumus. Sed nec primis fascijs, quas Hippocrates *inrodes-
quidias*, id est, subligamina vocat, vulnus contegendum esse vo-
lunt, tum huius ætatis chirurgi, tum qui seculo Hippocratis fracturas curabant. Itaque vlcere non deligato, hinc & inde, hoc
est vtrinque ab eo fascijs circumiectis quā vlcus est, fenestellam 30
relinquunt, per quam medicamenta vulnere accommoda imponant. Quem deligandi modum damnar ille medicorū princeps & antesignamus Hipp. libro quem de fracturis inscripsit, eumque
lemmatis ac rationibus non absurdis quidem, aut probabilibus tantū, sed sciētificis quoque & necessarijs, inutile, erroneum, prauūque esse conuincit ac demonstrat. Si brachiū aut crus
fractum est, bonum est alterum saltem os integrum manere. Altero nanque ossē integro manente, necesse est neruos ac tendi-
nes minus contrahi, quippe qui ab integro ipso ossē & non cō-
minuto adhuc intenduntur. Adde quòd curiosius omnia in cō- 40
tinendis

*Loc^{us} in Cor.
Celfo, aut
falsus, aut
manus,*

tinendis ossibus fieri debent, vbi vtrunque os fractum est, & neutrum alteri auxilio est. Itaq; si alterum os integrum manet, plus opis in eo, quàm in falsijs ferulisque est. Cor. Celsus memorie tradidit ignorari minimè oportere, si femur perfractū est fieri breuius, quia nunquàm, inquit, in antiquum statum reuer-
titur, summisq; digitis postea cruris eius insisti. Quod equidem à ratione, & experientia, ab ipsiusq; Hippocratis sententia prorsus est alienum. Non enim quoties femur frangitur, protinus necessario ipsum breuius efficitur. Sed duntaxat si statim quàm
10 fractum est, minus quàm par sit, à chirurgo distentum fuerit, vel tortuose distractum, & separata ac distantes inter se ossis con-
fracti partes, non rectè atq; admodum, priusquàm ferrumen impleat, coaptatę extiterint. Tūc enim & breuius femur reddetur, & crure eius partis claudicabit homo. Sic autē de hac re lib. de fracturis scripsit Hipp. At verò si femoris os fractū sit, extensio imprimis diligenter facienda est, ne minus q̄ debeat efficiatur. Amplior enim si sit, nullam læsionem affert. Verum quoq; est, vt in eodē opere idem testatur Hipp. quòd quibuscunq; vtraq; vel
ribæ vel cubiti effracta ossa fuerint, illa breuiora effici. Quòd
20 sanè intelligendū est, nempe vt Gal. interpretatur, nisi ante con-
formationem extensio debita adhibeatur, & commoda deliga-
tione ossium coaptatio seruetur, quoad callus obducatur; runc enim non solum in maiorem tumorem, quàm naturaliter con-
ueniat, membrum illis attollitur, verumetiam breuius propter retractos musculos efficitur. Sed hæc præfagia particularia sunt. Porro in quadrupedibus, præsertim veterinarijs, non omninò
eadem est de fractis præfagiendi ratio, quæ in hominibus. Nam
si quadrupes pedis posterioris radium fregerit, præsertim mulus
aut asinusq; quòd medulla careant, quamuis sanguinis compo-
30 tes sunt, nunquàm solidescit. Quæ supra genua fracturam sen-
serunt, vt deplorata non continget. Siquidem ea nunquàm fer-
ruminantur. Si femur fractum sit, in periculum venit, spesq; sa-
lutis in angusto est. Fractis armis, nullus medicinæ locus. Nam
nervorum distensio sequitur, quæ caput scapulis annectat. Vix
vnuquàm sanitas contingit, si fracturæ vulnus aut luxatio con-
iuncta sit. Si verò costa perfringatur, facilis medendi ratio est.
Fracturæ quæ calloso ferrumine coaluit, nūquàm vrens medi-
camentum admouebis: quandoquidem eo callus ille tophaceus
resolvitur, nec vllam ferè medicinam sentit. Hæc & quædam
40 alia de fracturis veterinorum, Hierocles & Apſyrus veterina-
rij me-

*Prognostica
quædam de
fractura in
veterinis.*

rij medici, nobis scripto reliquerunt. Fractura siue in quadrupede, siue in homine sit quo vetustior est, hoc est, quò tardius fracta ossa vt oportet committuntur, eò deterior efficitur. Quandoquidem & callus illic gignitur, & spatia ipsa inania, aliena quadam substantia opplentur. Quo fit vt dum instauratio molienda sit, maiore ac valentiore multo extensione sit opus, Magna autem & valens eiusmodi extensio, non raro conuulsionem intuchit, vt alicubi testatus est Auicennas. Fracturę non pari dierũ numero in omnibus ossibus ferruminantur, sed in alijs tardius, in alijs citius. Caluaria triginta quinque diebus glutinatur. Brachium & tibia si rite curentur, diebus circiter quadraginta coalescunt. Firmatur cubitus diebus plurimum triginta. Si in naribus os perfractum est, decem & octo dierum spacio consolidescit. Costa post vnum & vigesimum diem Celso, alijs non nisi post vigesimum octauũ, ferrumen implet. Ferè etiam intra decimum quartum, & vnum & vigesimũ diem sanescunt: maxilla, iugulum, scapula, os tali, calx, manus, planta. Inter vigesimum septimum, & quadagesimũ, humeri & femina. Coxa verò diebus quinquaginta coalescit. Hippocrati, pes eidem sexaginta dierũ spatio, si quiescat, consanescit. Et ita de alijs pro fracti cuiusque ossis natura dicendum est. Quinetiam confert aliquid ad celerem aut tardam sanationem, & ætas, & corpus, & vitę propositum, & anni tempus, vt & de vulneribus dictum est. Proinde in ijs nihil certum aut perpetuum est. Factionis Arabicę princeps Auicennas affirmabat ossium agglutinationem in biliosis, conualescentibus, & primis senibus, difficillimam esse: in decrepitis verò ac valde senibus, impossibilem. Cæterum costa aliquando tota, interdum non tota frangitur; nempe cùm pars eius interior (quę rara est) duntaxat laeditur, summo ossẽ manente integro. Si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitę periculum sequitur, & sanguis spuitur. Narium fractura peior est, vbi aut ossi, aut cartilagini fractę, cutis quoque vulnus accessit. In cranij fractura malum portendunt, membrana immobilis, nigra vel lunda, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, neruorum vel resolutio, vel dissentio, caro lunda, maxillarum rigor atque ceruicis. Spem verò certam faciunt membrana mobilis, ac sui coloris, caro increfcens rubicunda, facilis motus maxillę, atque ceruicis. Cætera quę ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem

*Nota malig-
nae boni in-
dices in fra-
ctura cranij*

eadem quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt. Ferrumen seu agglutinationem in ossibus remorantur, multa ex aqua calida perfusio, crebra superpositorum mutatio, festina nimis ac preproperea membri affecti dimotio, nimia coarctatio, & quæ parti oblaxæ (alimenti in eam distributionem prohibendo) atrophiam inducit. Sanguinis quoque viscosi penuria. Item & fragmenta quæ remanserunt. Ossia quæ fracturam experta sunt, rectè commissa esse, testantur, æqualis membri perfracti compositio, & figura naturalis, si alteri sibi compari, nihil
 10 noxæ perperlo, conferatur: dolor sublatus, ac veluti quidam voluptatis sensus, sanguinis quoque solerti quadam naturæ providentia, ad fracturæ locum expulsi apparitio. Proinde non minus verè quàm communiter, dici solet, quod tumor membri perfracti post primam eorum quæ fracturæ admota sunt mutationem, sine magno dolore apparens: atque vbi fracti ossis partes rectè concurrerint, & in naturalem situm aptatæ fuerint, evanescens, certam salutis spem pollicetur. Sed iam tempestivum est fracturæ in vniuersum curandæ veram methodum, quamquæ ipsa rei natura præscribit, tradamus.

Que agglutinatione remoratur in fractis ossibus, Ossia fractis rectè commissa nota.

20

Generalis curandæ fracturæ methodus.

CAP. XII.

Quoniam fracti ossis soluta partium continuïtas est, utique (inquit Gale.) finis quo tendit is qui fracturam curabit, saltem primus vnitio est. Quod si is primus in curatione propositus finis per affectarum partium siccitatem perfici non possit, restat alter, qui est
 ut alterius cuiusdam interuentu disiunctæ ossis partes glutinentur. Qui si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. Quod igitur coalescere (saltem per se & nullius alterius
 30 ope) nequeat tam durum os, quàm id quod in iuuenibus & adolescentibus, & viris, multoque magis in senibus cernitur, id profectò (inquit Galenus) vel cuius patere potest. Quæcumque enim conerescere ac coalescere debent, omnino mollia humidaque sint naturaliter oportet. Quæ igitur dura siccaque sunt, eorum dimissæ partes coire simul nequeunt, sed glutinum aliquod vinculumve, quo commissa manerant, requirunt. Itaque potest certe illud ostentum vnitionem per se, & nullius alterius interuentu recipere, quod abundè molle est, cuiusmodi conspicitur in puerulis: in adultis verò, & siccioribus corporibus, separatæ fracti
 40 ossis particule, non per se vnquæ, sed substantia duntaxat quæ

Vnitio, finis primus quò tendit in quò fracturæ curat.

Quorum fracta ossa coalescere non possunt: & quorum possunt.

Lib. 6. methodi.

*Puri, id est,
calli substan-
tia unde na-
scatur.*

*Calli medio-
cristas.*

*Scopi qua-
tuor, in cu-
randa fra-
ctura, que
per transuer-
sum facta
est, medico
proponuntur.*

*Recta par-
tium fracta-
rum inuice
commissio, &
coaptatio.
Lib. 6. Meth.*

piam interueniente, ceu glutino quodam, ferruminari colliga-
rique secum possunt. Interuenit autem ea substantia, quoniam
omnis particula sibi familiare trahit alimentum, os autem cras-
sius ac terrenum magis quam aliud quoduvis nostri corporis
membrum alimentum ad se allicit, exugitque. Quod autem ex
hoc ipso proprio ac maximè idoneo ossis alimento redundat,
& in labris fracturæ concreuit, suo ipsius interuentu ossis ex-
trema dura licet & sicca conglutinat, ut sæpe vsu euenire con-
spicimus. Vocatur autem corpus id, quod sic fracturis innas-
citur, Græcis *ωρ*, Latini verò callus, qui (ut suprà de vulne- 10
ribus ossium diximus) mediocritatem in crassitie, & tenuitate,
duritie etiam ac mollitie seruet oportet. Sed de hoc adhuc in
sequenribus. Age igitur dicamus, quomodo finem hunc pri-
mum, quo tendit is qui fracturam curat, nempe vnitionem asse-
qui valeamus, initium quidem facientes ab ea fracturæ disfe-
rentia, qua per transuersum os frangitur, & suo loco excidit.
Quandoquidem hoc fracturæ genus sæpius incidit. Itaque
quatuor mehercle intentionibus, in hac fracturæ differentia
curanda, est opus, quas & scopos appellare possis. Prima in-
tentio est, ut fracti ossis partes rectè committantur, & in natu- 20
ralem situm coaptentur. Secunda, ut ritè commissa ossis per-
fracti extrema, coniuncta atque immota maneant. Tertia, ut
ωρ, seu (ut diximus) callo interueniente disunctæ ossis par-
tes agglutinentur, coalescantve. Quarta est, symptomatum,
hoc est accidentium, quæ fracturam sequi consueuerunt, corre-
ctio. Quod ad primam intentionem attinet, cum in hac fractu-
ræ differentia quam *κελευδὸς καὶ ἐκφανιδὸς*, id est, per trans-
uersum fieri diximus, sic à se fracti ossis partes dissideant, ut è
directo non iaceant, clarum est primum id esse agendum ut
in directum agantur. Directum autem hic vocamus, quum 30
in figuram pristinam naturalemque situm reducuntur. Sanè (in-
quit Galenus) cum situm habuerint, si quis ea quæ sic disident
integræ partis exemplo vsus, in contrarium adducat. A qua ni-
mirum certissima iudicatio transpositionis eorum erit. Fieri
enim potest, ut tum prorsum, tum retrorsum, tum in hanc par-
tem membri, tum in illam facta translatio sit. Quæcumque
igitur retrorsum magis sunt acta, ea prorsum impelli conue-
niet. Nec minus alteram quoque fracti ossis partem modicè ad
contrarium retrudi. Contra quæ prorsum sunt emota, hæc
rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam verò partem sensim 40
duci

De Fracturis.

341

duci prorsum. Eodem etiam modo, & eorum quæ ad dextram
 sunt detorta medicatio est: si ad sinistram ducantur, contra.
 quæ eorum quæ ad sinistram, si mutantur ad dextram, semper sci
 licet altera parte modicè in contrariū acta. Guido à Cauliaco
 (præmissis quibusdam præceptis communibus, quæ hic suo
 loco referemus) quomodo primam hanc intentionem assequi
 possis, verbis iton adeo multis perstringit. Itaque iubet impri
 mis membrum perfractum, [si ossa suis sedibus (quod sæpius
 contigit) exciderint, aliudque super aliud efferatur, & muscu
 20 li ad capita sua retracti sint] decenter intendendum esse. De
 inde os depressum attollendum, & eleuari deprimendum, atque
 id quatenus fieri licet sine dolore, donec ossis fracti fines re
 ctè concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Neque enim
 vnquam fracta eiusmodi ossa, & suis etiam sedibus mota, in
 suum locum veniunt, nisi illa per vim aliquis intendat. Inten
 dere autem dignum, vel aliud quoque membrum si adhuc te
 nerum est, etiam vnus homo potest, cum alteram partem dex
 tra, alteram sinistra apprehendit. At verò valentius membrum
 duobus eget, qui in diuersa contendunt. Si firmiores nerui ac
 30 tendines sunt, (ut in viris robustis, maximeque eorum femi
 nibus & cruribus cucurbitabulis quoque vel lineis fascijs vtrin
 que capita articularum deliganda, & per plures in diuersa du
 cenda sunt. Cauendum autem semper est, ne immoderatus
 fractum membrum extendatur. Immoderata enim distentio
 in duris præsertim & siccis corporibus, vehementes dolores, fe
 bres, contusionem, & resolutiones interdum inducit. Quin
 etiam per eam diuelli ac disrumpi musculorum, ac nervorum
 fibras aliquando contingit. Proinde summa in hac re pruden
 tia opus est. Igitur ægro in sedili collocato, vel resupinato
 30 potius, ut Sorano placuit, ministris duobus iubebimus, huic,
 supra fracturam, illi, infra digitos circumponant, atque sic
 tensionem perficiant. Quod si valentius opus sit intentione,
 non solum manibus, sed etiam, ut diximus, habenis aut funi
 bus intendere aggrediemur. Ergo duos funes æquales con
 fracto membro, verbi gratia brachio aut cruri circumdamus:
 vnum, supra fracturam: alterum, infra: atque vni ministro
 ad ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funi
 um tradentes, iubebimus in diuersa membrum perfractum
 distendere. Vbi paulo longius, quam naturaliter esse debet,
 40 membrum, vis fecit, distentio remittenda est, ac tum demum

Hippoc. lib.
de fracturis.

Guidonis
præcepta de
reductione
fracturæ.
Cellib. 8.

Æger quo
modo collo
candus. in
fractis artib.
bus.

*Distentio qñ
remittenda.*

ossa manibus in suam sedem compellenda sunt. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor subleuatus. Cæterùm ossibus fracturæ iam sic probè coaptatis, iuxta Hippocraticam consuetudinem membrum deligandum erit, vt itatim subiungemus. Modus alius reducendi ossa fracta in suum locum & naturalem situm per distentionem, libro de fracturis traditur ab Hippocrate, qui & à Paulo refertur libro sexto sui operis de re medica, quo etiam si velis, & parata habeas quæ describit instrumenta vti poteris. Sed hic modus quem supra posuimus longe facilius, & magis ad manum est. Atque eo etiam Soranus medicus utebatur, estque hodie apud nos in frequentiore usu. Oporteret igitur (vt summatim dicamus) aut manibus ipsis, vtique si contractum membrum exiguum est, aut vinculis impositis, si maius est, & validiore tractu opus sit, aut eiusmodi instrumento quod nobis Hippocrates descripsit, antitrasum ossiũ facere, hoc est retrorsum ea trahere, vt è directo committantur, exactaque eorum coniunctio fiat, sic vt pristinam vniõnem imitentur. Postea verò quàm abundè retracta fuerint, & nullus amplius supersit metus, ne se in adducendo contingant, tum in directum opponere, vinculaque relaxare, ac musculis ipsis diductorum in idem commissiõnem permittere opus est.

Lib. 6. Ther.

Interim verò (vt rectè Galenus admonet) reipsum quoque qui operi præes, manibus subseruire expedit, ac sicubi aliquid paulum subsulter, ac promineat, corrigere atque formare. Cæterùm in adducendis sic, vt supra expressimus, contrario motu partibus, ne aliquæ frangantur ossium extantiae, non leue periculum est. Non enim veluti (inquit Galenus) in ferra desectis visitur, læuis est semper vtriusque partis finis. Quod si illæ (ossiũ inquam extantiae) fortè fortuna frangantur, non poterunt adamussim secum coaptari fracti ossis fines, tum quia forsitan fragmenta inter partes vniendas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium fortè extrà ceciderit, & comminutum perierit, vnde spacia inter applicata simul ossa, maneat inania: in quæ sanies collecta, atque temporis tractu putrescens, totum pariter membrum secum corrumpet. Atque hæc tractandæ fracturæ ratio omnibus propemodum contractis artubus conuenit, vbi præsertim ossa fracta suo loco (vt sæpius contingit) exciderint, aliudque super aliud effertur. Neque enim semper dum franguntur ossa suis sedibus moueri contingit, sed interdum fracta in suo loco,

Ossium extantia.

- at naturali situ remanent. Quod ante omnia (vt nos admo-
net Celsus) considerari debet : & sunt notæ certæ, quibus id
discrimen deprehendere possis. Namque si suis sedibus mora
sunt, resuma apparent, punitionisque sensum repræsentant,
ac tactu (vt suprà annotauimus) inæqualia sunt. Vbi verò lo-
co suo non exciderunt, neque punitionis sensus ullus, neque
vlla quæ tactu percipi possit inæqualitas adest. Cæterum si
primis diebus ossa ipsa perfracta & suis sedibus mora, reposita
non sunt, non leue inflammationis periculum sub est sub qua &
10 difficile, & periculose vis neruis & tendinibus adhibetur. At-
que hæc de prima intentione dicta sufficiant. Secundus sco-
pus in curandis fracturis nobis propositus, est, vt ossibus iam
sic, (vt suprà docuimus) probè coaptatis, & è directo admo-
tis, eorum positura seruetur, & exactè coniuncta maneant,
sicut pristinam vnionem imitentur. Porro nequaquam pro-
hibere poteris, quin diuisa eiusmodi ossa, quæ sic effinxeris
& adamussim secum coaptaueris, sua sede moueantur, &
rursus dissideant, si laborans quoquo pacto vel vigilans, vel
dormiens, membrum fractum dimoueat. Ergo vt secundum
20 hunc scopum assequaris, perfractum membrum prorsus im-
motum consistat necesse est. Quod si ipsi quidem ægotan-
ti, vt quietudini membri prospiciat, permiseris, vigilans for-
tassis (quemadmodum inquit Galenus) probè id curauerit,
at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igitur non dor-
mientis modò hominis, sed etiam ad desidendum, itemque cū
cubile resternitur surgentis, eorum quæ ritè formata & ex-
actè coniuncta sunt, positura seruetur, tuta deligatura com-
plecti fracturam oportet, quæque fracti ossis partes secum
coarctare adamussim possit. Tuta autem non erit deligatio,
30 si vel nimis arcta, vel laxa nimis fuerit. Quandoquidem per la-
xioris ossibus moueri licet, per arctiorem verò & vehemen-
tius adstringentem, & alimenti in locum affectum distributio
prohibetur, & dolor (qui humorum in ægram partem afflu-
xus euocat, & phlegmonas creat) excitatur. Danda itaque
opera est, vt vtrumque excessum declinemus. Constrictio igitur
mediocris esto, rum nostri sensus, rum ipsius ægotantis
iudicio. Ac si quidem æqualis esset crassitudinis membrum
quodque, vti que larissima fascia (vt Galenus ait) commodis-
sima esset, vtpote quæ totum æqualiter, continenterq; ex omni
40 parte fractum os complecteretur. Sed quoniam id non est, quod

*Note ossis
fracti, &
sua sede man-
ti.*

*Secundus
scopus.*

*Membru per
fractū prorsus
immo-
seruandum.
Libro. 6.
Metho.*

*Os fractum
deligandum
esse, & qua-*

*Deligatura
modus.*

*Com. in lib.
Hippocr. de
fractura. &
6. Therapen.*

*Angusta de
ligatio artu
bus utilis.*

*Ratio deli-
gandi artus
perfractos,
ex Hippoc.
Galeno, &
Celfo.*

*Hæc secun-
da fascia nõ
bus aut ter,
vt in priore
ligatura,
sed semel iu-
tum mēbro
perfracto
circundatur
Hippocrati.*

*Prioris deli-
gatura vs
& facultas.
Quid secun-*

deest nobis ex fasciarum latitudine, circuituum numero pensa-
bimus, vt in artubus ipsis, qui omnium maxime fracturæ per
transuersum factæ, expositi sunt. In talibus nanque vtilior est
angusta deligatura quam valde lata & remissa. Quippe quæ nec
rugas, vt ea quæ latiore fascia fit contrahat, & totius membri
cui circumdata est, cutem contingat. Eo igitur vsque augere ti-
bi latitudinem fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior effici-
tur. Cæterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis (in medio
præsertim brachij, vel tibiæ, aut femoris existentibus) adhibe-
tur, duabus fascijs lineis mollibus (iuxta Hippocratis dogma) 10
opus est. Has autem Hippo. ipse nomine peculiari *ὑποδυσμίδας*,
id est, subligamina, seu malis subfasciationes, appellauit. Primæ
fasciæ initium super fracturam iniici debet, ac circa eam bis tē-
ve conuoluta, sursum versum ferri, & quasi in cochlea serpere,
atque illie desinere. Id tamen perpetuò obseruandum est, vt mul-
tum partis sanæ fascia hæc complectatur. Ita enim fiet, vt &
firmius reposita ac conformata ossa contineantur, & magis ab
affecto loco in circumuicinas partes humores elidantur, magis-
que ne hi à superiori parte eo defluant, impediatur. Altera etiam
super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumque (vbi 20
primos complexus super fracturam fecit) tendere, atque inde ite-
rum reducta in superiore parte vltra priorem fasciam desinere.
Quocirca dimidio longior priore esse debet. Terminus autem
longitudinis earum fasciarum, non vnus ac certus statui potest,
sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine fracturæ, &
perfracti membri crassitie vtrique dimensio varianda est. Huc
Hippocrates libro τῷ 17^o *ἰν τῷ 17^o*, id est, de medicina
medici officina, & libro de fracturis, trium aut quatuor, aut quinq;
aut sex cubitorum longitudinem: digitorum verò latitudinem
constituit. Digni autem & cubiti intelligendi sunt eius ipsius 30
qui deligatur, nempe vel viri adulti, vel puerili. Hæc autem du-
plici deligaturæ ratio, ex ipsa rei natura desumitur. Quando-
quidem duo hæc prima lintea fracturam quidem muniunt ac
stabilium, nec phlegmonem (quæ in hac re imprimis est arcen-
da) oriri sinunt. Siquidem & ab integris ad laborantem particu-
lam sanguinis confluxum arcant, & quod iam collectum in ea
est exprimunt. Prior quidem deligatura quod in læsa parte cō-
tinetur, ad superposita expellit atque elidit: quod verò ex ijs
(superpositis inquam partibus) in locum perfractum confluit,
repellit. Altera verò primis quidem complexibus, quos, vt supra 40
dixi-

diximus, super ipsius fracturæ locum facit, itemque dispensa-
 tione deorsum tendente, quædam ad inferiora extrudit, quæ-
 dam, ne quid ex ijs in locum fracturæ confluat prohibet. Reli-
 quis verò deinceps complexibus, quibus videlicet ab infimis
 partibus sursum versum recurrere deligaturam diximus, ut eo-
 dem scilicet loco cum priore fascia, secunda desinat: tum ad
 superiora (vñ & priore ligatura) repellimus, tum confluxum
 ab ijs prohibemus. Cæterum priusquam fasciis huiusmodi fra-
 ctura deligetur, vnus aut alter panniculus lineus, candido oui
 10 liquore & rosaceo delibutus, nudo membro non absque ratio-
 ne à recentioribus chirurgis superaccommodatur, ea quidem
 magnitudine, ut etiam aliquid partis sanæ comprehendat.
 Sinto autem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe quatuor,
 aut quinque, aut sex, ut diximus cubitorum, & circa tres qua-
 tuorve digitos latæ, aqua aut posca potius madefactæ, & post-
 ea expressæ, præsertim si fractura inflammatione vacet, recentis-
 que sit. Si verò dolor vehemens, aut inflammatio adest, lanis ten-
 nibus mollioribusque, aut stupis læuibus oleo vel oxycrato imbu-
 tis membrum contegendum est, & non ita arctè deligandū. Sa-
 tis enim fuerit tunc, si deligatura adhibeatur, quæ & membrum
 20 utcumque fulciat, & admota medicamenta, ad hæc symptomata
 profliganda idonea, contineat. Verumenimverò cum hæc duæ
 primæ deligaturæ, ad ambos hos vsus quos supra retulimus,
 (nempe ad fracturæ munimentum stabilimentumque, & ut
 phlegmone excitari prohibeatur) non satis adhuc faciant, præ-
 sertim solæ, ad earum quidem tutelam & fracturæ stabilimen-
 Hippocrates remedium excogitauit, ut scilicet plagulæ, siue
 splenia à splenis forma ita appellata, vnà cum exterioribus fas-
 cijs, quas *ἰνδιδίωμι*, id est, superligamina vocat, desuper ad-
 30 hiberentur. Et hæc quidem tertiæ deligaturæ rationem qui-
 busdam obtinent. Splenia enim eiusmodi siue plagulæ, duarū
 primarum fasciarū, quæ peculiari nomine *ὑποδιδίωμι*, id est,
 subligamina Hippocrati appellantur, firmamenta sunt, ut
 commentarijs in librum Hippocratis de fracturis Galenus an-
 notauit. Ne autem phlegmone suscitetur, medicamento quo-
 piam ex ijs quæ inflammationum iniurias arcet, vñ censuit.
 Quale nimirum est ceratum humidum siue liquidum, quod
 confici solet ex cera in rosaceo aut oleo colliquata, aut eius
 loco rosaceum. Huius sententiæ fuit & Cornelius Celsus li-
 40 bro octauo, sic inquires: Super has (duas inquam primas de-
 liga-

*da deligatu-
ra efficiat.*

*Fasciarū lō-
giudo & la-
tando.*

*Si inflama-
tio adest, cū
fractura.*

*Splenia cur
adhibeat.
Hippocra-
tes.*

*Ceratum hu-
midum cur
adhibeatur.*

Si ossis fractura carnis quoque vulnus accessit.

Alia quatuor Corn. Celsi deligatura.

Cornelii Celsi opinio refellitur.

De appposita repositionis perfracti membri figura. Ex Galeno.

ligaturas) injiciendum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat. Quod si ossis fracturae, carnis quoque vulnus accessit, neque ceratum, neque rosaceum tuto admouetur: quandoquidem haec vlcus tum sordidum tum putre efficerent, sed in vicem eorum puerilli praelongi vino nigro ac styptico imbuti, superinijciendi erunt. Reliqua autem curatio, quae eiusmodi fracturis cum vulnere incidentibus conuenit, in sequentibus dicitur. Porro praeter has modò à nobis commemoratas deligationes, quasdam adhuc alias quatuor commemorat Aurelius Cornelius Celsus capite decimo, libri paulò antè citati. Sic autem eas dispensat, ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia fascia (quae duas primas, ac splenia comprehendit) tantum in inferiore parte, tres reliquae in superiore finiant. Quia satius est (inquit) saepius circuire quam adstringi. Siquidem id quod adstrictum est alienatur, & can- cro oportunitum est. Quo loco (ni fallor) cancerum pro spha- celo, quem vulgus medicorum esthiomenum vocat, usurpauit, ut & quibuidam alijs locis. Ceterum cum multis complexibus atque inuolutionibus duae illae superius commemora- tae Hippocratis deligaturae, fracturam contineant, (alias enim parum tutae essent) tam numerosis fasciis opus esse minime censeo. Hae enim in membro ipso perfracto, praeter solitum cooperto, & pruritus & dolorem (quae duo symptoma- mata à fractis membris diligenti studio arcenda sunt) exci- tare, atque etiam eius quod iam infixum fracturae est, perspi- rationem prohibere possunt. Porro ubi decenter sic mem- brum contractum deligaueris, de apposita repositionis ipsius figura, maxima tibi sollicitudo habenda est. Siquidem sub alia forma aut figura membrum perfractum deligare, in aliam ve- rò mutare ac reponere, non dolorem modò (ut inquit Gale- nus) excitare potest, verum etiam ossa intorquere. Necessè enim est, ubi figura mutatur, alios musculorum tendi, ac velut contractos rotundari, alios verò solui ac remitti. Vbi autem tenduntur, tum premi eos à deligatura est necesse, tum ex compressione ipsa dolere. At ubi tensio remittitur, quo loco deligatura est laxa, ibi fracturam fulcimento destitui. Ceterum aptissima fuerit in ossium fracturum repositione, sicuti etiam & in retractione, (quam anitassin diximus à Graecis appellari) & coaptatione, & deligatione: partis figura, quae (ut verò vno dicatur) maximè à dolore abest, & in 40

qua

qua æger persistere immotus diu possit. Hæc enim & rectis- *Repositionis*
 sima est, & maximè naturalis membro, ac ferè consueta. Re- *figuram ad*
 ctissimam autem hic partis figuram cum Galeno vocamus, *duo directâ*
 quæ venas, arterias, & musculos quàm rectissimos habet. Ita, *esse.*
 que angulosa figura, quæ ἰγῶνι & Græcè dicitur, brachio *Rectissima*
 quidem maximè naturalis est cruri verò, quæ paulò minus *figura qua*
 porrecta est. Hæc uanque & rectissima est, & à dolore ma- *dicatur Ga*
 ximè aliena. Cæterùm tamen angularis figura, quæ Græ- *leno.*
 cis ἰγῶνι & dicitur, propriè ea dicatur, quæ acutum angu-
 20 lum, quem recto minorem appellamus, efficit, per enguonon
 tamen, id est angularem figuram, Hippocrates eam intelli-
 git, quæ recto angulo constituitur, non prorsus tamen rec-
 to, ut quodam in loco Galenus est interpretatus, sed propè ad
 rectum accedente, ita ut paululum ad obtusum tendat: cu-
 iusmodi in manu, quod vulgò brachium appellamus, ea figura
 est, non quæ prorsus quidem inter extensionem & inflexionem
 media est, sed quæ ad extensionem procedere incipit. Quo
 plerunque positu eos qui dolore afficiuntur, si diligenter in-
 spexeris, manus tenere deprehendes. Porro ut dolor vite-
 20 tur, cum ad quietem membrum reponitur, non modò natu-
 ralis habitus cuius instrumentum est utilis, verum etiam con-
 suetudo quoque conducere nonnihil videtur. Ergo ut aptè
 membrum perfractum, & decenter ligatum reponatur, ea litus *Ratio inue-*
figura illi inuenienda est, quæ & naturalis sit & consueta, & *nienda figu-*
a dolore maximè aliena. Sed iam hæ indicationes inter se *ra, in qua*
 consentiunt, & conspirant maximè. Nam quæcunque figu- *custodire me-*
 ra magis quàm alia est à dolore libera, ea & maximè natura- *brum perfra-*
 lis membro, & ferè consueta esse solet. Atque econtrà, quæ *ctum conue-*
 naturalis & consueta est, ea à dolore est alienissima. Atque *nias.*
 30 hæc quidem figuræ, in qua custodire membrum perfractum *Ex Galeno*
 conueniat, inueniendæ ratio est. Ut autem in hac natu- *& Hippo.*
 rali, & quæ doloris minimum habeat, figura immotum prorsus
 (quoad expediet) membrum persistat, recentiores Chi-
 rurgi secundum deligaturam, procius ferulas etiam circum-
 ponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor
 ex inflammatione (si qua adit) postulat. Veteres autem, ut
 Hippocrates, Celsus & Galenus, à die tantum septimo vel
 etiam nono & undecimo, ferulas accommodabant. Verùm
 non abs re factum putamus, si statim ab initio post deliga-
 40 turam, ferulæ injiciantur, modò nimis premendo dolorem nõ
 excitent,

*Ferulæ quæ-
 do inficien-
 tur circumpo-
 nentur.*

Que vitare excitent, aut phlegmonem (quæ maximè arcēda erat) accerfant, vel præsentem (si adsit) exacerbent. Quæ igitur à principio adhibentur à recentioribus ferulæ, non eo nomine adhibentur circumponūturve, ut adstringāt, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita utcunque fulciant. Frimīs namque diebus cū phlegmones deuitandæ consilium vinceret, tutum non erat perfractum membrū ita ferulis premere. Cū verò nullus iam amplius futuræ inflātionis metus sit, aut ea quæ prius fuit discussa, membrum aliquanto gracilius quàm pro naturali habitu apparuerit, (quod intra septimū diē 10 ferè solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas (ut fracturam stabiliant) validè satis adstringere. Ferularū enim vsus idem est, qui & plagularum seu spleniorum, nempe ut fractum os contineant, & deligationem stabiliant ac firmant. Sun-

Ferule quales esse debeant.

to autem ferulæ, ut libro qui inscribitur τὸ κρ' ἰντρεῶν, id est, de ijs quæ in medicatrina seu medici officina fiunt, rectè præcepit Hippocrates, læues, id est, leuigatæ & planæ: æquabiles, id est, neque in larus, neque in superiorem, aut inferiorem partem distortæ: in summis partibus, id est, extremitatibus, resimæ, id est, leniter derafæ ac retusæ: minores hinc inde quàm deligatio 20 est: & ea parte crassiores, id est, latiores & valentiores, ἢ ἡ ἰσθμίου ἢ κατὰ γυμνα, id est, qua fractura erupit. Leues autem ferulas, id est, non asperas (læui enim asperum opponitur) adhibendas esse censet Hippocra. ne sua asperitate, & inæquabilitate (quod enim asperum est, continuo etiam est inæquale) fractis partibus negociū facessant. Vtroq; enim modo cōprimunt. Ceterū quoniam fieri potest, ut ferulæ læues sint, nō tamē æquabiles (inæquabile enim non protinus necessariò est asperum: ut pater de via quæ ascensus habet & descensus non asperos) ideo non solum læues, sed etiam æquabiles, id est, non distortas assumendas esse. 30

Læues.

ferulas monet. Quæ enim distortæ sunt, simihter, ut aspera lædunt, ac illud insuper efficiunt, quod deligationem simul distorquent: qua distorta, pars etiam fracta distorqueatur necesse est. Simas præterea in extremis partibus eas deligi voluit, id est, ut Galenus interpretatur, leniter derafas ac retusas in extrema parte, ne sua acutie articulum lædant, & æqualiter vbiq; partem fractam, propter æqualem suam crassitudinem, comprimant. quod certè fieri nullo modo debet. Vult enim Hippocra. ut in media parte, hoc est, supra locum fracturæ, ἡ ὑπερῶς, id est, ferulæ, deligationem magis astrin-

Æquabiles

Simas.

gant. 40

gant. Hinc ea parte, hoc est, supra fracturam ipsam, crassiores esse iubet: quia scilicet locus is potissimum (ut supra ostendimus) compressione ipsarum indiget. Vult item minores eas esse longitudine, id est, aliquanto breuiores, quam sit ipsa deligatio, ne cutem ultra deligationem attingant: quæ sæpenumero ex eo quod humores à fascijs expressos suscipit, paulò altius turgescit atque extat. Sed & breuioribus ferulis utendum præcepit senior ille Hippocr. ne pars eminentior, id est, gibba & carne nudata, attingatur, ut circa cubitum, & malleolos,

Crassiores modo ferulis

Minores.

10 ubi ossium extuberationes sunt. Modus autem ac ratio adhibendi ferulas, talis esto. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo delibura, super fascias similiter atque æqualiter, si membrum in crassitie fuerit æquale, circumdaro. Si verò inæquale, partibus magis concavis, per splenia repletis, membrum vndique æquale ferulis accommodandis effcito. Deinde ferulas lana, aut stupa mediocriter inuolutas, in orbem, non minore quam vnus digiti spatio inter se distantes fracturæ circumdaro, easque leniter ac moderatè constringito. Sed & in hac ferularum accom-

Med^o ac ratio adhibenda ferulas.

modatione summo perè caueto, quatenus fieri potest, ne articulus aliquis, (ut paulò antè notauimus) & præcipuè interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & neruorum inflammationes pariunt: itaque illic, hoc est, iuxta articulos ipsos deligatione aliquantò (ut diximus) breuior, tenuior, laxior, & magis flexibiles ferulas esse oportet, quemadmodum valentiores qua fractura excidit atque inclinat. Cæterum si nulla prurigo, nulla inflammatio, nulla suspecta exulceratio, nullusve dolor adest, & ossa rectè commissa fuerint, fracturæque rectè procedat, sic manere ferulas, & ligamenta ad decimum vsque diem, vel quintum & decimum, aut

Quando solvenda deligatio.

30 etiam vigesimum, vtile est. Si verò in membro perfracto præter solitum cooperto, vel dolor excitetur, vel pruritus creetur, vel eius quod iam infixum fracturæ est perspiratio prohibeatur, propter quam non modò noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosà à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur, non abs te feceris, si tertio quoque die ut iussit Hippoc. deligationem solueris, & membrum ipsum aqua temperata perfuderis ac foueris. Hac enim perfusione & acrem atque erodentem saniem discuties, & dolorem mitigabis, & prurigini pulchrè medeberis. Porro cum nec ferulis,

Ne perfracta

Tertium scilicet

40 nec deligatione, nec figura sitive membri appposito, diuina

osis

Pari gene-
ratio.

*mundo p
fignat*

Callus qui-
bus notus ge-
nerari depre-
hendatur.

Victus pro
gignendo a-
pius.

Lib. 6. Meth.

Lib. de fra-
cturis.

osis partes (tametsi exactè atque adamussim coniunctæ fue-
rint) citra glutinum aliquot vinculumve (vri suprà diximus)
coire, ac conrescere possunt, maxima calli, quem paron Græ-
ci dicunt, gignendi sollicitudo habenda est. Ad hunc igitur gi-
gnendum cogi conrescereque aliquid proprii ossium ali-
menti, crassi terrenique oportet, quod in labris fracturæ coa-
lescit. Ipsum igitur nec eluendum, nec foras euocandum est,
sed finendum. Crassa autem hæc terrenaque substantia, ex ge-
nuino, maximeque idoneo ossis alimento redundans (quæ
propria est calli materia) diem circiter duodecimum, ant de- 10
cimum quintum ab ossis fractura ferè gigni, atque accrescere
incipit, vt recentiores chirurgi testatum reliquerunt. Cæte-
rum huius generatio (quæ in alijs citius, in alijs verò tar-
dius aduenit) ijs ferè notis deprehenditur. Dolor qui prius
aderat, sedatur, nullus amplius inflammationis, aut tumo-
ris alicuius præter naturam metus adest, in membro perfra-
cto bonus ac nativus color efflorescit. vniuersa autem victus
ratio pro gignendo accommodata, talis esto. Dum callus gi-
gnitur, victum paulò pleniorē, quàm ab initio fracturæ,
laboranti instituito: Cibos, qui boni succi sint, & multam nu- 20
triant (nisi vulnus adsit) exhibeto. Sed & quæ offeruntur
alimenta talia sunt, ex quibus prouenire succus soleat non
solum bonus, sed etiam tenax, ex quali fieri callum maxi-
mè expedit. Quippe (inquit Galenus) cum ex serosa humidi-
tate, ac tenui gigni prorsus nequeat: ex crassa verò, sed
quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expertis gigni quidem po-
terit non segniter: cæterum tempore siccescens friabilior, at-
que ita fractioni obnoxius redditur. Itaque pro gignendo
conueniunt Avicennæ: Risum, panis similagineus, frumentum
triticeum, tandiu in aqua coctum, donec fiat (inquit) sicut puls: 30
id Galli vulgò appellant [froumentec.] Alicam nonnulli esse
existimant. Ad hæc, pedes, ventres, & capita animalium, sed
præsertim hædi, & vernecis. Hæc enim & multum alunt, &
crassi ac tenacis succi sunt. Circa initium fracturæ vsque
dum callus gignitur, quod ferè circiter decimum diem contin-
git) ægrum tenuissimè cibato. Cibi nanque subexiles (vt
censuit Hippocrates) & non validæ materiæ tunc satis sunt.
Venam interdum, cum scilicet res exposcular, secato, & per
ventrem supernacua expellito. Carne & vino vsque ad de- 40
cem dies, ex Hippocratis præscripto, abstineo, Post hoc
tempus,

De Fracturis.

351

tempus, vinum crassum & stypticum audacter cōcedito, tamen si Celsus vinum per omne tempus alienum esse dixerit. Magnitudo calli nec minor quàm par est, nec maior iusto sit, sed mediocritatem ad vngue seruet. qui enim iusto minor est, hic ossa parum tuta reddit: qui maior est, dolorem musculis inuehit, ergo calli magnitudo, vt breuiter dicam, ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo sit, nec musculos tamen comprimat. attendendum verò diligenter est, quemadmodum nos Galenus admonet, vt vel promoueat, si minor iusto proueniat: vel inhibeat, si immodicè crescat. Quibus verò hæc effices, paulò post dicemus. Atque hæc de pari generatione, qui tertius erat scopus, in curandis fracturis nobis propositus, dicta sufficiant.

Pari magnitudo.

Superest igitur de quarto, & ultimo scopo agamus. qui dispositionum præter naturam, quæ fracturæ interueniunt, emendationem, atque ablationem concernit. Ex autem ferè sunt, dolor, inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas, aut humiditas callo gignendo obfistens: gangræna, durities, pari magnitudo, aut deficiens, aut excedens. Itaque si dolor, aut inflammatio adsit, deligationem, si iam facta est, statim soluito, & lanam, oleum, & acetum, congruæque id genus alia auxilia parti dolenti, atque inflammatæ adiuueto. Sed neque priusquàm hæc sedata fuerint, vel deligaturam adhibeto, vel ferulas circumponito, nisi duntaxat eatenus, vt membrum fulciant, & vt impositum medicamentum contineant, hoc est, laxè admodum. Celsus consulit liberale fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio adest, cum verò ea decit, modicum: sedata inflammatione, & dolore sublato, deligationes, & ferulæ, vt supra diximus, adhibendæ sunt. Si noxius pruritus accidit, & erosa à faciei acrimonia (vt aliquando contingit) cute exulceratio concitatur, aquæ temperatæ tantum superinfundere oportet, quantum ad euocandam eiusmodi saniem est satis. Hoc quidem Hippocratis & Galeni consilium fuit. Recentiores autem chirurgici aquam salisam infundi præcipiunt, aut vnguento albo, vel eo, quod vulgò populeum appellatur, membrum illini, & vt supra dictum est, deligari. Cum ossis fracturæ, carnis quoque vulnus accessit, siue statim ab initio id factum sit, siue postea à chirurgo inductum, vt ossium fragmenta, & ea præsertim quæ pungunt, eximantur, si quidem sanguis profundatur, hunc prius aptis remedijs sistito. Si inflammatio oritur, præsidijs

Quartus scopus.

Symptomata quæ fracturam committantur.

Dolor.

Inflammatio.

Fomentum aquæ calidæ.

Pruritus.

Vulnus.

Contusio.

in eam efficacibus vitior. Si carnes contusæ sint, partem affectam,

Gangrena. affectam, vt gangræne periculum euitetur, scarificato. Quòd si gangræna quoque ipsa, aut alia quæpiam serpens putredo, iam occupauit, conuenienter occurrito: horum autem omnium curationem in superioribus libris tradidimus. At si nihil horù adfuerit, neque magna ossis pars nudata sit, hamulis futurisque vñ his medicamentis, quæ etuentis imponuntur, medebimur, priùs tamen fragmentis ossium euulsis. Cæterùm deligatura fracturæ eiusmodi cum vulnere factæ, hoc modo adhibenda est. Orbiculares fasciæ partibus vulneris utrobique, hoc est ab utraque vlcæris parte, iniici debent, obliquè verò supra ipsum vulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic vt per decussim ad X literæ similitudinem, iuxta hiatus oclusio ex omnibus fiat. Hippocrates tamen à prima statim circumuolutione, fascia latiore totum vlcus comprehendit, ita vt nulla eius pars nuda relinquatur. Itaque si sordidum adhuc vulnus est, expurgantia medicamenta, quando opus erit, impones. Si purum, carnem producentia, linteolis illita, aliamque vsu comprobaram materiam adhibebis. Hippocrates tamen statim ab initio picatum ceratum, quod ceram in rosacco, aut oleo colliquatam: & picis siccæ aliquantulù assumit, supra vulnus in linteolis adhibet. At Galenus auctore vtilius à tertio die, cum ea quæ in vlcere sunt concoquat, adhibetur. Cornelius Celsus omnibus his vulneribus primò imponendum iubet linamentum vino madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit. Si æstiuum tempus est (inquit Hippo.) splenia vino frequenter sunt irriganda: si hyemale, lanas multæ succidæ ex vino & oleo superimponendæ sunt. Lanas namque superpositione, & olei commistione refrigerationis vehementia (quæ in huiusmodi affectibus conuulsio- nis periculum interdum inuehit) obtunditur. Vino autem madefactæ plagulæ, ob vinum reprimendi vim habent. Cæterùm ubi purgata vlcera fuerint, & in eis iam caro concreuit, ferulæ non incommode iniiciuntur: aliqui verò etiam ab initio ipsas accommodant, vlceris locum vitantes, & prout necessitas, ac vsus tulerit, ipsas modò constringunt, modò remittunt: sed hæc curandi ratio ab Hippocrate, & Corne. Celso non probatur. Hi enim pluribus tantummodò, & latioribus fascijs (ferulas ne videlicet comprimendo lædant, similiter & canales omninò reiicientes) deligaturam in eiusmodi fractura, quæ cum vulnere incidit, fieri iubent, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset: adeò vt affulcitæ quidem, non compressæ tamen fasciæ

*Deligatura
fractura cū
vulnere ac-
commoda.*

Hippocra.

*infectio de
not fasciæ*

*Ferula quā-
do in fractu-
ra cū vulne-
re adhiben-
da.*

Cor. Celsus.

fasciæ ipsæ esse videantur. Ita nanque (inquit Celsus) numero fasciarum efficietur, ut laxæ quoque æque contineant. Ac factius quidem est, sæpius circuire, ut ante Celsum scripserat Hippocr. quam alstringi. Sed & in eas fascias multiplices ingerendum subinde, eodem Celso auctore est calidum oleum, & vinum: magisque vbi sic cum vulnere fractura à principio incidit, fame, id est, exquisitiore victu vtendum, vulnus calida aqua fouendum, frigusq; omni ratione vitandum, & transfundendum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt: maiorque vulnere, quam ossi cura agenda. Vt autem de hac re, quod ad ferularum appositione artinet, sic apud authores etiam eximios controuersia, id quod res est semel statuamus, hoc tibi tanquam axioma, id est, pronunciatum esto. Cum fractura cum vlcere interdum in longitudinem membri contingit, tunc ex vtraque vlcis parte ferulas etiam ab ipso curationis principio circumdare licitum esto. Cum verò transuersum vlcus euasit, idque maxime si maius sit, ferulas statim ne imponito. At si squamula aliqua ex osse resoluitur (id quidem colligi ex eo potest, quod & copiosior, tenuiorque humor profluit, & caro circa vlcus laxa, & mollis effecta intumescit) deligatura laxiore ad curationem vtendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere facile queat: frequentiusque, ut consilii Hippocr. religandum, quoad os recesserit, ferulæque non apponendæ. Vbi verò vel hamulo, vel quopiam alio eiusmodi instrumento squamam euulseris, deligatura iterum validiore membrum adstringes. Porro per totum id, quo vlcus curatur tempus, medicamen aliquod, ex his quæ inflammationem arcant, linamentum continens vulneri incumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus resoluentur, cum aliæ suprâ dictæ remaneant. Inter hæc autem, si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si reclusum est, in suam sedem dandum: si acutum, antè acumen eius longius est præcidendum: si breuius, limandum, & vtrinque (inquit Celsus) scalpro limandum. Tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, vulsella (quali fabri vruntur) iniicienda est, rectè se habenti capiti ab ea parte, qua sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id manifestum est, & membranulis fragmenta cinguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idque os, vbi iam nudatum est, abscindere: quod maturius scilicet faciendum est, potestq; ea ratione & os coire, & vulnus

*Si ossis pars
aliqua recess
sura est.*

Si fragmentum ossis eminet.

Lib. 8.

Si fragmen- sanescere, illud suo tempore, hoc prout se habet. Nonnunquam
ta velut e- etiam (inquit) in magno vulnere cuenit, ut fragmenta quædam
moriantur. velut emoriantur, neque cum cæteris coeant. Quod hic quo-

que ex modo fluentis humoris colligitur, quo magis necessa-
 rium est, sæpius vlcus resolvere, atque nutrire. Sequitur verò, ut
 id os per se post aliquot dies excidat. Cæterum cum tam misere

Vulnus in- ra antea conditio vulneris sit, tamen id interdum maius, diu-
terdum maius tiusque facies. Sæpe enim integra cutis osse abrumpitur,
efficiendum. protinusque prurigo, & dolor oritur. Quæ solvere (si accidit)

maturius oportet, & fovere aqua per ætatem frigida, per
 hyemem egelida. Deinde ceratum myrteum imponere. Inter-
 dum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat, quo
 prurigne, & punctiõibus cognito, aperire id melius, eosque
 aculeos præcidere necesse habet. Reliqua verò curatio in vtro-
 que hoc casu eadem est, quæ ubi iactus protinus vulnus intulit.

Haftenus Cor. Celsus de fractura cum vulnere facta. Nunc
 cætera prosequamur. Dum valenter nimis siccantur ossa, cal-
 lus ægrè provenit: expedit igitur istis ita resiccatissimis ossibus, ter-
 tio, vel quarto die modice, aquam calidam infundere. Hanc
 metam finiendæ perfusionis habentes, cum carnes in rubrum
 tumorem attolluntur. Atque in ijs quidem, priusquam subside-
 re incipiant, desistendum est. Contrà, ubi digeri quid vo-
 lumus, non prius est desistendum, quam quod ex perfusione in-
 tumuit, subsidat. Si verò humiditas abundantior, calli gene-
 rationem impediat, ibi hanc siccare convenienti deligatu-
 ra & perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit, vel plurima,
 conabimur. Quippe minima (ut sexto methodi Galenus ait) cū
 prius desistat, quam aliquid confluat, & qui ad manum, id est, in
 superficie, sunt humores, per halitum digerit, & qui in alto sunt
 modicè liquat. Expedit autem ita solui liquarique ea, quæ per
 deligaturam sunt expellenda. Plurima verò perfusio plus di-
 gerit, quam attrahit: atque ita commodat superflue humidi-
 tati. Attendendum verò (ut supra monuimus) diligenter est,
 ut vel angeatur callus, si minor iusto est, vel inhibeatur, si ni-
 mius superuenit. Vtrumque autem vitium corrigitur perfusio-
 nis quantitate & qualitate, ciborum etiam, ac medicamentor-
 um, quæ extrinsecus apponuntur, facultate. Ac de perfusioni-
 bus quidem, & victus ratione, iam supra est dictum. Ex me-
 dicamentis verò quæcunque emplasticam substantiam habent
 (cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur) ac mo-

Siccitas cal- lo gignendo
lo gignendo obstitens.

Humiditas calli genera-
tionem impe- diens.

Que ratio- ne purus,
ne purus, vel augeri
vel augeri vel minui
vel minui possit.

dicē

dicè calfaciunt, ea (Galeno authore) callos tum promouent, tum verò augment. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderatæ aquæ temperatæ, perfusiones, & idoneæ frictions. Quæ verò digerendi vim obtrinent medicamenta, ea callos maiores iam factos eidem Galeno imminuunt. Cum recens adhuc callus est, medicamentis valde astringentibus Paulus vtendum esse censuit, compressamque admodum deligationem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita: hæc enim calli excrecentiam mi-

Si nimius callus super increment.

Lamina plumbea.

10 rè reprimat ac imminuit. Huius rei efficaciter quoque subuenit Celso, multa leuisque ex oleo, & sale, & nitro, membri perfrictio, plurimusque ex aqua calida salsa fots. Posthæc malagma quod digerat imponendum, adstrictiusque alligandū esse admonuit, imò verò oleribus, & præterea vomitu vtendum. Siquidem per hæc (vt existimat) cum carne callus quoque extenuatur. Confert etiam eidem aliquid de sinapi, cum sicu in alterum par membrum imponere, donec, inquit, id paulum erodat, coque euocet materiam. Atque vbi is tumor extenuatus, & qui nimius supercreuerat callus, ad medicocri-

20 tatem redactus fuerit, rursus ad ordinem vitæ reuertendum erit. At si solidus, lapideusque callus, qui sic immodicè increment, iam euasit, aperta ibi cute deradendus est, parsque eius emittens scalpri, & terebris etiam, si res exigat, admodum excidenda est. Cæterum solent aliquando in fracturis diuersa inter se ossa conferuere, & membra distorta callo firmari, difficultate functionum obsecundarum haud exigua subsequente. Quod vbi contingit & breuius membrum, & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assiduæ punctiones sentiuntur. Ergo vbi perfracta ossa sic conferbuerunt, & perperam ferruminata sunt, si tener

Si callus in lapideâ duritiem & incrementum nimio magnitudinē euaserit.

Si ossa diuersa inter se conferuerint.

30 saltem adhuc callus est, & non ultra sex menses, vt quidam dixerunt, radices egerit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id hoc modo fit: Calida aqua multa, vel decocto aliquo emolliente diebus aliquot membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, aut emplastro ex althæa, vel cataplasmate ex ficis pinguibus aridis, aliisque medicamentis callum soluentibus (porolytica Græci dicunt) contegitur. Deinde facta sufficienti emollitione, modo quem supra posuimus, à ministris duobus, qui in diuersa contendunt, intenditur: & inter hæc medicus chirurgus pertractans

distortū callos firmauerit.

Ossa quādo iterū frangenda.

40 ossa, vt callo adhuc tenero existente, manibus ea didu-

*Quid agant
chirurgi re-
centiores in
osse male fer-
ruminato.*

*Si ab osse
male agglu-
tinato vetu-
stas iam oc-
cupauit.
Albucasis.*

Auicennas.

*Ex recentio-
ribus.*

*Si membrū
ex attritu
corrūpatur*

cit, compellitque id quod eminet in suam sedem: & si parum
valuit ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regu-
lam obijcit, atque ita deligando (inquit Celsus) assuescere ite-
rum vetustæ sedis cogit. Nostræ ætatis chirurgi malè ferrumi-
natum os, in fractura non admodum antiquata, diebus plus mi-
nus quindecim, ut supra diximus, primum emolliunt. Deinde
id in diuersa extendi iubent, & genu vehementer impulso, ite-
rum frangunt: quod tamen vetustiores medici non probarunt.
Mox fracti ossis fines adamussim secum coaptant, ac ut supra
exposuimus curant. Si ab osse perperam ferruminato, vetustas
iam occupauit, ac callus vehementer obduruerit, satius est ma-
num illi (ut consuluuit Albucasis) non admoliri. Quicunque enim
id rursus frangere aggressi sunt, post vehementes cruciatus in
extrema discrimina laborantes adduxerūt, adeo ut valde pauci
eorum, qui hoc tormenti genus perpessi sunt, mortem euase-
rint. Atqui melius est eum, qui sic affectus est, claudicatu, aut
membrum alicuius deformitate affectum, ad annos adhuc mul-
tos supersitem remanere, quam post talem, tantumque crucia-
tum, miserrimè sic inter manus crudelis chirurgi occumbere:
Adde quod sæpenumero alio loco, quam ubi fractura iam co-
ierat, os ipsum (quod lapidosus callus firmauerat) frangitur, ut
præter quotidianum experimentum, nobis autor extitit Aui-
cennas. Quod si laborans, & qui illi assident amici, importunis
precibus, atque assiduo rogatu te compellant, ut ossis eiusmodi
malè ferruminati, & cuius callus iam obduruit, ac inueterauit,
curationem suscipias, in angustio spem esse coram illis prefator:
deinde opus aggreditor. Summam igitur cutem, & carnem
callo superiacentem cultro rasorio aut scalpello dextrè ac pru-
denter secato, magna cura habita, ne nerui, musculi vel lædan-
tur: deinde ossiū, quæ non rectè coaluerant, agglutinatione, seu
continuationem (quod aiunt excisorij scalprij dissoluito: mox
verò eorum sic diductorū fines secum adamussim coaptato, ita
ut prisinam unionem, quoad licebit, imitentur. Denum cetera
fiant, quæ supra scripsimus. Ceterum si ex attritu, membrum cor-
ruptelæ metus impender, protinus scarificandum erit reliqua-
que facienda, quæ supra, in gangrænæ, & sphaceli curatione
diximus: si verò tophacea aliqua duities post ossis perfracti
agglutinationem remanserit, ea modo qui in antidotario ex-
primetur discutienda, & tollenda erit. Fracturæ quædam, su-
pra diffinitum naturæ tempus, sine callo interdum perma-
nent:

De Fracturis.

357


nent: quod ob varias causas solet accidere, nempe vel ob affi- *Si fractura*
 duas solutiones, vel ob immodicas superfusiones, quas & fomen *sine callo sis*
 tationes vocant: vel ob intempestiuū motum, vel ex fasciarum *pra defini-*
 multitudine, nonnunquam etiam quia totum corpus, non suf- *tum tempus*
 ficienter alitur, quo in casu membrum quoque ipsum (vt Paulus *remanjerit.*
 annotauit) gracilius euadit. Oportet igitur cum alijs, tum præ- *Lib. 6.*
 cipue maciei corporis occurrere: quod commodè fiet, si vel cali-
 dis admotis materiam ad membrum perfractum euocemus, vel
 alimentum copiosius subministremus, & balnea, reliquasque
 10 animi voluptates adhibeamus. Porro eorum quæ iam callo fir-
 mantur, indicio esse, cum alia tum illud præcipue potest, si fa- *Note ossis*
 sciolæ cruentæ conspiciuntur, nullo etiam in parte oborto vul- *perfractical*
 nere. Quod ideo forsitan accidit, quoniam calli substantia, dum *is firmari*
 coit, in ossium cauernosos meatus perrumpens sanguinis gut- *incipientis.*
 tas aliquot inde extundit, exprimitque. Ac de transuersis quidē
 fracturis, hæc dicta sufficiant. De longis verò, quæ non
 tam crebrò contingunt, reliqua omnia ad eundem
 se habent modum. Cæterum comprimendæ
 hæc magis (Galeno auctore) in ipso fra- *Lib. 6.*
 20 cturæ loco sunt, tum quod recess- *methodi.*
 sit, retrudendum introrsus
 est. Ac de fractis qui-
 dem ossibus hæc-
 nus in vniuer-
 sum di-
 ctum
 sit.

FINIS LIBRI QUARTI.

z 3

Fos-

Formula Glossocomi, instrumenti ad gignendum callum in fracturis idonei, cuius pluribus in locis meminit Galenus.



A, Axis. B, Laqueus translativus. C, Laqueus in rectū procedens. D, Trochlea, seu rotula. E, Tabella. F, fractura. Vide huius machine seu instrumenti descriptionem apud Galenum lib. de usu partium. VII. & lib. VI. de morbis curandis. Item in commentarijs eiusdem in librum secundum Hippocratis de fracturis.

Generalis diuifio Lu-

XATIONVM, IN LIB.

V. INSTITVTIONVM CHI-
RURGICARVM, IOANNIS TA-
GAULTII MEDICI.

Luxatio, Græcis exarthrema, osis è sua fede di-
10 motio.

Simplex. Nulli alteri affectui coniuncta.

Composita. Alteri præter naturâ dispositioni complicata.

Luxatio tam simplex quàm composita,

Perfecta, siue absoluta, aut completa.

Imperfecta, siue non absoluta.

Completa luxatio, siue absoluta,

Cùm os suo loco omnino excidit.

Generis nomen retinet, diciturque absolutè **Luxatio Roma-**
20 nis, & exarthrema Græcis.

Luxatio imperfecta, siue incompleta,

Cùm os, non in totum, sed aliquatenus duntaxat suo natura-
li positu dimoritur, diciturque subluxatio Latinis, parar-
threma Græcis.

Subluxatio, seu imperfecta luxatio,

Peruersio, siue distortio.

Laxatio, seu elongatio ligamenti.

Peruersio osis, quæ spinæ vertebrae maximè est
30 peculiaris.

Lordosis, } in { priorem partem-
Cyphosis, } posterioriorem partem.
Scoliosis, } latera.

Compositæ luxationum differentia, posterioris
seculi chirurgi.

40 **Luxatio cum** { fractura,
inflammatione,
vulnere,
dolori,
duntic.

*He propriæ
differentia
non sunt, sed
complicati
affectus.*

Institutionum Chirur

GICARVM IOANNIS

TAGAVLTII MEDICI,

LIBER QVINTVS,

De luxatis ossibus in vniuersum.

*Quid luxatio, quæ sint luxationum differentia. & quot
modis ossa luxentur.*

CAP. I.

10

*Luxatio
quid.*



Vum luxationes fracturis proximæ sint, consequens est, vt de ijs generatim, (quæ admodum & de alijs supra in quatuor libris superioribus, commemoratis affectibus, fecimus) nunc sermonem faciamus. Luxatio igitur, vt formula quadam definiatur, est articuli è natuo positu, seu proprio (quod dicitur) acerbulo, in alienā 20

*Exarthre-
ma.*

atque insolitam sedem prolapsus, quo motus arbitrarius impeditur: Græci exarthrema vocant. Huius autem (vt Paulus inquit) nullæ aliæ differentia habentur, præter eam quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur. Quum enim articulus sua sede in totum excussus deciderit, communi generis vocabulo Græcis exarthrema, Latinis luxatio dicitur. Si autem è compagibus suis paululum duntaxat emotus est, aut vsque ad sinus seu cauitatis supercilium (nonnulli marginem vocant) prolapsus, nobis subluxatio, Græca verò consuetudine pararthrema nominatur.

*Pararthre-
ma.*

Sub qua sanè differentia, & laxationem, seu vt vulgares chirurgi 30 Auicennæ interpretem sequuti loquuntur, elongationem ligamenti comprehendimus, sicuti & distortionem, ac peruerfiones cum pluribus ossibus, tum verò maxime spinæ vertebris familiares. Ossa duobus modis potissimum suis sedibus Celfo mouentur. Nam modò quæ iuncta sunt inter se duntaxat (inquit) debiscunt (vt cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius a cubito, & in crure tibia à fura, atque enam interdum à saltu, calcis os à talo, quod rarò tamè fit) modo verò suis acerbulis ex toto prolabantur, hoc est, suis omninò se-
dibus excidunt. Vertebrae nanque & articuli propemodum 40
omnes

Cæ. II. lib. 8.

*Quæ ossa
inter se de-
biscant.*

- omnes, tamen si validis nervis ac ligamentis comprehendantur, sæpius tamen suis sedibus elapsi decidunt: aut vi scilicet expulsi, aut aliquo casu nerveis ligamentis vel ruptis vel infirmatis, faciliusque in pueris & adolescentulis, quam in robustioribus. Itaque modus hic posterior exarthrema: prior verò, quo tantum ossa dehiscunt, & suis ex toto sinibus haudquaquam prolabantur, pararthrema non immeritò appellabitur. Arque hæc sunt luxationum discrimina seu differentia. Præter has tamen aliquor adhuc alias posterioris ætatis chirurgi statuerunt, quæ reuerà differentia non sunt, sed potius quædam veluti præter naturam dispositiones, cum luxatione complicatæ: ut cum ipsi luxationi accedit inflammatio, aut fractura, aut vulnus, aut dolor aliquis ingens, aut tephacea quædam durities. Hæc enim, dolor inquam, fractura, durities, vulnus, & inflammatio, cum seorsum & per se subsistere possint, nullus unquam alterius (si saltem Galeno credimus) differentiam constituent. Si quis tamen protervè contendat, differentias esse, cum eo certamen inire recusamus: quandoquidem hæc curandæ luxationis ratione & pervertunt, & non parum aliquando inturbant. Ac de his quidem in sequentibus suo loco dicemus. Cæterum modis quatuor potissimum, quod ad situs differentias attinet, contingit ossa luxari aut perverti, seu aliquatenus detorqueri: in partem nimirum priorem seu anteriorem, posteriorem, internam, & externam. Alij superiorem & inferiorem addunt. Quædam autem in omnes quatuor partes, quædam in certas promouentur. Sed præstat singulorum exempla subijcere. Maxilla superior, cum non in homine solum, sed & in omni animante, præterquam in crocodilo, immobilis existat, luxatione non periclitatur: inferior verò subinde oris hiatu in anteriorem partem luxatur, alternatimve ac pervertitur, hoc est, aliqua ex parte distorquetur, & ex naturali situ in alterum repente transmutatur, quod verbo *ᾠσται* expressit Hippocra. Sed modò altera parte, modò utraque: toto autem loco non admodum excidit, ut idè annotavit Hippocrates: quippe quòd capita, id est, extrema, qui & processus appellantur, habeat in superiori maxilla, firmiter ac tutò cardinis modo infixæ, ex quibus nervosè tendones, validis annexi musculus, exoriuntur. Itaque hanc nunquam luxari contingit, nisi quàm maxima oris apertio fiat. Ut cum vel maximam rei alicuius molem ore excipere quispiam conatur, vel cum oscitando quàm maximè potest, os diducit, & in alteram

Quæ ossa proprie luxantur.

Affectus cū luxatione complicati.

Modi luxationum à situs differentia sumpti.

Maxilla inferior, quæ luxatur.

Capitis luxatio.

Vertebrarum spina luxatio.

Clavicula qui luxetur.

Brachij caput.

Genu in tres partes luxatur.

Cubitus, manus, & femur, in quatuor partes prolabantur.

ram partem os traducit, quorum primum raro contingit: secundum (inquit Galenus) euenire dementibus tantum potest. Capitis processus, in duos sinus summæ vertebrae dimissi, in omnes partes prolabantur: sed dum in partem posteriorem excidunt, mentum pectori agglutinatur, æger neque bibere, neque loqui potest: atque illi celerrimè mors iuperuenit. Vertebrae in spina & in posteriorem partem, & in priorem, tam supra septum transuersum, quam infra subinde peruertuntur, ac nonnunquam etiam ex toto prolabantur. Sed cum toto loco mutare sunt, nulla restitutionis spes relinquitur, præcipitemque etiam mortem inferunt. Nam intra triduum (vt Celsus ait) homo moritur. Clavicula (quam soli homini inter cætera animantia concessam esse Paulus existimauit) nunquam in totum excidit: quippe quæ pectori ita committatur, & inhæreat, vt ne moueri quidem in ipso possit. Interdum tamen ex violenta quadam extrinsecus facta percussione, paululum auellitur. Sed neque altero sine, qui humeri articulo inferitur, excidere admodum potest. Nam & à bicipiti musculo, & summo humero prohibetur. Brachij seu humeri caput, quod in sinum omoplae seu scapulae demittitur, modò ad ima in alam decidit, idque frequenter sed in ijs maximè qui non multa carne præditi sunt: modò (licet raro) in priorem & anteriorem. In superiorem verò ferè nunquam promouetur, vt quod ab utroque scapularum processu, & eo scilicet qui anchoræ similis est, & eo quod acromion Græci vocant, impediatur. Genu in tres partes excidit, anteriorem nimirum, posteriorem, & posteriorem iuxta popliteum. In priorem prolabi opposita patella prohibetur. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se (vt Celsus refert) curatum esse memoriæ prodidit. Cubitus, manus, & femur, in omnes quatuor partes prolabantur, nempe in anteriorem, posteriorem, anteriorem, & posteriorem. Atque hæc pro exemplis adducta sint. Nunc ad communem de luxatis ossibus tractationem reuertamur, & iuxta morem à nobis hætenus obseruatum, causas, signa, prognostica, & curationem luxationum in vniuersum persequamur.

De causis & signis luxationis ossium in vniuersum.

CAPVT II.

Causæ externæ.

Causæ luxationum ossium, & à sua sede motorum, quædam sunt extrinsecus ingruentes, vt casus, percussio, & violentia.

lenta atque incongrua membri alicuius extensio, aut distortio, seu peruersio. Quædam verò intrinsecus eueniunt, atque ideo internæ dicuntur, sicuti & superiores externæ: vt cum mucosus aliquis humor, & pituitosus, in articulis seu iuncturis aceruatur, qui articulationis ipsius ligamenta primum madefacit, deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit. Signa luxationum, quædam sunt omnium communia, quædam verò propria cuiusque. Ac de communibus duntaxat hic agemus. Hæc autem factionis Arabicæ principii Auicennæ à tribus potissimum desumuntur. Nempe vel à substantialiter (vt loquuntur) in hærentibus, hoc est, ab ijs quæ secundum essentia rationem insunt: vt à mala partis ipsius laborantis constitutione seu compositione, in qua & tumor præter naturam ea parte qua os prorumpit, & sinus seu cavitatis insolita ea à qua recessit, manifestò apparent. Vel ab ijs, quæ ex necessitate consequuntur (casus & accidentia vocant) vt à dolore, qui ex luxatione contrahitur. Vel ab actione læsa, seu operationibus etiam ex necessitate consequentibus, vt à morus afflictae partis difficultate, aut priuatione. Hæ itaque notæ in luxatis omnibus deprehenduntur, aliæ verò in singulis.

Causa interna.

Signa luxationum omnium communia à tribus potissimum desumuntur.

De prognosticis, seu iudicijs luxationum. CAP. III.

Consequens est, vt communia quædam de luxationibus iudicia, quæ & prognostica vocant, hoc loco subiiciamus. Primum prognosticum ex Auicennæ & aliorum quorundam scriptis erutum, ad hunc modum habet. Quibus luxationibus inflammatio, aut vulnus, aut dolor ingens & acris accedit, hæ præterquam quòd curata admodum difficiles sunt, periculo quoque non vacant. Ad eò vt aliquoties in ijs casibus tutum non sit, luxatæ particulæ reductionem aggredi, sed sic eam remanere (ne pro læsione mors sequatur) melius esse censent. Aliud. Vetusæ omnes luxationes, & quæ spatio temporis iam callo obduruerunt, vel difficillimè, vel nunquam consanescunt. Proinde statim, si fieri potest, reponi luxata debent. Luxatio, in qua (inquit Guido) franguntur margines ofsium, hoc est, sinus seu cavitatis supercilia, pessima iudicatur. Repulsi enim in suum positum articuli, inibi diu persistere non possunt: sed leuissima quæque occasione iterum relabuntur. Articuli qui neruorum ac li-

gamentorum.

gamentorum vitio prolapsi sunt, & postea in suas sedes compulsi iterum excidunt. Indicium evidens ossis in suam naturalem sedem reduci, est, cum veluti strepitus aliquis auditus est, dum in nativum suum acetabulum ingrediebatur: & membri nuper luxati figura, & conformatio, suae ipsius aut alterius paris figurae, quam simillima tum visu tum attractu deprehenditur. Ceterum si reposito osse nervi distenduntur, rursus id protinus (ut consultat Celsus) expellendum est. Ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim si in partem (ut supra diximus) posteriorem aliquando prolabitur, nunquam in suos sinus compellitur, sed mortem statim adfert inevitabilem. Sic neque in spina vertebrae, cum toto loco mutatae sunt: neque etiam maxilla, quae utraque parte prolapsa est, & antequam reposita sit, inflammationem concitavit, ut Celsus memoriae prodidit. Ossa, quae suis sedibus moventur, alia alijs facilius, alia difficilius & excidunt & reponuntur: nempe pro ratione & natura iuncturae unde propelluntur. Itaque genu ut facile prolabitur, sic non magno impendio in suam rursus sedem compellitur. Digitorum luxatio nullum etiam facessit negotium. Cubitus vero, ut tardius quidem ac difficilius excidit, ita prolapsus negotij plurimum exhibet. Aegerime enim propter tuberculorum seu eminentiarum, sinuumque frequentiam reponitur. Humerus autem ut neque difficulter admodum, praesertim in macilentis, elabitur, sic nec difficillime in sedem suam reponitur. Et ita de alijs. Multum quoque eo confert (ut Celsus inquit) & corporis, & nervorum, hoc est, tendinum, habitus. Nam si corpus tenue ac macilentum, si humidum est, si nervi & ligamenta infirma, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quae contraria his sunt, melius continent, sed id quod expulsus est difficulter admittunt. Quibus in pueritia articuli exciderunt, neque repositi sunt, minus quam ceteri crescunt. Quae loco suo non sunt, caro ea increscit, magisque in proximo membro, quam in vltiore. Ut puta si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio, & in hoc (brachio inquam) maior quoque, quam in manus acie. Tam pro sedibus & pro catibus qui inciderunt, aut maior aut minor usus eius membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. Inter luxarorum cuiusmodi prognostica numerantur & duo hi sequentes Hippocratis aphorismi. Qui-
buscunque

*Genu.
Digiti.
Cubitus.*

Humerus.

*Nervorum nomine apud Celsum ligamenta intel-
liguntur.*

*Ex Hippoc.
& Celfo.*

buscunque à coxendicum dolore molestatis, excidit coxa, & rursus incidit. ijs mucres superueniunt. Quibuscunque à coxendicum dolore molestatis diuturno, excidit coxa. ijs crus tabescit, & claudicant, si non vrantur. Hos autem nunc sic coniunctim legimus & interpretamur: Quibuscunque à diuturno coxendicum dolore constictatis, propter mucoris seu mucosi humoris ac pituitosi copiam, in articulo siue iunctura coxæ coaceruatam, § 194, id est, coxa ipsa, (hoc est, femoris caput, quod in coxæ siue ossis ischij cauo inferitur) suo naturali acetabulo propulsa excidit, & rursus incidit, (id est, in nativam suam sedem iterum spontè resiliit, aut alter repulsa est: inibi tamen diu persistere non potest, sed soluta compage lubrica continenter relabitur) ijs processu temporis crus (quod Græcis *ὀκλα* & dicitur, hoc est, totum membrum, tam tibia scilicet quam femur) necessario alimonix penuria contabescit, & ariditate conficitur, omnesque in claudicationem euadunt, si non vrantur, hoc est, nisi prius ferramentis igne candentibus vrendo, & mucus ille qui ossis ischij sinum occupat, absumatur, & laxitas cutis, ad quam femoris caput subinde lubricum

Aph. 49. 29.
50. lib. 6.

Interpretatio duorum
aphorismorum
Hippo.

20 procidebat, contrahatur.

De ratione curandi luxata in vniuersum. CAP. XIII.

QUum luxata suo nativo positu, in alienam atque (vt supra retulimus) insolitam sedem prolapsa sint, vna nimirum communis omnium luxationū curandi indicatio erit. Nempe luxati articuli & suo loco moti in propriam ac naturalem sedem reductio.

Porro, vt scopum hunc primum & vniuersalem assequaris, luxatum membrū in diuersas partes deceter extendendum est, donec
30 spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod suo loco excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere oportet atque ita in germanum suum acetabulum restituere, vt sinus seu cavitatis inchoata vacuitas impleatur. Hæc autem leniter, & sine dolore, quatenus fieri licet, agenda sunt. Ceterum non vna eademque in omnibus extendendi ratio est sed alia atque alia, pro natura scilicet partis luxatæ, proutque nervi ac tendines valent, aut ossa huc illucve sederunt. Modò enim manibus solis, modò habenis iniectis vtendum est, modò verò quædam alia machinamenta adhibenda sunt, vt ex vno
40 Hippocrate lecto, libro de luxatis & fractis, discere poteris.

Ab

Secundus
pms.

Ab ijs secundum quo tendes fuerit, vt membrum quod exciderat, & iam repositum est non amplius deinceps sua sede portabatur, sed inibi continenter perfistat. Repositi igitur articuli iunctura, modis omnibus statim firmanda ac roboranda est. Firmabitur autem optimè, si rosaceo perlinatur, ac postea pannus aliquis lineus gracilis, vetus, & lenis rhodino delibutus, ipsi applicetur, deinde si stupæ lenes ac panni multiplices, ouorū candido persusi, super accommodentur, & postremo si fascijs posita madentibus, pro ratione particulæ longis latisque, subligentur. Quinetiam ferulæ ex corio aut densa papyro factæ, si necessitas vocet, circumdandæ sunt. Cauenda autē semper est vehementior perstrictio, ne inflammationem moueat. Iis ita ritè apparatis, membrum in figura ei maximè naturali, atque à dolore alienissimum, ad quietem reponendum est. Nec verò ante diem septimum, aut etiam decimum, si nullum symptoma prauum accesserit, ipsum resolvere oportet, aut alijs adhibitis medicamentis curare, sed ita finire. Porro nihil noxæ attuleris, si dum legitimo tempore resoluitur, & secundo curatur, aqua modice calida foueris. Hic enim foris gemina tūc ratione prodest. Nam & dolorem (si quis sit) demulcet, & quod in laborante particula noxium conceptum est, digerit. Vbi autē sic vt res exigit luxatum membrum foueris, mox huic emplastrum adhibebis, quod constet polline, id est, farina volatili, puluere rubro communiter appellato, & albo oni in vnum corpus redactis. Post hæc verò membrum strictius obligandum erit, vt Razes medicus Arabs percelebris consuluit. Ad eundem quoque modum, vt etus omnis luxatio, & quæ spatio temporis calidam obduruit, non modò foris eiusmodi aquæ simplicis calidæ (qui in hac re plurimum confert) antequam reducatur, desiderat: sed etiam & cum, qui fit ex decocto maluar, althææ, fenigræci, atque id genus aliorum postulat. Quippe qui molliat, laxet, discutiat, & membrum aptius extensioni efficiat. Recentes verò adhuc luxationes, & quæ nuper inciderunt, eius naturæ foris tanquàm sibi non parum incommodantes auersantur & respuunt. Hi enim calfaciendo ac humectando relaxant, & dissolunt vnde pars ipsa afflicta imbecillior rediditur, & ad recipiendam fluxionem pronior. Proinde & inflammationi opportuna efficitur, & luxati sinus superflua humiditate oppletur. Inde consequitur, vt articulus in nativo suo acetabulo diu persistere non possit, sed lubricus ac subterfugiens

- giens delabatur. Vetat etiam Auicennas pannos impensè calidos membro recenter luxato admoeri, ne fluxionem etiam euocent, & inflammationem eo loci excitent. Quin potius eos cerato (inquit) refrigeratorio, aut vino aliquo austero imbutos adhibere conuenit. Cæteram luxato, ita ut dictum est, in suam sedem reducto, firmatoque, & ad quietem conueniente schemate seu figura reposito, ipsum à dolore, & inflammatione vindicandum est, qui tertius est scopus in curandis luxatis medenti propositus. Hunc igitur si consequi studueris, humorum
- 10 in partem affectam influxum modis omnibus prohibeto. Si enim fluxione tentetur, & dolorem statim perferenscet, & inflammationem experietur. Quæ duo incommoda in luxatis & fractis maximè vitanda sunt. Hæc autem deuirabis, si quæ roborant & repellunt, parti luxatæ, ut paulò antè docuimus, adpoueris: si præterea tenuem ab initio probamque victus rationem ægro imperaueris, illique venam, si nihil prohibeat, iuxta periti alicuius medici præscriptum secueris: & ventrem, si opus est, purgante medicamento subdueris. Vtroque enim auxilij genere (purgatione inquam & sanguinis missione) fluxionem (si commodè adhibeatur) à laborante particula auertimus. Verùm enimuero si ante quàm ad curationem voceris, luxata pars iam dolore infestetur, aut inflammatione occupetur, non prius eam in locum suum à quo excidit reponere tentabis, quàm dolor finitus fuerit, & inflammatio conquiescit. Si enim membrum sic dolore, aut inflammatione affectum distendendo lacesiueris, periculum est ne conuulsio, vel nervorum dissentio, aut aliud prauum id genus symptoma suscitetur. Hoc præceptum in luxatis omnibus diligenter, curiosèque obseruandum: à Cornelio Celsò ex Hippocratis sententia,
- 30 non minus doctè quàm eleganter, ijs verbis traditum est. Quicquid loco suo (inquit) motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa iam occupauit, dum conquiescat, haud quaquàm lacesendum est. Vbi finita est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur. Oportet autem inflammationem ipsam atque dolorem leuare succida lana ex hydrelæto, id est, aqua & oleo moderatè calido, aceticque momento, superimposita. Si verò etiam febris accessit, & ossa quæ suo loco mora sunt, validisque plenisque musculis & tendonibus contineantur, curiosius omnia facienda sunt: sed maximè quæ
- 40 ad victus rationem, venæ sectionem, & purgationem attinent. Cæterum

Tertius scopus.

Quartus scopus, qui est acciderium correctio.

Cap. II. li. 3.


Loc^{us} hic corruptus est apud Cel. quæ ita restituenda putam.

Cæterum sedato dolore, & finita omninò inflammatione, plenior victu (sicuti & de fracturis dictum est) laborans refici potest, cibisque uti bonis, uti vino modicè. Ac sub finem quidem curationis, si è sententia res cefferit, luxatum ipsum roborabis perfusione aquæ decoctionis rosarum, absinthij, & musci albi quercini. Peracto foru, Guido à Cauliaco iubet superponendū esse spanadrapum, quod vocant, aut oxycroceum. Sed iamque ad usus quoque suos, id membrum sensim, ac suavitè promovere oportet. Morus enim ut in dolore, atque inflammatione noxius, ac (ut ita dicā) pestifer, sic aliàs luxato præsertim iam obfirmato, saluberrimus corpori est. Si luxatis ossibus vulnus quoque accessit, multa diligentia, ac etiam prudentia est opus. Dum enim hæc reponuntur, ingens periculum, nonnunquam & mortem etiam maturam inferunt. Nam cum ex distensione adiacentes nervi & muscoli inflammantur, dolores validi, convulsiones, & febres acutæ oboriuntur, atque hoc præsertim in cubiti gibbero, genu, superioribusque articulis etiam magis. Quantò enim principalibus membris, luxati cum vulnere articuli, viciniore sunt: tantò maior timor est. Sed eò quoque gravius periculum concitatur, quo maius membrum est, quoque validioribus nervis, aut musculis continetur. Ideoque humeris femoribusque metus mortis est. Ac si reposita ossa sunt, spes (inquit Cels.) nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoque maior in viroque timor est, quò propius vulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates horum repositionem, valentiorēque deligaturam omninò aucturatur, solisque inflammationem abigenis, & mitigantibus præfidijs, per initia uti iubet. Sic enim (inquit) ipsis superesse licebit. Itaque nihil tutò reponi posse præter digitos, & plantas, & manus, dixit: atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præcipitent. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet, nisi ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Cæterum quod ipse in solis digitis faciendum consulit, id nos in reliquis quoque articulis facere aggrediemur, ac statim quidem inter initia, dum pars adhuc inflammatione vacat, prolapsum cum vulnere articulum mediocri intentione (validam enim citra periculum perferre non potest) reponere tentabimus. Quod si iuxta animi institutum evenerit, in sola ratione, quæ inflammationem arceret, persistemus. Si verò inflammatio aliqua, aut convulsio, aut quidpiam ex supradictis, re-


*Lib. de luxa-
torū fracto-
rum ve ossiū
coaptatice.*

posito osse acciderit, rursus id (si modò sine vlla vi potest) suo loco protinus expellendum est. At si hoc quoque discrimen, seu periculum metuamus (non enim inflammatus articulus sine vi fortasse cederet, & sua sede iterum propelleretur) satius fuerit per initia in maioribus quidem membris, vt femoribus & humeris, superfedere, & repositionem differre. Vbi verò inflammatio conquieuerit (id autem fit communiter post septimum nonumve diem) præfati etiam periculum apud necessarios ægrotantis, quod ex repositione futurum sit, tum quòd si non reponatur, 20 debilem ea parte hominem, & claudum manumve prorsus fore, conabimur tuto, & sine vlla violentia, os in suam sedem compellere. Porro vlcis curationem eandem quæ proposita est in fracturis cū vlcere, administrabimus. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neq; repositum est, sic (si Celso & Hippocrati credimus) iacere conuenit, vt maxime cubantem iuuat: tantum ne moueatur, ne ve, dependeat. Si luxatio cum fractura, sine vlcere tamen euenerit, comuni ratione membrum extendendum est, ac manibus conformandum, vt in simplicibus fracturis superiore libro docuimus. Si verò etiam vlcus 20 accedit, rursus ab ijs quæ de fracturis cum vlcere, & luxationibus etiam cum exulceratione incidentibus priuatim à nobis dicta sunt, congrua repetenda curatio est. Ceterum, vt verbo vno dicamus, si cum fractura luxatio incidit, hæc primum, si fieri possit, illa verò secundò curanda erit. At si ante fracturæ administrationem luxatum commodè reduci non possit, fracturam ipsam primum curabimus, deinde cum fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis curationem aggrediemur. Quòd si luxatio inueterauerit, & ob temporis spatium, callosa inibi durities contracta fuerit, ea decocto maluæ & althææ (quam officinæ bismaluam appellant) perfundenda est, deinde vnguento dialthæa vulgò nuncupato, collinenda: post hæc, emplastrum quod Diachylon magnum nominatur, super apponendum erit, vel eius loco, lana succida viscillagine quapiam emolliente delibuta. Ad hoc etiam efficax habetur, cortex radicis maluauisci, hoc est althææ, in aqua decoctus, & cum æxungia, vel anserino pingui subactus, vt quasi malagmatis lentor contrahatur. Itaq; loco sub his sufficienter emollito, luxatum in suam sedem dandum est.

*Si luxatio
cum fractura
euenerit,*



- A Os coronale, quod & os frontis appellatur.
- B Clavicula, & ossa furcula.
- C ἀνωμιορ, processus superior omoplate.
- D Caput brachij, seu pars humeri superior.
- E Os pectoris, quod σῆγορ Graci vocant, constans ossibus septē ex-
pientibus: septem veras costas, quæ superiores sunt & perfectæ: infe-
riores vero, quæ numero sunt quinque, nothæ, imperfectæ & mendosæ
dicuntur.
- F Chartilago fini sterni adhaerescens, ab ensis similitudine dicta
10 Gracis ξιφοειδής, hoc est, ensiformis: vulgus malum punicum seu
granatum appellat.
- G Brachium, seu humerus & os adiutorij Guidoni, omnium ossium
(femore excepto) maximum.
- H Collum brachij.
- I Humeri orbita trochleis similis.
- K Os inferius & longius cubiti, quod Latinis ulna, & nomine to-
tius cubitus dicitur, Guidoni & vulgo socle manus. Græcis ὠχ-
minimo occurrit digito, ἐπὶ: rectum, ut superius obliquum.
- L Os superius cubiti (latius sumpto nomine) quod Latinis radius,
20 & socle minus Guidoni, Græcis vero ῥαδιός vocatur: occurrit pol-
lici.
- N ~~καρπος~~ Græcè, Latine brachiale, & rasceta Arabicè. Constat ossi-
bus octo duris & exiguis. si os quod ad pollicem pertinet, non nume-
raueris. *moneta*
- O μετὰκαρπιον, id est, post brachiale, & pecten, constat tantum
ossibus quatuor Galeno, a sese distantibus, palmam inter digitos ad
carpum explentibus. *quæ hæc hæc moneta*
- P Ossa digitorum, quæ numero sunt 15, nempe tria singulis.
- 30 Q Pateilla & rotula genu, græcè nonnullis μύλα, id est molla, alijs
ἐπιγρανῆς, quasi supra genu, os chartilaginofum nulli alteri con-
ferunt.
- R Os balista vulgo Latinis talus, ἀστέρας Gracis.
- S Os σφαγιον, hoc est, maniforme, sua cavitate navis simile, unde
nomen sumpsit, circumambit caput astragali. *adcan*
- T Ossa tarji, & rasceta 4 carpo respondent.
- V Ossa pedum, seu pedij ac plantæ 5, figura tereti & oblonga me-
tatarso respondent.
- X Ossa digitorum pedis, quæ numero sunt quatuordecim. In singu-
lis digitis præter pollicem terna.



B Sutura labdoeides, posterior in occipitio : anterior qua in scin-
pate est, *σιερασια*, id est, coronalis dicitur. Vide in prima figura.

C Sutura *δελταία* dicta, qua recta & sagittalis vulgo ap-
pellatur.

E Scapularum ossa duo, pone pectus sita, lata, figura tri-
quetra, Graecis *ωμοπλάται*, Latinis scapula operta, vulgo spa-
ihula. Nulli alteri ossi committuntur.

G Collum omoplatae.

H Os sacrum, *τερόν* Graecè, amplum seu latum quibusdam appel-
10 latum, finis spinæ dorsi.

K Os femoris, quod brachio seu humero, hoc est, ossi adiutori
respondet, Graecè *μυρὸς* dicitur.

L Caput femoris.

M. Collum femoris.

N Throchanter.

P Tubercula duo ossis femoris.


DISTICHON OSSIVM NV-

MERVVM COMPLECTENS.

20

Adde quater denis, bis centum senaque, habebis
Quam sis multi plici conditus osse, semel.

Ossa fiunt è semine, cum id quod est crassissimum, à calido vrente
induratur, sicut lapides coquuntur à calido vrente. Sunt autem
ossa veluti truncus sustinens reliquum corpus.



- A Offa βρεγματος, id est, sincipitis 2. vulgo parietalia appellantur.
 B Offa λιδοειδής, id est, lapidosa vel petrosa 2.
 C Os frontis 1. quod & coronale vocant.
 D Os occipitis 1. densissimum & firmissimum.
 E ζύγωμα, vel os ζυγοειδές, id est, iugale & paris vulgo superiorem
 maxillam capiti coniungit.
 F Os σφυνοειδές, cuneae formae, basilare, aliquando à multiplici for-
 ma πολύμορφον, colatorij, cavilla.
 G Maxilla inferior: haec in maximis oris hiasionibus interdum à sua
 10 sede distortetur.
 H Processus duo maxillae inferioris.
 K ὀλίκρανον, seu cubiti tuber, superior vlnae processus grandior:
 Hippocra. ἀγκῶνα nominavit.
 L Offa validissima quae ossi sacro committuntur. Arabicè gasber-
 ua dicta.
 M Os ilium, & anchæ, pars superior ossis coxae.
 N Ιχίον, seu os ischij, quod recipit femoris caput. Pixis coxae dicta.
 O Os pubis & pectinis, pars est anterior ossis coxae ad pudenda.
 Q Os maius tibiae, quod & tibia nomine totius appellatur, & crus.
 20 Vlna seu cubito respondet, κνήμη Graecis nominatur.
 R Περὶον seu fibula, & os surae. os minus tibiae radio cubiti, quod fo-
 cile minus appellant, consimile.
 S Malleolus externus, ima pars fibulae.
 T Malleolus internus, pars infima cruris seu tibiae.
 V Os calcis, seu calcaneus, Graecè πτέρυν ossium pedis maximum.

Institutionum Chirur

G I C A R V M L I B. VI.

DE MATERIA CHIRVR-

G I C A.

P R A E F A T I O.

*Interpretes
materia chi-
rurgorum.*



*Laus aliqua
Arabum &
posterorum.*

*Vnde peten-
da materia.*

*Natura fer-
tilitas in ma-
teria chirur-
gorum.*

*Pronæa chi-
rurgos po-
tius quam
epicurea.*

E materia remediorum, quæ ad chirurgū¹⁰ pertinent, plurima quidem Hippocrates, Galenus, & ante hunc Anazarbæus Dioscorides memoriæ tradiderunt. Quædam posteritas addidit non fraudanda laude: sua enim veterum, sua posterorum gloria est. Atq; iniquum decreti genus est, quod omnem fructum laudis & gloriæ huius disciplinæ vni Græciæ detulit, vt Arabum ac posteritatis studia perpetuis tenebris opprimantur. Illaudato solo laudatæ fruges læpenero proueniunt: Vixerunt Græci in media luce litera²⁰ rum. Extiterunt Arabes, & inde ductæ familiæ, iam desertis ac sepultis melioribus disciplinis, digna tamen luce æternaq; memoria nobis reliquerunt. E viuis fontibus Græcorum remedia primum petenda sunt: sed ita, vt nec Arabū riuos, nec posteritatis ingenia contemnamus. In his hauriendū quod saluum & incolume: repudiandum, quicquid fecerit cœnum, & disciplinæ veterum malè conuenerit. Atque omninò hac parte perlustranda nobis naturæ fertilitas, à qua omnis vberitas, & quasi sylua remediorum ducta primum est. Nusquam natura magis luxuriat, nulla in re pariter atque his chirurgiæ opibus ambitiosa est. In quibus³⁰ tam prolixè vnmen suum explicat, vt Pronæa illa non tam Epicurea, quod quidam ait, quam chirurgos fuisse videatur: Plurima quidem ad voluptatem & delicias hominis: omnia verò ad salutem eius & conseruationem chirurgus comparauit. Nam quæcunque tota rerum facie exposita, quæcunque cauernis terræ ac visceribus latent, quicquid est aquarum, stirpium, animalium, terra, ignis, maria, chirurgus inseruiunt. In fece rerū & excrementis, in carie, in rebus minimis, obsoletis, ac propè nullis, remedia condita sunt. In re vna multiplex natura vario genere remediorum fœta est. In apicula quàm variè lufit, quàm multas⁴⁰ diui-

- diuitias chirurgo condidit, mella, ceram, metyn, sandaracham, fauos, propolim, quicquid denique locuples illa alueorū respública continet. Quin & apes ipsas ad auxilia transfudit. Et in homine multa sunt, quæ profunt homini, ut quocunque animum aduertat, quocunque oculos conijcias, remediorum turba sese offerat. In quo summopere probanda est maiorū diligentia, multoque magis imitanda studia, qui in ea vastitate rerum nihil intentatum, nihil in expertū reliquerunt: omnia elaborata & summo iure existimata, literis consignarunt, quibus iam perfrui datum est, alienis scilicet bonis. Primum ergo consuetudine, natu-
Tacentur nostri homines.
- ra, & maiorum historia, infinita nobis materia comparata est, quæ iam deserta ac suppressa iacet, quia neglecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta: satis pyxidicula: hic vno atque altero remedio contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec vlli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia, quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri elementa sordet, & quicquid elementare est. Hinc noua elementorum soboles, hinc æther & cælum ipsum ad remedia exprimenda sunt. Vernaculæ sunt nobis atque domesticæ, naturæ opes, quibus vulne-
Argumentū libri explicatur.
- ra coniungas, repurges sordida, sinus impleas & cicatrice regas, cæteraq; præstes omnia, quæ chirurgi opere continentur. Verum suis cuiq; studijs frui liceat. Nos ex immensa, omnibusq; exposita naturæ sylua & maiorum historia, quæ iam publica vel multorum fide consistit, remedia transferemus. Exhibebimusq; rudimentum operis, suis quidē lineis descriptū, quod alius impleat informet, suis deniq; numeris absoluat. Nos speciem aliquam & formam argumenti adumbrabimus, secuti Cosmographos, qui totius orbis ambitum angusta tabula cōtrahunt. Idem enim cōdonandum nobis, cum non alios fines imperij, alios materię, de-
Antidotarium.
- qua præfens instituta oratio, natura posuerit. Genera quædam rerum & precepta artis primum explicabimus, utendi methodū, & leges aliquas instituemus, ex quo censetur particularis materia, & formulæ describentur, quas partim ars ipsa reperit, partim optimorum medicorum vñs atque experientia comprobauit. Antidotarium inscribunt hoc genus argumenti, nulla ratione aut vñs veterum, sed, ut fuit annorum licentia, è Græca voce Latīna analogia nomen detorserunt. Multa nobis, plurima alijs reliquimus, ne volumen, quod quinque libris Ioannis Tagaultij, & hoc de materia chirurgica commentario cogendum erat, in maiorem molem accresceret: deinde nō plus operæ hac
in

*Laus operis
Ioannis Tagaulij.*

in re licuit collocare nobis, quam à quotidianis studijs, statatq; interpretandi cura relictum fuit, idque breviori tempore, quam hoc institutum nostrum, breue quidem, sed varium, exposulet. Ideoque dignum venia, si contracto ambitu verborum, pressaque periodo, quædam describentur. Et in tam numerosa medellarum turba potior est verborum moderatio, breuib;que sententijs res premenda est. Ad hæc ponimus idoneos esse huic doctrinæ, qui iam intacti fuerint præceptis artis, quam Ioannes Tagaulius singulari ingenio atque incredibili studio informavit. In qua genera morborum diuisa sunt, circumscriptæ formæ, designata indicia, notata præfagia, institutæ leges, scriptæ medellæ plurimæ: in qua quæcunque collabebantur in disciplina veteri, constituta, quæ vitium fecerant, reformata: tota denique ars, quasi rediuuio lapide instaurata est. Vnicam hanc partem operis interceptus negotijs in nos transtulit, quam ideo recepimus, ne & publica ratio deserui à nobis, & officium necessitudinis repudiari videretur. Multa igitur è Græcis, quædam ex alijs transtulimus. Quæ à Guidone, eiusque notæ scriptoribus rudius tradita sunt, paulò purius reddere contendimus, etiamsi intelligamus vitia corporum non curari eloquentiâ. Sed nec barbarismo depelli possunt. Probamus quidem omnem orationem, modò sententijs rerum, quasi suo succo & sanguine condita sit. Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quod barbarissimus ille multas sæpe tenebras rebus attulit, & optima quæque fordescent plurimis, quæ fordidis, nec ita puris vocibus describuntur. In damnandis quibusdam rebus, authores Græcos adhibui: in remedijs ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæque ut res præsto sunt facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus 30 veniamus.

De repellentibus.

CAP. I.

Utilitas repell.

Vacuatio.

AΠΕΡΣΙΝΓΓΙ Græci vocant, quibus & initijs fluxionum, & post initia utendum est, quamdiu videlicet humor affluit: hinc enim phlegmones ortus atque incrementa hinc vomicas, maligna vlcera, febrium dolorumque causas, alia denique permulta vitia corporum declinamus. Ideoque principijs obita. Sed vacuandum prius corpus est, si quidem postulat casus, ac ferè postulat: 40 quia

- quia in plethora & cacochymia, rheumatismi plurimum commouentur, quanquam etiam in mediocri vino humorum & copia, ubi phlebotomo vel pharmaco natura leuanda est. Idem remedium sapientius innouandum, si quidem metus est, ne cum incaluerit morâ, affecta inde pars nimium recalciscat. Vis quoque remedij vitio cõferenda: Leuius enim pharmacum vt lactuca, in graui ardore frustra est: fortius, qualis est succus è pomo Mandragoræ, liuore inficit, indurât scirrhum, & aliquando ita reprimat, vt in viscera fluxionis impetus rapiatur. Ad consilium adhibenda hæc omnia, natura, situs, figura, sensus, robur, partium, humoris copia, qualitas, corpus, viæ præterea per quas is illabitur. Neque perpetuo satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi: aliquando enim superius collocandum: vt veluti præmissa manus vias interceptat, nequid transfluat, ubi venarum ductus atque coniugia animaduertenda. Cæterum reprimentium consuetudine naturæ admodum controuersa est. Arabibus repellant quæ influxum prohibent, refrenant, crassant, illinunt, oppilant, quæ denique robur partium confirmant. in Græcorum libris astrigentium materia cum repellentibus ferè commiscetur. Apud latinos Cor. Cels. scripta reliquit, quæ simul repellant atq; refrigerent, & rursus quæ sine frigore repellant. Auerroes in chronicis alia scribit vnâ astringere atque reprimere, alia astringere quæ non reprimant. Sed vtriusque, vt aliquot locis Arabum, in censenda materia non sine vitio est oratio. Iustissima Græcorum sententia, eaque nobis explicanda est. Repellit perpetuo quod frigidum est: frigidum aliud aqueum natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia, quod quia astringit & magis contrahit partes, efficacius reprimat: aut certè solum id efficit, si quidem ab actionis vehementia repellentibus nomen inditum est. Ac certè in rheumatibus præstantissima medicamenta sunt, quæ cum quadam astringitione vehementer siccant vt non mordeant: qualia terrena sunt. Quanquam & alterum genus, quod aqueum est, vtrunque reprimat, & ex æquo frigidum vel terreno frigidius est, ac refrigerio magis conuenit. Verum præterquam quod humor frigore repercutitur, si quidem accessit confringendi vis, quod iam coit, loco exstringitur, magis etiam si tenue est: & si quid reliquum sit, sæpenumero recalcatur: confirmatur pars, vt sine pharmacorum ope quod postea influat, possit retinere. Verum hac parte prouidendum, ne

*Modus.**Quæ ad consilium adhibenda.**Conuersare repellentia natura.**Græcorum sententia.**Cautio in astringentibus*

ne quid nimis, ne cutis grauius contrahatur, crassescat humor, dolor exasperetur, fluxio increascit: grauius denique incendium irriteretur. Atque vt initio quidem te iuuiffe putes, reliquum tamen & scirrhus & contumax perficitur, quod impofterum ægerrimè discutias. Ac grauior metus, si quid viscerum infirmus est. Excipit enim celeriter quicquid retunditur: vbi omnia firma sunt, in magnas venas & viscera citra periculum aliquid refluet. Videndum quoque ne vltra modum contrahas in materiæ copia, crassitie, vitio, molli vegetoque sensu corpore, dolore graui pariter & calore. Vbi laxanda potius via est, vt diffuatur calor, ac dolor temperetur: qui vbi cruciat vehemens, ad laxantia & anodyna omnino confugiendum est. Adstringenti simul atque repellenti auxilio vis efficacior est, si quid tenuium partium vel natura insitum, vel arte commixtum est, modò non mordeat. Iusto enim calore temperari potest, multò magis, si (quod ferè fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitas orta est. Pestiferæ materiæ non occurrimus, vbi in superficiem diuertit: sed potius illicimus, atque rapimus vi maiore, si tardius mota resistit. Neque dissimilis ratio est in criticis apostematibus, coxarijs, lue venerea, vbi nò repellenda in corpus, sed foràs potius materia trahenda est. Iam verò quæ illinunt, oppilant, offarciunt, aliàs quidem dolorè leniunt, aliàs acrimoniam hebetant, viasque intercipiunt. Ex quibus si vis, reprimant: ac reuerà nonnunquàm reprimunt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinum, oui candidum, aliæque id genus. At gummi genera, resina, gluten, farina pistrinalis, gyris tritici, hydrelæo, oxelæo, Rhodino, repellente succo, austero vino dissoluta, non tam sponte sua, quàm aduentitia vi reprimunt. Adstringunt calida, folium, casia, cinnamomum, spica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myrrha, absinthium, marrubium, polium, saluia, centaurium, vina quidem austera, & aromata plurima. Reliqua verò tum austera, tum acerba in proximum ordinem referemus. Leniter repellunt aqua, vinum, lactuca, intyba, polygonium, trifolium, auricula muris, lenticula palustris, psyllium, liquor oui, vmbilicus veneris, semperuium, portulaca. In summa, quæcunque frigida aqueo elemento soluta sunt. Omphacium adstringendo efficax: Solanum ambigit. Hoc potentior rubus est immaturo fructu & floribus: mollioribus autem folijs & asparagis plurimum aquæ continet, ideoque leuius contra-

Vbi non repellendum.

Oppilantia.

Quæ calida adstringunt.

*Materia repellentium.
Aquea.*

*Omphaciū.
Rubus.*

hit.

- hit. Adstringunt vitium folia, & capreoli, plantago, sorborum, cornorum, mespilorum, pirastrorum, cydoniorum, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, rosarum capita, obelisci: deinde, sed minus, semina, flores, & folia: oxyacantha medicocriter, malicorium magis, cytinus, balanitia, rhus, acacia, bolus Armenus, terra sigillata, quercus, cupressi folia, germina, & nuces. Vehementer refrigerant pomi mandragoræ, hyoscyami & papaveris succus: quæ reliquis interdum temperari possunt, ubi acrior inflammatio est, sed prius auferenda, quam inde partes luorem ducant. Spongia è frigida expressa partim contrahit, fluxum inhibet, dissipatque in viciniam, quod iam coijt. Eodem modo lana succida & splenia austerio vino insuccata. Magis etiam, si aqua prius, galla & similia incoxerint. Vinum aquæ præferendum, & maxime austerum, ubi reprimendum est. In deligationibus fasciæ vino insuccantur. Acetum repellit, adstringitque vehementer. Caphura repellit, & tenuitate partium facile permeat. Oculis populi veteribus Græcis calfacit. Repellit gypsum oxycrato maceratum. Olei rosacei frequens usus est, sed sit ex oleo omphacino, in quo rosæ sæpius muratæ maduerint. Quod annum superat, exoletum est. Oleum omphacinum si desit, recenti oleo & vix æcerbæ succo vnâ coctis, dum succus omnino exhalauerit, fingito, & ad ignem saligno ramo, vel simili assidue commoueto. Oleum verò nec sit conditum sale, nec ætate rancidum: in myrtino, melino, lentiscino, & similibus eadem vitia fugienda sunt, vetustas, rancor, salugo. Mastichinum, nardinum, costinum, adstringendo roborant, & calfaciunt. Vitiosum oleum, cum integrum desit, tandiu eluatur, dum virus exuat. Eluatur aqua vel simplici, vel rosacea. Descriptæ materiæ
- 30 oleum vim combibet, si vel materia ipsa, vel succus eius oleo incoquatur. Plātaginem gratia exempli, oleo recenti & pari aqua aut vino coques, dum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculosus olei usus est, quia calore incenditur & frigit. Expressis succis melius vitimur in lana succida, panniculis, ac splenijs. Portulaca, semperuiuum, umbilicus veneris, ægrè succum reddunt: nisi in mortario tritis aliquid omphacij, vel liquoris similis affundatur. Cataplasmata fiunt farina in succo pista. Ex oleis cerota coeunt, & succis imbuuntur. Remedia neque dura fiunt, neque graua, ne presso loco dolores
- 40 augeant. Cerusa cichorij succo & aceto leniter diluitur.
- Cera.

*Que rebe-
menter refri-
gerant.*

*Aqua.
Vinum.*

Acetum.

Rosaceum.

Rō in oleis.

*Olea facti-
titia.*

*Cautio.
Succorum.
vsus.*

*Cataplas-
mata & ce-
rota.*

Cautio.

- Ceratum à Psyllio.* Ceratum à psyllio, Psyllij vnc. quatuor in aquæ hb. quatuor macerentur percoquanturque expresso succo, adde rosacei libram vnā: ceræ vnc. sex, contra articulorum rheumata. Non absimile ceratum rosaceum. Duplice vase cera cum oleo liquefit: vbi refrixerint, conspersa aqua commouentur, aqua reijcitur, fuccus plantaginis affunditur, vt quantum fieri potest, absorbeant. Inflammationes, sinus, vlcera genitalium quæ serpunt, adiuuat. In teneris corporibus idem ceratum coriandri succum imbibat. Coriandrum leniter adstringit, alijs refrigerat, Galeo calfacit: vtcre incrementis. Ceratum myrtinum & melinum **10**
- Cerata magis adstringentia.* magis adstringunt. Herpetibus, & nimio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini libra vna, ceræ vnciæ duæ: pollinis myrtorum vncia vna. In ceratis vtendum cera, quam adolescentior apum populus confecerit, ceram virginēam apiarij nominant, eaque ē nouis fauis separanda. Alioqui cera alba vtendum erit, non sponte quidem nata, sed factitia, qualis olim Tyrrhenica, quia suauior est, & acrimonia hoc genus remedium carere debet, ideoq; preferenda cera ē dulci ac diluto melle. In coagulato lacte & indē nascente inflammatione farina fabacea hydrelæo vel rhodino pista, mamminis imponitur. Idem opitulatur testibus inflammati. *Διά χαλκί- πικω.* **20**
- De lithar. & hydræ.* contra rheumata hoc modo temperari debet. Adipis suilli recentis, exemptis fibris vnc. duæ, olei recentis, lithargyri, ana vnc. tres: chalcitidis vnc. dimid. Consciendum arte medicamentum: vsus tempore, vnc. duas medicamenti, olei rosacei vnc. tres colligabis: vbi refrixerint, aqua frigida, succo portulacæ psyllij, lactucæ, vino austero, vt res postulat, sribiges, animaduertens quantum repellendum, adstringendum, refrigerandum, siccandum, leniendum, vt modò rhodini loco myrteum aut melinum mifceas: oxycratum hunc vel illam succum alijs præferas. Quod **30**
- Defensua.* sequitur, exprimit vlceribus quod influxit: & quod influat, repellit. Lithargyri vnc. quatuor: olei dulcis vel rhodini vnc. quatuor, aquæ vnc. tres: lithargyrum die vno hydræo coquitur: difficilius enim illiquefcit: teneris corporibus & paruis vlceribus conuenit. Defensua vocant ē boli Armeni parte vna, terre sigillatē dimidio, rosacei triplo, aceti vel succi repellētis dimid.
- Deligatio.* Liquidis reliqua infusa commiscuntur: vel ē bolo Armeno liquore oui cōleuato: deinde affuso succo ē capreolis vitium, aut omphacij. Fasciæ ritē conuolutæ in repellētibus censeri possunt: quales in fracturis, & qui ab vlcere sursum adducuntur: vt **40**
- adstricta

adstricta parte, & ita ductis orbibus paulatim laxes. Similiter cum altero membro atrophia intrabescence, alterum deligamus. Vincula quoque superioribus partibus iniecta, quæ videlicet materiæ curius est. Aliquando etiam inferiores illaqueamus, ut cum è crure exhalat virus quod viscera appetat, ex quo & epileptiæ & syncopæ causa præcidiunt. Sed in vlceribus plurimum & fracturis, vias laqueo comprehendere oportet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmone, putredo, syderatio, aliæque id genus conententur.

10

De attrahentibus.

CAP. II.

EΛκτική & ἰπικωστική: Græcis appellata, vsu quidem repellentibus conferri possunt, sed natura plurimum diffident calida, tenui substantia, quæque vi quadam rapiant, quæ in alto corpore posita sunt. Ideoque viscera,

Attrahentium materia.

internumque corpus exonerant, foras translata materia, venena in cutim euocant. Criticos abscessus accelerant, desperatos pleuriticos & fortasse attonitos releuant: inguinum tumores amplificat: quodque vel pestiferum, vel nimis vitiosum

Multiplex vsus.

20 medio corpore conceptum est, aliò petrahunt. Tabidas ac velut syderatas partes vitæ restituant: perfrigeratas spiritu resonent: vitiosam saniem exhauriunt, quæ nervis & cuniculosis vlceribus lateret: squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant: hydropicos exugunt: paxillos, clauos, spinas, fagittas reuocant: multò magis, si locus vlcis periculo inciditur, nec patitur æger angustiorē plagam ferro ampliari.

Quod in vomitibus, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus, reliquisque partibus altius deiecit, eliciunt. Multiplex ergo attrahentium vsus, sed nihilominus varia materia est. Alijs ea vis à natura insita est: atque in his modò manifesta qualitas elementaris: modò occulta quadam proprietate & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduentitia qualitate ex putredine contracta acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidum est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisugæ, pyulcus, fuçtus, dolor, vincula, frictio, cauteria. In attrahentium vsu aliquando quòd fuerit attractum, corpore excludimus: sed hic modus est, ne cum vitio partem frugi materiæ eripias. Nonnunquam tantum attrahimus, non etiam discutimus:

Differentia attrahentiũ.

30 ut quum in partem emortuam calor & spiritus attrahitur.

Quæ miscenda attrahentibus.

Argenti

- Particula -
ria materia.** Argenti spumam, ceram, resinam picem, oleum, epispasticis veteres miscuerunt, ut & temperaret, & magis emplasticum pharmacum efficerent. Quidam etiam adstringente materia obtundi voluerunt. In primo genere sunt dictamnus, propolis, ceram virginem vertit Scribonius. Rudis est & crassa materia in apum officinis, nondum cera: odore graui, ut quæ pro galbano veteres vterentur. Ea mellatione verna, separari potest fauorum pars quæ cellas obstitat. Sed iam exemptis fauis, posteaquam mella distiuxerunt, quicquid est in fauis, vnâ cõfundunt, ut nihil syncerum haberi possit. Magna verò synceræ propolis virtus est, spiritus crassos & vitiosam materiam ex alto elicit. Recens per se satis est mollis & pinguis. Sic in puncto neruo agricolæ Galenus vñs est: quæ ætate induruit, oleo veteri moliri debet. In mollioribus corporibus oleo illiquatur. In duris lacte multo tithymalli: cum terebinthina satis attrahit. Thapsia recens vilis: bimula & vetustior exolefcit. Cerato, misceri solet: quæ quia ut viscum plurimum aquæ continet, quatuor & quinque horas insistere oportet. Radix arundinis cum melle. Sagapenum, galbanum, ammoniacum, opopanax, calx viuæ, cinis è fæce vini vel aceti, quæ loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quæ & spicula, & squammas extrahit, lepidium, sinapi, nasturtium, tithymallus, dracontium, pyrethrum, ramunculus, sales, tum qui edi possunt, tum ammoniaci. Quædam infriata affricantur, aut gummi & resinis concorporantur. Lixiuum in subtili callidaque materia extillatum: ex eadem cinis Anemonæ, calamintha, narcissi radix, cyclaminus. Sparthi quo vites alligant fructus, & è folijs succus.
- Acetum.** Acetum, sed hoc suspectum, vbi siccitas, dolor, inflammatio, vlcus, adstrictio, & à neruis dolor est. Cantharides ex polenta & melle pistæ. Medullæ & adipēs ætate acrimoniam contrahunt, vsinus adeps, hyeminus, pardalinus, leoninus, & alii, sed hi maximè. In alopeciis & profluuiis capillorum vitium discutiunt, attrahuntque quod ad capillitium vile sit. Oleo & oleæ flore, tela sibi refigere elephantos, testis est Aelianus. verus sit oleum tenue & calidum. Sulphur infriatum melle, oleo, terebinthina, salua hominis, axungia. Idem in cenostragmate feruefit dum enatet lentor quidam (oleum appellant) quem concha excipere oportet aliquoties commutanda aqua, dum satis olei collectum sit, quo demersum corpore hydragryon foras elici voluerunt statim illito à balneis.
- Euphorbiū.** Euphorbium

bium recens acrius est: bimum trimumque paulatim remittitur: quinto & sexto anno exoleſcit. Cerato temperatur, quod vel decuplum, vel duodecuplum oleum habeat, & triplam ceram.

Modus est vt tantum erubescat locus, & pruriat, non vratur, nec vlcus contrahatur, nisi & hoc etiam necesse sit. Cerato largiore dilui potest, quod est acrius: quod verò languidius pharmacum, aucto euphorbio, cerato imminuto augeti debet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est. Ardor affusa aqua, aceto (quod vim thapsiæ efficacissimè diluit) cernis à rhodostagma-

*Modus en-
phorbij & s
milium.*

10 lota extinguitur. Succus cyrenæicus medicus, opobalsamum & alia quæ partim exoleta sunt, partim vsui esse possunt, ex 3. de comp. pharmacorum κ γιν, & alijs Græcorum libris repetenda. Aduentio calore trahunt fermentum, stercus asinerum, gallinaceum, columbinum, arictinum, humanum, & quæcunque talia sunt. Scatebat quidam è grege mendicabulorum lue venerea: aliquot diebus vniversum corpus equino fimo obruit, vt tantum esset quâ respiraret. Erat stercus stabularium, equino lotio sæpius perfusum, quodque iam computruerat. Effecit ille hac arte, vt totum virus exprimeret: addidit aliquoties en-

*Que tra-
hant aduen-
tatio calore.
Mendicus
lue venerea
curatus.*

20 chrifton ex axungia, larigna, & hydrargyro. Nec alia vitæ lex seruata est, quam mantica offerebat: atque his remedijs curatus est. Fermentum oleo incoquitur: fundit, liquat, furculos trahit, spedes contusos sanat, mollit, discutit. Axungia veteri, larigna, & terebinthina resinis liquidis pistum efficacissimum est. Alias cum cepa cocta subigitur: coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulum quò vetustius, eò efficacius. Ex echino animalium (quæ πολύκιλα) lepore & vitulo marino colligitur. Lac est in lactentium animalium ventriculo vel omaso ita conco-

Fermentum.

Coagulum.

30 num: equinum Dioscorides Arabes & quidam è Græcis adstringens frigidum, ac reprimens auxilium faciunt. Alij acrimoniam elementis, reliqua occulte qualitati attribuunt. Hoc certo habet, quòd dissipata cogit, & coacta dissoluit. Magnes ferrum attrahit: repellit Theamenes. Succinum illicis festucas ignorata vi. Cancer fluminatilis trinis tela extrahit: facertæ caput: rana summis partibus reſectis. Cochlearum & limacum carnes, alias per se, alias cum suis volutis tritæ, ac mixto interdum coagulo, tela rapiunt, atque hydropicis aquam exigunt: non prius tollere oportet, quàm totus humor exuda-

*Que quali-
tate occultis.*

40 uerit. Ostrea viua pefaseros bubones loco transferunt, & ad

Ostrea viua.

Scorpio. se trahunt. Scorpio iritus & impositus, quod infixit virus retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem efficit, & calculos educit illitum glandi, si in cole resisterint: vel pubi ac perinaeo, si superius inhaerent. Cucurbitula summa vi rapit. Hirudines superficiem sugunt. Pus, vrinas, calculos, fustus elicit ore mundo ac prius loto fit qui exugit. Pyulcus, catheter ijdem vtilia sunt: vincula frictio, phoenygmus, dropax, sinapismus, ferrum candens, vel admotum, vel impressum, calore trahunt. Sed hoc violentum remedium est. Verum quæ non sanant pharma-

*Apho. Hipp.
Pforicum.*

ca, sanat ferrum: quæ nec ferrum, sanat ignis: quod Hippocrate in Aphorismis scripsisse volunt. Mixta remedia sunt theriaca. Pforicæ dupla chalcite & lithargyre, aut equis partibus cadmiæ & chalciteos: vel duabus chalciteos, & tribus cadmiæ fortius est quod cadmiam, quam quod lithargyrum recipit: minus acre lotis metallicis. Ex acerrimo acero trita & fistili clausa se-

*Quomodo
tenuiora me-
tallica,
Olea commo-
da.*

peliantur fimo. Hac arte macerata, triplo, duplòve cerato excipiuntur. Ceratum sesquialtera ratione dupla, tripla olei, ad ceram conficitur. Ea metallicorum cura pharmaca tenuiora sunt, facilius penetrant, & inde trahunt. Oleum fit vetus, ricin-

*Resina &
inde olea,*

lignum, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica si vis distillatum: quæ resinæ etiam è profundo trahunt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina: in quibus non modò calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt. Cerati vnc. quatuor: terebinthinae vnc. dimid. liquatis

*Formula ex
Gale. Orib.
Aët.*

immisce pulvisculi, euphorbij drach. tres. Interioris fermenti vnc. vna: terebinthinae liquidæ vnc. vna: concorporata plurimum valent in punctis nervis. Propoleos acris & pinguis (nam cera virgineâ abutendum non est) vnc. duæ: olei veteris vnc. quatuor: galbani vnc. dimid. coeant ad ignem. Picis liquidæ, picis aridæ, propoleos partes æquales. Lithargyri, cerussæ, salis ana drach. decem, seorsum tusa, & cum olei vnc. tribus in mortario pista, ad ignem diu versentur, paulatimque decoquantur. Lithargyri, cerussæ, nitri, ceræ Colophoniz, ammoniaci, ana vnc. vna: olei veteris vnc. sex: reliqua vncijs sex, xlijij siculnei dum non inquinent, concoquantur. Deinde cera Colophonia, ammoniacum, deinceps quidem ac paulatim adiiciantur. Nucleorum è dactylis erematorum, nitri rubri, salis ammoniaci, vel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinae ana 40 drach.

*Relatum ad
Androma-
chum.*

drach. viginti : piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylo-
balsami, myrrhae, resinæ siccae, capitum lacertæ, læsci succi
mori, ceræ, ana drach. decem : adapis caprini drach. quindecim :
olei lirini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest,
nisi aduocata *ἀνθελλομένη* confugias. Quod sequitur admi-
randum ad strumas, ramacem gutturis, parotidas, omnem duri-
tiam, & cedemata. Cupressi folia neque teneriora, neque duri-
ora in puluerem comminues : tortiuo vino consperges, atque
ira volutabis, dum in fœcis corpus coeant. Inde struma vel ra-
mex inducitur, tertio primum die soluitur medicamentum :
contractum locum inuenies, qui digitis exprimi debet. Rur-
sus ad tres dies idem pharmacum applicabis, eodemque modo
solues & exprimes : septimo die, vel ad summum nono, strumæ
velut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem per poros affe-
ctæ partis. Olei antiqui vnc. viginti duæ : ceræ albæ vnc. quindecim :
nitri vel salis torrefacti, aut fœcis crematæ vini vac. tres : te-
rebinth. vnc. duodecim : lixiuij querni, vel ficulnei vnc. octode-
cim : cera cum oleo liquatur : terebinthina adijcitur, refrigeratis
nitrum conspergitur, lixiuium paulatim affunditur : omnia pi-
20 stillo conuoluuntur. Plurima ex tertio & sexto de compositione
pharmacorum & γ' & 15. Aet. repetenda. De sinapismo,
dropace, phœnygino, & alijs alio loco. Addunt Apostolicon
Nicolai, Oxycroceum, & alia.

*Necepsosis è
cupressi.*

De resoluentibus.

CAP. III.

Incrementis rheumatû discussionis materia cum repellente
misceri debet. Inclinate virio diaphoretica pura sunt. &
horum vnicum fortasse genus est : sed clarior doctrina fue-
rit, si duplici differentia separemus, vt alia quidem leuiora,
30 quæ *ἀραιωτικὰ* : alia fortiora, quæ *ὑγροφορητικὰ* si vis appelles.
Arzonica mediz naturæ vicina sunt eo calore, quem humidi-
tas temperet : ex quo minime siccant, dolorem leniunt, relaxant
cutem, spiramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partium in-
tro penetrant, quodque inhaerit parti, liquefaciunt. hinc ex hu-
more vapor fit, qui subinde expirat, dum omnino locus deta-
meat. Et adhuc quidem satisfaciunt, vbi tumor in superficiem
exponitur. Locusque mollis est ac rarus, materia vero calida, hu-
mida, & tenuis est. Quod si in alto corpore humor deponitur :
40 si idem frigidus, crassus, glutinosus : si dura densaque cutis : si via

*ἀραιωτικὰ.
ὑγροφορη-
τικὰ.*

*Consilia in
usu resolu-
entium.*

longitudo quædam est flexus & anfractus, iam vi maiore opus est, videndumque non quale, in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, quum eò peruenierit. Ex quo nec acribus quidem parcendum erit. Etenim pars exterior perferet, quæ ægra dolensq; tolerare non potest. Maiora verò remedia in diaphoreticis numerentur, iam vicina epispasticis; quanquam vtraque virtus euocandi atque digerendi plurimis rebus insita est: sed vt in vnoquoque vis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, ventriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus merus est ne dissoluant vires: ideoque adstringens materia, qualis est aromatum, misceri debet. Frigida crassaque materia, incidente auxilio prius comparanda. Mollienda quoque vbi durior concreuit, ex quo à leuioribus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, vt sine periculo discutias. Alioqui diffabit tenue, lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida, durius, cum ea quæ vegetius sentit, clementius agendum est: quam suppure partis abutendum non est, vt ea imperes, quæ exulcerent. Sic enim sensibile corpus intabescet: contrahetur, non rarefiet: cogetur materia, non liquefiet, horror, dolor, fluxio irritabitur: dehiscunt venæ, omnia in deterius commutabuntur: multo magis si pharmaca crassiore consent materia, & siccant. In phlegmone quæ vetus est, videndum nunquid affluat: id ferè accidit tumoribus qui inueterascunt, vbi medela quæ reprimat, commiscenda est. Posteaquam verò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquum est, confirmanda pars, quæ longo vitiò elanguit, multo magis si statis periodis, rheumatismo vexari solet. Aræotica sunt, chamæmelum, lini semen: in maluis efficacissima, althæa: sequitur agrestis, domesticæ vis nimio humore elanguit. Aqua calida vtitur Hippocrates in fracturarum exolutione, quam vocat *πίλυσιν*: vinum exsiccat, reprimat, & digerit: lana sordida bene carminata inebriata vino, & inde pressa: ceratum similiter. Butyrum digerit, mollium corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas aliaque innumera, vt per se satis esse possit. Oleum dulce, calens, & in quo illa efferbuerint. Sicyonium è folijs, fructu & radice cucumeris agrestis. Crinelaon intinctum croco, omnes inflammationes discutit. Oleum caryinon efficacissimè suggillata rapit, inuritur, aut candente ferro premitur, vt reddat oleum, quod optime discutiat. Omne oleum concal-

Cautio.

Ab acrioribus quum contingat.

Particularis materia,

*Olea.
Oleum lilorum cum croco.
Nux rancida.*

factum igne, quale est lucernarum, vel ignito ferro extortum; efficacius est. Oleum vetus, ricinum, canabinum, anethinum, quod è rosmarino, maiorana, zambace, leucoio, hyssopo, alijsque eiusmodi cœlæo coctis, dum omnino expiret vinum. Rhaphaninum, sinapinum, melanthinon, terebinthinum, hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ, & vocati sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydropicis & œdematis olea comparantur. E galbano, ammoniacum, & similibus quæ molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, vt
 10 flatus excutias, cui rei galbanarium vile est. Si quid incidendum, detergendumve, aliquid aceti vel oxymelitis affundi potest, quo tempore absinthium, polium, centaurium, iris, aristolochia, gentiana, vrtica, hyssopus, & similia cœlæo incoquantur. Hic vinum melius non adstringens, gisium, tenue & odorum. In phymatibus & parotidibus duriorum corporum talia ex vñ sunt. Brassica per se, vel cum axungia trita, induratas phlegmonas & vetera erysipelata discunt. Adipe & medullis recentibus laxando, veteribus discutiendo
 20 vtendum est. Mastiche, furunculis: Ammoniacum & similia chceradibus & articulorum tophis conueniunt. Fermentum oleo pistum, & cum cocta cepa mixtum, potenter coquit, mollior, ac digerit. Pellibus animalium recens detractis, in confusis verberumque plagis vñ conuenit. Fœnum græcum duris phlegmonis adhibendum. Acetum achoribus & œdematis vile est. *Acetum.*
 Agrippa concalfacto aceto pedes immerfit, vnde intolerabili pedum cruciatu liberatus est. *Agrippæ aceto liberat.*
 30 ~~Adiama~~ collo appenduntur & vi latente, vel elementari qualitate vitia corporibus excutunt, corallus, viscum, peronia. Mirum est quod affirmant. Coluber è cauda suspenditur subiecto vase aqua pleno, in quod
 ille dehiscat ore: aliquot post horis vel diebus lapidem euomit, qui in breui totam vasis aquam combibat. Alligatur lapiis hydropicorum ventri, atque in totum exhausta aqua liberat. E sambuco & ebulo oleum œdemata iunat, & hydropicos. Composita sunt Cerata, quæ simplicia, oleo minus digerunt, sed fortius hærent. Oleum abietinum, chamæmelinum, anethinum, sampsuchinum, & similia, cum subquadrapla cera vase duplici colliquabis: liquatis duodecimam partem terebinthinæ, vel larginæ commiscebis. Iisdem oleis & gilaio vino erinaceus coquitur, dum putrescat, oleum pinguius
 40 lectum arthriticis conuenit: idem è vulpe, lutra, mele, fieri potest

Sulphur.

Vfus διὰ
χαλκίπας.

potest. E lini semine oleum molla exprimitur, cum fermentitio
lixuio subigitur, modicum larinæ ad lentorem adijcitur. Pa-
nis cibarius, falsus fermentatus e ricinino pistus, fuggillata de-
let. Fauos mellis è vino friges, cum loliacea farina, momento bu-
tyri, & larinæ subiges. Bdellium cum melle teritur: calx cum
veteri axungia: laferpitium cum sulphure: hæc omnia, molliunt,
tergent, discutiunt. Sulphur cum oleo vetere, melle, terebinthi-
na, vel salua mixtum, aut vrinâ maceratam, in venenatis mor-
fibus deterget, attrahit, discunt. Calce lota, & recenti axungia
mixta in tenellis corporibus vtendum erit. Lixiuum cum mel-
le, farina hordeacea, fabacea, conuenienti oleo pista calidiori
phlegmone conuenit. διὰ χαλκίπας vncia vna, in olei vete-
ris, vel ricinini vnc. duabus liquefit, declinanti phlegmone: ante
declinationem, & in vigore oleum sit dulce ætate media. Oro-
bi farina diluto oxycrato cocta, vt sit calidum cataplasma: cras-
sa & viscida fecat, & discunt. In contumaci vitio & minus cal-
lente: olei chamæmeli vnc. tres: ceræ drach. tres: axungia anatis
& gallinæ ana vnc. vna: chamæmeli & anethi ana drach. duæ.
omnia lento igne cocta percolantur, vt fiat vnguentum. Olei si-
cyonij vnc. tres: ceræ drach. sex: terebinthinæ drach. duæ. In fri-
gidior materia ita temperabis: seminis fœniculi, anisi, anethi
ana drac. duæ: farinæ lupinorū, seminis fœnigreci, lini ana vnc.
vna, cocta vino, tusa ex oleo & aceto imponantur. Papaucri
cornuti folia cum axungia & propoli pingui trita, strumas, bu-
bones, & similia molliunt, atque discutiunt. Colophonæ lib.
vna: ceræ sesquilibra: oleo liquentur: liquatis addito salis tor-
refacti vnc. sex. vbi refrixerint manibus conuoluito, cylindros
vel magdaleones fingito, vsus tempore alura intendito adhibi-
tum hoc pharmacum: pus, in se rapit, quod cum hæreat, eradi
debet, ac rursus alura imponi, idque sæpius repetendum. Nam
veluti miraculo conditum pus emulget, & vinum discutit: sed
quia durius, in dolore abstinentum. Eidem rei picis aridæ, ce-
ræ nouæ ana lib. vnam: olei lib. duas blando igne fusa con-
iungito. Adipis porcini, picis, ceræ nouæ, saponis nigri ana
vnc. duæ: liquata transcolato, hydropisimos & dothienas adiu-
uat. V chementer discunt galbani, castorei ana vnc. vna: lique-
fiant in olei ricinini sesquilibra: expresso & colato oleo adde
picis, terebinthinæ ana drachmas quatuor: ceræ quod suffi-
cit, vt fiat solidum pharmacum. Hæc autem contumacibus vi-
tijs imperanda sunt, in quibus est quod molliat, coquat, trahat, 40
discu

discutiat. Plura sexto & septimo de compositione pharmacorum κατὰ γένος, 15. Aëtij, & alijs Galeni libris. Partem chalaſticiſ fovebis, ex quo diaphoreticum induces, quod initio quidem lenius: poſtea verò vt ſubſidet tumor, efſicacius eſſe oportet.

De mollientibus.

CAP. IIII.

- M**αλακτικαὶ ſunt, quæ modicè calida nulla vi ſiccandi vel humectandi manifeſta indurata corpora emolliunt, quanquam (vt omnia ferè multiplici natura coierunt) in malaſticiſ cenſentur plurima, quæ primo ordine calfaciant, ſecundo ſiccant, ac tertio. Sed quæ malaſtica ſunt, humido calidoque elemento temperari neceſſe eſt. Plurimus uſus eſt in tumoribus, quos οὐροβάλεω Medici appellant. Hi in muſculorum ſinibus ferè concreſcunt: aliquando in medijs muſculis, glandibus, viſceribus, vlcerum labris, ex materia craſſa, lenra, & frigida, qualis eſt pinſura, & melancholicus ſuccus. Sed è melancholico ſucco omnino cancroſi ſunt, & malagmatiſ exaſperari ſolent. Inflammationes in ſcirthum cogi contingit, ſi materia craſſa & lenta eſt: ſi adhibita pharmaca, quæ nimium ſiccant & calfaciant, qualia ſunt ἐπιſπαιτικαὶ & ζυγπικτικαὶ. Hinc enim tenue exprimitur, reliquum occaleſcit. Sic enim tophi in articulis, & calculi in renibus lapideſcunt. In tenui ſeroſaque materia non ita metuendum: tota enim facilè exhalat. In craſſa & viſcida omnino declinanda quæ ſiccant, diſcutiunt, adſtringunt: ſiquidem ſola molliendi cura eſt. Malaſticiſ quod elementer digerat, interim commiſcemus, vbi iam malagmate coeperit tumor durus edomari. Phlegmone & eryſipelata in ſcirthum degenerant nimis refrigerante atque adſtringente materia. Sed à
- 30 phlegmone ſcirthus amplior eſt. In uſu malagmatum certæ ſunt leges. Primum enim cognoscendum, quantum pars ægra à ſua ſymmetria receſſerit, quantumque vitium increuerit: ex quo æſtimanda remediſ vireſ. Tum naturas partium diſtinguere oportet: poſtremo artiſcioſè colligendum, qua ratione emollias: nunquid ammuſceas quod detergeat, incidat, diſcutiat, in quorum omnium uſu modum, occaſionem, qualem, quantumque animaduertas. Deſperatur ſcirthus qui ſic occaſit, vt iam non ſentiat, & inde glabreſcat locus. Deſperari dico, quia nullo malagmate domari poſſit. Etenim reſcindit
- 40 ferro, & ſeptis exedi poteſt, niſi à ſubiectis nervis, venis, &

Malagma
tis natura.

Vſus.
Scirthi gene
ra.

Scir. cancro
ſus irrita
tur mala
ſticus.

Cautio.

Leges in
uſu ma
lagma.

Deſperatur
ſcirthus.

arterijs metus est. Scirrhus cui sensus aliquis vel obscurus, vt magis minúsve induruit, ita leuius aut efficacius auxilium requirit. Mulieribus, eunuchis, pueris, vrbani, ociosam atque vmbrailem vitam degentibus, lenior medela: messoribus, fossoribus, duris omninò & laboriosis corporibus fortior utilis est. In lenta & contumaci materia miscendum aliquid quod incidat, atque detergeat: quod in chordis & tendonibus fasciari solet. Tale est acetum multum, vel per se, vel in quo hyssopum, thymum, pulegium, & similia præcoxerint. Est & hoc animaduertendum. Scirrhus quidam simplex, alius φλεγμονώδης, vt quædam inflammatio σκίρρωδης est: Scirrhum malaicticis & diaphoreticis excuties: phlegmonem lenies & concoques. Vbi vtrumque coijt, vt hoc vel illud superat, ita remedia temperabis. Leniter emolliunt butyrum, cefypus, & lana succida: hæc oleo insuccanda amygdalino, chamæmelino, in quo semen lini, althææ, fœni græci: in quo malux, cucumeris agrestis, & liliorum radix: tenella malux agrestis, & liliorum folia, vel anethi cucumina præcoxerint: in quo illiquatum fuerit aliquid galbani, ammoniaci, bdellij. Lentiscinum, terebinthinum, mastichinum, vsurpari debent vbi molliendum, digerendum, ac leniter repellendum. Hyosciamino locus est in calida & iam durescente inflammatione. Hæc ergo olea in lana fordida molli ter apprimenda sunt: hinc enim multò commodius malaicticis conimpones. Omnia verò prius intepescere oportet, & frigida omninò vitanda sunt. Expressa oleorum materia, & cum adipe pistata, malagmata confinges. In hoc quoque genere censentur, vitellus cui, crocus, cera pinguis, caricæ pingues, κνέφαλον è duplo oleo, vt sit humidissimum: æquali, vt sit medium. Iam crassius est, quod ceræ partes quatuor, & olei tres continet. Caricæ pingues cum irino tritæ, scirrhis hepatis & lienis opitulantur. Id habet peculiariter scirrhus hepatis, q̃ leniter molliencia desiderat, mixtis aromatibus, quæ calfaciant, & attenuent. Siræon è pinguibus caricis ad melliginem coctis mollior, deterget, ac digerit. Adeps & sebum, vtrumque coquit, laxat, & mollior quæ quia materia vndè generantur, genere animalium, & loco vbi concrescunt, natura denique (nam adeps humidior est) differunt, cum Aristotele distinguas licet: vt in natura molli, adipe, in dura sebo potius vtendum putet. Rursus quia minimum est quod dissident, misceri possunt. verum vtrumque genus natura, & specie animalium, ratione 40

vitæ,

Particularū
materia.
Olea mala-
ctica.

κνέφαλον.

Siræon.
Sebum &
adeps.

- vitæ, & pabulo, sexu & ætate: deinde quia hæc recentia, illa vetusta: alia syncera, alia condita sale, aromate, vel externa imbuta qualitate distinguendum est. Lenissimus suillus adeps, axungiam vocant, in qua mirum est, & experimento constare veteres scripserunt, quod ea genibus adligata, redit in os sapor, ut etiam expui videatur. Ex quo fortasse non vnius hydrargyri qualitati, sed totius mixturæ ex hoc & axungia illitis in lue venerea, os grauius exhalat, & saliuâ madet. A suillo sunt vitulinus, hœdinus, caprinus, bubulus: quibus si vis, vulpinum & leporinum adijcies. Atque hi leniunt magis, & concoquunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sunt hyeminus, pardalinus, vrsinus, & hi duriora corpora emolliunt. In medio sunt, taurinus, hircinus, ceruinus. In volatilium genere efficax anserinus, anatinus, olorinus: ficior è gruibus: suavis gallinæ: calidior columbinus. Ex anguillis & piscibus fluuiatilibus languet: humanus mediocriter valet ad omnia. Domesticorum animalium pingua humidiora sunt, ut suum, quàm apro-rum: è maribus ficiora & calidiora. Castrati mares fœminis respondent. E iunioribus humidior, è senioribus ficior est.
- 20 adeps. Pingua oleo magis molliunt, & calfaciunt, ætate tenuiora sunt, & acrimoniâ contrahunt. Purgantur adeps exemptis venis, quas fibras vocant. Salsus vel conditus aromate ficior est: constat verò peptici & malaëticis aduersari, quæ nimium siccant. quanquàm Plinius conuenire scribit salsam axungiam mollire magis. Id in suillo fortasse concedi potest.
- Recens adeps si dehit, & vetus ad curam reuocandus est, liquefieri prius oportet, mox frigida sæpius lauari: postremo etiam vino quàm odoratissimo. Eo modo sæpius liquatur, cogitur, lauitur aqua, dum omne virus exuat. Medulla in sebalibus sebo, in adiposis animalibus, adipi respondet: viscera,
- 30 chordas, tendines, musculos emollit. Ex ossibus humidior, è spina ficior est. Prima laus ceruine, quæ nullis malaëticis inferior est: vitulina sequitur, tum ouilla, & caprilla: acrior taurina quàm ut emolliat. Atque hæc leuiora sunt. Durioribus naturis conueniunt: Ammoniacum quod aceto liquari potest, leniter decoquendum, ne effruescat, Bdellium molle ac pingue saliuâ hominis subigitur, mollior, coquit, modicè digerit. Stryx idem efficit. Galbanum præter hæc septon, & anodynon: est: repurgatur, liquefit vino vel aceto, neque co-
- 40 ctionem sustinet, his efficacior opopanax. Ladanum mollior,

*Mirum de axungia.**Tres naturæ adipum.**Salsus adeps**Vetus adeps ut recens fiat.**Medulla.**Secundus ordo.*

*Emplastica
esse oportet
malag.
Resinae.*

Aceti usus.

ac repellit. Propolis ammoniaco vicina est. Sint hæc omnia
molliā & pingua, pro sua quæque natura. Malacticis resinæ
commiscetur, quia hæc emplastica esse oportet. Resinæ
sint, quæ acrimonia carcant. Chia, larigna, picea, abietina, tere-
binthina. Pinea nimium siccatur, strobilina acrior est. Bitumen
pix aridior: in summa, quæ nimium siccant, quæque acria sunt,
reicienda. Pix mollis & bene pinguis, qualis olim brutia, com-
misceri potest. Succedit his miraculosum ex aceto remedium.
Scirrhus malactico oleo fouetur, tum emplastico malagmate
inducitur. idque aliquot diebus repetendum. Sitque iniussu le-
uius malacticum, postea etiam paulò efficacius, ac postremo
aliquid aceti combibere oportet: ubi verò mollior tumor exti-
terit, pyritem, lapidem molarem, aut filicem unde scintilla de-
curritur, candentem igne, acerrimo aceto demerges. Exhalabit
plurimus vapor, quo scirrhus aptè infumandus est, contexta
parte, & omnino præclusa via, ne dissipetur fumus, sed totus
in scirrhum coeat. Locum verò satis infumatum oleo tepido
fouebis, & ut prius, malagmate conteges: post dies aliquot aceti
vium reuocabis, ut sit aceti & remedium vicissitudo. Verum
neque diutius, neque sæpius habitu aceti pars vexanda est, ac in
lapidem concreseat, & nervosum genus grauius lædatur. Sed
ut molliendo profeceris, ita acetum repetes. Et in malacticis
vius similiter interpellari debet: primum enim è caricis, medul-
lis, adipibus, cera & oleis, exigua resina, malagma conficies.
Tum ut res succedet, ad ammoniacum & similia veniendum:
ac primum quidem citra acetum, post etiam cum aceto com-
parentur: quibus cum vno, vel altero die fueris usus, ad ea, quæ
leniora, quæque sine aceto sunt, redeundum: ut veluti circulo
quodam, & è re nata auxilia repetantur. In musculis & hene-
tunior aceti consuetudo est. In chordis & tendonibus neque
diutius neque frequentius vtendum erit. Ammoniacum aceto
fufum manibus diducitur, ut sit lati crassitudo. Fermentum
coquitur aceto, hepato duro & heni. Ac fortius acetum in
quo tritum hyssopum, thymum, pulegium, & similia madue-
rint. E lini semine hydrelæ cocto, & adipi mixto: althææ
radice atida trita, vel inde rasa parte medullacea, resinæ mo-
mento mediocri fiet malagma. *πάργυρον* recens (si quid
phlegmones) inueteratum alioqui, Heræ & veteribus lau-
datum est. Adipis suilli recentis & bene purgari vnc. qua-
draginta quatuor: ceræ vnc. viginti quatuor: ceruæ, lithargyri

ana vnc. sex. liquabilibus fufis reliqua trita mifceantur.

Aliud. Lithargyri, ceruse ana vnc. tres : succi feminis lini, olei, ana vnc. viginti : ceræ vnc. octo : adipis fuilli vnc. quatuordecim : Colophoniz vnc. octodecim : perni-

Aliud πῆμα
γυργου.

nibus, & callofis rimis calcaneorum comperit. Διὰ λῶδον, carbunculis, clauis, furunculis : lithargyri olei, ana lib. vna : galbani libræ dimidium : ceræ, terebinthinæ, ana libram

Διὰ λῶδον
veterum.

vnam : radicem althææ, fasciculos quatuor : litharg. diu ex oleo teritur in mortario : cera & terebinthina fufa com-

10 mifceantur : postremo radices tufæ ligneo pistillo concorporantur. Radicum althææ & liliorum, ana vnc. duæ coquantur in

Mnafea fecū
di ordinis.

hydrelæo ad aquæ consumptionem. tum æ olei inde expref-

fi, adipis fuilli, lithargyri, ana libram vnam, litharg. ol. coquitur dum non inquinet, & adeps commifcetur. Colophoniz puriffimæ vnc. duæ : ceræ albæ vnc. quatuor : matiches vnc.

vna : olei, quod fufficit, vt fit iufta crassitudo. Terebinth. ceræ, ana vnc. nouem : galbani, nitri, ana vnciam : thu-

ris pinguis, fefquunciam : medullæ cerui vncias duas : propolis pinguis, fefquunciam : olei laurini, fepti vitulini, ana drachmas duas, vel eo plus, vehementer molliet, atque difcutiet.

20 Violentum quod fequitur, tantum ruficorum, & iam præmolito fcirrho. Caprinum ftercus folum oxytrato, polentæ iunges, & affuso fi vis oleo, cataplasma finges. Stercoris caprini vnc. duæ : radice cucumeris agreftis, ficuum imma-

Διὰ κοπρὰς
γίας Gal. &
Amic.

turarum, ana vncia vna : staphios, agrias, bdellij, farinæ fabarum, amygdalarum amararum, ana drach. quatuor : fa-

cis olei antiqui, quod fit, fatis ad emplaftrum. E veteri ca-

seo, ac iam putri, potentiffimum fit remedium. Subigitur

E putrâ ca-
seæ.

30 cafeus, è iure in quo fuilla perna bene pinguis coxerit. To-

phos mollit quafi miraculo coccum cnidium defquammatum, cum myrrha & aceto tritum. Διὰ χυλῶν, Aquæ fext. viginti

Διὰ χυλῶν

[Orib. duodecim] radicem althææ recentis, lib. tres. [Orib. quatuor] fœni græci, feminis lini, vnciæ nouem : [Orib. vnc.

octodecim] radices purgæ, tufæ, diem integrum mace-

rentur aqua, poft ridie forum græcum lotum fideliter & purgatum adijcitur : tertio lini fermen fimiliter lotum eadem

aqua in qua reliqua etiamdum madent, immergitur, quarto die coquantur omnia ad crassitiem, tum exprefsa & traiecta co-

40 lo materia vñi feruatur. Iam verò æ ol. pinguis æstate lib. septem & femis. hyeme lib. quatuor : succi prioris lib. qua-

tuor:

tuor: mixta in primis coquito, dum bullæ extent, tum litarg. tri-
 ti lib. duas sedulò cōmisceto, agitaro bene puro foco, bullire si-
 nito dū non inquinent, & medicamentū colorē flauum iucun-
 dumq; trahat. Hoc sublatū igne cōuoluito rude, manibus subi-
 gito, in pastillos fingito. Vfus tēpore æ. pastillorū vnc. duas: ce-
 ra, olei, ana vnc. vnā colliquato. Potest medicamentū alijs ma-
 lacticis vniri, tam efficax, vt hoc vnū sine alijs chirurgō satis esse
 possit: glutinat superficialia vlcera solutū rosaceo, vel myrtino:
 aliās implet, & cicatrice tegit. Liqueatū chamæmelino, vulnera
 neruorum inflāmatione liberat: podagricis quouis tempore opi-
 tularur veteres vteri phlegmonas persanat inditum pessario.
 E semine lini, fœni græci, hordei, radice althææ, vt prius
 maceratis, coctisq; succus exprimitur: tum libris duabus suc-
 ci, adduntur litharg. olei, ana libræ duæ: ceræ vnciæ octo: li-
 thargyrum cum oleo diu teritur, & cum cerâ leniter conco-
 quitur, infuso oleo: postremò succus adijcitur, versantur om-
 nia, & sedulò commiscuntur. Sunt & alia *Διάχυλῶν* malag-
 mata, vt Alexandri è psyllio, quod Aëlius describit: & Ma-
 gnum Mesuæ ad strumas sine gummi, & gummosum quod-
 que paruum, album, & magnum, passim conficiuntur. Paru-
 vtendum in duris inflammationibus: album mediocres scir-
 rhos adiuuat: magnum reliquis efficacius est. Est & *Διάμελι-
 λώτς* veterum & recentiorum dialthæas de muscillaginibus.
 Oleo è maioriana & ficyonic, alijsq; id genus molliri pos-
 sunt, & adiecto galbano, & similibus, fortiora reddi. Priuatim
 conueniunt duris inflammationibus mammarum, violaria &
 althææ folia hydrelæo cocta, adipe vituli conteruntur ouorum
 vitelli duo, infecta croco commiscuntur. Hæc dina capita, ver-
 uecini pedes cum althæa & violaria percoquantur: in expresso
 succo, oryza bene munda, & asperiore linteo attrita, decoqui-
 tur: butyrum recens imijcitur: postremo cum iam corpulen-
 ta pulicula est, ouorum vitella croco tincta commiscuntur.
 Plura malagmata ex septimo de compositione pharmaco-
 rum *κετά γινε*, & decimoquinto Aëij describuntur. Sed
 octauo *κετὰ πέντε* alia sunt, quæ siccant, contrahunt, indu-
 rant, nec enollunt: quanquām malagmata & Asclepiadi, &
 Andromacho appellata. Quæ verò malactica, corpulenta &
 emplastica sunt, si neque dolor, neque phlegmone prohibet.
 Locus oleo fouendus, ex quo subijciatur malagma remolli-
 tum pingui vel oleo, ne celerius exarescat: tum enim reuellē-
 dum:

*Vis medica-
 menti Διά-
 χυλῶν.*

*Διά χυλῶν
 Ορίβαν.*

*Malagmata
 quæ ὑγρὰ
 εἰσι.*

dum est, & aliud imponendum: alioqui pluribus diebus hærere conueniet.

De suppurantibus.

CAP. V.

I Am hoc genere utendum nobis est, cum ab alijs remedijs desperatio est. Ac ferè maiores phlegmonæ suppurant, pulsant, dolent. Dum pus conficitur, inquit Hippocrates, dolores fiunt ac febres. Suppuratis, omnia ferè con-
 quiescunt. In sugillatis hæc eadem remedia sæpe conue-
 niunt. Sunt autem natura modicè calida & humida, iisdem li-
 mibus circumscripta, quibus temperiem hominis definias. Ideoque eligenda materia, quæ naturæ corporum elementari
 familiaritate consensiat. Emplastica sunt *διαπυρην* (sic enim
 hæc appellantur ut *ικπυρην* & *πυρην*) ut præclusis inde spiracu-
 culis, naturæ calorem inhibeas, in quo concoquentis naturæ
 robur est. Ita substantia quidem calor augebitur, neque qua-
 litate crescet: solidæ partes confirmabuntur, insitus humor
 saluus persistet: dissipabitur verò, qui inanibus spacijs alie-
 nus est. Ex quo vitium concoquetur, & consuetudine par-
 tium simularium exalbescet, fietque tandem pus album, lenè, &
 uniforme: quod quia alimento esse non potest, exesa cute
 vias sibi faciet, atque ita effluet. Non ab simili ratione χα-
 λασινε vocata *μυρην* fient, si accesserit crassities parti-
 tium; eodem modo quæ leniunt, calfaciunt, & adstringunt.
 Emplastica modicè calida, omnia concoquunt. Præit in ijs,
 quod est tenue: reliquum verò vel contracta, vel illita cute
 vias intercipit, ne quid spiritus exhalet. Contrà verò si expi-
 rat calor, nec emplastica materia est, nihil suppurat, & ali-
 quandò alienus calor succenditur, vnde putredò. Echecolla
 per se hærent: reliqua verò vel gummi, vel resinis implican-
 da, vel commodè alliganda sunt. Malactica calidiora sunt,
 & leniter siccant: insitumque humorem paulò minuunt: quo
 nomine à pepticis distinguenda, ne similitudine fallant. In
 pepticis vitanda, quæ detergent, & vehementer calfaciunt.
 Nihil enim quod valde discutiat, pepticum est: & quod de-
 terget, poros expurgat, quos illinere oportet. A siccantibus
 metuitur, ne frugi materiam exorbeant; multò magis, si præ-
 terea calfaciant. Neque verò contra nos faciet, quod in hysto-
 rijs medicorum permulta peptica sint, quæ mixtis diaphore-
 tics, deterforijs, atque siccantibus temperentur. Qualitas enim
 rerum

Quando op-
 tibi præci-
 pue utendū.

Natura sup-
 purantium,

ιαπυρην.

χαλασινε
 sunt ικπυ-
 ρην.

Malactica
 quomò disse-
 rant à pepsi-
 cis.
 Vitanda.

*Materia.**Aqua.**Oleum.**Triticum, farina, panis.*

rerum mixtura retundi potest, & multa vitia eodem tempore interdum cocunt, unde varia misceri necesse sit. Ac sæpè facit abscessus natura, vt acria etiam misceamus. Peptica sunt, aqua temperatè calida affusa parti: modus est, vt inde erubescat locus, ac leniter extuineat. Nimum fit, si inde subsidet, aut expalleat. Hydrelæo, & oleo pingui ac dulci, modicè calido, & butyro similiter vtendum est. Triticum ore præmansum, salinaque hominis commolitur rusticis corporibus conuenit: leniora sunt, farina tritici, & inde panis, perpurcata fursure: dissoluenda aqua, oleum, vel butyrum additur: coquuntur omnia vt sit cataplasma quod lenit inflammationes vulnere, & celeriter maturat. Vbi calor aliquis superest, minus cocto pane ac recenti, quem vel hydrelæo, vel pauciore oleo insperferis, vtendum erit. In contumaci vitio, sed minus calenti, panis siccior vberiore oleo molliori debet. Panis conditus sale, efficacior est.

*Farina hordeacea.**ὠμάλυσις.**Adeps.**Pix.**Picatum, ceratum.*

Farina hordeacea per se inutilis, verùm quæ bene purgato grano extunditur, & castratur fursure, eodem modo quo triticea comparari potest, hydrelæo cocta, consperita oleo, mixta butyro: sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis conferet, præsertim hydrelæo cocta. Tale fuit cataplasma veterum ὠμάλυσις, vel ὠμάλυσις ex farina hordei, quod prius tostum non fuit: quanquàm etiam licentia quadam ad alia farinarum genera nomen transfulerunt. Est & alia ὠμάλυσις ex farina hordei, fœni græci, seminis lini, in sapa coctis ad glutinis corpus, adiectis interim duobus vel tribus vitellis. Adeps suillus phlegmonæ familiarissimus, deinde vitulinus. Taurino & caprino in duris frigidisque tumoribus vtendum est. Leoninus, & reliqui huiusmodi, inutiles Gallinaceus, & hoc paulò acrior anserinus vsurpari potest. Pix & resina in feruenti phlegmone, rosaceo, in frigidiore, vetere oleo, Sicyonio, vel simili liquanda sunt. Pix arida, qualis Coracina & Colophonia, vberiore oleo dissoluitur: pauciore, quæ liquida est: mediocri, quæ naturâ mollis, digitis cedit, lentoris particeps, qualis olim Brytia & Lycia. Picatum ceratum, & anodynon, & pyopæon est, ideoque inflammatis vlcenibus conuenit. Resina sit ierebinthina, & lentiscina. Cera languidior, resina acrior, confusa ad suppurandum valent. Eluantur prius, si quid acrimoniæ conceperint: molliantur oleo, vel butyro, cum exarue-
runt,

rint. Oefsypon veteres in pepticis censuerunt. E flore lilij succus exprimitur, suppuraciones cōcoquit, & vuluas mollit, quod mel, & tyrrion veteres appellarunt. Siræon verò melligo è coctis caricis detergendo & moliendo idoneum est. Decoctum caricarum lenissimum est, quod maximè coquit, ac digerit: In aquæ sextarijs sex, pinguium caricarum lib. quatuor decoquenda, dum sextarij duo reliqui sint: magis maturabis, si inde pista farina triticea, cataplasma finges. Vbi verò digerendum magis, ac refrigerandum, hordeacea melior est. Eodem modo althææ decocto, & vix passæ succo, farinas vel panem purissimum incoques, & inde cataplasmata intinges croco. Crocus coquit, & leni adstrictione confirmat partes, & poros contrahit.

*Syrrion.
Siræon.
Decoctū caricarum.
Cataplasma
sz.*

Crocus.

Pinguissimas passas, exemptis nucleis, per noctem aqua macerabis, postmodum coques ad melliginem. Inueteratis & callosis tumoribus conueniunt, colla librariorum quæ sit è purissima farina: viscum aucupatorium, styrax pinguis, ladanum, galbanum, thus in corporibus temperatis molle, album, pingue, dumque manditur, minimè friabile. Rhodinum & myrteum in calidioribus & dolenti phlegmone misceri possunt: vt

*Melligo passæ vix.
Efficaciora remedia.*

pix, resina, viscum, colla, & similia: vbi perniciosa malum & platysmata diutius hærere necesse est. Miscentur quoque sterces suillum, columbinum, caprillum, nitrum. Et iam notum mulierculis remedium, pueri sterces calidum, duris & inflammatis mammis: alijs quoque partibus imposiunt. Certum experimento est, breui tempore concoquere. Ac in fæditate excrementorum auxilia inuenta sunt: furunculos & parotidas mollit, ac suppurat cataplasma è coctis ficibus, calce, iridis radice, vel nitro. Omnino si nitrum desit, sale torrefacto in mollioribus: vsta fæce vini, vel acetii, quæ acrior est

Loco nitri.

in durioribus, vtendum erit. Fæx sit recens, nam celeriter exolefcit: vulgò etiam nora est medela è cepis cineribus coctis. Tetrapharmaco veterum primas tribuit mouendo puri, non aspernabilis author Cornelius Celsus. Idem remedium à Græcis suppurando vsurpatum. Constat pice, resina, cera & adipe: vsus tempore, oleo, vel butyro subigitur.

Tetrapharmacum.

Pix sit mollior, resina fricta, vel Coliophonia, quæ in teneris corporibus oleo molliori potest: cera pinguis, adeps in mollioribus naturis, vel suillus, vel virgatus: in durioribus, taurinus, vel hircinus. Hoc tetrapharmacum Paulus ba-

40 filicon, Scribonius emplastrum Aristi nigrum appellauit, & aliud

*Macedoni-
cum.*

*Viride An-
dromachi.*

*Vtendi mo-
dus.*

*Noxa sup-
presse sanie.*

aliud basilicon descripsit. Tetrpharmacum thus additum fa-
cit Macedonicum, quod & pepticon est. Basilicon minus, hoc
imbecillius commutato adipe in oleum, quanto adeps oleo effi-
caciore est. Sic oleum quoque, variè commutare licet. Oleo rho-
dino, myrtino, vel simili, tetrpharmacum durius molliatur, vt
corpus & affectuum natura exigit. Mirabile hoc ad mollien-
dum & suppurandum. Cerae terebinthinæ, medullæ, ceruicadi-
pis vituli, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei
rosarum, myrrhæ, ana vncia vna. Myrrha cum melle subigitur,
& prunis leuiter incoquitur, ex quo reliqua adiecta sedulo mis-
ceantur. Picis vnc. vna: ceræ vnc. tres: axungia veteris purga-
tæ vnc. sex: adipis taurini, cespici ana vnc. tres: resinae pineæ vel
magis picæ vnc. quinque: liquatis vitior. Resinae vnc. duode-
cim: ceræ, æ ruginis rasæ ana vnc. 8. sapi vituli vnc. duæ: aceri,
mannæ, ana vnc. i. manna & ærugo cum aceto liquantur &
conteruntur: reliqua dissoluta commiscuntur: mollit, coquit,
purgat, digerit. Ceparum & aliorum coctorum in cinere ana
lib. vnam: vitellorum numerum quinarium radici lapacti co-
ctæ lib. dimid. farinæ, fœni græci, vnc. tres: fermenti vnc. duas:
axungia lib. vnam: fiat corpus. In frigidis & crassis humoribus
conuenit. Locus oleo peptico, succo, vel hydrelæo foueatur,
sympepticon medicamentum inducatur, mollis suppa, vella-
na succida superponatur: omnia decussata fascia colligentur,
vt qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affe-
ctum locum opprimas: semel in die vel rarius commutari de-
bet, nisi vel dolor vrgeat, vel pharmacum exarescat. ita verò for-
mari sympeptica oportet, vt neque liquidiora diffuant, neque
corpulenta nimis locum opprimant. Iustum corpus est ceroto-
malagmarum & emplastrorum, ac quod antè dictum est ixi-
uella & glutinosa esse melius est, vt per se sine vinculis hæ-
reant: quanquam & emplasticis lanam succidam, aut mollicula
splenia superdari: & omnia colligari nihil prohibet, idque
hyeme magis & frigore.

De aperienda vomica.

CAP. VI.

Quæ suppuratio, sponte sua non rumpitur, ferro, igne,
vel medicamentis aperienda est. Alioqui serpit sa-
nies, & cuniculos agit: venas, nervos, arterias, & vi-
cina corpora depascitur: atteruntur ossa, & cariem
ducunt, liuescit cutis, & in rugas quasi senio
mar-

marcescens contrahitur. idque metuendum magis in digitis, articulis, partibus corporis, quæ in decliue parent. Sic enim parotides femorum, abscessus in fistulas cauantur, & quæ facili putrescunt, qualis anus est, os, & loci genitales. Quare etiam si tumor nondum satis maturuit, ea pericula ferro, anteuertunt, multo magis si pestifera aut virulenta materia, vomica includitur: quanquam animaduertendū, vt ne nimis cito. Nunquam enim vis naturæ gratis inferenda est, sed semper aliquid beneficii, nihil maleficij proponi debet. In vomica quæ tardius erupit,

Cautio.

membranæ, neruacea corpora, & alia semiputria sæpe occurrunt, quæ nec intempestiue rescindenda sunt. Sua enim putredini maturitas est. Alioqui noua inflammationis & conuulsionis pericula creari solent. Neque perpetuum est aperire vi, quod suppuratum est: sed si nullum in mora periculum apparet, diaphoreticum remedium imponendum, quo loco mollior abscessus est, & digito cedit. Sic enim sanies exugi potest, idque faciendum magis, cum alta parte vomicæ, non declini, suppuratione se colligit. Quod si ferro, vel igne vtendum est, prius animaduertere oportet, ne quod vas insignis, neruus, tendo, vinculum, ne quid neruosum, quales membranæ quædam sunt, aut potius lati tendines conuulnerentur. Parcendum etiam quibusdam partibus, quæ uegerius sentiunt, & à quibus vis ignis ad principia transeat celerius. In musculis fibrarum intersutia cuncto ligneo, vel digito diducenda, ne fibræ præcidantur: idque cum in profundo sanies resedit. In his omnibus anatomica disciplina opus est. Cauteria periculosa, occipitio, temporibus, & ubicunque caluaria mollior est, ubicunque uel exitus neruorum, vel aditus uasorum est: nec ea ipsa oculus sustinet.

Animaduertenda in ista

ferretur.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

In craniij fracturis, ubi modiolis, cyclificis, cerebellis, uia puri sit, à futuris neruorum radicibus molliori ossis ferrum declinamus. In strumis, & colli abscessibus, à carotide arteria, vena sphagitide, vocali neruo abstinendum. Illinc hæmorrhagia, quam ægrè suppressas: hinc vel omnino mutus, vel certe semimutus homo relinquitur. Exteriore parte humeri tendo est, qui ignem ferrumque non sustinet. In empyicis & deploratis pleuriticis scalprum & cauterium inferiore parte mesopleurij collocamus, quia uidelicet superiore vena, arteria, neruus est. In extremis ilibus multi sunt tendines, multa uasa coëunt, ex quo vomicas hac parte prudenter aperire necesse

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

Vbi cautio.

est. Inuritur carnosus podex, & ferrum sustinet, non ita, quod

C

quod



In genitalibus. quod illic neruaceum est. Eadem ratio in genitalibus seruari debet, ubi ab arterijs cauendum, quæ illuc plurimæ coeunt, hiantque maioribus clausulis: nam inde hæmorrhagiæ non ita facile supprimuntur. Sub natis, nervus est, qui si iuxta suppurationem præciditur, aut nudatus violatur frigore, subiectum crus stupidum relinquit. Idem animaduertendum in reliquis partibus, ne nudi mancant nervi, & frigore contrahantur. In bubonibus glandulæ sunt, quas perreptant venæ & nervi. Ideoque si quando iniuriendum, apprehendenda prius curis est, & in vulneribus, quæ ferro fiunt, eadem ratio seruari debet. Hoc reliquis partibus commune est, quibus subiectæ venæ, nervi, & arteriæ. In articulis perpetuò suspectus ferri & cauteriorum usus. Ideoque i schiadicis inferiore parte quam malum est, ignem adhibemus: in perinei tumoribus qui inciduntur, summopere cauendum, ne quid intus vulneres, quod postea egerimine glutinetur. Hæc omnia pericula facile declinabit, & alia, quæ breuitatis studio omisa sunt, quisquis in anatomicis operibus fuerit exercitatus. Alioqui sæpenumero errare necesse est. Et quia non semper similiter, sed variè, nervi, venæ, arteriæ, in corpus diducuntur, si quid è profundo rescindendum ferro, lentè quidem, & perpetuo duce oculo culter dirigendus est. Id quod in strumis, & ubi pus altius defecit, facere oportet. Primum ergo cutem nudabis, si quid vasorum aut nervi occurrit, id ipsum digito, vel ligneo vericulo separandum distinctis fibris, nec ita momentaneis membranis, quibus illa inter se coniugantur. Atque ubi ad locum perueneris, in quo colluvies laret, & iam omnia tuta sunt, opportunè parti gladiolum infiges, & ita vomicam repurgabis. In reliquis vomicis videndum, ut quantum oporteat, culter descendat. Profundius vulnus hæmorrhagias commouet. Superficiale sæpenumero frustra est. Eodem modo cauterium superficiem exurit, vel altius imprimitur. Et hoc quidem in molliore corpore mollius, quale è subere, & quibusdam radicibus confingi potest. In metallicis aureum æneo & ferreo clementius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum verò, an transversum, vel obliquum vulnus esse debeat, figura partium, flexus, rugæ, fibræ primum indicant, quemadmodum consilium iuvant subiecta vasa & corpora: præterea in collo, qua parte sunt vena, arteria, & nervus, rectum magis quam transversum adigitur. Alioqui transversum melius. In fronte è rugis trans-

uersum

Cauteria.

Figura vul-

nerum, qua

hic esse debe-

at.

uersum sit nec ita profundum, quia membrana subest: alijs re-
 Et placuit magis. In inguinibus ē flexu transuerso ducitur: du- *Quoniam*
 plex interim angustum, & oblongum in myrti folium. In ven- *et cetera*
 tre, nisi flexus prohibeant, vt sunt fibræ musculorum. Eodem
 modo in reliquis. Simplex aliquando sufficit decliui parte, du-
 plici aliquando & trigono opus est. Atq; omnino ea parte scal-
 prum imprimatur, quæ mollior digito cedit, magis acumina-
 tur: & qua commodius sanies effluat, *ὑπορρευσίς* appellant exa-
 nationem: vel vt alij, exanationem, in qua *ἔπιρρευσίς* est, & *ὑπορρευσίς*
 20 *ἔπιρρευσίς*. Nam vbi propensa parte foramen est, facile pur-
 garur sordes: vbi verò in sublimi, resistare solet, deorsumque
 subfider, & sinuat: siquidem vomitosa pars nequeat pro arbi-
 trio commutari. Quale est in trunco corporis, ac ferè capite, &
 parotidibus. In manu & crure, etiamsi aliud os vlceris positum
 sit: poterit tamen ita inclinari, vt sanies liberè excurrat: tum-
 que manus quidem ē mitella suspendi debet, vt carpus gibbero
 sit altior. Crur autem puluino innitatur, sublato genu & decli-
 ui in coras femore. Vtrumque ea ratione collocandum, vt sine
 dolore ita persistat. At si cui parti id denegatum est, nec ea po-
 20 test pro libidine conuerti, aduersa parte vulnus inferendum,
 quod *ἄντρυψίσις* appellant. In alijs quoq; manu & crure, quæ
 commodè inuerti possunt, quum sinus longior, cuniculosum
 vlcus, sordes vberior, etiam aduersa parte lanceola immittitur
 vt duplici exitu dato, vitium celerius expurgetur. Est cum ab
 ore vlcis ad fundum ducto gladio tota cauitas detegitur, vt
 in fistulis: nonnunquàm angustius orificium ferro ampliatur,
 aut quod amplum quidem sed rotundum, aucto vulnere in-
 longum, aut aliter deformatur. Sed hoc non tam purgando,
 quam glutinando fit. Quibusdam locis plurimæ concur-
 30 runt arteriæ, plurima vitæ spiritus materia est. Hic paruo
 vulnere contentus eris, ne confertim ac semel erumpente sanie,
 simul, magna vis spiritus diffuat, vnde animi deliquia, & nec
 opinariæ mortes consequantur. Et hæc quidem de ferro & cau-
 terio in aperiendis vomitosis breuiter dicta sint. Reliquum est
 vt eodem compendio de medicamentis quæ aperiunt, dica-
 mus: quibus idèò vtendum, quia mollior æger est, quàm qui
 vel ferrum, vel cauterium sustineat: quanquàm medicamenta
 hæc cauteria quædam sunt naturæ quidam caustica. Ideo-
 que à quibusdam veterum cauteria, frigida vocata, à recen-
 40 tioribus potentialia: cauteria quidem quia reuerà vtunt: fri-
 gida,

gida, vt ad ferrum & similia quæ igne rutilent, comparentur. Neque tamen sic vrunt, vt quæ caustica & septica postea describentur. Theriaca igitur adhibita, vomica aperit: vt ricæ semen *Semen ricæ.* è vino tritum, frangit, purgat, incarnat, cicatrice regit. Caulium radices vstæ, tritæ, & vetere axungia exceptæ: ita è radice caninæ, volutis ostracodermæ, & testis prius crematis: adeps collectus è ranis viridibus arboreis: lac ficulneum, & tithymalli, cantharidum puluis, batrachij caulis, & folia: caninû stercus album tritum: terebinthina, vel adipe vetere concorporantur. Melligo anacardina similiter excepta. Sed hæc ita insistere oportet, vt ¹⁰aperiant, nec crustas ducant. Mixtum est, Fecis, cremati vini vnc. dua: fimi columbini, propoleos, salis torrefacti, æruginis, ana drach. tres: aquæ marinæ, vel in qua subduplum sal illiquauerit vnc. vnâ: olei antiqui, aut feruefacti, vnc. dua: arida scorsum trundito, æruginem, facem, salem in mortario simul terito: tritis in puluisculum aquam conspergito, & iterum oleum misceto, vt fiat vnum corpus. Ex quo fictili vase placido igne omnia coquito, dum tota exhalet aqua: postremò præmolitam propolim imposito: & vbi sublata igne paululum refrixerint, columbinum finum inspergito, pusille plagulæ, & oblongæ, quantum ²⁰medicamento opus est, inducito, & conuenienter adaptato: tum amplius splenium malagmate illitum superdato. Fimi columbini, nitri, ana drach. quatuor: caricæ, septem: quibus arida trita commisceto, ac bene pinsito, inducitoq; vt prius: quod si durius medicamentum videbitur, purgatam axungiam & mel coniungito. Arsenico, puluere angelico, vel vocato mercurio, prudenter vtendum est, vt habeatur ratio corporum & vomicarum. Excipiantur butyro, axungia, terebinthina, visco. Superponendum folium ex ijs quæ leniunt, vel molliunt: alioqui splenium epicrastico, vel malactico illitum. Obseruandum in vsu horum me- ³⁰dicamentorum, vt æstus vomicæ, & phlegmones acquiescat: vt quantum vulnus esse velis, tantum splenium constituas, in quo aperiens pharmacum positum est: videndum ne venam, neruum, arteriam violes, ne diutius relinquis. Quod si dolor acciderit, non committendum diutius vt vexetur æger, sed statim reuelendum pharmacum, & leniendus dolor est, pauloque clementius agere oportet. Minus vexabit pharmacum, prius foras parte laxante remedio. Epicrastico iam facto vulnere, temperandus calor. Plura libro decimoquinto Aërij, & capite de pyroticis.

Depurgantibus.

CAP. VII.

- S** Equitur, vt purges. Ac si vomica dehiscit foras, neque fistulosa est, molli flocco, vel linteolo tum sinum ipsum, tum labra vlcis expurgabis: deinde medicamentis in concerto linamento cauum implebis, dum rubens, ac nimium neque siccum, neque humidum cauum extiterit. Quod si non ita expositum vitium est, sed intus later, difficilior cura est. Et si quidem capite includitur, neque per aures, nares, vel aliter diffuit, modiolus, cyclis, ac terebellis patefacere viam oportet. Ad thoracem vnica ferè via est ab ore per asperam arteriam, nisi vulneris orificium in superficiem veniat: hic pyulcis, collyrijs, fuctu, suppuratio exorberi potest, ijfdemque machinis, vel melicratum, vel aliquid tale iniungere licebit, vt aliquid spuris repurgetur. Ad ventriculum, & intestina prima per gulam aditus est. Clysteribus intestinum crassius expurgabis. Medicamenta verò *καθαρτικὰ* detergeant modicè, & siccent. Detergenda sordes, quæ corruptelâ corporis concreverunt. Exiccanda sanies, humidumque recrementum, quod statâ naturæ lege ab alimento partis reliquum sit, aut aliunde illa bitur: ac *εὐπλικά* peculiariter appellant, quibus vis purgandi data est. Vitanda quæ adstringunt, vnde sordes pertinacius inhaereat: quæ laxent, vnde robur partium clangueat: acria, vt quæ collunie sordium cauum impleant. Sale, & eadem materia idèò abstinendum, quia vt detergeant, adstringunt tamen, & sordes impingunt, ac sæpenuerò vellicant. Hæc autem ita inaudire necesse est, si non serpit vlcus, atque putredine vicina depascitur: si non est callus, aut aliquid tale vnde consilium euariet. Vt sunt corpora, & sordes vlcis, ita qualitas remediorum distinguere debet. Adde quod vel recens, vel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque sordido, neque humido, parti præterea sensus acrioris leniora auxilia conueniunt. In contraria conditione, contrarijs consilijs locus est. Quod si pars aliqua apostematis maturuit quidem, & pus reddit, alia verò cruda est, huic sympeptica, illi cathartica: si quid durius, illic malactica: si quid phlegmonodes, lenientia suis quæque locis eodem tempore accommodabis. In purgando plurimum valet recta ablundi ratio, de qua obiter dicendum est. Vbi ergo molli vellere, vel linteolo sinum & labra extensis, si præterea abluas, magnopere curationem adiunabis, vt ad exte-

Ratio purgandi.

Καθαρτικὰ

Triplex excrementum vlcis.

Vitanda.

Scopi distinguendi remedia.

Animaduertendum.

De ratione ablundi.

ra per se natura fufficiat. Itaque si sanies acris est, sero : si copiosa sordes, melicrato : si multa simul, & acris, sero in quo sacchari octuplum, vel tantundem mellis diffusum sit. Cum iam coeperit cauum esse purius, œnomelite: post etiam vino è dulci aulteriusculo vtendum erit. In fetido sinu putri & cruento, oxycratũ conuenit. Acetũ, oxymeli, œnomeli, dilutũ marrubij, absinthij, aloës, myrrhæ, pauculo conditum melle, putredines efficaciter iuuant: & assato melle vti melius fuerit. In fluxis, humentibus, & malignis vlceribus, ex atramento sutorio, & caricis in cinerem vstis, puluisculus œnomeliti inspergitur. Nec improbandum ligni sancti remedium. Alij ænoistagma probant, quia siccatur, & putredinem prohibet, cui aliquid mellis infundere licebit. In nomis, phagædenis, chironijs, & omninò malis vlceribus, veteres vsi sunt ijs, quæ & detergeant, & adstringant: sed hæc rectè diluas, vt liquida infundantur. Ideoque aqua aluminosa, vel in qua malicorium, myrra, cæteraque eiusmodi coxerint, vsurpari possunt: verum melius fuerit detergente materia prius expurgare, quàm adstringentia injicias. Lixiuum è calce sæpius elota terget & siccatur, nec sine re laudatum est. In callosis, ægrè coherentibus, cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithymalli, alijsque id genus lixiuium fit, quæ quotidie sinus perfunduntur. Cancerosa adimit, quæ è sania, id est, oluæ nucleo comparata est. Aqua è larigna destillata, & resinis eiusmodi detergendo idonea est. Melicrati, & eorum quæ mel vel saccharum recipiunt, modus est, vt sit decupla, sexcupla, vel octupla aqua, dilutiore vti oportebat, cum iam purior sinus est: in sordidiore acrius conuenit. In vlcere satius exposito linteolum prius insuccatur, leniter exprimitur, insinuatur cauo: humidiori, exactissime triti puluisculi insperguntur. Sicciori, & quod sorde offarctum est, emmora vel sine ilitis pharmaca mollia imponuntur: ex quo bene carminato vellere, os vlcetis oblitipandum est: deinde superponenda mollis sponsia, vel quod Syriaca, & iam vulgari lingua *cotion*, appellatur. Alioqui linteo aliquoties in se conuoluta, tota vlcetis regio contegenda est. Atque hæc omnia vino inculcabis, & expressa injicies. Postremò artificiosè colligabis. Omninò tamen cauendum erit, ne quid durius aut grauius vlceri incumbat. Postea verò quàm tempus redierit, in quo vincula soluantur, atque reuellantur indita cathartica, recognoiscendum sedulo, quanta, qualisque sordes fuerint. Si enim

*Cathartici
quomodo
sciendum.*

*Probatio
medicamentii.*

minor

minor appareat, bene est. Optime verò si purum vlcus est, & iam aliquid carnis succreuit. At si solito magis sordescit, ita distinguendum est. Nam si cavitās maior, nouus calor & dolor adfuerint, id acriori medicamento attribues. Temperabis ergo cerato rosaceo, si maior calor est: si verò flaccidum vlcus apparet, myrtino. Quòd si nihil horum extiterit, magis tamen obsorduerit vlcus, imbecillius catharticum adiecto mel le temperabis. Et si humidius, siccantem pollinem sine molli-
 20 bus insperges. Aliquando verò nimium siccando, & contra-
 ctum, & exuccum vlcus reperies, quā in te siccantia humido dilues. In summa: iustam pharmaci qualitatem aestimabis, si purum vlcus inde redditum est, si naturaliter sentit locus vl-
 ceris, qui sensu præditus est: si modicè rubet, ac nimium ne-
 que siccus, neque humidus est. At quicumque sensu caret, si non naturaliter sentit, si nimium aut aridus, aut flaccidus est: si pallidus, albidus, liuidus, aut niger est, is nondum purus est.

Accedit aliquando ad sordes vlcum, vt etiam vermiculen-
 tur, quo tempore aloë cremata inspergitur, veratrum album
 cum melle, polij & absinthij puluis cum pice imponuntur, vel

*Vermiculā
 tia vlcera.*

20 nuclei perfici ē periscariæ succo pisti: plantago arefacta, cen-
 taurium minus, marrubium, calamyntha, porrum, & similia
 vsurpantur. Arida teruntur, vel inde exprimitur succus. Ei-
 dem rei lixiuium conuenit, vrina, tilia denique imbuta iei-
 uni hominis salua. In cancerosis, canceri fluuiatilis cinis cum
 cadmia, aut cerato inditur, Irionis semen conlæuigarum mel-
 le, lens cocta cum melle: mel in tegula torrefactum, & sola-
 ni succo madidum: oleæ virentis furculi exuccari, malico-
 rium vltum, Aizoi succus, vmbilici veneris, solani, intybi, la-
 ctuæ, psyllij, omphacis, attriplicis. Exprimere oportet, diu trita

Cancerosa.

30 materia pistillo, & mortario plumbeis. Eodem modo tritus
 pompholyx diu conuoluitur, affuso succo qui conueniat. Floc-
 cus, aut vermiculus iisdem succis madidus imponitur, ac sæpius
 repetitur, vt succi frigus contineat. Sed hæc ad accidentia vl-
 cerum magis pertinent, quanquam & quædam in his catharti-
 ca sunt. Repergant tincta melle linamenta: aridum mel quod
 melitis vasibz in hæsit, quodque in tegula crematum est: mel
 rosaceum, quod & alienum calorem attemperat: serum lactis,
 terebinthina, cum melle & rosaceo pari mensura. Eadem cum
 butyro neruis vtilis est: liquefieri oportet, & vnā commisceri.

Materia,

40 Iris, serpentibus & plenis sordē: marrubij succus conditus melle:

C 4 zruqo

Radix dra-
contij.

Lupinus.

Minium.

Mixta.

Esandice.

Ex ærugine.

Viride An-
dromachi.

Aegyptiaca.

Cera viri-
dis.

ærugo lota, caprinum stercus exustum & è vino pistum despe-
rata sanat. Maligna curat dracontij radix, colligitur sub cani-
cula, siccatur umbra, aliquot post diebus secta in taleolas, filo
traiecitur, atq; ita pendens umbrosa domo, asseruatur: vsus tẽpo-
re trita inspergitur: melli mixta vel cerato, ne acrior sit, imponi-
tur. Ex eadem radice cerusa facti ititia clementer purgat. Cicer,
orobus, faba, hordeum, fresa omnia, & melli infriata: Lupinus
vstus, tritus, & inspersus, maligna tibiæ ulcerum purgat, im-
plet, cicatrice claudit. Testarum, & voluminum crematorum, ci-
nis eorum, quæ ὀσπανάδιεμα. Ernacei cinis, amygdala, stœchas, 10
anagallis, aristolochiæ radix, gentianæ, cyperi, vricæ semen &
irionis, humidioribus, cancriosis, putrilaginosiis, gangrænosis,
mirificè profunt. Diplaci radix in cinerem vsta. Eadem ad mel
liginem vino cocta, & pyxide seruata. Radices solani, cortex,
herba, succus, cacoëthe iuuant, & non modo ulcera. In summa,
quæ nitrosa, & amara: quæcunque ita detergent & siccant, vt
non mordeant, non adstringant, purgandis vlcibus idonea
sunt. Arsenicum, & quæ ex hydrargyro conficiunt, quandiu
acrimoniam retinent, irritant vlcera, sed putredini repugnant,
ubi nec adstringentibus, vt alumine scissili: nec mordentibus 20
metallicis simul, & adstringentibus, vt squama æris, ferri, stom-
omatis abstinendum est. Nam & arsenico, & chrysocolla vete-
res vsi sunt. Minium quod è sulphure & hydrargyro fit, his
coniungi debet. Clementius, quod cerusa vsta comparatur,
vel plumbi gleba sterili. Secundum genus Græci τανδύλας
vocat. Ex quo diuturnis vlcibus & maleficis medicamen-
tum parant. Sandic. lib. vna: olei dulcis, lib. duæ, coquantur lento
igne, dum non inquinent. Aærugo octuplo, decuplo, & duode-
cuplo cerato mixta. Ceræ, terebinth. ana drach. sex: vel vn. vna:
olei vnc. tres, vel 4. liquefiant in vase duplici. Liquefactis ad- 30
de ærug. drach. 3. Clementius est vsta prius, & lota ærug. Po-
test dupla ceræ terebinthina commisceri: terebinth. lib. 2. ceræ,
lib. 1. rosacei, vnc. 3. vel 4. ærug. vnc. 2. vel 3. Liquatis & coctis re-
liquis ærugo inspergitur. Quod plus æruginis recipit, magis
siccatur, & deterget: quod minus, glutinando idoneum est. Aeg-
yptiaca ferè similia sunt: Aæruginis vnc. 1. squamæ æris, vnc.
2. aceti, vnc. 8. mellis, vnc. 2. Arida cum aceto terito: mel adijci-
to: omnia dum ruffescant, coquito: maleficis conuenit. Cle-
mentius est, ex mellis, & terebinthinæ pari pondere. Cera
viridis in Aegyptiacis numerari potest, trita inspergitur, vel 40
mollita

molliſſima oleo imponitur. Maligna iuuat: Lithargyri libra vna: leniter coquatur in aceti libra vna: olei, lib. duabus. Iam inſpiſſatis adde ærug. vnc. i. iterum coquantur, dum ruſſeſcant. Mellis lib. i. aceti, lib. ſemis: ærug. vnc. i. aluminis, drach. 4. coque ad ſpiſſitudinem, dum ruſſeſcat. Alij quoque aliter, modò viſta, modò lota: aliàs etiam viſta, & elota ærugine parant cathartica. Modus ſit, vt ne mordeat. Habes $\chi\lambda\omega\rho\alpha$ è cruda: $\mu\epsilon\acute{\rho}\rho\alpha$ è cocta deſcripta à Galen. primis libris de comp. phar. $\kappa\epsilon\tau\alpha$ γένε.

20 E farina hordei, cicerum, fabarum, orobi, cum vitellis, mo- *Alas è farin-*
mento mellis, & terebinthina, fiat catharticum. Alioqui farine *nis.*
conuenientis, vnc. tres: ſucci api, abſinthij, marrubij, vel ſimili-
um, lib. i. mellis, vnc. nouem: ad iuſtum corpus concoquantur.

Hordeacea in duabus partibus aquæ, vna mellis roſacei per-
coquitur: purgat, lenit, calorem temperat: poteris addere mo-
mentum lariginæ, quam è ſucco plantaginis elueris. Farinæ in
memoratis ſuccis coctæ, contra caneros & fiſtulas valent: in la-
boribus neruorum, terebinth. conuenienter additur: myrrha
& aloë, in putredine: in calore, fabacea & hordeacea præfe-
renda: calidior orobea, & è ciceribus. Amiciſſimum neruis,

Neruis ami-
cum.

30 quod ſequitur: Reſinæ, mellis, terebinth. ana ſelib. myrrhæ, ſar-
coc. farinæ, foenig. ſemis lini, ana vnc. i. Liquatis alijs reliqua
commiſcentur. Pus educit, & purgat mellis ſelib. terebinthi
vnc. 3. farinæ, foeni græci, vnc. i. radic. ireos drach. quatuor. Puri
craftiori, Galbani, ammoniaci, reſinæ, terebinth. ſepi taurini,
ceræ, olei antiqui ana in aceto merſa, paulatim fundantur igne.

Pus euacuat.

Efficaciter purgat, & ſiccatur: Iris Illyrica, vnc. quinque: fari-
næ, orobi, vnciæ tres: mannæ, thuris, calcis lotæ, ana vnciæ tres:
ariſtolochiæ, vnciæ tres, & drachmæ quatuor: terantur omnia
in puluerem: fiſtulas expurgat, & glutinat. Quod ſequitur,

Pulsis Oſt.
ad fiſtulas.

30 vetera vlcera repurgat, excreſcentem carnem reprimat, cicatri-
cem ducit: Chelidoniæ, planraginis, ſcabioſæ, liguſtici, vrti-
cæ, ormini ſylueſtris, ana manip. i. conquaſſata, ſeptem diebus
in oleo macerantur: deinde cocta exprimuntur: expreſſo ſuc-
co adde ceræ vnc. 3. terebinth. vnc. 6. reſinæ, vnc. 2. bulliant ad
corpus. Subductis igne, adde ſarcoc. aloës, ana vnc. i. ariſtolo-
chiæ longæ, æruginis, ana vnc. ſex. Fiar vnguentum. Vnguen-
tum Apoſtolorum variæ deſcribunt: reſponderet ſerè veneti an-
tiquorum, quo hi vſi ſunt, attrahendo, molliendo, glutinan-
do, & contra ferarum morſus: quod quia variè deſcribitur, ex

Viride ex
herbis.

40 Actio vertimus, tantum thure addito, & myrrha. Litharg.
vnc. 25.

vnc. 25. ammoniaci, vnc. 9. Colophon. vnc. 16. æruginis, galbani, ana vnc. 2. bdellij, opopan. ana vnc. 3. aristoloch. longæ, vel rotundæ, thuris masc. ana vnc. 6. myrrhæ, vnc. 4. ceræ, olei ana lib. 2. Lithargyron, in oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo [recentioribus, decoctionis fine, vt melius purget] vbi non inquinant, puluisculus Colophoniz inspergitur. Summotis igne, reliqua ex aceto trita immittuntur: postremo versata in mortario commiscuntur. Mellis cocti lib. 1. thuris drach. 4. myrrhæ drach. 2. Efficacius est, si drach. 1. æruginis, & tantundem terebinthinæ exceperit. Plura ex primo de comp. phar. 10
 ἄγ. τὰ γιν. 24. & 15. Actij.

De sarcotica.

CAP. VIII.

Ἀπείσχατον
 vlcus.

QUod iam purum quodque ἀπείσχατον vlcus est, carne impleri debet. Tale est, quod sordibus purgatum, modicè siccatum, sine rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie constitutum est. In summa, cui nihil accidit, quo minus impleri possit. Hic ergo carnem regenerato. Sed hoc naturæ opus est, quæ carnem è sanguine conficit. Oportet ergo tantum talemque sanguinem 20 naturæ suffici, vt inde carnem procreet. Insinuenda vitæ lex: cibi boni succi, vitæ aeribus, aui, venatio, suilla elixa dari potest. Vinum in dolore & phlegmone alienum est: datum aliqui modicè, nec ita vetus, aliquando prodest. Reliquum verò **Sarcotica.** sarcoticis medicamentis perfici debet. Quæ reuera sarcotica, iustam materiam naturæ comparant, modicè detergent, siccant primo gradu, vel ita, vt ne nimis calfaciant. Licentiæ est vocare sarcotica, quæcunque repellunt, temperant, molliunt, intemperiam corrigunt: in summa, summovent omnia, quæ naturæ **Vitanda.** opus intercipient. In sarcoticis vitanda, quæ adstringunt, im- 30 modicè siccant, quæque acrimoniâ mordicant. Illa frugi humiditatem partium, & materiam carnis ebibunt. Acris colliquant, & aucta sorde vlcera amplificant. Seligenda materia, quæ naturæ corporum & partium conueniat. Nec si quid Dionis vlcus impleat, statim & Socratem iuuare potest: Nec quod in glande carnem instaurat, protinus & præputium incarnabit. Finge Socratem, cui femur vlcusatum sit: thure aliqui sarcotico putredinem gignes. Aristolochiæ puluere carnem restitues. Etenim Aristolochia carnem generat, vbi thus sordes commouet. Ac rursus Dion sit paulò humidior temperatis: 40
 huic

Distinquenda materia
 quomodo.

Thus & Aristolochia.

huic thus commodum, Aristolochia inutilis est. Thus quod in Dione carnem constituit, in humidior, vel ficiore nihil tale efficit. In ficioribus partibus, ficiora: in humidioribus, minus ficcantia vtilia sunt. Idcoque & præputio, & tori pelli, quæ colem induit, ficiora: peni, & glandi minus ficcantia conueniunt: carni etiam, quæ minus ficcant: oculo minus, quàm nari: huic, quàm auri. Sinus humidior, ficiore: aridus, minus ficcante curari debet. Nudatis ossibus vitanda pinguis, aridis vitandum, vt carne impleas. Vlceribus pudendi, quæ humidiora sunt, anethum vsum inspergitur, cucurbita sicca, vsta pompholyx, lapis hematites, pini cortex: horum aliquid in pollinem tritum, & mannæ momento mixtum. Quæ verò madida non sunt, aloë sicca, & mannæ portiuncula incarnantur. Eadem ratio in ano, & eius naturæ partibus seruari debet. Omnia ergo remedia suis finibus distinguenda, & naturæ partium vlcerumque accommodanda sunt. Languidius sarcoticum, vel sanie aceruat, vel mollem carnem, flaccidamque gignit. Efficacior cauum exarescit, vel callosum germen enascitur, sæpe etiam excitatur dolor, & grauiter vlcus arroditur. Sarcoticorum genus, quod multa perficit, sæpe vsurpatur: quia videlicet eo cura celerius absoluitur. Quod volumus subiecto exemplo intelligas, idque in vsu reliquorum pharmacorum semel dictum sit. Glutinat, ficcet, deterget, & carne implet: Strobilina vnc. 3. ceræ vnc. 1. æruginis rasæ drach. 4. thuris masculi drach. 2. acetæ, quod sufficit: æruginem pluribus diebus conterito: thus vno die: tum cæteris, liquatum commisceto: gangrænis, nomis putrilaginosis, & vetustis conuenit. Fiet clementius. strobilina mollita prius, rosaceo: vel terebinthina, strobilina loco mixta. Quod si terebinthina careas, quod sæpe fit, larigna, quæ omnino terebinthinae similis est, vitandum crit. Alia larignæ differentia, cetera quidem terebinthinæ similis, sed gustu mordacior, sensu acrior, & odore grauior est. Mitius quoque fuerit cerato mixto, cera lota, diutius trita æruginem, aceto, non ita forti, sed vinoso: postremo, si æruginem minuas. Atque vbi vincit, consilium glutinandi sit thus pari pondere cum æruginem: si magis ficcandum, lithargyri, vel similis metallici bene triti partem aliquam commiscebis. Ex alijs etiam acrioribus, vt squammis, tostis, tratis, lotis, aliquid poterit adiungi. Si flaccidior caro est, præter metallica, myrteo oleo, vel melino: si calor

extitit,

*Natura partium.**In ossibus nudatis.**Vlcera pudendi.**Signa imbecillis sarcotici, & acrioris.**Sarcotica impropria.**Viride Gal.*

Ladanum.
Aloë.

**Duplex ge-
nus ulcerū
contumaciū.**

Antispod.

Cristallus.

Fuligo.

Pix & resina.

Colophon.
Caries.

exiit, rosaceo vti oportebit: si parum processit caro, aristolochiam, & aliquid è sarcoticis vnies. In duritie, adipēs, medullas, ammoniacum, & similia colliquabis. Alumen interes, si quid affluit: Ladanum, quod simul mollit, ac reprimat: Aloën, quæ repellit, terget, digerit, & sarcoticon est. Sic ergo *πολύχρηστον* temperabis, quod & aliter alijs accommodes, & ad multa vicia transformes, vt interim carnem repleas. In contumaci vlcere animaduertendum, aliud quidem tale esse, quod suauissima desideret: aliud, cui non nisi acris, extremisque auxilijs prodesse possis. Pudendorum, & sedis vlcera maligna, neque acris, neque vim ignis sustinere possunt, qua videlicet parte neruacea, & suauissimis medicamentis curari debent: qualia sunt, oui candidum, cadmia lota, cerusa, pompholyx, amydon, manna, myrrha, styrax, succus solani, Aizoi, & similia extus in mortario plumbeo, pistillo plumbeo: vel chymicorum oleum, quod exillant plumbo. Spodion, antispodion, quod fit ex oleastri floribus & folijs; ebore, cornu cerui, crematis nucleis dactylorum, ficulno ligno, lentisci, cytonij, myrti folijs, cum tenerimis ramorum partibus, moris immaturis in sole arefactis, vel è buxi coma, rubi, & terebinth. testis, & volutis ostreorum, buccinorum, purpurarum, & similia, taurino glutine, & linteorum cinere, facce vsta & elota vruntur ea omnia crudo fictili in fornacibus, donec figlina percoquantur: tenuissimè læuigare, & si quid superesse pures qualitatibus ignis, eluere oportet: si nolis adstringere, aceto macerabis, & siccabis. In fluxionibus leniter adstringere melius est: in putredinibus, aceto, oxycrato, cenomelite, vel oxymelite: in canerosis, solani succo & plantaginis imbui, & inde siccari conuenit. Corallo similiter vti licet. Cristallum laudant in oris vlceribus & cancribus. In clementibus auxilijs aloë est. Fuligo thuris terebinth. myrrhæ. E styrace, & pice liquida valentior est: ex cesypo, & butyro, suauior. Elui potest, quæ acrior videatur. Manna repellit, & ad multa vtilior thure est. Coloph. pix, resina, præsertim sicca, humidioribus corporibus conueniunt. Colophon modò per se, modò cum thuris polline vlceratis genitalibus inspergitur. Caries lignorum, magis ex adstringente, & detergente materia peculiariter, quæ vimo collecta est, expurgat, impletque humida. In Chironijs, maleficis, & extremorum vlceribus per se, vel ce-

crato mixta vsurpatur: farina corticis capparis interdum commiscetur, quæ eadem purgat, siccatque maligna: farina hordei & fœni græci humidiora corpora iuuare possunt. In secundum ordinem referuntur: Aristolo. iris, & similia, quæ detergent, digerunt, euocant, farina lupinorum, orobi. Pumex crematur carbone puro, & vino albo eluitur: per se tritus, vel cum sexta sulph. parte, iuuat chironia: his longè optimum medicamentum est plumbum vsum & elotum, vt & putrilaginosus, & cancerosus. In acriore sanie, contumaci vlcere re parte humida, quæque facilius putrescat, acria vitanda sunt.

*Sec. ordo.
Pumex.*

Acrimonia multorum, partim vstrina, partim lotura, vel vtroque diluitur, vel cerato rosaceo mitescit. Talia sunt quædam metallica, squama, chalcitis, atramentum furorium, quibus vstis, lotis, & alijs rebus temperatis, & parcè quidem vtendum erit. Lauantur pluuia, si queritur adstrictio, alioqui puteali, fluuiali, vel fontana. Chrysocolia, concreta sanies è putri vena metallica, difficilium vlcerum efficax remedium est: factitia quoque ex ærugine, quæ alumen recipit, & salem, in ijs, quæ nimio humore madent, & rheumate

*Vbi vitanda acria.
Metallica.*

Chrysocolia.

20 vtilior est. In hoc genere censentur, quæ Græci vocant κεφαλική & καταγματική. Illa caluaria, hæc reliquis quoque ossibus fractis imperantur, quanquàm interdum vtriusque ratio commiscetur. Cephalica catagmaticis acriora sunt, squamas & ramenta ossium detrahunt, foràs euocant, quæ in alto latent, vtraque tergent, digerunt, & siccant. Miscetur his quod adstringat, sed oportet ex aceto forti tam diu in æstu arteri, dum in tenuissimum pollinem abeat. Sic enim quod insuat repercutitur, & vis tergentium altius penetrat.

*Κεφαλική.
Καταγματική.*

*Adstringentia mixta
cephalica.
Vfus cephalic.*

His autem sic vtendum est nudato osse, quod in caluaria 30 sæpe fit ad vocatam διπλόου, arida inspergenda. Nudatis enim ossibus pingua malè conueniunt. Sintque paulò acriora, vt non solum squamas, sed viscidum humorem ex alto trahant. Videndum etiam ne qua parte syderatum vel corruptum os luceat: eliminandum enim, ac omninò repurgandum. Atque vbi cœperit caro succrescere, & os integri, cephalica cerato temperanda: sic enim coges iarcoticon, quia videlicet quæ euocant, tergent, discutiunt cerato mixta implere possunt. Cerati modum desumunt naturæ, vitij corporis, virtus denique medicamenti. Parantur cephalica ex 40. i. Illyrica, erui farina, manna, aristolochia, panacis. Heraclij

Materia cephalic.

- raclij radice, magis cortice (opopanax calidior est) radice
bryoniæ : in summa, his quæ detergeant, sed non rodant.
Cathegeis. Acria enim miscentur, ut ramenta auferant. Cephalicon quod
tollit squamas, ossa corrupta rapit, & caua implet, Iridis Illy-
riæ, panacis, ana drach. quatuor: aristol. rotundæ, mannæ,
ana drachmæ duæ: tuisa leuissimè, & traiecta cribro insper-
Ex orobis. guntur, vel melli mixta imponuntur. Farinæ orobi rubri
drach. octo: iridis, drach. decem: mannæ, aristoloch. rotundæ,
squamæ, ana drach. quinque: tritis, vel cum melle vitior. Sunt
qui addant radicem bryoniæ, & aliter parent. Corticis 10
pinei, squamæ, pumicis vsti, ana drach. sex: mannæ, thuris,
aristolochiæ, iridis, resinæ pityinæ, ana drach. quatuor: myr-
rhæ, aloës, ana drach. duæ: tritis vttere, vel cum melle, Athe-
næus loco corticis pini, drachmas quatuor gallæ miscuit. Plu-
ra ex secundo & quarto de compositione pharmacorum
Sarcotica mixta. *χρτά γιν.* Iam verò multa per se nocent, mixta sarcotica sunt.
Oleum sordes colligit, sic & cera: ærugo rodit: tria hæc
mixta, carnem regenerant: magis etiā, si quid sarcotici ammi-
sceas. Sic enim purgant, & carne implent. Quale est, Cerati ro-
facei lib. vna: æruginis vnc. i. mannæ, thuris, vnc. duæ. Cere, 30
terebinthinæ, ana vnc. quatuor: æruginis ex aceto lotæ, vnc.
vna: vel ut efficacius, vnc. duæ: thuris, vnc. duæ. Ita ex oleo,
cera, ærugine, resina, terebinthina, thure, manna, & ma-
teria sarcotica, sexcenta pharmaca confinges ea arte, quam
Galenus tradidit, quibus extergeas, sicces, repellas, ac simul
Trigener. impleas. Trigener, Cera, colophonia, terebinthina, pariter
colliquatis, refrigerata hæc in frigidam conijcies, diuque ma-
In fracturis ossium. nibus volutabis: nuda ossa capitis incarnat, squamas deducit,
& cicatricem trahit. Admirandum est mastiche pariter
mixta in ossium fracturis. Iudæi, Colophon. lib. vna: ma-
stiches vnc. vna: olei sesquuncia: liquata, & in frigida pista-
sine linamento vlceri impones: purgat, & præ cæteris im-
plet, sed cicatricem non generat. Optimè incarnat fari-
E farina pi- strinali. næ pistrinalis è tritico vnc. duæ: picis, Colophonæ valde tri-
tæ, vnc. vna: arido cauum impletur. Gal. Cere drach. sex:
olei vnc. tres: liquefactis adde thuris, iridis, aristolochiæ, ana
drachmam vnā: æruginis drach. dimid. Aliud, Radicis
Theriaca. Anchusæ, vnc. duæ: aloës, vnc. quatuor. Fiat puluis. The-
Maleficis vlceribus ti- biarum. riaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. Ma-
leficis vlceribus tibiarum, litharg. vnc. sex: cum adipis capril- 40
li,

li, olei rosacci, ana vnc. sex, coquito : coctis adde mastiches
vnc. sex, parum refrigeratis misce vitella quinque ouorum.
Hactenus experimenta veterum, nunc ad recentiorum reme-
dia transeundum est. Aureum Mesuæ. Cere vnc. quinque:
resinæ vñc. tres : terebinthinæ lib. vnam : mellis sesquun-
ciam : mastiches, thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloës, croci,
ana drach. tres : fiat vnguentum. Fuscum Nicolai mul-
ta habet vndè concoquat, & emolliat. Similiter & quod
Croceum describunt. Tetrapharmacum dolorem lenit, ma-

*Aureum Me-
suæ.
Fuscum Ni-
colai.
Croceum.
Tetraphar-
macum.*

10 turat phlegmonem, putredinem augere potest : siccare verò
& expurgare non potest. Galenus locis aliquot Thessalum re-
prehendit, & alios, qui tetrapharmaco vt siccante, purgante &
incarnante, vterentur. Actuarius iam à doctrina veteri dege-
nerans, vim molliendi, coquendi & incarnandi tetraphar-
maco tribuit. Omnia vlcera persanat : Artemisiæ, scabio-
sæ, absinthij Jormini, senecionis, tamaricis, apij, verbenæ,
pilosellæ, lanceolæ, pimpinellæ, linguæ canis, mille folij,
chelidoniæ, ana manip. vnus, ex omnibus reiectis radicibus
exprimatur succus, cui adde axungię veteris, lib. duas : sepi
20 hircini, libram vnam: olei libras duas: mellis vncias tres: me-
diocriter bulliant, & in mortario pista viniantur. Dia ireos:
Sepi vaccini, felibra: olei rosacci, vnc. tres: cere vnc. duæ: ra-
dices ireos vnc. vna: thuris, sarcocollæ, mastiches, aloës, aristo-
lochiæ, ana drach. duæ: cum terebinthinæ vnc. tribus, fiat
vnguentum. Pulvis Rasis, Olibani, aloës, sarcocollæ, sangui-
nis draconis, radicis ireos, ana. Ita cum mastiche, farina fœni
græci, & id geous remedijs sarcoticos pulueres confinges.

*Omnia vlce-
ra persanās.*

Dia ireos.

*Pulvis Rasis
Pulvis fœni
quomodo pa-
randi.*

Oportetque exactissimè conleuari, ne asperitate lædant.
Itaque materia in pila tunditur, tenui cribro secernitur, post-
30 eà molitur, ac deinde tenuius cribatur: quicquid non tran-
simeat, repetitur in pilam, ac tam diu conteritur, dum ad ex-
tremam tenuitatem perueniat. Hæc arida sunt, quæ humi-
dioribus vlceribus conueniunt. Alia per se induntur cauo,
vel penicillo vulnerario capta imponuntur. In fistulas mittun-
tur clysterio, sed diluta. Ab his thorulus mollis vino madens
superdatur. Vinum sit è dulci austeriusculum. Postremò omnia
commodè alligantur. Aestate bis, hyeme semel in die com-
mutantur sæpius etiam si dolor phlegmonæ, vel aliquid ta-
le intercesserit. Ac lintei lanugo bene munda impacta cauo sæ-
40 pe sufficit.

*Vtendi mo-
dus.*

De

De epuloticis.

CAP. IX.

Natura epulotici.

PLenum vlcus clauditur cicatrice. Epuloticum fccat, adstringit, sed citra morsum, atque hinc reprimi, & quod in carne humidum est, sorbet: carnem contrahit, & cute tegit, aut certè callo tenui, qui cuti similis est.

Secundū genus epulot.

Tertium genus epulot.

Ex quo fccare magis necesse est, quàm quod carnem gignit, vel glutinat. Aliud genus est, quod quia excrecentem carnem adimit, epuloticon appellant, acri natura, & iam mordaci. Addunt & tertium genus, quod fccat quidem, sed non adstringit. Cicatricem ducunt, galla immatura, myrta, malicorium, æris, squama, chalcitis, misy, ærugo vsta lota. Et quod præstantissimum est, æs vstum, & elotum. Metallis acris excrecens caro consumitur: vstis, & elotis trahitur cicatrix. Vruntur hæc fictilibus crudis, carbone puro: extinguuntur vino, mortario interuntur affusa pluuia, mox fccantur, cribrantur linteo: in mortarium aliquoties repetuntur, ne quid arenosum ex scabrum reliquum fiat. Abluuntur etiam ea ratione, quæ ex Dioscoride & Galeno repetenda: vt eadem materia excedentem carnem adimas, in duris ac mollibus corporibus cicatricem ducas. Erysimi semen, scorïa plumbi, stibia, cera-
to myrtino excepta. Erinaceorum, purpurarum, buccinorum, ostreorum, calculorum marinorum, silicum, & similium crematorum cinere, metallis acris similiter vtendum est: vt crematis quidem superfluum carnem adimas, vstis, & elotis, cicatricem contrahas. Hæc omnia tam possunt mansuescere lora, quàm suaues est cerusa lota. Flaccidis carnibus balaustra affarim insperguntur. Liberalius inijci oportet, vbi caro demenda est: parcius, & in subtilissimum puluerem conleuata, atque acie cultelli capta, vbi cicatrice plaga regenda est. In calloso stupidiq̃ sensus corpore, si neque plethora, neque
cacochymia, acrioribus ad cicatricem vti licet. Quæ enim molliora corpora colliquant, duriora in cicatricem contrahunt: & acria cerato rosaceo fracta epulotica sunt, vt vel pluuia, vel adstringente vino lora. Vinum sit neque recens, neque ætate mordax, aut languidum: præstat quod annis est & qualitate medium. Siccant, nec ita fringunt, myrrha, argenti spuma, ostrea, diphryges. Iam verò alia *ἐπίπασα*, quæ arida tenuissimè insperguntur. Alia *ἐμπλαστῶδι*, & firmo corpore. Hæc in platysmate adhibentur. Corpus accipiunt à
cera, quæ pinguis sit, vel natura sua, vel myrrino, melino, len-
tiscino

Ratio vren di metallica

Distinctio re mediorum.

Vinum.

*ἐπίπασα
ἐμπλαστῶ-
δι.*

tiscino

- tiscino oleo remollita. Ac sit olei pars decima, vel duodecima. Terebinthinâ quoque, & larignâ temperare licet: vt cefypo, si quid tumoris, vel calli vlcera labris reliquum fuerit. Eodem modo, medulla cerui & vituli. Sic enim epulotica diutius infister, neque breui exarescet. vnde lædat scabrie, & ante tempus decidat: ac tertio quoque die absolueret satis est. Cerata conueniunt è rosaceo, myrtino, melino, terebinthino, lentiscino, fraxinino. In ceratis epulotica applicantur multò magis, si hæc aciora: nec ita malignum vlcusest. E larigna, & dupla cera ceterum confici potest. Spodos factitia, quod antispodium vocant, in epuloticis censeatur: vis eius eluatur, vt sunt corpora, & vlcera: fugienda *μαλακνός δὲ*, quæque *μαλακνύει*: adeps, maxime suillus, oleum, cera, resina, ammoniacum, & similia in vlcerebus, quæ difficiliter cicatricem trahant. Fugienda acra, piper, sinapi, sed præcipuè vbi vel plethora, vel cacochymia. Ad hæc quæ humectant, vt aqua. Quod si omnibus ritè institutis vlcus cicatrici pertinacius reluctatur, aut iam opertum, clausumque rescinditur, horum aliquid subesse conijcies. Nam vel plethora, vel cacochymia est, vnde perpetuò madescit vlcus: hic purgante pharmaco, illic phlebotomia, quæ vacuet, & reuellat opus est.
- Aliquando in quantitate & qualitate vitium est: tumque primum phlebotomo, deinde cathartico medicamento occurrere oportet. Emulgendus atque etiam præcidendus varix est, si inde materia transfluit. Quibus ab hepate, liene, capite, aut alia corporis parte scarunt colluies, necessarium parti remedium adhibebis. Aliàs vicina malè habita scaloro lacerabis: callosa labra adimes: partem ægram, totamque viciniam, pristinæ naturæ reddes: os subiectum si qua parte syderatum, aut cariem duxit, abrades, aut etiam cauterio inures: vel si qua resistunt ramenta, maturè detrahes. In summa, omnia summoueas, quæ cicatricem tardant, aut eandem refricant. Lithargyrus per se trita, attrita operit. Eadem è vino lota tritaque resiccatur: tenuis plumbei lamina, plumbum vstum, lotum, summoperè medetur caneris. Implet, & ad cicatricem ducit cadmia cremata, pluribus diebus ex aceto, vel vino modò giluo, modò albo austeriusculo terere oportet. Ladanum molle & recens è vino, vel salina pistum cum elegantia iuuat. Cerusa, pompholyx, calx elota, bolus Armenus, terra sigillata, & similia quæcunque
- 40 siccant, adstringunt, nec mordent. In mixtis prætulit Galenus

Vitanda

Causa rebel-
lis vlcera.Redit ad
materiam.Mixta reme-
dia.

D

duè

διὰ κηρίαις, & *διὰ λασάνς* medicamenta. Quæ cum multa sint, ac variè concinnentur, pauca, & paratu facilia describemus. Cadmiæ, lithargyri, cerusæ, ana vnc. vna: ceræ, vnc. quatuor: rosacei, vnc. tres. Cerusæ, cadmiæ, ana vnc. quatuor: ceræ, myrtini, ana vnc. sex. Plumbi vsti, vnc. tres: cadmiæ, æris vsti, ana vnc. duæ: Colophonæ, olei myrtini, ana lib. duæ: vini antiqui odorati, quod sufficit. Cadmia pluribus diebus in sole tenitur ex aceto, vel conueniente vino. Quod si æs vstum

*διὰ λασάν-
ος Cistonii.*

similiter lauatur, melius est *διὰ κηρίαις* medicamentum: *λασάνου* prætumidis ulceribus auxilio est, implet, & ad cicatricem perducit. Picis aridæ, denar. centum: æruginis rasæ, denar. viginti quatuor: æris vsti, denar. quindecim: squamæ rubræ, denar. viginti quatuor: ladanî, vnc. nouem: lithargyri lib. tres: olei, vini optimi, ana vnc. triginta, Litharg. oleo coquitur, coctione media reliqua metallica iniiciuntur, volutantur rude, dum non inquinent: hinc pix immittitur: refrigerantibus ladanum vnitur è viso tritum: omnia in mortario conficiuntur: hoc & reliqua medicamenta, quæ siccent, & non mordeant, diutius coqui melius est. Adhibetur hoc in platysmate, deligatur, nec ante quartum diem exolui debet. Alia quarto de compo. phar. *κ' γινε.* Sunt & hæc epulorica: Aeruginis, æris cremati, ana semuncia, aluminis fissilis drach. duæ: ceræ drach. sex: ærugine vsta melius est: metallica excipiuntur cera præmolita igne, vel cerato ex larignæ semuncia, & ceræ vncia vna: alioqui cerato myrteo, vel rosaceo. Squamæ, æruginis, ana vncia: ceræ pinguis, vnciæ sex: larignæ, semuncia. Liguatis ceræ & resinæ reliqua trita coniunguntur, hæc in platysmate apponuntur, quod ulceris locum nec eò amplius circumscribat. Munitur vicinia his, quæ phlegmonem arceant: tertio quoque die, vel quarto, medicamentum reuellitur: austero vino for-

*Quomodo
hæc adhiben-
da.*

*Albū è ceru-
sa & lithar.*

uetur locus, platysma innouatur. Repetuntur hæc, dum cicatrix duci incipiat: resinæ loco, vel cefypus, vel medulla est, si quid inest durius. Et hæc quidem efficacia sunt, & maligna iuuant. Aliud: Cerusæ, lithargyri, ana libra vna: olei myrtini, libræ duæ: ceræ scilicet terebinthinæ, vnciæ tres: aluminis scissilis, vnc. vna: piperis, semuncia, vel paulò minus: leuius erit, si sciquinciam thuris addideris. Parabile & mirabile: Aluminis scissilis semuncia, in vini, aquæ pluuiæ, vel quæ in cauis quercuum defidet, vncias nouem, diluitur: linteolum verus, sed mundum, aquâ inculcatur, exarescit sole: deperditur, & concerptum imponi-

imponitur. In sedis vitijis, & inueteratis, vino quàm aqua, vti melius est. Aliud, in quo veterum & posteriorum consensus est: Linteolum aqua illa, vel vino madens, sed expressum, molliter apprimis loco: cui deinde pertenuem plumbi laminam indaces, & alligabis. Cerusæ, drachmæ duæ: gallarum, myrti, recrementi, plumbi, ana drach. vna: fiat puluis. In ignis exustionibus & calore: Cerusæ, lithargyri, hordei tosti, ana vncia vna, ceræ, vnc. tres: rosacei, vel myrtini, vnc. octo: metallica è vino terito, ceram cum oleo liquefacito, hordeum cribratum in-
 10 spergito, omnia coquito, excolato, in mortario conficito.

*Lamina plū
bi.*

Album Gal.

*Larigna po-
tior est, quā
terebinth. in
malignis.*

*Ratio in his
ablundis me-
tallici.*

Calx.

*Recentiorū
pharmaca.
Vng. album
comunitatis
Albū Rasis.
Pulvis epu-
loticus.*

*Plantago.
Album è ca-
russa.*

Aliud: lithargy. cerusæ, ana libra vna: coquantur in olei albi libris duabus: aquæ purissimæ scilicet, dum aqua exhalauerit, & purum pharmacum consistat: purus sit ignis. Liguat-
 20 tis adde terebinthinæ, vel larignæ potius in malignis, vncias duas, vel tres: ceræ albæ, vncias quatuor, vel sex: vt augetur refinæ modus sic & cera augenda est. Postquàm verò hæc cum cæteris coierint adde thuris semunciam, pompholygis, ostreo-
 rum, cadmiæ, ana vnciam vnam. Vsta hæc in cinerem, tri-
 ta, & ex aqua lota: dulci quidem in acri sanie: marina, vel
 30 acero in callosis, & tumenitibus labris vsurpentur. Inopiâ mari-
 næ, subduplum salem aquâ diffundes. Quod si multus humor affluit, vino albo pellucido leniter adstringente, commodè lauabis. Calx septies elota, è rosaceo, vel aqua diluitur, in æstu medio subinde versatur, teritur, abluatur: postremò cum iam satis lota, tritaque exaruit, è rosaceo pista imponitur: ci-
 caticem trahit: vlcera neruorum maligna, & ambusta iuuat.

Probanda quoque remedia posteritatis: Cerusæ vncia vna: lithargyri semuncia: rosacei libra vna: aquæ rosaceæ sesquun-
 30 cia: metallica in mortario fortiter perfriantur pistillo duro, quod cum sit, deinceps, ac paulatim liquida affunduntur. Vng. desiccatum rubrum. Album Rasis: Olei rosacei libra vna: ceræ vnciæ duæ: cerusæ vncia vna: caphuræ drachma vna: albumina ouorum tria. Melius fiet cum drach. sex lithargyri. Aliud: Ba-
 laustiorum, sanguinis draconis, cadmiæ argenti, tris vsi, loti, ana: fiat puluis. Addunt santalos, nymphæam, minorem planta-
 ginem, rosas, vbi calor inest. Vtraque plantago cum radi-
 ce trita epulorica est. Emplastrum album è cerusa non om-
 ninè dissimile albo Gal. Ceræ vnc. quatuor: rosacei lib. dimid.
 terebinth. vnc. tres: cerusæ vnc. duæ: lithargyri vnc. vna: thuris,
 40 aluminis, cineris è cochleis crematis, ana semuncia: ceræ oleum,

¶ *Hum è ce-
russa Actu.
Litharg. nu-
trita Ras. et
Auicenn.*

terebinth. simul funduntur, fufis reliqua commifcentur, pifta omnia in mortario vniuntur. Aftuarij: Litharg. feſquilib. ceruſæ lib. quatuor: ceræ albæ lib. ſeptem: olei myrtini quantum ſufficit. Litharg. ol. coquitur, ceruſa additur, & cera. Lithargy. nutritum Ratis & Auicennæ: Lithargyros tenuiſſimè teritur, ex aceto & roſaceo diu exercetur in mortario, vt quidam volunt, plumbeo. Modus eſt, vt inde craſſior fermentetur, & exturgeat. Sunt qui addant vni parti lithargyri iam nutriti, ſextulam ænis vſti, vel cremati plumbi: aut tantundem aluminis, balauſtiorum, rubiæ, ſanguinis draconis, cadmiæ argenti. Idque ſingulari ope in malignis & pertinacibus vitijis. In cancroſis ceruſa iungitur piſtillo & mortario plumbeo. Ceruſa per ſe curat abraſa: ex vino trita, humidioribus vlceribus idonea eſt: ex aqua roſacea lota, pellit, cicatricem contrahit, & calorem attemperat, butyro mixta, mollit, coquit, & epulotica eſt, vt licet & emplaſtro deſiccatiuo rubro, & alijs. Epuloticis vtimur, iam propè pleno, ſed nondum adæquato vlcere. Celfus linamento è frigida preſſo integit: vbi iam æquatum eſt, ſicco: ac bene fiet, ſi in frigida alumen maduerit, & quod ſiccum imponitur, in ea merſum, poſtea inaruerit. Et hæc quidem in leni vlcere faciunt ſaris. In malignis, linteo lo bene puro ſinum molliter extergebis. Epuloticum induces, quod plurimum ſiccet: deinde ſi quid eſt durius, platyſina, quod attenuet labra, ſuperdabis, quod æquali linteo conteges, ex quo ſplenion ſubijcies expreſſum frigida, alioqui vino, ac frigiditatem ſplenij aſuſa ſubinde frigida continebis: poſtremo commodè ligabis, tertio primum die ſolues. Hic linteo ſicco, molli, puro, ſaniem detergebis, & vt prius, omnia reuocabis. Recentiores vino calido cui balauſtia concoxerint, aut ſimilia, vlcus ſouent. Alioqui aqua, quæ vim aluminis conceperit, vbi calor aliquis eſt, molli vellere humorem for- bent, pharmacum imponunt, ſuperdant ſtupas vino madidas vel aqua: omnia glurinantibus faſcijs conſtringunt, Galenus interdicit aqua nec vlcus nudum contingere oportet. Plurima epulotica ex 1. 2. 4. de comp. phar. & 14. Actij.

Ceruſa.

*Ratio vſus
epulotici.*

De glutinantibus.

C A P. X.

Longius fortaffe quàm res poſtulabat de glutinantibus ſermo dilatus eſt: verum ita nos coëgit, traxitque conſe- quens medelarum ratio: nec alius locus obigit com- modior,

modior, in quo de illis orationem institueremus. καλλυμνῆς Græci vocant, συμφοτῆς & τραυματῆς. Quidam etiam ἰναιμα: & peculiariter quæ cruentis vulneribus adhiberentur. Siccant hæc

Facultas
glutinantis

omnia ad 2. ferè gradum, media ratione inter ea quæ cicatricem trahunt, & quæ carnem regenerant: non detergent, sed astringunt, prohibentque ne quid humoris labris ulcerum obueniat: nec in cruentis solum usurpari solent, sed ad sinus fistulas, maligna vetustaque ulcera transferuntur. Opitulantur celerius, si integra partium natura est, si paucus sanguis idemque

Cutis quam
faciat ad celeritatem
glutinationis.

30 purus affluit, si non abrasa non præcisa, sed vel salua, vel parte aliqua etiamdum hærens cutis est. Etenim cuti cum subiecta carne naturalis quædam amicitia coijt, vt ægerimè sanescant, quibus omnino illa excidit: facilius, vbi incolumis seruata est. Mirum quod præcisa, sed loco suo reddita coalescit ac mortua reuiuiscit, quodque è plaga liuore ducto, non in iuvene solum, sed etiam sene viuidum colorem recipit. Magna igitur cutis habenda ratio: non ob id tantum quod inde celerius glutinatur vlcus: sed quia interiecta cure plurimis inuatur, quæ nuda

20 gia irritatur: medicamentis paregoricis, fordes colligit: vellicatur cathartici: inuatur omnibus si familiari rectorio munum est. Ideoque & abrasa cutis & pendula, suo loco inducatur, & reducta molliter apprimatur: sic enim vnà cum vlcere celerius coalescet. Animaduertenda quoque labra sunt, quia videlicet, alia contracta alia euerfa plurimè debiscunt. Contracta deligatione abducenda, quæ in vlcere laxior, hinc inde sana parte arctius contrahatur. Colligenda verò quæ plurimum hiant à sanis partibus ineunte fasciæ quæ vt ad oras propius accedit, ita firmitus constringatur, sed ita vt ne nimis cogendo nimis comprimas & dolorem ingeneres. Euerfa

Ratio adhibenda labris

30 tantum altero vlcis labro, hinc lintea abduces & in alteram partem quasi trahendo volutabis. Si vtrumque euerfitur, ea quæ ἰσχυρὸν ἀρχὴν ἐπιδέσσει vocant, necessaria est: & vt sunt contracta, ita remedia distinguuntur. In recenti paruoque vlcere fasciola in orbem nexa, satis esse potest: nisi vel à cacochymia, vel plethora, vel aciore sensu partium subesse periculum videas: hic enim vel si acus minima pupugerit, dolor, phlegmone, conuulsio denique ad exitum sequi consuevit. Statim ergo colleticis abstinendum, & paregoricis vtendum erit. In maiori

Ratio deligendi

Paruum vlcus non negligendum.

40 vulnere, maiora remedia querenda sunt, deligatio, sutura,

D 3 fibula,

ἐπὶ καίρῳ
vulnus.
μύξα.

Quomodo e-
tergendus
crur.

Ratio glutinandi.

In rectis vul-
neribus.

In transuer-
sis.

Vinum nigrū
austerum.

In quibus su-
endum.

In quibus
etiam fibula.

Particularis
materia di-
stinctio.

fibula, medicatio, hicque audienda sunt magnum & parum in sectione, non quorundam veterum more qui ἐπὶ καίρῳ in-
signe vulnus è natura loci : μύξα, è periculo statuunt. Atque in
glutinando, natura corporum distinguenda : quia videlicet
vt illi loquuntur hoc δυσέλκεις, illud εύέλκεις. Ac difficultas fe-
re nascitur ex ijs quæ in rebelli vlcere proximo capite tradira
sunt. Primum igitur in cruento vulnere, siquidem neque pro-
fundum est, neque hæmorrhagia extitit, spongia, lana succida,
molli panniculo detergendus cruor est, atque illa prius inculcan-
da frigida, exprimenda, atque ita adhibenda. Quod si altè
descendit vulnus erupitque sanguis, frigida loco aceto vtendū
erit, vt inde grumum attenuet & sanguinem supprimas. In ner-
uis, ab aceto metus est : Ideoque specilli extremo lintecolum
alligabis, quod vel sapa vel melicrato madesfacies. In lacunis
vbi iam glutinandum, vinum & cenomeli idonea sunt. Ac cum
iam deterfus cruor est, nihilque labris intercedit, qualia sunt,
pilus, grumus, oleum, pluma, & similia, sequitur vt latera la-
teribus, oræ oris ritè coeant. Ponimus autem neque dolore, ne-
que phlegmone, neque vilo alio vitio vlcus laborare : ac iustam
carnem lateribus vulneris inter esse. In rectis vulneribus labra
facile adducuntur, multo magis si molle corpus est, adducta fa-
scijs continenda sunt, ex duplici initio : alicui simplicibus,
sed futura interdum addita, & fibulis. In transuerso vulnere, ore
disident magis, quare futuris & fibulis opus est. In magnis &
profundis vulneribus vincula ex duobus initijs necessaria : eadē
quoque in latis simul & profundis, sed hæc præterea altis futu-
ris cogenda sunt : neutra verò præpropere glutinanda : ac fa-
scias austerio vino & nigro maduisse iuuat, quod in vulneribus
cæteris præferendum est, quia repellit, phlegmonem prohibet
& cogit : in quo etiam aliquid eorum quæ adstringant licet
incoquere : sed modus sit, ne nimis contrahas, vnde excitetur
dolor. In molli parte, extrema auricula, imo naso, fronte,
bucca, pericranio, palpebris, cute gutturis, ventre membranarum
quæ non sunt tendines, sutura conuenit. Præputium assuitur
& infibulatur, vt & carnosum genus vbi nimium debilitat vul-
nus, nec oræ facile coniunguntur. Sed de his alio loco pluri-
bus. Particularis materia, vt sexus : vt molle durumve cor-
pus : vt recens vetustum, paruum magnumque vlcus est, ita
distingui debet, quod in fascijs, futuris ac fibulis similiter ser-
uandum est. Ebulus, sambucus, symphytum, syderites, pal-

- ma: cortex, plantago, fraga equisetum, pini, tedæ, dracon-
tij folia recentia, anagallis, salix, androsæmon, astragalus,
phloununculus, araneæ tela, & ea percipne cui è pistino fa-
rina infederit. Spongia, lana succida, linteolum expref-
sa è frigida, vino, vel liquore qui contrahat: caseus recens
& oxygalactius. Ifaris satina nervos etiam præcisos in fine *Ifaris satina*
musculorum iungit, & duriora corpora conglutinat. Nervos
etiam iuvat pentaphylli folium cum melle, alia aistata trita-
que: myrrha ulceribus capitis idonea. Sarcocolla, gummi ge-
nera & resinæ quæ non mordeant nec ita detergeant. Fix sic-
ca magis quàm humida: hordeum vstum, aloë ex aqua tri-
ta: herbæ succus & folia, quam ex India comportant, & patrio
nomine Zambanam appellant. Aloë vulgaris est quæ tenace
vita in multis mensis viget: è laquearibus ædium & tabularis
magna virosis commendatione suspenditur. Constat hoc re-
medium certo experimento nautarum. In colicis quæ ad
manum sunt, præcipua laus attractylidi. Eius cacumina au-
stero vino vel oxycrato incoquantur: excipitur concha quod
enatat. Vlmi cortex alligatus, eiusdem quoque folium intri-
tum glutinat & ambusta iuvat, vt sine manifestacatrice co-
eant. Purgat, implet, cicatricem ducit, glutinat, & artificia-
libus balliamis miscetur aqua quæ vlmi folliculis concluditur,
bene purgata vermiculis. Et balsamo quodam raro & pre-
cioso principes vtuntur glutinando. Sunt qui aquam quæ
castratis viribus exudar vere vitreo vase excipiant, annum
integrum bene opercularum vas & clausum exponunt soli,
loco subdiali, sed qui ab iniurijs cæli tutus sit: vas subin-
de ad solem vertunt, melligo tandem concrefcit quæ fit bal-
samo viribus æqualis. Efucaciora sunt sorbus, mæspilus, pi-
rafter, quercus, & quæcunque acerba sunt: teruntur, affuso in-
terdum vino, quod astringat: atque ita alligantur. Addunt bo-
lum Armenum, terram sigillaram & similia. Composita sunt: Ce-
rari myrtini vnc. 3. cerui vnc. 1. vetusta glutinat. Aloë arida, ceno-
melite coquitur, emmotum inde tinctum imponitur: capitis vl-
cera coniungit. Galenus pharmaca temperavit mollioribus na-
turis ex Lithargyro oxelæo & cnelæo durioribus ex bitumi-
ne, ærugine, squama, aloë & myrrha. Lithargy. vnc. 4. olei, &
aceti, ana vnc. 8. vel eo plus, vt diutius coquatur, Oxelæo facilius
liquefcit argenti spuma: diutius tamen vexari mortario, ac dein
de integrum diem excoqui necesse est, idque luculento foco, & *Ex lithargy. & oxelæo*
grum.

- sereno aëre: quod bene coctum ritè coijt, nigrum euadit, non
abfimile ei quod nigrum vocant: fortius fit, si oleum vetus est:
acetum verò tenue, pellucidum, & acerrimum. Fistulas sine cal-
lo, maiora minoraque vulnera, cruenta, lacunosa, difficillima.
& parotidas glutinat. Quod verò ex cenelæo, cruenta iungit:
Litharg. lib. dimid. tenitur diebus quindecim ex vini gilui, te-
nuis, & odori schibra, vel libra vna: deinde affusa olei libra vna,
vt prius coquatur. *Διὰ χαλκίτεω*, fistulas & magna vlcera
coniungit, & cicatrice tegit. Axungia veteris bene purgata
fibris, & sine sale lib. dua: olei veteris, litharg. ana lib. tres: chal-
citis vnc. sex: conficiatur ex arte: quòd si ipatha palmaria de-
fuerit, sagkna rudicula commouebis potius, quàm radice can-
nae, cui non exigua vis inest abstergendi. Diuturnis maximis-
que viceribus, & quæ ægrè cicatricem ducunt: Succu foliorum
hlij vnc. quinque: mellis & aceri, ana vnc. i. coque ad crassitu-
dinem: efficacissimè glutinat. Cochlearum carnes cum thu-
re, & myrrha trita: neruorum vulnera, & alia quoque vniunt.
Cruentis, suggillatis, excisis, quacunque corporis parte: vitili-
gini, lepræ, maculis & crustis auxilio est. Attractylidis effossæ
cum radice & siccata vmbra, deinde trita, olei dulcis ana vn. 4.
Colophaniæ vnc. 18. ærug. vnc. 2. ceræ vnc. octo: liquabilia si-
mul liquato: excolatis æruginem primum: deinde attractylida
commisceto, mixta in frigidam conijcito, diu manibus versa-
to ac per noctem frigida macerato: postridie vsui reponito.
- Barbara.* Barbarum Galen. Ceræ, picis resinæ, bituminis, thuris, ana
Recentiorū. vnc. septem. Aliud: Picis lib. i. bituminis, ceræ, ana selib. ammo-
niaci, mannae, ana vnc. 3. ceru. sesquunc. olei drach. 18. aceti vnc.
18. Aliud ad cruenta: Aerug. rasa, denarij 12. litharg. denarij 20.
aluminis, picis arida, resinæ. pini arida: ana denar. i. aceti, olei
ana vnc. 9. Plura primo & secundo de comp. medic. *κερά γίνω.* 30
- Pulvis ruber.* Iam verò adscribenda remedia posteriorum. Pulvis ruber ex
sanguine draconis, & sesquialtera ratione, vel dupla thuris. Alij
calcem, bolum Armenum, vel santalos commiscunt. Sunt qui
hoc modo conficiant: Symphyti maioris, boli Armeni, ana vnc.
1. picis Græcæ, vnc. 3. mastiches, olibani, ana semunc. sanguinis
drac. mummiæ, ana drach. 2. Pulueres futuris insperguntur, vel
in cerato imponuntur. Sanguinem draconis collecticon variè cō-
ficiunt. Thus, mastichem, bolum Arm. æqualiter mixta, hirci san-
guine mactati Augusto mense concorporant: alij aliter ex eadē
materia: quidam bolum Arm. terunt, efficiuntque vt multū for-
beat

beat sanguinis hircini, & forborum succi. Plinius forborum succo, & caprillo sanguine compingit. In his omnibus prouidendum, ne supra modum contrahas: quod si meruitur, cerato phar maca temperabis. Eidem Pli. & Solino sanguis est draconis, qui dum vulneratus elephas concidit, colliso casu dracone colligitur. Aëtius è succo herbæ Indicæ quam draconteam vocant, fingi credidit. Dracontio nostro vis inest glutinandi. Plantaginis vtriusque, consolidæ, betonicæ, verbenæ, pimpinellæ, pilosellæ, millefolij, linguæ canis, caudæ equinæ, ana manip. i.

*Viride Be-
nastini.*

20 Conquassata coque cum lib. tribus sepi arietini: colatis adde resinæ, ceræ, galbani, ana quart. tres: sarcocollæ quart. i. terebinth. quar. i. & semis. Liquata omnia miscentur. Centaurij minoris manip. 6. macerentur per noctem in vino albo: tum in eodem coquito, dum medium vinum consumptum sit: colarum succum iterum coquito ad mellis crassitudinem: postremò reponito: vltus tempore accipito terebinth. lib. i. ceræ nouæ quar. i. resinæ, thuris, gummi Arab. mastiches ana vnc. i. succi prædicti vnc. 3. laetis muliebris vnc. 2. Fiat emplastrum. Betonicæ, centau

E centaurio.

Dini.

30 finæ quar. i. terebinth. selibram: sarcocollæ vnc. i. ceræ vnc. 2. Li quata omnia bulliant, acetum paulatim affundatur: vbi refrixerint, omnia manibus è muliebri lacte conuoluantur. Ceræ albæ, resinæ, ana quart. i. olei vnc. 2. terebinth. lotæ, vnc. i. thuris, mastiches, ana semunc. Fiat vnguentū. Pimpinellæ, betonicæ, me langianæ, vel loco huius telephij, vel maioris semperuiui, verbenæ, vermicularis, aut potius semperuiui minoris, ana manip. i. coquantur vino vt prius, dum duæ partes exhalauerint: & alijs similiter pereolentur, colatus succus iterum coquatur, tum adde resinæ lib. i. ceræ albæ selib. mastiches vnc. 2. refrigerata vt

Anserini.

30 prius è muliebri lacte subigantur. Aliud: Olei bedegaris lib. i. ceræ quar. i. seminis albarum rosarum semunc. Fiat vng. Olei bedegaris finges, cymis bedegaris, aut si desit, attractylicos in olei & vino nigro coctis, dum vinum expirauerit. Semen rosarum est, quod detractis folijs, & apicibus luteis, excusso capite decidit: Chelidoniz, panis cuculli, orumini, lybistici, scabiosæ, ana manip. i. sepi arietini lib. i. olei selib. ceræ, mastiches, thuris, aloës, æruginis, ana vnc. i. E vermibus neruosis partibus glutinidis, vtriusque symphyti, cynoglossi, pilosellæ, vtriusque plantaginis, ana manip. i. vermium terrestrium lib. dimid. trita omnia

Vng. gloria.

*Viride ex
herbis.*

E vermibus.

40 macerentur septem dies in olei sesquib. Deinde cocta leuiter excolen.

*Vermes tor-
genti.*

excolentur: expresso succo, misce sepi arietini purgati lib. i. picis naualis scilb. picis Græc. quart. i. ammoniaci, galbani, opopanacis, terebinth. ana vnc. i. thuris, mastiches, ana semunc. macerata pinguis in aceto, & soluta cæteris vniuntur. Lumbrici terræ per se triti, & impositi neruos glutinant. His ergo utendum, vt prius, constituto vlcere, stupa è vino rubro pressa superponenda hypodermides, splema, & reliqua lintea eodem vino insuccanda: ligandumque vulnus, vt contineas, reformes, coagas, quantum videlicet vlcus expostulat.

De pyroticis.

CAP. XI.

10

Δρώπαξ.

Πυρωτική sunt Δρώπαξ, σινκπισμός, φεινιγμός, καυαίρετική, σκηπτική, εξαρωτική: ignis denique & inde cauteria. Dropacac picationes vertunt, non è verbo quidem, sed πρῶτα & πῖτανα veteres appellarunt, vnde Latina vox conuersa est. Alij etiam Δρωπακίς è pice, & quarta, vel quinta parte olei, quibus subdecuplum, plus minúsve piperis, pyrethri, euphorbij, & similia, miseri solet. Sic enim melius calfacit, vt accepto sulphure, cinere sarmentorum, & sale siccando magis conuenit. Nam & dropax, quique describentur, sinapis & 20 phœnigmus, eo sunt, vt refrigerata calfaciant, confirmetque partes, quæ partim frigore, partim assidua fluxione elanguescunt. Alia quidem possunt plurima: hic tan. en precipuus eorum vsus est. Et hæc in genere μετασυγκριτική veteres appel-

Vfus.

*Μετασυγκρι-
τική.*

Πτύσματα.

*Διπλώμα-
τα.*

Modus.

larunt. Alutę dropax impingitur, vel linteis complicatis, quę πτύσματα & διπλώματα Græci vocant. Deglabratur cutis etaso pilo, dropacissimus calens inducitur: idem subinde reucllitur, priusquam refrigeret. Renouatur pharmacum, dum inde efflorescat locus in ruborem, & leniter extumeat. Nimium est, cum morâ pharmaci subsidet tumor, & exal- 30 bescit. Hoc enim volumus, vt dropacis ope reuocata anima, pars velut intermortua reuiuifcat, calorem suum, ac spiritum recipiat, & iam proprio alimento perfruatur: postremò etiam corporetur, quæ confecta macie intabuit: verum alia tardius, alia celerius vitam recipit. Quæ breui rubet, ea celeriter instauratur: tardius, quæ ægrè recalescit: desperatio est, quum neque frictione, neque fori tepidæ, neque dropace melius coloratur. Alijs satis fuerit, si tribus aut quatuor diebus adhibeatur dropax, nec assiduè quidem, sed bis hyeme, semel æstate. Alijs bis tervc singulis diebus, nonnunquam tertio, vel 40

quarto

quarto quoque die, et videlicet vel facile cedit, vel contumax laequer est. Ac tepida prius fouisse cōfert: vel smegmate affricasse, quod aliquid thapsie, sinapi, euphorbij, piperis, pyrethri, caparis receperit. Quod si affixus dropax pertinacius hæsit, tepidâ diluendus est: quem quum detraxeris, sursum decocto, & similiū, partem extergebis. Sinapisinus paralyticos, coxarios, podagricos, inueterata rheumata, hemicranias, quæque caloris inopiâ languent, adiuuat. Caricæ vno die aquâ macerandæ, aut cappares, si grauius malum est, vel si lenius, & acrior sensus est, panis triticeus: hicque magis, cum in superficiem tantum agere oportet. Macerata tundenda sunt: lenis erit sinapisinus, qui subduplum sinapi seiorum triti acceperit: acrior, qui duplum: mediocris, in quo vtrumque ex æquo temperatum fuerit. At quo tempore pinfitur medicamentum, paulatim affundenda aqua est, in qua illa maduerint. Sunt in veteribus, qui acetum prætulerint: alij aquam, quod experimento didicerunt, sinapi vim aceto exolefcere. Eodem modo, quo dropax, vsurpari debet. Si quis dolor, aut feruor à medicamento extiterit, tepide, vel rosacei fotu, illitu cerati rosacei: ceruſa è rosacco trita, & alijs id genus extinguitur.

Sinapisinus

Materia.

- 10 nius, & acrior sensus est, panis triticeus: hicque magis, cum in superficiem tantum agere oportet. Macerata tundenda sunt: lenis erit sinapisinus, qui subduplum sinapi seiorum triti acceperit: acrior, qui duplum: mediocris, in quo vtrumque ex æquo temperatum fuerit. At quo tempore pinfitur medicamentum, paulatim affundenda aqua est, in qua illa maduerint. Sunt in veteribus, qui acetum prætulerint: alij aquam, quod experimento didicerunt, sinapi vim aceto exolefcere. Eodem modo, quo dropax, vsurpari debet. Si quis dolor, aut feruor à medicamento extiterit, tepide, vel rosacei fotu, illitu cerati rosacei: ceruſa è rosacco trita, & alijs id genus extinguitur.

Phenigmus

Anacardium

Materia.

Phenigmus rubore facto etiam vesicas mouet, & exulcerat: in eorum genere, quæ quia illita exulcerant, vocantur æmurtæ. Ex nasturtio, sinapi, radice helenij, bryonie, lepidij, columborum fimo, maxime syluestrium, caprillo stercore (vnde *Alaxo naryius*) aceto pistis. Scilla trita, nucleis alij: & tunicis lacte tithymalli, ficulneo, pulegio, cantharide, vrtica, ranunculis, thapsia, euphorbio, fœce vſta, metallis acribus, & alijs id genus: lana sordida bene carminata, & calente igne, asis carnibus, & ouis, dum vehementer calent, impositis.

- 30 Visco, melle, axungia veteri, terebinthina, cerato, actionibus, gummi, & resinis, vt res exigit, & corpora vel mollia vel dura sunt, excipere oportet. Alias quoque friabilia affricantur: emplastra verò imponuntur loco: hic prius palpatu manibus, exercetur ferulis, aut asserculis euerberatur: affricatur etiâ, vt laxatis spiraculis medicamenti virtus celerius penetret.

Mel anacardium

Anacardia trita septem diebus macerant aceto: in eodem coquant, dum pars tertia euanescat: refrigerari sinunt: excipiunt concha, quod enatat oleosum. Id mel anacardinum est. Alij conquassant anacardos: sepius melle, dū hoc vim anacardi

- 40 dijs satis conceperit. Fermentum aceto tinctū, anacardino melle, vel

le, vel causticis rebus concorporatur. Puluisculus è sinapi, piperis, euphorbij, ana drach. vna infricatur : vel inspersus anacardino melli. Ita cerato è thapsia, & alijs vtendum est. Breui mora rubor fit, deindè bullæ excitentur, vlcus etiam, si diutius institerint: vesicæ configuntur, humor exprimitur: relinquitur vlcus, dum vitium reddiderit: hac arte coxarij, podagrici, hemicranici sæpe releuantur: repurgantur viscera, sexcentaque vitia percurantur. Cathartica sunt, æs vstum non lectum, ærugo, squama æris, & rubra magis: testæ, & terra furnaria, testarum, concharum, & ranarum cinis, alia quoque in epuloticis descripta: hæc ferè in superficiem agunt, excrecentem carnem complanant, ac leniter radunt. Septica altius subeunt, tenellam carnem tabefaciunt calore multo, nec ita crasso corpore. Arënicum: Sandarachæ, dryopteris, chrysocolla, pityocampe, aconitum, sanguis equi admixtarij. Escharotica vt nihilo plus caleant, rodunt tamen acrius, crassiore materia, quæ duris & callosis corporibus conueniunt, vt septa mollioribus. In escharoticis calx viuæ, vini fæx cremata, & acetii, quæ secundum mensuram non superet. Nam quæ verustior, exanimari solet: ignis denique & cauteria: vtriusque generis vsus est in callosis fistulis putrilaginosi, humore fluentibus, ac solutis vlceribus. Escharoticis peculiariter vtimur in caneris, carbunculis, hæmorrhagijs hinc frugalis vita, frigida liberaliter posita, vini abstinentia, alimenta refrigerantia magis etiam si subest febricula, imperanda sunt. Septon, quod exest sine morfu: Sandarachæ, auripigmenti, ana drach. duæ: calcis viuæ, mannæ, thuris, aristolochiæ, ana drach. sex: pumicis, resinæ, ana drach. quatuor: iridis drach. duæ: teruntur omnia. Arsenici lib vna: calcis viuæ drach. duæ: diebus triginta in aqua mersa tundere oportet, idque in sole, & bis quotidie aquam commutare. Auripigmenti, sandarachæ, calcis viuæ, pumicis, ana drach. quatuor. eodem modo mersa, tusa, & siccata vsurpantur. Squamæ æris drach. quatuor: sandarachæ drach. duæ: ellebori nigri, aluminis scissilis: vel auripig. ana drach. vna. Squamæ, sandarachæ, auripig. ellebori nigri, seminis vrticæ torrefacti ana cum rosaceo tritis vttere. Sandarachæ, aluminis scissilis, ana drach. quatuor: auripig. squamæ ana drach. vna: in serpente vlcere, & humore fluido, vteris arido. In cancro, & struma, cum rosaceo subiges: bis in die commutatur. Atque hæc ferè materia septicorum est, quam exuras, eluas, cerato & alijs

Cathartica.

Septica.

Escharotica

Vsus septicorum & escharoticorum.

Ratio vite in vsu escharoticorum.

Septa.

- alijs temperare possis. Elleboro magna vis inest contra cal- *Elleborus.*
 los: fistulæ injectus, ad tertium diem callum adimit. Callus, *Call' quid.*
 dura quædam est, & compacta caro, vnde pars stupet, albicat,
 nec expirat. *ἐκλωπιγῆ* sunt, quæ callos detrahunt. Oppu- *ἐκλωπιγῆ*
 gnantur calli, primum quidem malacis: deinde causticis: po- *Curatio cal*
 sitremò igne & ferro: vnguibus eraduntur, lacerantur scalpris. *li.*
 excinduntur cultris ad viuum, & si quid reliquum sit, cau-
 stico remedio absuntitur, vel cādente ferro inuritur: sed flu-
 xio reprimenda, prius quàm exercetur callus. Exciso callo tepi-
 20 da fouendum, tum abluendum aqua, vbi alumen diffluerit.
 Repurgandum melle, & æruginē, si qua sordes extiterit. Ecti- *Materia,*
 lonica iunt: scilla cocta, & cum calce trita: nitrum, sal, torrefa-
 cta: fæx cremata veteris acrisque vini, vel aceti: cortex salicis
 vstus, & aceto pistus. Vsta calx cum pueri impubis vrina: æru-
 go melli, sali, thuri æqualiter mixta. Laser aut calx cerato
 inino vel ligustrino capta: Testa, terraque furnaria, pumex
 crematus ex aceto, trita: nasturtij farina aqua subacta: bdel-
 lium pingue cum melle: ammoniacum aceto fustum cum pari
 ærug. Radix lilij vsta in cinerem: ærugo cocta, læuigata: amy-
 20 gdala & melle trita. Squamæ vnc. i. æruginis drach. duæ: cerati
 lentiscini, vel myrtini, vnciæ octo, plus minùsve: harpax cum
 modica æruginē. In hoc genere laudatur oleum lentiscinum,
 quia præterquàm quòd mollit & digerit, etiam adstringit, re-
 pellitque: quibus omnibus difficilia vlcera cum oris induratis
 egent. Terebinthinum similiter & mastichinum quæque similia *Olea escharo-*
 sunt, *ἐκλωπιγῆ* & *σκηπινῆ* iisdem rebus quibus amyctica exci- *tica.*
 pi possunt, visco & alijs. Satis profecisse putes, cum suis margi-
 nibus vitiosum corpus à sano excesserit. Quòd si sepius nihil ef-
 feceris, ad escharotica, ignem, & cauteria veniendum, atque
 30 omninò vis pro magnitudine & contumacia vlceris adhiben-
 da est. Escharotica ex septorum materia conficiēs, sed vt fir-
 mior trahatur crusta, è metallicis acribus miscendum erit, quod
 sit crassa, & adstringente potentia. Qualis est cadmia, chalcitis,
 chalcanthum, quæ per se cruda, trita, & saliuâ hominis, vel acco-
 to capta, crustam contrahunt. Eadem vsta leniora quidem, ve-
 rùm escharotica. Septa miscentur, cum altius imprimenda cru-
 sta. Celerius operatur ignis, & melius si egri perferuat. Atque is
 non vno modo adhibetur. Conceptus aqua feruida, ligneo ru-
 bulo, canali, penna scriptoria inducitur, extrema parte in equa- *Vstio ab i.*
 40 bilem circulum circumscripta, quæ clauos, verrucas, & similia, *gnc.*
 quæ

quæ vrere oportet, includat: altero extremo dehiscente, aqua feruens, plumbum fufum, vitrum, & similia illiquantur: dum vim suam vna collabens ignis satis impresserit. Alioqui lana mollis, specilli nucleo alligata, feruente oleo, vel butyro intingitur, atque ita imprimitur. Fortius est, si vel è vitreo, vel antimonio, & vocato sublimato, alijsque id genus, oleum fuerit extillatum. Quidam nucali testa, voluta cochlear & oui vrunt posteaquàm igne incæduerint. Alij radice Aristolochiæ, gentianæ, struthij, ramento myrti, buxi, & similibus, cauteria effingunt. Oportet igne contineri, dum extrema parte carbonculent. Visione Arabica veteres, vt post etiam recentiores, vsi sunt. Auro & argento lenius ære, & ferro acius inurant. Cæsim punctim cauteria imprimuntur. adiguntur longius & latius, & in circulum circumferuntur: vno loco vel pluribus: semel ac sepius: vt natura rerum, partium & corporum sustinet, & vitia requirunt. Ex quo variaz cauteriorum formæ affinguntur. Locum igni circumscribere oportet, nucali testa vel re simili, quæ suis marginibus cõstans, pateat in medio: Cerato rosaceo: lana vino tincta muniendæ sunt vicinæ partes, ne iusto latius euadat ignis violètia. Alioqui splenis imbutis oui cædido, muc- 20 cagine psyllij: cerusa è rhodoistagmate lora, refrigerante succo & ijs omninò quæ ἀφλεγμαίνοντα Græci vocant. Crusta non statim detrahenda: sed nutare prius oportet, ac veluti maturitate sua excidere. Alioqui vis afferri solet: profundum vlcus relinquitur: dolor, fluxio, phlegmonæ irritantur. Tempestiua deduci potest butyro & rhodoistagmate loto, farina tritici in porri vel rutæ succo. Lenticula cocta & cum melle mixta, folijs oleastri cum melle lris, sulphure trito ex oleo, contusis nucum interaneis, porri folijs salua tinctis, & in mollioribus lacte cum melle cocto: albo stercore canino, cinere vstarum hirundinum, & minoris centaurij: humano stercore siccato, crematis cochlearum terrestrium carnibus. Chalcite trita & subtriplo melle vel chalciteos vnc. x. ireos semuncia per se tritis aut cum melle. Nutrito lithargyro cū vfulato butyro, radice anodidis: columbino stercore e melle quod & carbunculos scari- 30 ficat. In summa, abstergente & incidente materia, quæ paregorico & molliente remedio temperari potest. Recetiores chirurgi in septis numerant, stupas canabinas, hermodactylos, bryonæ radices, alumen, vnguentum apostolorum. Et in carne dura & multa vitreoli genera & cuperosam quibus pro chal- 40 cantho

*Quæ crusta
detrahunt.*

- cantho & chalcite vti solent, aruginem. Vnguentum viride *Recetiorum*
 Aegyptiacum: Trociscos è viuz calcis vnc. quatuor tritis & *septa.*
 cum melle iunctis. sit autem mellis plus minúsve, vt sunt corpo- *Trocisci à*
 ra. Trocisci capsula figulina ordine collocantur, siccátur in cli- *calce.*
 bano, puluis inde vtilis est. Succus radicis asphodeli vnc. 6. calcis
 viuz vn. 2. auripig. vnc. 1. arida succo mersa sub canicula insolé-
 tur, dum squaleant. Calcem viuam modò melle, modò sapone
 incorporant. Cantharidum ventres fermento cogunt vel sapo:
 sed à cantharidibus vrinæ ardor metuitur: Nam & hæc illuz ca-
 20 piti id genus vitij inferre possunt, cui malo gargarismus & in-
 sectio & lacte succurrit. Eadem quoque parata è pægoricis. Se-
 pra adipe vel sebo excipiunt. In adipibus septicus est è ranis vi-
 ridibus, quas in arboribus venantur. Quæ sequitur ex quinto
 de comp. pharm. *αγρὰ γινε* transfulerunt: Malicorij drach.
 10. Aristoloch. rotundæ gallæ, drach. 8. aluminis scissilis, aloës
 ana drach. quatuor, myrhæ, chalcanthi (vitreolum vertunt)
 drach. 2. thuris drach. 4. Exedunt sine mori: Sandarachæ, id *Trocisci de*
 est arsenici rubri, auripig. ana drach. 2. calcis viuz, drach. 4. *arsena.*
 mannæ thuris tantundem: tritis vtror: Sic enim Galenus. Re-
 30 centiores hoc modo: Calcis viuz lib. 1. auripigmenti rubri &
 citrini, alkali, acaciæ, ana lib. dimid. trita vniantur cum capi-
 tello. Est autem alkali, sal niger, quem è quercu, corylo harundi-
 nis trunco, carbuncularis & aqua dulci vel marina coctis vete-
 res fingeant: nunc è brassica marina, betis, & nitrosis re-
 bus comparari potest. Alioqui torrefactum salem cum hydrar-
 gyro, randiu pistillo volutabis, dum sal nigrescat. Alij aliter
 alkali interpretantur. Capitellum ita fit, Calcis viuz, salis am-
 moniaci, ana lib. 1. trita subigantur lixiuio è fabaceis scapis. De-
 ponentur olla quæ à fundo hier angusta rima: aliud figinum
 30 subijcitur, in quod paulatim lixiuuium diffundit: sed vas *anque*
 statim initio defodi terra opus est, vbi septem dies persistit.
 Catharticon, septicon, & lene eichaericon capitellum est.
 Alij tres partes cineris fabaceorum, vnam viuz calcis, subinde *Lixiuu. fa-*
 perfundunt aqua, identidem conuoluunt, & per quasillum ra- *culum.*
 rum transcolant. Rami ficulnei cremantur, cinis aqua macera-
 tur, qui vbi in aquam vim suam demisit, exprimitur & abijci-
 tur, nouis aliquoties reuocatur. Eodem modo è ramis tithy-
 mali & causticis cineribus lixiuuium parari potest. In quo spon-
 gia subinde mersa apponitur. Alia capite de epuloticis: In
 40 humido ac fordido vicere, pingui abstinenti: arida inspergun-
 tur.

tur. In calloso, & squallente malo arida pingui excepta adhibetur. Septica faciunt Arabes quæ à Græcis descripta sunt, & alterum genus relinquunt, quod humido calore cum fectore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatu, sublimatum cinabrium, brassicæ succo, solani, limonum, & similium attemperant. Licet etiam, quod veteres facitarent, non tribus, sed triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, bis mutata aqua. Et ut sunt corpora & vitia, ita magis minusve acia comparari possunt: nec lotura solum sed vstrina & mixtura diluuntur. Minium è micis metallicis è sterili gleba plumbi è cerussa vsta, quod alij syricon alij sandicen vocant ad epulotica potius referendum. Quod verò è sulphure & hydrargyro factitium est, in causticis censi debet. Vsurpant præter hæc, aquas fortes, & ut dicunt Alchymistarum. Salis ammoniaci, auripig. rubri & citrini, cuperosæ, æruginis ana trita in alembicum vitreum bene stipatum luto, & vndequaque clausum deponatur, & ita extillentur lento igni, quod primum fluit, vel abijcitur, vel in alembicum repetitur. Ignis augetur duplo: quod secundo stillat, fideliter reponitur. Alij ex aluminis rotundi, vitreoli Romani ana lib. i. salis nitri aut si desit crematæ fecis acciti sesquilibra aquam eliciunt, hæc callosis naturis idonea sunt, suspecta in naso, labris, palpebris, digitis aut pudendis, mollibus atque exiguis partibus, vbi vena, nervus, arteria insignis est: ac primum quidem minimum fit quod imponitur: deinde ut res exigit, augeatur. Aliquando cerato rosaceo: vnguento albo, dialthæas, & similibus mixta retunduntur: muniunt vicina: doloribus medentur ut prius.

De dolore.

CAP. XII.

*Venis sanguinis ad san-
guinis morantibus*

Accidunt multa vomitis & vulneribus, quorum remedia aliquot conspersa locis, ut proximo capite contra callos: alio contra vermes, cancrosa, putredines: & quæ rheumata intercipient, præcidantque phlegmonum causas, ac feruorem partium à phar macis extinguant: alia quoque obiter annotata sunt. Iam de dolore & hæmorrhagia instituenda oratio, quæ ut plurimum curandi consilia interturbant. Itaque dolor omnino fit subita alteratione & solutione continui, cui quam celerrimè occurrendum, nunquàm enim committendum ut diutius crucietur æger, sic enim rheumata commouentur oriuntur phlegmonæ, labefcunt vires, conuulsiones

Causa doloris.

- unlfiones rapiunt ægros, ac sæpe mortes. Et quod ad infirtum maximè pertinet, vlcera inde maderere contingit: quæ *3*
 ficca effe, fervata naturali ratione, & vacua excrementis ne-
 cefle effe: *Ανώδυνα* vocant & *ἄπυρρον* quæ dolorem leniunt, *Ανώδυνα, ἄπυρ-
 ρον*
 tenui fubftantia primo gradu calida, vel ita temperata vt fami-
 liaritate elementorum, naturæ partium consentiant. Adde fi
 vis, quæ qualitate contraria caufam oppugnant, quale effe o-
 leum laurinum in refrigeratis, violaceum in calefactis, ficcatis
 hydrelæum: humiditas non tam qualitate quàm copia dolorem
 10 facit. Ideoque phlebotomia, catharticon clyfter, & fimilia,
 quæ fublata copia dolorem tollunt, in hoc genere collocare
 licet. A calore, & frigore dolor acerrimus: a ficcitate medio-
 cris: ab humiditate propè nullus, vel ftupidus excitari folet.
 Tertium quoque genus adiiciunt, fed improprie: eorum quæ *3. genus.*
 ftupefacto fenfu dolori remedio funt, quia quod doleat fen-
 15 tire necesse effe, & extincto fenfu dolor neceffario conquiefcit.
ὑπνογονὴ & *ὑπνωτικὴ* talia appellant. Anodyna funt: oleum
 dulce arate medium, oleum Chamæmeli, oleum è lini &
 althææ femine, & è dulcibus amygdalinum, oleum lumbri-
 20 corum, vulpinum, melinum, è meli, è pullis cygni, extortum
 tritico candenti ferro, e famentis vitium, ex ovis preffum,
 Sambacinum. Sambucinum, è floribus, & alia, de quibus po-
 ftea. In quibus diftinguenda, quæ non folum leniant dolorem,
 fed etiam caufæ repugnant: quale effe rofaceum, vbi à calore do-
 lor effe: aut à dolore communis calor. Chamæmelinum vbi
 leniendum fimulatque difcuriendum aliquid effe. In anodynis *Adipes.*
 funt butyrû, cefypus, lana bene fuccida, fuillus adeps, vitulinus,
 è cercopitheco, & fimia, gallinaceus, anferinus, humanus, ex
 anguilla & cuniculis, vulpinus, melinus, afininus, lac muliebre, &
 30 vaccinum. Althææ, malæ, feminis lini & cydoneorum. lili,
 violariæ, pedum arietis, capiti & interaneorum hoc di fimili-
 liter decoctum, & hæc lacte coqui melius effe, aut cocta lacte
 butyro condiri, vel conterri rofaceo. Crocum, thus, mannam,
 galbanum & fimilia pharmacis commifcent, vt quæ aliquid
 habeant quod paregoricon fit. Calorem temperant, & anody-
 na funt, aqua tepida, oleum rofaceum, violaceum, nymphæon,
 papaverinum, cucurbitinum, & quod è candido alterci femi-
 ne, priuatim vfurpatum fruidis doloribus podagricorum: la-
 ctucinum, portulacinum, pſyllinum, cucumerinum. Et ex ho-
 40 rum oleorum materia fuccus ac muccago colligitur, vel eadem
gerant.

*Contra dolo-
res frigidos.*

in lacte coquitur, ex conuenienti oleo subigitur: Linteola in decocto merguntur, succo & mucagine imbuuntur, & ita iuuant. Ac subinde inculcare linteola & auxilium repetere necesse est. Cerata & enchrifa è cera alba, lora, oleo conueniente, mucaginibus, cerusa lora, populeo vnguento & similibus confingi possunt. Dolores è frigore iuuant, quæcunque ferè in anodynis numerata sunt, oleum chamæmelinum, anethinum, è leucoio, meliloto, hyperico, linum, atque his magis è baccis lauri & iuniperi vino maceratis extunditur mola, coxarijs, & frigidis articulorum vitijs. In lue venerea frigidos dolores iuuat galbanarium. Sulphurinum, styracinum, in quo thus, manna, & similia diffusa sunt, & quod è nuce myrepica in cude & candenti ferro pressa extringitur. Sed eadem conuassata, vt & cinnamomum oleo incoqui possunt: ita è calendula, maiorana, rosmarino & similibus parare licet. Inpum ex acori radicibus, centaureo, gentiana, aristolochia, bryonia, hyssopo, thymo, pullegio, vbi crassus humor impactus cruciat. Sinapinum enidellæon, & alia id genus efficacissima sunt. Vino ferè & pari oleo materia coquitur, quæ prælo vel mola oleum non reddit. Cum iam vinum exhalauit, ea exprimitur, oleum reliquum vsui est. Terebinthinum oleum, è terebinthinæ libra vna laterum antiquorum, vel, vt Albucasis, recentium, quia plus olei combibant, vncia vna: mastiches, et styracis ana vncia vna: lateres igni extinguuntur oleo: extincti tritique cæteris commiscuntur in Alembico vitreo: tres liquores effluant, quorum tertius est optimus. Flores rosmarini amphora vitrea duplici linteo obstopata, deinde etiam cera includuntur: elicitur oleum calida arena, Chymicorum more. Oleum philosophorum Meius, petreleon, & quod ex euphorbio. Contra flatus & dolores frigidos ventris atque vteri, quod sequitur, plurimum facit: Olei anethini libra vna sem. agni casti, seminis rutæ ana vncias tres: cinnamomi vnc. sex: conuassata hæc quadraginta diebus insolentur merfa oleo: vel lento igne incoquantur, forus è Chamæmelino & meraco vino calidus, dolores omnium partium corporis compescit. E garyophyllis oleum, & calamo aromatico efficacissimū est. Radix cucumeris agrestis in taleolas cæditur, cum absynthij cacumine hydrelæo coquitur, hinc forus & cataplasma hemicranij singulare. Erinaceus terrestris oleo & vino excoquitur, dum solum oleum reliquum sit: contra dolores articulorum. E sex vitellis assis, myrrhæ drachmæ dimid. ellebori nigri granis 4. 49
oleum

*Oleum tere-
binthinum.*

*E floribus ro-
smarini.*

oleum exprimunt singulare vlcerebus puerorum, callosis ac dolentibus vlcerebus labris, putrilaginosi ac vermiculantibus vitijs & scabiei. Styraei pinguis vncie duæ: vel eo plus in sesquialbra olei colligantur in duritie dolente, addita octaua parte essebri albi, scabiei conuenit. Agrippa & Marciato quidam vntur in frigidis doloribus. Vulgarum est, anodynon: mica papis soluta lacte vel incocta ex tribus vitellis oui & sesquuncia rosacei subigitur, cataplasma fit. Sir panis libra vna: oua momento croci intinguntur. In desperatis narcotica vlturpantur: vnguentum 20 to rosato, & dialthæas aliquid populei vnguenti & opij commiscetur. Cerati rosacei vnc. 3. opij drach. 1. castorei scrup. 2. vnguenti rosacei vnc. 1. terebinth. vnc. dimid. colligatis adde opij scrup. 1. croci grana. 4. Aliquid etiam Philonij scriptis vnguentis & ceratis miscere licet. Oleum in quo viua torpedo coxerit, narcoticum est. Dialthæa vnc. 2. galbani semuncia, opij scrup. 2. croci grana. 6. Grauisimis quibusque doloribus singulari ope succurrit, ex aduersa parte detractus sanguis, quem statim initio minuere melius est: Sic enim præciuntur malorum causæ, & quæ nocent vulneribus omnia ferè sanguinis vitio commo-
uentur, dolor, phlegmone, gangræna, syderatio. Multo magis, si affecta parte veng sunt inignes, quæ oppressæ copia dolorem
ciant: postea verò cum non expirent, gangrænam pariunt
& σφάκελον, id est syderationem: hoc vitium corruptela est, primum quidem ossium, deinde partium reliquarum: cui periculo
phlebotomo occurrendum, atque etiam cultello scarificandus
locus est, vt leuatus onere & vitio, ad spiritum libere attollatur.
Cucurbitula quoque ad hanc rem sæpe contulit, de qua scriptum
à nobis libellus ædixit est.

Phlebot.

Scarificatio.

Cucurbitula.

la.

30

De hemorrhagia.

CAP. XIII.

Non solum è recenti, sed & inueterato vlcere sanguis effluit, apertis, ruptis, exesis vas. Et ex arteria hemorrhagia periculosior: deinde maioribus venis quæque plus sanguinis effundunt, quas inde
αἱμαῖς vocauit Hippocrates. Apertis adstringentia: ruptis, Apertis,
glutinantia, exesis, sarcotica, & boni succi alimenta remedium sunt. Aperta simul & rupta iuuant plantago, balaustia, hypocisthis, rhus, omphacium, galla destilans & vino vel
40 aceto tincta, acacia, malicorium, symphyti radix, portum,
E 2 contusum,

contusum, polygonon, peruinca, terra sigillata & figlina, bolus Armenus, rhabarbari magma, rubigo ferri, lapis hæmatites, passæ vuæ nucleus, gallæ flos, lanugo quæ coroneo & mascula salice insidet, quæque in ea paniculæ dependent, fraga herba, cynosbarus, aqua frigida, vinum astingens, acetum, oxycratum, & alia quæ in epulonicis, glutinantibus, & repellentibus antea descripta sunt. Peculiariter ruptis conueniunt, thus, manna, aloë, mastiche, tragacantha, amyllum, gummi, glutinum, larigna, teribinthina, pix sicca, colophonia, gypsum, farina pistrinalis, cochlea, cum domo trita: horum alia in puluerem comminuta insperguntur: meliora ferè emplastica, ideoque in omni candido, resina liquida, conueniente succo imponi debent. Linamenta, pili leporis, lanugo illa salicis & coronei succis liquidis inculcantur, atque inde penicillus aut vermiculus pharmaco madens hianti vasorum ori inferitur: floccus ex eadem materia & pharmaco saturatus superdatur, ligaturque commode, iniectis vasi modò tribus, modò quatuor fasciarum orbibus, ad eam partem vnde profluit sanguis, ex quo fascia radicem versus paulatim adduci debet ut sursum versus magis magisque stringas atque illabentem sanguinem reprimas. Tertiò die resoluenda lintea sunt, neque commutanda, linamenta flocci, vermiculi, siquidem firmiter inhaerent, sed tantùm irriganda pharmaco, ac ut prius colliganda. Quod si vacillant, digitus vasi imprimendus, reuellenda turunda, & reliqua tum noua ut prius omnia repetenda, eademque ex præscripto vincienda sunt: idque tandiù reuocandum, dum renata carne, ac bene stypto vase, extra periculum omnia videantur. Aliquando verò ubi in superficiem vasa exponuntur, digitus impressus hæmorrhagiam sistit, coacto grumo. Quæ si in profundo larèt, nec facile digito continguntur, hamo prehendere, leniter intorquere & laqueo intercipere oportet. Nonnunquam volsella capta vtrinque funiculo illaqueantur, & media præciduntur, ut extrema in se reuulsa coeant. Id verò in maioribus vasis non caret periculo. Desperatis alijs auxilijs, ad ignem & cauteria veniendum, multo magis siquid putre, vermiculosum, serpens, rodens: si eiusmodi locus est qui facile computrescat, qualis est sedes, os, & genitalia, quique vim ignis sine periculo sustineat. Escharotica hoc loco vehementius contrahere oportet, ut firmam nec deciduam crustam efficiant. Alioqui maior vis sanguinis erumpet,

Aqua frigida
Ruptis.

Vtendi ratio.

Ferrum.

Ignis.

Escharotic.
Phlebot.

- erumpet. ante tempus resoluta crusta: In remedijs laudan- *Cucurbit.*
tur phlebotomia, cucurbitula, sanguisuga, vincula aduersa *Sanguisuga*
parte & κατ' ἐκθυσίαν reuellendo adhibita, & constringens
epidefis. Cucurbitulae ratio ex libello nostro repetenda. De
phlebotomia & sanguisugis alio quod paramus, opere disse-
remus. Purgatio saepe necessaria, sed tardius opitularur: his *Purgatio*
ferè remedijs materiae cursus retrahitur: quanquam non re-
merè renitendum sanguini: quia ex omni vulnere, nisi sit in
Ventre, crebrò sanguinem fluere vtile est: Author Hippo- *Vfus refrige-*
crates. Tempestiue ergo supprimes, iusta ratione leuato cor- *rantium.*
pore: vt inde siccus effectum vlus celerius possit coalesce-
re. Ac fortasse tutius fuerit vlus emplasticis obtypare, frigi-
dis & astringentibus medicamentis vias interciperè, quā san-
guis decurrit. Frigidum enim & astringens vlcibus mordax
Et in ijs frigido vtendum, vnde fluit sanguis vel fluxurus est,
non ad ipsa, sed circa ipsa, inquit Hippocrates. Aliæ quo-
que partes, vt thorax & quæ neruaceæ sunt, frigido læ-
duntur magis. Ideoque, iam aucta materia, neque etiam lo-
cis omnibus, frigida adhibere conuenit. Columbæ sanguis *de columb.*
peculiariter reprimit hæmorrhagias è membranis cerebri. Me- *de Jalen.*
morabile remedium est quod sequitur: Spongia noua, alio- *Spongia.*
qui vetus, sed marina vel lixiuio querno repurgata, acerrimo
aceto inebriatur, tum inquinatur liquefacta pice, deinde trito *memoria*
bitumine, galla, vel re simili conspergitur, atque ita crematur *de Jalen.*
testa figulari clausa, dum cinerescat. Alij aceti loco, taurino
sanguine imbuunt, ex odore vino propinant, singulari ope,
dyenteris, menstruis, & alijs hæmorrhagijs. Emplasta sunt, gy-
psium crudum, gyris, si oui candido excipias: Thuris partes
duæ, aloës pars vna, vel eo plus in duriore natura: Loco thu-
ris vsurparur manna, vt quæ melius astringat, sed thus *εμπλα-*
στικόν φάρμακον pharmacum, reddit: concorporantur liquore oui:
vermiculus è mollissimis pilis leporis medicamento intin-
gitur, & si fuerit opus, dehiscenti vasi immittitur. Ex ijsdem
pilis conficitur floccus qui eodem pharmaco imbuitur: atque
imponitur cauo, vt incumbat vermiculo. Eunuchò è manu *Historia.*
summa profluens sanguis eo pharmaco non restitit, qui de-
inde linamentis ex dilutissimo oxycrato presus omnino con-
quieuit. Loco pilorum leporis, linoxylo quod vocatur *cotton*
& memorata lanugine bene depexa atque carminata vti lice-
bit. In erosione vbi vniuerso corpori consuleris, nec aliter

In erosione. mederi datum est : veniendum ad pastillos Andronis, Pasionis, Polydæ, ex libro quinto de compositione pharmaco. & γιν. In ychementi hæmorrhagia primum quidem validè astringentibus materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli commiscantur, postremo solis pastillis vtendum erit. *ῥοχαίμα* veterum : Chalcitidis drachmæ sexdecim : alij octo : mannæ drachmæ duodecim : alij sexdecim : terebinthinæ frictæ & aceto extinctæ drachmæ duodecim. Chalcitidis drachmæ sex : mannæ drachmæ duæ, terebinthinæ colophonix ana drachm. quatuor. Mirabile : Chalcitis, resinæ ana drachm. 10 octo, mannæ drachm. sexdecim, infusata aenea pyxidicula reponuntur, vsus tempore par pondus gypsi commiscetur. Adduntur his ad crustas, Chalcanthum, misy, auripigmentum, sandaracha, calx viua. Debilior crusta est a calce viua & auripigmento, nisi astringenti materiæ coniungantur, ferrum candens, æs, aurum, & argentum cauteria sunt : sed ab auro & argento mollior eschara relinquitur. Celerius auxilium a tere-
calce no que ro, cauterio percipitur. E subere vel spongia orbiculus tenuis
serunda pice immergitur, & ita calens impingitur. Alij masti-
 corio, gala, radicibus astrictionis prius ignitis, crustas efficiunt. 20
 Recentiorum escharotica sunt : Vitreoli Romani semuncia, balaustiorum vnc. tres : aluminis vncia vna : fiat pulvis. Colophonix vnc. tres : boli armeni sesquuncia : mastiches, olibani, sanguinis draconis, ana semuncia : radices symphyti, rosarum, ana drachma vna : vtuntur puluere rubro, sanguine draconis, & alijs, de quibus antea : ac plura escharotica ex proximo capite repetenda. Adhibitis remedijs membrum ita collocari debet, vt altior sit locus, vnde hæmorrhagia, reliquæ venæ, quæ radici propior est : vt veluti declui vase quasi deorsum, sanguis ressuat. Sit membrum in quiete, & ea figura situm, quæ dolorem non affe- 30
 rat : ac mitella cōfirmare manus, & puluino crura melius est : eger quoque aduersa parte decumbat : Instituat vir vnde sanguis acquiescat, aquæ potus, & similia. Interdicatur ijs vnde effruescat, qualia vina quædam sunt fortia, & calida alimenta.

De vtili materia in vitijs ossium.

*Celeriter
medicandū
ossibus.*

CAPVT XIII.

Vitijs quæ ossa fecerint, eodem serè momento succurrere oportet. Alioqui phlegmone succenditur quæ sanari facit, 40

facit, agit cuniculos, vlcera dispergit alta, exesa, & curanda motis: *ἰμώτες* inde vocat Hippocrates. Ex quo denigrantur ossa, cariem inducunt, & syderationem contrahunt. Laborant fracta, collisa, fissa, forata ossa, & mota articulis. Accessio mali est, si cum vulnere laesa sunt, multo magis in articulis ubi nervi tendines nuda carne & ossea loca sunt, in quae laxa & comota excrementa, corporis coire solent. Adde quod ibi charilago quaedam est, in qua cicatrix firmari nequit: hic ergo asperior casus, dolor, vigilia, convulsio, deliria, saepe numero commouentur. Atque ut maior articulus est, ita grauius

Vitia in articulis: quoniam obvia inaequaliter periculis sunt

periculum creare solet. Verum non alia parte diuor supellex veteris disciplinae: nullquam haec curiosa magis, quam in ossium medellis. Infinita prope reperit & literis tradidit, quaedam

Multiplax materia mechanica.

etiam auctoritate principum, aere publico in ciuitatibus extruxit, quae ad hanc curam ossium pertinerent: ferramenta varia, cauteria, excisorios cultros, scalptra rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forfices, *μυηιστοφυλάκας*, volsellas, scalas, scamna, repagula, vectes, canales, glosiocomia, sphaeria, stathmia, trochiscos, pennas,

20 inceratos canaliculos, fistulas, setas, fila bysso & auro texta, alia quoque plurima, quae ad purganda, tendenda, reformanda, constituenda denique ossa facerent. Er in

In deligendo quoniam multa.

vna deligandi arte quam plurima vsu diuersa suis etiam nominibus veteres distinxerunt: linteola, fascias, hypodesmidas, splenia, apodesmos, regulas, ferulas, spatulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modo scortcos modo molliusciculos, nodos, acus, acias, & alia sexcenta: quorum multa quidem retenta, alia antiquata, quaedam deserta, quia videlicet multis in rebus facilius, nec tam operosa

Compendiosa curatio materiae.

30 cura inuenta est. Corruptum os ad viuam scobem eliminandum, exterebrandum, inurendum, excidendum, etiam ut asperum, malum est. Atque hic medicamentis opus est, quae vehementer siccent: quorum materia capere de purgantibus pharmacis & epuloticis instituta est. Nec ante vias claudere oportet, quae ad laesa ossa pertinent, quam haec omni carie, nigredine, sorde, corruptela sedulo purgata sint. Quin & praclusum iter vel angustum, ferro ampliare necesse est, spongiaque aut penicillo implendum cauum, ut ne coeant, sed dehiscat vulnus, dum vel

Aperta sit via ad os.

40 integendum carne, vel ferrumistandum callo bene purum

os & iam incolume, videatur. In altis cuniculis, spongia, li-
namenta, penicilli summa parte deuincta sint filo, quod foras
propendeat, vt illa facile reducantur. Videndum quoque prius-
quam impleas ne qua squama, vel fragmentum excesserit, quæ
si licet osi suo coaptanda sunt, aut si acumine carnem subin-
trant, molliter præcidere oportet, verum incolumi radice: alio
qui eliminanda scalpro. Quod si nihil molestiæ adferunt, verum
non possunt osi suo compingi: in horum altero consilium
est: Nam vel medicamentis detrahes vel permittes dum veluti
maturitate quadam & sponte sua excidant. Ita enim os ce-
leriter carnem inducet, vel callum contrahet: ex quo medi-
camentis, quæ mediocriter siccant, vel astringant, cicatrice
operies. Quæ verò squamæ, ante maturitatem rapiuntur fer-
ro, aut vi reuelluntur, fistulas ægrè sanabiles reliquunt. Om-
nino ergo declinanda vis est. Squamas detrahunt medicamen-
ta, tum iuperius capite de glutinantibus memorata, tum eru-
cæ radix, cucumeris agrestis, viriisque bryoniæ: Aristolo-
chia peculiariter elicit testulas caluariæ. In abscessu paruo osi-
um deligatio καταμαρτυνῶν idonea est, sed paulò laxior, &
sine ferulis. In magno non est deligandum καταμαρτυνῶν. Sa-
tisfaciunt splenia, insuccata vino nigro, subaustero, quæ de-
inceps atque continenter, hinc inde adhibenda sunt, non vt
hoc illi infideat. Longiores sunt quàm quæ solum ambi-
tum membri comprehendant: nam si quadrantal circulus est
partis, paulò longiores splenes trientalibus esse oportet.
Obliquè inferuntur mēbro, & aduersa parte decussant. Sanan-
tur vlcera alijs similiter: nisi quod ossa magis siccantia desi-
derant, & quæ continenter ossibus generatur caro, vt est pau-
lò sicciior, ita magis siccantibus pharmacis gaudet: vt vero du-
cenda carne ab ossibus recedis, ita vis siccantium temperanda
est, donec iam cicatrix trahenda sit. Ac carne ossa tegere sæ-
penumero opus est, vbi callum cogere non licet, nimum dis-
sidentibus fracturæ labris, & vbi in circulum os excisum est:
verum è callo multo stabilius vinculum est. In fractis ossibus
& luxatis multarum rerum cura est: ac circa initia omninò pro-
hibenda fluxio, dolor, inflammatio. Os ergo quod vel abiit lo-
co, vel fractum dissidet, omninò constituere oportet: deinde ita
continere, vt ne excidat: In quo hæc sunt præcipuè τάξις, διά-
πλευσις, ἐπίδυσσις, ἀποθυσσις vel ὑποθυσσις. Extenditur membrum,
vt diductis & adductis marginibus soluti ossis oræ oris mol-

doce semou
at. / Squama.

Quæ squa-
mas detra-
hunt.

Abscessus.

Splenes ma-
gnorum ab-
scessuum.

Incarnaria
ossiū ab-
scessus &
vulnera vi-
cina.

τάξις.

- liter consuecant, nihil exasperetur, nihil diffingatur, quod
in fracturis denticulatis, scabris ac serratis saepe contingit.
 Videndum quoque, ne in distentione nervus, vena, arteria,
 musculus, contra naturam extorqueatur. Extensum mem-
 brum & loco redditum, manibus palpari, tractari, atque le-
 gitimè conformari debet: *διάπλασις* appellant. Quòd si
 tractatum, tensum, non constituitur os, ad *μοχλίας*, lorum,
 habenas, & machinas eiusmodi veniendum erit. Sequitur
ἐπίδεσις, quam *καταγματικὴν* appellant: in qua multorum pro-
 10 uidentia est, sed maximè, ut contineas, phlegmonei arceas,
 procure callum. Ac primum an sit deligandum, statuere opor-
 tet: tum quæ deligandi forma, ac ferè ἀπὸ δύο ἀρχαίω, va-
 ria tamen ratione: ex quo discernendum, quibus, quam mul-
 tis, longis, latis, quàm denique firmis fascijs opus sit. Adhæc
 idonea forma lintheis quaerenda est. Cognoscendum præterea
 unde primum iniicias, quæ sit futura progressio, quàm mul-
 ti & quales circuli, quomodo distinguendi orbes, quibus in-
 20 teruallis, ubi & quando laxior vel adstrictior deligatio, qua
 parte desinat, quo loco, & qua arte necantur nodi, acie fi-
 gantur, conducantur habenæ, quando regulæ, ferulæ, pulvi-
 naria, mitellæ adhibenda sint: quandiu continere omnia, &
 quando solvere oporteat. Atque in sano membro probanda
 prius deligatio, quàm in ægro periculum facias. Prostre-
 mendum, ut in ea figura collocetur pars, in qua diuissi-
 mè constare possit, & minimè doleat. Iustos hæc commenta-
 rios desiderant, verùm hæc breuiter, nec tam docendi, quàm
 monendi causa dicta fuerint. In fascijs remedia adhibentur
 quæ repellant, & madorem scissilium lintheorum contineant:
 sic enim prohibetur dolor atque inflammatio: fasciæ initio plu-
 30 res & adstrictiores, si neque dolor neque phlegmone, vulnus vel
 aliquid tale prohibeat. Ac ferè inebriantur vino crasso, nigro,
 modicè austero: vinum hoc superficiem cogit, vim suam ad
 repellendum altius imprimit, & ita præcidit inflammationum
 causas. Quod nimium stringit, dolorem excitat. Tenue, al-
 bum giluum, fuluum etiàm contrahat, repudiandum tamen
 est, ut reprimentium genus quod humectat, papauer, cicura,
 mandragora, multo magis si in articulis & neruaceis partibus
 labor est. Nec enim qualitas sola, sed horum etiam corpus in-
 tro penetrat & neruosa lædit. Atque inde calor qui regit cor-
 40 pus, interdum extinguitur. Vino igitur crasso, nigro, modicè
 austero

*διάπλασις**ἐπίδεσις
καταγματι-
κή**Que infla-
scijs repel-
lunt.**Vinum qua-
le.**Vitanda.*

Oenelaum.**Oui candi-
dum cum ro-
saceo.****Acetum.
Ceratum al-
bum.****quid ceratum
Ceratum pi-
catum.
Perfusiones.****καλαμίν.
καλαμίν.****Alimenta.**

antero fasciæ & splenes saturandi sunt. Minister adfit, qui sub-
indè affuso vino ligamenta compluat: alioqui cum periculo res-
siccantur, quod ne fiat, noctu præcipuè providendum erit: hye-
me vini loco oenela o uti satius est, quo etiam tempore succida
lana splenibus præferri debet: fumoso vino & odore abstinend-
um, ne caput feriat. Iustam quoque insuccandis linteis medi-
cametum ex oui candido, oleo rosaceo vel myrtino. Alij aceto
& oxelæo contra phlegmonem fascias imbuunt. Detur id bene
carnosa parte & sine ulcere. Ceratum album in usu est, suspe-
cta ministri diligentia, ne videlicet lintea inarescant: quod vi-
no quidem minus efficax, repellit tamen & phlegmonem inhi-
bet. Verùm cerato vi post initia satius est, iam abeunte periculo
inflammationis, & ubi fractura simplex, nec in fragmenta varia
contutum os est. Cerato ergo pars ægra, fasciæ, & splenes illi-
nèda sunt, adhuc extremæ partes, sed manus præcipuè, ne quod
deligatione exstringitur, infirmū scilicet frigidūq; corpus imbi-
bat: Ceratum καλαμίνος è cera pingui & duplo oleo confici-
tur, oleum sit recens rhodion vel myrteum. Cera sicior paulo
liberalius oleo emollitur. Picato veteres vsi sunt si quid contu-
sum esset, si quid coquendum atque mitigandum. Liquidiori ce-
rato albo pix addita picatū facit. Omnia verò lenia sunt & mol-
lia ne asperitate lædant: vitetur pondus, quod callum prohibeat
& partem opprimat. Perfusiones fiunt ex aqua tepida, ita ut ore
temperata ut in qua manum hucundè contineas: In frigoribus
hydrelæum melius est. Perfunditur pars tertio ac quinto die,
quoties videlicet lintea dissoluantur, idque liberaliter ut inde
pyrigo acquiescat, & materia eius dispergatur. In articulis tepi-
da, tensa relaxat, lenit dolentia, & phlegmone aduersatur. Se-
pimo die vel nono iam affunditur, non ut discutiat, sed ut euo-
cet sanguinem vnde concreto poro ossa conscrantur (καλαμίνος 30
Græcè vocant, & inde καλαμίνος quæ callum gignant.) Cal-
lus neque caro est neque os, sed inter vtrumque ambigit. Itaque
deposito metu inflammationis, circa hoc tempus omainò eogi-
tandum, ut coeat porus, vnde effracta solidantur: sic ergo mode-
randa perfusio, ut inde pars viuido colore efflorescat, & leniter
attollatur: nimium est, si subsidet & palliorem ducit. Alimen-
ta sunt, quæ probum sanguinem, multum, crassum, viscidum-
que creant. Panis triticeus & farina primaria: triticum legatur
græue, densum, vnde prisana comparetur: chartilaginæ anima-
lium partes, neruaceæ, curaceæ & pingues, ligamenta, tendines, 40
petioli,

petioli, ventres, linguæ, rostra: capita hædorum veruacum & porcellorum, agnina caro & suilla, palmulæ pingues, castaneæ, vinum stringens, & similia. Medicamēta sunt emplastica, quæ modicè calcassant è gyri, similia, thure, manna gummi, fabrili glutine, mastiche, tragacantha, liquore oui, pingui cera, oleo, la chrymis & succis, quibus emplasticum nec ita calens corpus est. Ac iam antea de catagmaticis, & cephalicis sermo habitus est: sed hic quoque ea materia locupletanda est. Caninum cerebrū in linteo adhibetur: superdatur lana inculcata oui candido: vbi
 10 squalescit remedium, commutari debet: quatuordecim diebus solidat. Aliis purgatur hybisci radix, atque hinc medulla eraditur, quæ per se farinæ tritici mixta liquori oui, effracta iungit. Radix hæc aquæ indita & sub dio posita, aquam cogit. Musco viticis vtuntur veterinarii: alij quernum præferunt. In honore
 Muscus. Conserua. Historia.
 est veteri exemplo, quam conseruam vocant. Muscus est densus, herbaceus, spongiosus, herens aquatilibus petris. Putator quidam ex alta arbore deciderat omnibus ferè osibus confractis: præsto aderant amici, qui corpus eius vniuersum eo musco obligarunt: atque ita relictum domum in quiete tenuerūt, sub
 20 inde conuersa aqua, ne muscus emarcesceret. Rarò nec nisi deficiente herba remedium mutatum est: Atque hæc medela vix credibiliter celeritate conualuit. Aestate, bene carnosio duroque corpore, recenti malo, exemplum vetus liceat imitari. Farinæ triticeæ vnc. 6. sanguinis draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ ana vnc. i. trita hæc cum farina & oui candido subiguntur. Triticea farina, gummi, & manna incoquuntur aqua: fit caraplasma, quod reprimat, continet, & peron generat. Exiguus partibus effractis, pelliculæ affiguntur illitæ gummi & fabrili glutine. Canaliculi afformantur, caui
 30 uis, emplasto inducti, vt & contineant, & solident. Fali go thuris liquori oui & farinæ tritici coniungitur. Emplasta quæ pertinacius hærent, tepidæ fotu reuelluntur. Panathes ad contusa, fracta etiam cum vulnere, vulnera neruorum, vertebrarum, purgandas collectiones, incisum scrotum, bestiarum etiam venenatarum morsus, & alia. Olei dulcis, vnc. 9. bituminis, ceræ, resinæ picæ, picis aridæ ana lib. i. litharg. cerusæ, ruginis ana drach. 10. thuris, ammoniaci, myrrhæ, aloës, ana drach. 8. opij, succi pomorum mandragoræ ana drach. 6. aluminis scissilis, chalcantbi, chalcitidis, croci ana drach. 4. aceti, quod sufficit. Omnia à litharg. ad cro-

Medicamentum.

Caninum cerebrum.

Hybiscus.

Muscus. Conserua.

Historia.

Panathes.

oleum and

nada fieri

debent

teq

...

...

...

...

*Aegyptium
Androma-
chi.*

*Nigrum
Asclep.*

Moschionis.

*Signum
creti calli.*


cum in puluerem trita, & affusa conducuntur mortario, vt sit luti crassitudo: oleum, cera, bitumen in fabales pillulas diuisum nihil versando colliquantur: liquatis pix & resina ammiscuntur, colantur omnia, atque recoquuntur. Aegyptium Andromachi, eadem potest, mollior, ac maligna operit. Cera, lithargana vnc. 5. & semis, ammoniaci vnc. 7. & drach. 6. terebinth. vnc. 4. succidæ lanæ vsta, vnc. 2. & drach. 2. Aristolochiæ, thuris, squamarum æris & stomomatis, id est, perpurcati ferri ana vnc. 1. myrrhæ drach. 3. opopanacis drach. 2. ol. ricini, scyoni, vel antiqui lib. 3. litharg. oleo coquitur, dum concretat: squama inijcitur: vbi non inquinant, cera & ammoniac. exactissime tusum imponuntur: liquatis terebinthin. additur: sublatis igne thus, & lanarum cinis insperguntur: refrigerata manibus subiguntur. Nigrum Asclepiadæ mirabiliter vnit laxata & fracta. Litharg. vnc. 8. bituminis vnc. 6. ceræ, picis, ana vnc. 3. resinae piceæ sesquuncia, aluminis, propoleos ana vnc. 1. ammoniaci drach. 6. eruginis drach. 2. & semis. ol. quod sufficit. In oleo litharg. coquitur dum non contaminet: cera & bitumen seorsum liquefcunt, neque commouentur: his pix adiungitur: tracta colo omnia, lithargyro cocta vniuntur: ammoniacum vehementer tusum immittitur atque ita in solidum corpus omnia concoquuntur: hic præmollita cera & propoli. coniunguntur: vbi coierint probe & igne decesserint, alumen & ærugo in pollinem trita insperguntur: versantur omnia & oxycrato mersa manibus subiguntur. Moschionis ad eadem. Litharg. vnc. 3. picis aridæ, adipis vituli, ana vnc. 20. terebinth. mannae ana vnc. 10. ceræ vnc. 5. æruginis, opopanacis, galbani, ana vnc. 1. picis liquidæ, selibra: aceti, succi mororum, olei ricini ana lib. 1. litharg. oleo coquitur, vbi efferbuerit, adeps inijcitur: Iam non inquinantibus, cera & pix immittuntur, mororum succus cum pice liquida seorsum coquitur, cocta hæc alijs permiscuntur: Subdus igni manna & ærugo in puluerem resoluta insperguntur: opopanax, aceto fufus coniungitur: confectum pharmacum vino in tertium diem maceratur, & manibus pistum sedulo reponitur: vsus tempore thorulum madentem vino, vel fasciam superponere oportet. Alutæ intenditur vel duplo rosaceo dilutum non aliter quàm ceratum album in fascijs ac plagulis vsurpatur, nam & fracturas confert, vlcera coniungit & phlegmonæ aduersatur. Concreti calli signum est, quum iam sine vulnere exudar sanguis, qui lintea contaminet. Id ferè fit

criticis

- criticis diebus 14. & alijs. Conveniens callus est qui neque maior neque minor, durior aut mollior quam oportet, neque distortus est. Iustus callus confirmari debet medicamentis quæ *Conueniens callus.* *Quæ callum firman.* *Perfusio.* *Sparadrapū* *Call' maior* *Minor call'.* *Species fabris cum cibum non dnt,*
- ἐναίμα* vocant, quæque cruentis vulneribus adhibentur. Siccāt leniter, & callum mediocriter confirmant. Ac de enæmis multa capite de glutinantibus. Perfundunt vino quod *πεθαλασσομί-
νον* & *θαλάπιον* Græci, Latini salsum & marinum vocant, quod si deficit, sale m vino liquefcere oportet. Rosæ balaustia, myrta muscus ē quercu albus, absinthium & alia vino incoquuntur.
- 10 Addunt peroticis quæ callum contrahant bolum Armenum, galbulos cupressi & alia. Sed hic moderatio quædam adhibenda est: ne nimium stringendo callum supra modum atteras. Confirmant peron: Rosacei vnc. 4. resinæ vnc. 3. ceræ vnc. 2. colophon, mastiches, thuris ana semuncia, coni cupressi, radicis rubiæ maioris ana drach. 1. Melius fiet auctis emplasticis, minuto oleo & adiecto momento croci. Thuris, mastiches, picis, farinæ pistrinalis, boli Armeni ana vnc. 2. sepi arietini, ceræ albæ ana sēlibra: Liquefactis cera & sepo reliqua infriantur: In his lintheum sæpius, inculcarum fracturæ imponitur.
- 20 *Sparadrapū* vocant. Utuntur Apostolico, oxycroceo, & alijs. Atque hic meminisse oportet instituenda esse callosis corporibus quæ magis contrahant: mollioribus autem, quæ id mediocriter præsent. Callus maior extenuandus est: deducta parte alimenti & mutata qualitate. Diu leniterque affricanda pars est, ex oleo, sale, nitro: Eademque calida salia foueri debet, induci que malagmatis quæ discutiant. Colligandum arctius: olenbus vtendum & vomitu. Alterum membrum sinapismo linere oportet, vt eo diuertat alimentum. Paulus in recenti callo qui supercreuit vehementer stringentia instituit, arctiusque ligat, lamina plumbea interdum apposita. In eo verò qui iam vetustate induruit, & unde pudendum ac deforme membrum est, neque officium facit, cutem aperit, deradit peron, lacerat scalprio, terebra pertundit, & quantum superest execrat. Quod si nulla inde actio naturæ intercipitur neque conspicuus membri pudor est, nullus denique dolor, præstat abstinerere ferro. Qui verò infra modum crescit aut non crescit quidem suis terminis alia ratione promoueri debet. Idque contingit plurimum, cum nimis ac sæpius fouetur locus: parum conuenienter alligatur, sæpius & autē tempus fasciæ resoluuntur. Sæpe etiam in ratione vitæ peccatum est.
- 40 Omnia ergo commutanda in melius. Quod si atrophia totius corporis

corporis callus non prouenit, imprimis consulendum corpori. Sæpe etiam astrictioribus linteis, naturæ partis vitio membrum quasi syderatum ac marcidum gracile sit: hic affecto membro instauranda vita est, & laxanda deligatio. Id verò in dropace magna ex parte descriptum est, capite, de pyroticis. Extenuatum membrum vehementer iunat commoda deligatio, sed contrà quam in fracturis. Marcescente tibia femur superius alligamus, ab inguine ad genu deducta fascia: atque initio quidem arctior, paulatim relaxatur, vt communibus venis quasi riuis deorsum sanguis exprimatur: femore dextro cō-
Extenuato- rum mem- brorum in- stauratio. tabescente vel toto crure, sinistro femori fascias injicimus à ge-
Distortio cal- lus. nu ductis orbibus, astrictius quidem, qui cum desinant in inguine, hic etiam ita constringant, vt parte aliqua veluti diuerticulo, sanguis in gracile membrum deriuetur. Sit autem deligatio ea ratione temperata, quæ neque dolorem creet, neque vniuersum sanguinem ab incolumi membro reprimat: hoc enim alere frugalius, nutrire tamen statutum est. Eadem ratio in superioribus membris seruari debet. Distortus callus siquidem mollis est, laxante fotu & diaphoreticis exinaniri debet: fouetur tepida, hydrelæo, althææ & similibus decocto. Discutitur
Mollior & durior. arida sicu mixta stercori columbino. Sed de ijs generibus medicamentorum capite de resoluentibus abundè dictum prius est. Si verò occaluit, eadem quæ in supercrescente & inueterato paro, consilia sunt. Mollior astringentibus emplasticis firmari debet. At vix durior esse potest, nisi ea de causa fragilior sit: atque hic tota gignendi calli institutio sæpenumero repetenda est. Est quum è neruaceis partibus & ossibus muccosus humor cliquescit, puri similis, qui ferè in alto latet, nec facile discutitur: quanquàm laxata parte fusa incisaque materia conuenientibus pharmacis dissipari debet: alioqui factio vulne-
Muccosus humor abscedens. re repurgandus est. Atque is neglectus in scirrhum coit, qui præscriptis antè remedijs capite de malacis expugnari debet.
Scirrhus.

FINIS.



L V G D V N I,
Excudebant Stephanus Rufinus
& Ioannes Aufultus.